

Aufgabe 2:

(a) i. $E \leq Q$

Seien v, u Kodierungen für zwei Turingmaschinen.

Definition von $M_{u,v}$

- 1: **input** $x \in \{0, 1\}^*$
 - 2: Simuliere M_u auf Eingabe x
 - 3: Simuliere M_v auf Eingabe x
 - 4: Falls beide akzeptieren: **reject**
 - 5: Falls beide nicht akzeptieren: **reject**
 - 6: Sonst: **accept**
-

Definiere $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^* \# \{0, 1\}^*$ mittels $f(w) := v \# w$

Zu zeigen: $w \in E \iff f(w) \in Q$ für $w \in \{0, 1\}^*$

Definiere $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^* \# \{0, 1\}^*$ mittels $f(w) := v \# w$

Zu zeigen: $w \in E \iff f(w) \in Q$ für $w \in \{0, 1\}^*$

Zu \Rightarrow : Sei $w \in E$. Dann hält M_w auf keiner Eingabe. Also hält $M_{u,v}$ auf keinem $x \in \{0, 1\}^*$. Dann halten M_u und M_v entweder beide auf jedem x oder beide halten auf keinem. Also gilt $x \in T(M_u) \cap T(M_v)$ oder $x \notin T(M_u) \cap T(M_v)$ für jedes $x \in \{0, 1\}^*$. Es ist somit $T(M_u) = T(M_v)$, also $f(w) \in Q$ für jedes $x \in \{0, 1\}^*$.

Dann hält M_w auf keiner Eingabe. Also hält $M_{u,v}$ auf keinem $x \in \{0, 1\}^*$. Dann halten M_u und M_v entweder beide auf jedem x oder beide halten auf keinem. Also gilt $x \in T(M_u) \cap T(M_v)$ oder $x \notin T(M_u) \cap T(M_v)$ für jedes $x \in \{0, 1\}^*$. Es ist somit $T(M_u) = T(M_v)$, also $f(w) \in Q$ für jedes $x \in \{0, 1\}^*$.

Zu \Leftarrow : Sei $w \notin E$. Dann hält M_w auf mindestens einer Eingabe. Also $M_{u,w}$ für alle Eingaben. Dann akzeptiert jeweils nur eine der Turingmaschinen M_u und M_v für die Eingabe x . Es gilt also entweder $x \in T(M_u)$ und $x \notin T(M_v)$ oder anders herum. Also $T(M_u) \neq T(M_v)$ und somit $f(w) \notin Q$.

ii. $H_0 \leq U$

Sei u die Kodierung einer Turingmaschine M_u .

Definition von M'_u

- 1: **input** $x \in \{0, 1\}^*$
 - 2: Simuliere M_u auf leerer Eingabe.
 - 3: **accept**
-

Definiere $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ mittels $f(w) := w'$?

Zu zeigen: $w \in H_0 \iff f(w) \in U$ für $w \in \{0, 1\}^*$

Zu \Rightarrow : Sei $w \in H_0$. Dann hält M_w auf leerer Eingabe. Also hält M'_u auf jedem $x \in \{0, 1\}^*$.