内科学含诊断学 呼吸系统疾病


核心精讲·急性肺脓肿

（性感认识：空洞）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、吸入性肺脓肿（最常见）

1.厌氧菌等多见



右主支气管更粗短:吸入性肺脓肿好发于右肺
病理学继发性肺结核好发于右肺尖

2.好发于右肺：
①仰卧位：上叶后段或下叶背段（后背）
②坐位：下叶后基底段 重力原因
③右侧卧位：右上叶前段或后段

3.治疗 厌氧菌感染常合并需氧菌感染(消耗氧气有利于厌氧菌生存)

②①青霉素。但脆弱拟杆菌用甲硝唑+林可霉素类（脆弱的甲壳虫）　停药的指征看影像学

②疗程 6-8 周：空洞周围炎症吸收，空洞缩小消失、最后残留少量纤维条索影（停药）

细菌6-8周后呈指数生长 神奇的"6-8"


可能可能最可能：早期可能空洞并未形成,不能排除肺脓肿

①昏迷（如醉酒/脑卒中/麻醉/癫痫/药物过量）、鼻窦炎、牙槽脓肿等误吸病史

②高热、咳大量脓臭痰（之后体温可降低）、可咯血 厌氧菌-臭　咳痰(自行引流)-体温降低

③X 线早期大片边缘不清的浓密模糊浸润影，之后出现伴液气平的空洞

炎性渗出



小凯笔记自行整理

醉酒后相关疾病:吸入性肺脓肿、胰腺炎、前列腺增生、霍奇金淋巴瘤、痛风


二、血源性肺脓肿

具有丰富的层粘连蛋白受体　菌栓栓塞小血管

可能可能最可能：金葡菌多见，皮肤外伤、疖、痈、骨髓炎、右心心内膜炎等病史，双肺外野多发空洞及液气囊腔 ③

一个脓点　多个脓点

右心室→肺动脉　VS 吸入性肺脓肿单发



（1）检查：血培养

（2）治疗：苯唑西林或头孢呋辛

耐酶青霉素　一、二代头孢

金葡菌对青霉素往往耐药

血源性肺脓肿先全身问题,再到肺,所以痰量不多,咯血概率低

原发灶引起寒战高热

三、继发性肺脓肿

砖红色胶冻样痰

①金葡菌、克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌等肺炎 同个疾病的不同阶段

薄壁囊腔 癌性空洞 干酪样坏死

②支扩、肺癌、肺结核等继发感染 本身不导致肺脓肿形成

③支气管异物阻塞（尤其 ttsx 小儿）

④邻近病变（如阿米巴肝脓肿累及右肺下叶）

---

① 理顺知识点：
鼻、口腔中常见的定植菌是厌氧菌,故吸入性肺脓肿以厌氧菌更多见。

② 理顺知识点：
大多数厌氧菌,对多数抗生素均敏感,即针对厌氧菌不一定都要选择甲硝唑。
青霉素对多数厌氧菌敏感,其机制为:因厌氧菌常合并需氧菌感染,需氧菌消耗了氧气,创建了局部的缺氧环境,有利于厌氧菌的生存。而青霉素对需氧菌同样有效,可破坏局部缺氧环境的形成,更好的消灭厌氧菌。

③ 理顺可能可能最可能：
金葡菌、肿瘤等具有层粘连蛋白受体,易侵犯血管,造成血行播散。因此血源性肺脓肿多见于金葡菌。
皮肤表面金葡菌较多,皮肤出现外伤时,也易发生金葡菌感染。

细菌是不溶于循环血液的,可形成菌栓(即栓子的一种)。当其随肺动脉血液移动到肺部外周的小血管时,菌栓无法通过,即可形成栓塞。
故血源性肺脓肿好发于双肺外野。

串联外科：
金葡菌感染,易致寒战高热、皮疹、心肌炎,形成迁徙性/转移性脓肿内(特征)。
即"脓热疹心金"

真题解析·急性肺脓肿

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N63 A 急性肺脓肿停用抗菌药物治疗的指征是
看影像学
A.血白细胞正常
B.痰恶臭味消失
C.体温正常
D.胸片示脓腔消失

2.2021N44 A 血源性肺脓肿最常见的致病菌是
A.厌氧菌
B.金黄色葡萄球菌
C.铜绿假单胞菌
D.军团菌

以题带动
知识点复习

思维导图·急性肺脓肿

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-2 D B