内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·肠易激综合征

（性感认识：功能性疾病）


核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、发病机制 ①

内脏高敏感性（核心）、胃肠动力异常、肠道免疫激活（感染等引起）、肠道微生态失衡、精神心理障碍（脑-肠轴）等共同作用引起肠-脑互动异常（你敏感肠道跟着你敏感、你紧张肠道跟着你紧张）

精神因素可以是急性胃炎的病因、肠易激综合征的病因、十二指肠溃疡的诱因

二、临床表现 ②



1.青壮年多见，慢性病程

①腹痛部位不定，多为下腹和左下腹痛，肠道发生痉挛 **极少在睡眠中痛醒** 疼痛不足以影响睡眠

可能因神经心理障碍导致睡眠差，因此睡眠差不能排除肠易激综合征

②粪便**可有黏液、但绝无脓血**

③排便不净感，排便排气后可缓解

④多无明显体征

2.分型

①便秘型：＞1/4 的排便为 1 或 2 型、且＜1/4 的排便为 6 或 7 型

②腹泻型：＞1/4 的排便为 6 或 7 型、且＜1/4 的排便为 1 或 2 型

③混合型：＞1/4 的排便为 1 或 2 型、且＞1/4 的排便为 6 或 7 型

④不定型




图 4-10-1　粪便性状量表

一般：消化系统疾病腹泻出现体重↓无特异性

特殊：肠易激综合征腹泻，体重却无明显变化

可能可能最可能：粪便**可有黏液但绝无脓血**、**焦虑**等使症状加重、体重无明显变化

功能性疾病

三、诊断标准

①反复发作的腹痛、腹胀和腹部不适与排便相关，伴粪便性状和/或排便频率改变

③ ②症状至少 6 个月、近 3 个月症状符合诊断标准

③常规检查包括**结肠镜未发现**可解释症状的器质性、系统性、代谢性疾病的证据

四、治疗 区别于维拉帕米、硝苯地平，匹维溴铵用于消化道

解痉止痛 （尔嗅俺丁）	①肠道平滑肌解痉剂：**匹维溴铵**、奥替溴铵、**曲美布汀**、阿尔维林 ②抗胆碱药（短期用）属于CCB，平滑肌收缩需要Ca^{2+}→现在被拮抗了→解痉
止泻 （luo nuo tuo tan）	①阿片受体激动剂：**洛哌丁胺**、地芬诺酯 吗啡可以止泻 ②吸附剂：**蒙脱石散**、药用炭
缓解便秘 （秒变蠢驴）	①渗透性泻剂：**聚乙二醇** 开塞露 ②促分泌剂：鸟苷酸环化酶激动剂、Cl^-通道激动剂
调节内脏感觉 前三组无效才选	①鸟苷酸环化酶激动剂 ②神经递质调节剂：5-HT 再摄取抑制剂、**三环类抗抑郁药阿米替林** 抑制了突触前膜再摄取递质 VS 利血平：抑制囊泡再摄取递质
调节肠道炎症和菌群失调	①肠道不吸收的**抗生素**：**利福昔明**（短期用） ②**益生菌**：双歧杆菌、乳酸杆菌

① 理顺知识点：

肠易激综合征IBS不属于感染性疾病，但与感染相关。因感染会导致菌群紊乱，进而导致机体对肠道中滞留的细菌易发一些异常的免疫反应，进而加重疾病的发生发展。

VS 炎症性肠病IBD也不是感染性疾病，是免疫失衡损伤肠粘膜后，肠粘膜出现的持续性慢性炎症，故抗生素对炎症性肠病无效，但可因抗感染控制病情不恶化。

② 理顺临床表现：

肠易激综合征IBS患者的腹痛较轻，不会出现睡眠时被痛醒的情况，但是肠易激综合征IBS患者常有精神紧张、焦虑的问题，即精神因素可以是肠易激综合征的病因，而此时焦虑、失眠会导致患者睡眠不佳。

③ 理顺检查手段：

肠易激综合征属于功能性疾病，诊断功能性疾病时，辅助检查的主要目的是排除器质性性疾病。（同理，心脏神经官能症患者辅助检查的目的也是为排除器质性疾病）

即诊断肠易激综合征IBS时，需结肠镜未发现可解释症状的器质性、系统性、代谢性疾病的证据。

补充：

钙卫蛋白主要是一种反映“炎症”的指标，临床上最常用于粪便检查，可用来判断肠道里到底有没有“实质性”的炎症，即可区分肠易激综合征和炎症性肠病。

如炎症性肠病患者的粪便中钙卫蛋白含量升高，且可评估炎症的严重程度，即数值越高，说明炎症性肠病的病情活动性越明显，药物治疗效果一般。

真题解析·肠易激综合征

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

第一反应:肠易激综合征

1. 2016N68 A 男性，45 岁。腹痛、腹泻 5 年，发作时排便 2-4 次/日，排粘液便，无脓血，排便后可缓解，因再发 1 周来诊。查体：腹软，左下腹压痛。化验粪常规：WBC(-)，RBC(-)。该患者最可能的诊断是
A.克罗恩病
B.细菌性痢疾
C.溃疡性结肠炎
D.肠易激综合征

2. 2018N79-81 A 男性，32 岁，间断发作下腹痛、腹胀伴腹泻或便秘 3 年余，下腹痛不重，多于便后可缓解，粪便常有粘液，无脓血，近 3 周再次发作下腹痛伴腹泻，大便 2-4 次/天，粪便性状与之前相同，体格检查除下腹轻度压痛外，未见其余异常。粪便常规、隐血及培养均未发现明显异常。
79.该患者最可能的诊断是
A.肠结核
B.克罗恩病
C.肠易激综合征
D.溃疡性结肠炎
80.为明确诊断，最有意义的检查是
A.PPD 试验
B.腹部 B 超
C.钡剂灌肠
D.结肠镜 排除器质性病变
81.此时可选择的治疗是
A.口服抗结核药
B.口服柳氮磺胺吡啶
C.口服匹维溴铵 胃肠道的解痉剂
D.口服布地奈德

3. 2025N130-131 B
A.腹痛-黏液脓血便-缓解
B.腹痛-黏液便-缓解
C.腹痛-果酱样便-缓解 阿米巴、肠套叠
D.腹痛-黏液脓血便-加重
溃疡性结肠炎的临床特点是
肠易激综合征的临床特点是

以题带动
知识点复习

答案:1-3 D CDC AB

专题串联·需要内镜确诊（并可活检）的消化系统疾病

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

食管癌

食管胃底静脉曲张：红色征可考虑预防性断流术 胃镜确诊

反流性食管炎（但胃食管反流病金标准：食管反流监测如电阻抗-pH 监测）

胃镜看到食管黏膜破损,洛杉矶LA分级(我气我)　　非糜烂性胃食管反流病:食管反流监测提示存在客观反流证据、质子泵抑制剂PPI试验性治疗有效

急性胃炎 NSAIDs引起,胃镜诊断+止血

慢性胃炎：萎缩性胃炎可见黏膜变薄、皱襞稀疏平坦、黏膜下血管透见、腺体变小减少、肠上皮和假幽门腺化生

消化性溃疡，**消化性溃疡并发出血、幽门梗阻、癌变** 穿孔用X线

胃癌

A型胃炎:查壁细胞和内因子的抗体,查VitB12
B型胃炎:查幽门螺旋杆菌

肠结核：好发于回盲部的环/横形 ttsx 溃疡或肿块，干酪肉芽肿、抗酸杆菌

克罗恩病：好发于回肠末端及邻近结肠，节段/跳跃性，纵行裂隙状溃疡、鹅卵石/铺路石样、非干酪肉芽肿

溃疡性结肠炎：好发于直肠和乙状结肠，连续/弥漫性，浅溃疡

肠易激综合征（结肠镜排除器质性病变）

大肠癌 首选:直肠指检

判断消化道出血病因和止血等

消化性溃疡
出血休克:补充血容量
活动性动脉出血:PPI+内镜
裸露血管:PPI+内镜下治疗
血凝块:PPI,必要下用内镜治疗
溃疡不伴血迹:PPI

思维导图·肠易激综合征（含消化系统内镜小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

