内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·心脏骤停（内科+外科）

（性感认识：C→A→B）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、心脏性猝死

1.原因

①最常见：**冠心病**及其并发症

②<35 岁：**肥厚型梗阻性心肌病（最常见）**、致心律失常性右室心肌病、离子通道病（如长 QT 间期综合征、Brugada 综合征）胖胖又买 QB

2.心脏骤停时**室颤最常见**。**无脉性室速**可在短时间内迅速恶化为室颤、可以和室颤同等对待 也需要进行电除颤



二、心肺脑复苏（心脏骤停抢救成功的关键）

1.**胸外按压**（circulation,**C**）→**开通气道**（airway,**A**）→**人工呼吸**（breathing,**B**）

①按压部位：胸骨下 1/2、剑突上 4-5cm（双乳头连线中点）

②按压幅度：**5-6**cm

③按压频率：**100-120** 次/分

④通气频率：10 次/分

⑤按压与放松时间比：1:1

⑥按压与通气比：**30:2**

⑦头后仰、抬起下颏以防止舌后坠，捏闭 ttsx 鼻孔

⑧**无**需深吸气，吹气持续＞1s 以确保胸廓起伏

容易导致气道压力过高

2.电除颤首次能量：**单相波 360J**、双相波 120-200J

3.**静脉**注射**肾上腺素** 强心




图 3-11-1　胸外按压

A. 操作者肩部正对病人胸骨上方，肘部保持不动；B. 先确定按压部位，然后正确摆放手的位置。




图 17-2　仰头抬颏法

（1）头后仰　（2）提起下颌



图 3-11-2　口对口人工呼吸

① 理顺心源性猝死：

心源性猝死SCD是指急性症状发作后1小时内发生的以意识突然丧失为特征的、由心脏原因引起的自然死亡，患者此时无论是否有心脏病，其死亡的时间和形式无法预料。故其病因多样，包括患者自身疾病，如心源性疾病、非心源性疾病、疾病终末期等，此外还有外部因素，如创伤、溺水、自杀等，其中心源性疾病为主要病因。

即绝大多数心源性猝死SCD发生在有器质性心脏病的病人，最常见冠心病及其并发症患者，如心肌梗死后LVEF降低是SCD的主要危险因素；

而在冠心病易患年龄前（即<35岁）时，SCD多见于心肌病患者（如肥心病HCM是最常见的、致心律失常性右心室心肌病）、离子通道病（如长QT间期综合征、Brugada综合征等），即“胖胖又买Q币”。

② 理顺电除颤：

心脏骤停时最常见的心率失常是室颤，及时的胸外按压和人工呼吸虽可部分维持心脑功能，但极少能将室颤转为窦性心律，而迅速恢复有效的心律是复苏成功至关重要的一步。

终止室颤最有效的办法是电除颤，且每延迟除颤1分钟，复苏成功率下降7~10%，故尽早除颤可显著提高复苏率。但值得注意的是，心脏停搏和无脉电活动时电除颤均无用。

若采用单相波除颤仪，首次能量应选择360J，若采用双相波除颤仪，一般为120~200J。第二次及后续的除颤能量应相当，而且可考虑提高能量。一次除颤后，立即实施胸外按压和人工通气。五个周期的CRP后，再评估病人自主循环是否恢复或有无明显循环恢复征象（如呼吸、脉搏、血压等），必要时再次除颤。




图 3-11-3　室颤处理步骤

真题解析 • 心脏骤停（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1. 2019N49 A 正确的心肺复苏程序为
   A.A-B-C
   B.C-B-A
   C.B-A-C
   D.C-A-B

2. 2019N155 X 在冠心病好发年龄前（＜35 岁），心源性猝死的原因有
   A.Brugada 综合征
   B.肥厚型梗阻性心肌病
   C.长 QT 间期综合征
   D.X 综合征 微循环问题

3. 2025N49 A 关于心脏骤停的初级心肺复苏，不正确的是
   A.首选心内注射给药 静脉推肾上腺素
   B.人工胸外按压
   C.开通气道
   D.人工呼吸

思维导图 • 心脏骤停（内科+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

以题带动 知识点复习

微信搜一搜 天天师兄

答案:1-3 D ABC A