核心精讲

运动系统慢性损伤

性感认识：把握一般治疗原则

一、一般治疗原则

外科　运动系统慢性损伤&手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤1
00:01:20--00:02:23

①临床观察、理疗

②NSAIDs：单独用、短期间断用，用选择性COX-2抑制剂塞来昔布、美洛昔康以减少胃黏膜损害

③糖皮质激素：不能多次用

④手术

二、粘连性肩关节囊炎

外科　运动系统慢性损伤&手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤1
00:02:23--00:06:55

①女性多见、左侧多见，肩关节外旋外展（梳头发）、内旋后伸（挠后背痒痒）　疼痛和受限

②软组织退变→MRI诊断和鉴别诊断

③6-24个月可自愈，每日做肩关节主动活动、不能三角巾悬吊固定（区别于肩关节脱位）

④无效可行关节镜松解术









图 67-18　粘连性肩关节囊炎时的外展姿势实为躯干代偿侧弯



「理顺知识点」


- MRI 对软组织分辨率高，适合观察脊髓、神经、韧带、半月板等软组织结构
- 粘连性肩关节囊炎属于自限性疾病
- 粘连性肩关节囊炎：肩部疼痛→运动减少→三角肌废用性萎缩→加重粘连性肩关节囊

三、肱骨外上髁炎（网球肘）

外科　运动系统慢性损伤&手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤1
00:06:55--00:09:53

①肘关节外侧痛、Mills征（别动碗里的蜜汁肘子）

②限制腕关节活动（waiwangwan）








图 67-16　肱骨外上髁炎压痛部位



图 67-17　前臂伸肌牵拉试验（Mills 征）


四、狭窄性腱鞘炎


外科　运动系统慢性损伤&手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤1
00:06:55--00:09:53

①弹响指/扳机指、痛性结节、Finkelstein征（Fingersting）

②限制活动→NSAIDs→注射激素（至腱鞘邻近的骨膜）

③无效可行腱鞘切开减压术









图 67-12　屈指肌腱的骨-纤维隧道示意图








图 67-13　弹响指发生机制示意图
(1)正常肌腱和腱鞘　(2)发病后肌腱呈葫芦形肿大，腱鞘肿胀　(3)手指主动屈曲时，远侧膨大挤过狭窄的腱鞘，发生弹响　(4)手指伸直时也同样发生弹响










图 67-14　握拳尺偏试验(Finkelstein 试验)



图 67-15　弹响指术中所见

五、髌骨软骨软化症

外科　运动系统慢性损伤&手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤1
00:14:48--00:20:00

①限制膝关节剧烈活动

②关节内注射玻璃酸钠/透明质酸钠，慎用激素（不利软骨修复）

六、胫骨结节骨软骨病

①X线胫骨结节骨骺增大、致密或碎裂

②18岁后症状即消失（但局部隆起不会改变）

③不宜注射激素（骨骺难以注入）

髌软软和胫骨骨相敬如宾不GC




图 67-6　胫骨结节骨软骨病
骨骺撕裂，密度增高，软组织肿胀。

七、股骨头骨软骨病

①逐渐加重的髋部疼痛、摇摆式跛行、髋关节屈曲挛缩试验/Thomas征

②ECT有早期诊断意义

③治疗关键时期：血供重建期

真题解析·运动系统慢性损伤

外科　运动系统慢性损伤&手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤1
00:20:00--00:35:25

1.2016N180X严重腰肌劳损时可采用的治疗方案有

A.物理治疗

B.卧床休息，活动时使用腰托

C.联合使用两种非甾体抗炎药

D.压痛点行激素封闭治疗

2.2017N165X以下关于肩周炎的治疗方法中，可以采用的有

A.临床观察

B.物理治疗

C.三角巾悬吊固定

D.关节镜松解术

3.2019N67A女性，49岁。右肩痛，右上肢上举、外展受限8个月，无肩周红、肿、热，疼痛可向右侧颈、耳、前臂及手放射。X线示：右肩关节间隙变窄，软骨下骨囊性变，关节边缘骨质增生。最可能的诊断是

A.肩关节骨关节炎

B.类风湿关节炎

C.粘连性肩关节囊炎

D.肩袖损伤

　答案：1-3 ABD ABD A

4.2020N165X关于粘连性肩关节囊炎，正确的描述有

A.最主要的激发因素是肩部急性挫伤

B.颈椎病可诱发本病

C.本病有自限性

D.肩盂肱关节囊粘连、僵硬，致肩关节痛和活动受限

5.2021N106−107A女性，50岁。右手中指晨起僵硬伴疼痛半年，近2周出现中指关节轻度肿胀及活动受限，活动患指可出现弹响伴明显疼痛。

106.最可能的临床诊断是

A.类风湿关节炎

B.骨关节炎

C.狭窄性腱鞘炎

D.关节内游离体

107.目前最正确的治疗是

A.腱鞘切开减压

B.限制中指运动

C.口服糖皮质激素

D.反复按摩患处

6.2025N106−107A女性，58岁。右拇指根部晨起僵硬伴疼痛半年，反复发作，未治疗。近1周出现右拇指疼痛加重，第一掌指关节轻度肿胀及活动受限，局部压痛明显，屈指可出现弹响。


106.最可能的诊断是

A.类风湿关节炎

B.狭窄性腱鞘炎

C.风湿性关节炎

D.骨关节炎



107.下列处理方法中，目前不考虑的是

A.局部制动

B.应用非甾体抗炎药

C.局部激素注射

D.腱鞘切开减压

 答案：4−6 BCD CB BD

粘连性肩关节囊炎	50岁左右多见，肩关节活动受限、疼痛（症状向远端多不超过肘关节） X线肩关节结构正常或骨质疏松（软组织退变、依靠MRI诊断）
神经根型颈椎病	颈肩痛+上肢放射痛，上肢麻木、无力、Eaton和Spurling征 X线椎间隙狭窄、骨质增生（椎间盘退变）
原发性骨关节炎	中老年人，大关节和远端指间关节多见 X线关节间隙变窄、软骨下骨硬化和囊变、关节边缘骨质增生（关节软骨退变）
强直性脊柱炎	青壮年男性多见，骶髂关节、脊柱、大关节多见 骶髂关节变窄融合、竹节椎
类风湿关节炎	青壮年女性多见，腕关节、掌指关节、近端指间关节多见 明显晨僵，多发、对称性
肩袖损伤	落臂征、疼痛弧