核心精讲

非化脓性关节炎

性感认识：滚动复习很重要

一、原发性骨关节炎

外科 骨与关节感染2&非化脓性关节炎&骨肿瘤
00:27:06–00:35:55

①遗传和体质（如体重增加）

vs 类风湿关节炎：好发于腕关节、掌指关节、近端指间关节

②中老年的单侧膝、髋、脊柱、远端指间关节多见


③疼痛、骨擦音/感、膝内翻、方形手、Heberden 结节（远端指间关节）、Bouchard 结节（近端指间关节）（方脑壳哈 ber、HB 按字母表顺序记）


④关节软骨退变：软骨下骨硬化和囊变、非对称关节间隙/椎间隙狭窄、边缘骨质增生形成骨赘（硬碰硬）


⑤非药物→NSAIDs、关节腔注射透明质酸钠→手术（关节镜清理术、关节力线矫正术如胫骨高位或腓骨近端截骨术、人工关节置换术–关节明显畸形者）


「理顺知识点」

- 体重增加→整个下肢如膝关节承受很大的重量→膝关节软骨经常性摩擦、磨损→退变→原发性骨关节炎（关节本身没问题）
- 继发性骨关节炎：关节本身有问题，eg. 股骨头坏死 IV 期/股骨头脱位期可继发骨关节炎
- 方形手：局部发生骨质增生
- 关节软骨磨损不均匀→非对称关节间隙/椎间隙狭窄
















图 72-2　膝关节骨关节炎的 X 线表现

图 72-3　膝关节骨关节炎行人工全膝关节置换术后 X 线表现




图 72-4　髋关节骨关节炎行人工全髋关节置换术前后 X 线表现

二、强直性脊柱炎

外科 骨与关节感染2&非化脓性关节炎&骨肿瘤 00:35:55-00:42:06

附着点炎（富强）	粘在一起了
病变从骶髂关节开始 向上蔓延至脊柱 可同时向下蔓延至髋关节、膝关节较少累及手关节（竹节伦能弹钢琴）	有少数强直性脊柱炎病变始自颈椎，逐渐向下波及胸腰椎易致上肢瘫痪和呼吸困难（预后差），称为 Bechterew 病（B 在字母表排前面）
骶髂关节影像学是诊断关键MRI 能早期诊断（核磁/直）	骶髂关节变窄、融合 脊柱呈竹节椎
慢性腰背痛，驼背畸形，4 字试验 Schober 征（削脖、看不到头了） HLA-B_{27}	为你弹奏（驼背的样子）肖邦（Schober 征）的夜曲（休息后加重）纪念我死（4 字试验）去的爱情（HLA-B_{27}）
治疗	非药物→NSAIDs、DMARDs→手术（脊柱截骨矫形术、关节置换术）

「串联」

- 4 字试验：股内收肌损伤、股骨头坏死、髋关节结核、强直性脊柱炎（4 字是姑姑的盒子）

「理顺知识点」

- 强直性脊柱炎与类风湿治疗的区别：类风湿可用GC，强直性脊柱炎是骶髂关节问题，是脊柱问题中轴病变，GC对中轴病变治疗效果非常差，故不用





图 72-5　强直性脊柱炎驼背畸形






图 72-6　MRI 示脊柱呈竹节样改变



图 72-7　X 线片示髋关节呈骨性强直

专题串联

非化脓性关节炎鉴别诊断

外科 骨与关节感染2&非化脓性关节炎&骨肿瘤
00:42:06−00:46:20

	原发性骨关节炎	类风湿关节炎
病变始于	软骨	滑膜
好发年龄	中老年	青年
晨僵	多＜30 分钟	多≥半小时（内科）、≥1 小时（外科）
好发部位	膝、髋、脊柱、远端指间关节，单侧为主	腕、掌指、近端指间关节，多发、对称
手部畸形	方形手、Heberden 结节、Bouchard 结节	天鹅颈样、纽扣花样、手关节尺侧偏斜
治疗	NSAIDs、透明质酸钠，手术	同服 NSAIDs 或糖皮质激素+DMARDs，手术

「理顺知识点」
- 骨关节炎使用GC不利于软骨，故不主张使用

强直性脊柱炎	类风湿关节炎
男青年多见	女青年多见
大关节多见	小关节多见
HLA−B_{27}	CCP、RF
休息后加重、活动后减轻 （类风湿的晨僵明显而持久；竹节伦穿海澜之家（男人的衣柜）不停开演唱会、因为休息后会加重）	
非药物→NSAIDs、DMARDs→手术 糖皮质激素对中轴关节病变无效	同服 NSAIDs 或糖皮质激素+DMARDs 如甲氨蝶呤 手术

注意：

原发性骨关节炎病变始于软骨

类风湿关节炎病变始于滑膜

强直性脊柱炎病变始于骶髂关节

血友病关节炎病变始于关节内

出血股骨头坏死病变始于骨

「串联」
- 血友病（遗传性缺乏凝血因子 8、9、11）等凝血障碍性疾病以手术或外伤后渗血不止、脐带出血、肌肉血肿、关节出血、内脏出血多见（深）机关枪jiyiqi

真题解析 · 非化脓性关节炎

外科 骨与关节感染2&非化脓性关节炎&骨肿瘤
00:46:20−00:51:03

1. 2012N118−120 A　男性，18 岁。近一年反复腰部疼痛，活动受限。近两月来又出现双髋疼痛，轻度屈曲畸形，需拄拐行走。X 线检查显示：双侧骶髂关节面模糊，双侧股骨头表面毛糙，髋关节间隙变窄。

118.该患者最可能的诊断是

A.骨关节结核

B.强直性脊柱炎

C.类风湿关节炎

D.双侧股骨头缺血性坏死 GC地易建联

119.以下检查中，对该患者明确诊断帮助最大的是

A.ESR、RF、骶髂关节 CT

B.ESR、HLA−B27 、骶髂关节 CT

C.ESR、RF、双髋关节 MRI

D.ESR、HLA−B27，双髋关节 MRI

120.患者所患疾病较少累及的部位是

A.脊柱

B.髋关节

C.膝关节

D.手关节

2. 2014N180 X　引起继发性骨关节炎的常见原因有 关节自己问题

A.先天性关节结构异常

B.后天性关节面不平整

C.体重超重者，下肢关节过于承重劳损

D.关节不稳定

3. 2015N149−150 B

A.脊柱结核 破坏+狭窄

B.强直性脊柱炎

C.脊柱恶性肿瘤

D.退行性脊柱骨关节病

X 线示骨破坏和椎间隙狭窄，常见于

X 线示“竹节样”改变，常见于

　答案：1−3 BBD ABD AB

4. 2023N165 X　不属于骨关节炎导致的畸形变有

A.杵状指 硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎

B.Heberden 结节

C.手指向尺侧偏斜 类风湿

D.天鹅颈样畸形 类风湿

　答案：4 ACD