真题解析 · 感染

外科 感染2&围术期
00:00:00-00:12:38

1. 2014N77 A　中指脓性指头炎如治疗不及时，最易发生的并发症是

A.败血症

B.掌中间隙感染

C.末节指骨缺血坏死 肿痛明显时：及时切开引流，否则易致末节指骨缺血坏死、骨髓炎

D.化脓性腱鞘炎

2. 2014N178 X　以下选项中，需早期切开、清创引流的有

A.破伤风

B.气性坏疽

C.蜂窝织炎 颌下蜂窝织炎早期切开

D.寒性脓肿 仅寒性脓肿有混合感染、全身中毒症状明显者可考虑寒性脓肿切开引流

「理顺知识点」

- 抓规律：常规波动感形成后再切开引流，如甲沟炎、蜂窝织炎、急性乳腺炎
  记特殊：破伤风、气性坏疽重在预防，早期切开引流；颌下蜂窝织炎早期切开引流；手部化脓性感染除甲沟炎以外肿痛明显时切开引流

3. 2017N97-99 A　男性，28 岁，足底铁钉刺伤后两天，乏力，张口困难，继之苦笑面容，角弓反张，声响可诱发上述症状，神志清楚，无发热。

97.引起该患者上述症状的致病菌为

A.大肠埃希菌

B.厌氧芽胞杆菌

C.变形杆菌

D.产气荚膜杆菌

98.对该伤口的处置应用

A.高浓度抗生素

B.过氧化氢溶液 痒死你

C.高锰酸钾溶液

D.生理盐水

99.治疗过程中，不需要使用的药物是

A.TAT

B.丙种球蛋白 ITP 的急症治疗、一线治疗

C.甲硝唑

D.青霉素

　答案：1-3 C AB BBB

4. 2018N163 X　真菌败血症的临床表现有 结膜淤斑、视网膜淤斑

A.突发寒战、高热 败血症共有

B.多伴有消化道出血

C.神志淡漠、昏迷、休克 败血症共有

D.外周血有类白血病反应 败血症共有

真菌感染：长期使用免疫抑制剂、广谱抗生素、真菌的二重感染、留置静脉导管过久、免疫低下

5. 2019N161 X　丹毒的临床特点有

A.主要致病菌为乙型溶血性链球菌

B.口腔溃疡可以是诱发因素

C.很少发生组织坏死

D.必要时可切开引流 无需切开引流

6. 2020N163 X　丹毒的临床特点有

A.β－溶血性链球菌为主要致病菌

B. 口腔溃疡可以是诱发因素

C.反复发作可发生组织坏死 非化脓性炎

D.治愈后易复发

7. 2024N59 A　下列有关破伤风的叙述，正确的是

A.最早出现颈部肌肉强烈收缩 张口困难牙关紧闭→苦笑面容→角弓反张→呼吸困难窒息

B.光线不能诱发全身肌肉痉挛

C.发作时神志不清

D.可出现尿潴留 膀胱括约肌痉挛

8. 2025N59 A　下列抗菌药物应用原则的叙述，错误的是

A.严重感染可联合用药

B.轻症感染可口服给药

C.能单一用药者不必联合用药

D.体温正常即可停药

烧伤：感染控制后及时停药

肺炎链球菌肺炎：退热三天后停药

吸入性肺脓肿：影像学空洞消失停药

　答案：4−8 ACD ABC ABD D D