核心精讲·感染性心内膜炎 ①

就是感染了心瓣膜

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

② 感染性心内膜炎主要累及**二尖瓣+主动脉瓣**

	急性	亚急性
致病菌	**金葡菌（最多见）**、溶血性链球菌、肺炎链球菌等毒力较**强**的化脓菌	**草绿色链球菌**等毒力较**弱** 小草很弱 ttsx
病变部位	正常心瓣膜即可侵犯	**病变心瓣膜（如风湿病）**
赘生物	**易脱落**形成栓子→**败血性/感染性梗死** （**含菌**）→会产生代谢物→赘生物松软 组织缺血缺氧坏死 ③	**易脱落**形成栓子→**无菌性梗死** （栓塞最多见于**脑**）脑袋血流丰富 ④ “逃”：脱落后细菌就被干掉了
受累瓣膜	瓣膜穿孔等	瓣膜变形等
变态反应	肾小球肾炎和 Osler 小结少见	肾小球肾炎和 Osler 小结多见

免疫反应




图 9-25　细菌性心内膜炎
主动脉瓣上可见体积较大的鸡冠状赘生物。



形成抗原抗体需要时间

栓塞：不溶于循环血液的物质（不一定就是血栓）即栓子，随血液循环阻塞直径小的血管

真题解析·感染性心内膜炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2020N35 A 风湿性心脏瓣膜病并发亚急性感染性心内膜炎的主要病原体是
与溶血性链球菌有关　草绿色链球菌毒力弱，只能侵犯已病变的心瓣膜（如风湿病导致的瓣膜病）
A.A 群溶血性链球菌
B.草绿色链球菌
C.金黄色葡萄球菌
D.肺炎链球菌

以题带动
知识点复习

思维导图·感染性心内膜炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1 B

① 感染性心内膜炎IE是由病原微生物经血行途径直接侵袭心内膜，特别是心瓣膜而引起的炎症性疾病，常伴有赘生物的形成。常见病原体为链球菌。

串联：
根据感染瓣膜类型，可分为自体瓣膜心内膜炎（最常累及二尖瓣和主动脉瓣，联合损害）、人工瓣膜心内膜炎（肠球菌和葡萄球菌是经导管人工瓣膜心内膜炎最常见的致病菌　“人工尝葡萄”）

② 理顺知识点：
感染性心内膜炎更多见于左心，压力大血流急容易产生细菌的沉积，而左心脱落的栓子进入体循环，如果赘生物在三尖瓣，则栓塞最多见于肺动脉。

③ 急性感染性心内膜炎主要是由致病力强的化脓菌（如金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌和肺炎链球菌等）引起，在受累的心瓣膜上形成赘生物，赘生物主要由脓性渗出物、血栓、坏死组织和大量细菌菌落混合而成，体积庞大、质地松软、呈灰黄或浅绿色。破碎后形成含菌性栓子，可引起心、脑、肾、脾等器官的感染性梗死和脓肿。

亚急性感染性心内膜炎主要由独立相对较弱的甲型溶血性链球菌所引起，病原体可治感染灶入血形成菌血症，随血液侵入瓣膜，常在有病变的瓣膜上形成赘生物（“小草很弱”），赘生物呈息肉状或菜花状，质地脆，易破碎、脱落，光镜下赘生物由血小板、纤维蛋白、细菌菌落、坏死组织、中性粒细胞组成，溃疡底部可见肉芽组织增生，淋巴细胞和单核细胞浸润。

④ 理顺知识点：
左心的压力更大，血流更急，细菌更易出现沉积，感染性心内膜炎多发生于血流压力差较大的部位。故左心较为多见。

左心瓣膜为二尖瓣和主动脉瓣，若赘生物在二尖瓣，一旦赘生物脱落，则进入左心室。左心室收缩射血，则赘生物进入主动脉，随血液循环进入脑、肾脏、四肢等，其中脑血流量最丰富，故脑栓塞最常见。

但常见于左心，不代表右心不发生感染性心内膜炎，即赘生物同样可以出现在三尖瓣。此时赘生物脱落进入右心室，随肺循环进入肺动脉，造成肺动脉栓塞。