

核心精讲·其它传染病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、中枢神经系统感染性疾病

	流行性脑脊髓膜炎	流行性乙型脑炎
致病微生物	① 脑膜炎双球菌 G-球菌	乙脑病毒 人畜通吃
传播	冬春季多见，经飞沫呼吸道传播	夏秋季多见，蚊子是重要媒介
炎症类型	**软脑膜、软脊膜的化脓性炎**（中性粒细胞渗出为主）流脑流脓	② **中枢神经系统的变质性炎**变异（累及脑实质）（**大脑皮质、基底核、视丘**等）位置靠上的部位 上重下轻
病理变化	**蛛网膜下腔大量脓性渗出物（中性粒细胞为主）**、血管扩张充血 局部症状轻，全身症状严重 注意：急性暴发性流脑脑膜炎较**轻**，主要为广泛出血和循环衰竭 内毒素大量入血 ③ 	①**筛状软化灶（特征）**脑液化性坏死—脑软化（富含磷脂）VS 病毒性肝炎也是变质性炎 结核性脑膜炎以脑底多见 ②血管周围 ttsx **淋巴细胞套** 继发性肺结核：上重下轻，上旧下新 ③星形胶质细胞增生及**胶质纤维瘢痕**（机械强度较成纤维细胞产生的胶质瘢痕弱） ④**小胶质**细胞增生及**结节**形成 ④ ⑤**噬神经细胞**现象（**小胶质细胞**（单核巨噬细胞）小吃），小胶质细胞吞噬神经组织崩解产物后、胞质出现大量脂质、HE 染色空泡状，称为**格子细胞或泡沫细胞** VS AS的泡沫细胞（单核巨噬细胞/SMC吞噬脂类） ⑥**卫星**现象（**少突胶质细胞**突围） AS:脑部血管主要大鸡娃受累 ttsx 变质大鸡屎、筛状软化灶、血管淋巴套、星巴小姐姐、噬神经卫星
其它	脑膜刺激征、脑神经麻痹更严重 主要累及脑膜	颅内高压更严重 主要累及脑实质






图 16-14　流行性乙型脑炎淋巴细胞套
以淋巴细胞为主的渗出环绕脑组织血管周围呈袖套状外观。




图 16-6　卫星现象
退变的神经元周围见多个少突胶质细胞围绕。




图 16-15　流行性乙型脑炎嗜神经细胞现象和小胶质细胞结节
左上角箭头(▼)示噬神经细胞现象，右下角箭头(→)示小胶质细胞结节。




图 16-16　筛状软化灶
脑组织内见淡染的类圆形境界清楚的镂空筛网状病灶，病灶内为液化性坏死的神经组织碎屑和吞噬细胞。

① 理顺知识点：
通常而言，革兰氏阳性菌多见于球菌，革兰氏阴性菌多见于杆菌。
如金黄色葡萄球菌为革兰氏阳性球菌，大肠杆菌为革兰氏阴性肝菌。

特殊：脑膜炎双球菌、淋病奈瑟球菌为革兰氏阴性球菌。

② 理顺知识点：
流行性乙型脑炎的病变上重下轻，多累及大脑皮质、基底核、视丘。
类似继发性肺结核，肺部病变同样表现为上重下轻。

VS 结核性脑膜炎在脑池中存在大量的结核杆菌，此时以脑底部病变最明显。

③ 理顺知识点：
流行性脑脊髓膜炎是软脑膜、软脊膜的化脓性炎。
理顺此处的解剖结构：贴近脑组织的是软脑膜，往外是蛛网膜，最外侧是硬脑膜。同理，贴近脊髓表面的是软脊膜，其次是蛛网膜，最外侧是硬脊膜。
当软脑膜、软脊膜发生炎症时，中性粒细胞大量浸润的部位就是蛛网膜下腔，(即软脑膜/软脊膜与蛛网膜之间)。

对比记忆，两个局部症状轻全身症状重的疾病：急性暴发型流脑、中毒性痢疾。
前者机制是脑膜炎双球菌为革兰氏阴性菌，产生的是内毒素，当内毒素大量入血，造成败血症，出现广泛出血和循环衰竭。

④ 理顺知识点：
流行性乙型脑炎造成神经元细胞的死亡，按照病理学的一般规律，需要进行纤维性修复，常见的是肉芽组织的成纤维细胞产生胶原纤维。
但在脑组织中，是由星形胶质细胞产生的胶原纤维。相比较成纤维细胞产生的胶原纤维，此时脑中的胶原纤维较软，机械强度略低。

同时，小胶质细胞聚集，形成胶质结节。需注意的是，胶原纤维来自星型胶质细胞，胶质结节来自小胶质细胞。
注意单核巨噬细胞系统的多种名称，在脑组织中的单核巨噬细胞其名称为小胶质细胞。

脑组织中富含磷脂，易发生液化性坏死。小胶质细胞吞噬磷脂，脂类在HE染色时较难上色，故呈空泡状，命名为格子细胞/泡沫细胞。
VS 动脉粥样硬化AS的特征病理细胞—泡沫细胞

二、伤寒 急性增生性炎

风湿的皮肤病变有增生性和渗出性
结核有增生性和渗出性
伤寒只有增生,胆囊可以储存伤寒,但是胆囊无增生

①全身**单核-巨噬细胞系统增生**：**肝、脾、骨髓、淋巴结**等，以**回肠末端**集合、孤立淋巴小结多见全身冷

没有胆囊(储存伤寒杆菌)

一般肉芽肿都是慢性单核巨噬细胞增生性炎

②**特征为伤寒小结（急性肉芽肿）**：伤寒细胞（吞噬红细胞/伤寒杆菌/细胞碎片的**巨噬细胞**）聚集

特殊

结核结节:巨噬C吞噬结核杆菌
风湿细胞:巨噬C吞噬纤维素样坏死物

VS 结核沿肠黏膜淋巴管环形走向容易引起肠梗阻

③肠道溃疡期：累及**淋巴小结**→**圆形/椭圆形**溃疡（溃疡长轴与肠长轴**平行**→**不引起肠梗阻**）小姐玛丽。可并发肠出血（最常见）、肠穿孔（最严重）

取决于淋巴小结形态

溃疡深达肌层,穿透粘膜下层(富含血管)

④**蜡样**变性：横纹肌发生**凝固性坏死**，常累及膈肌、腹直肌、股内收肌蜡烛-凝固

助记

寒　核

最后一笔平行　最后一笔垂直

⑤脾大、玫瑰疹、中性粒细胞多↓、肥达反应(+)



图 18-10　伤寒髓样肿胀期



抓规律:细菌感染中性粒细胞↑
记特殊:伤寒杆菌感染中性粒细胞↓

三、细菌性痢疾

靠近肛门　累及直肠

①以**直肠和乙状结肠**多见，粘液脓血便、里急后重

纤维蛋白贴在粘膜上

②**假膜性炎（黏膜的纤维素性炎）**

纤维素性炎分子量大,血管通透性大,血管受损严重

③急性：表**浅**不规则**地图状**溃疡→多不引起肠梗阻、肠穿孔

跟痢疾杆菌毒力无关,跟个体自身有关　全身重局部轻

④**中毒性痢疾**：2-7 岁多见（特异体质），全身重而**肠道轻**

eg.感冒流鼻涕一黏膜的浆液性炎

（**卡他性炎**-此为黏膜的**浆液性炎**、**滤泡性炎**）淋巴滤泡增生

血管通透性还没那么高,渗出的是浆液,顺着粘膜往下流叫卡他

浅溃疡 { 细菌性痢疾 / 溃疡性结肠炎



图 18-11　细菌性痢疾
结肠黏膜有多处表浅“地图状”溃疡。




图 18-16　结肠急性阿米巴痢疾的“烧瓶状溃疡”模式图
溃疡深达黏膜下层，口小底大呈烧瓶状，溃疡口周围的黏膜悬覆于溃疡面上。

小结：

ttsx	肠结核	肠伤寒	急性细菌性痢疾	肠阿米巴
炎症	**慢性肉芽肿**	**急性肉芽肿**	**假膜性炎**	**变质性炎**只要看到阿米巴就是变质性炎
好发	**回盲部**	**回肠末端**	**直肠和乙状结肠**	盲肠和升结肠
溃疡	长轴**垂直**肠长轴（肠黏膜**淋巴管环形走向**）	长轴**平行**肠长轴（**淋巴小结**圆形/椭圆形）	表**浅**不规则**地图状**	口小底大的烧瓶状溃疡周围找滋养体 烧瓶装果酱 果酱样变
肠梗阻	**会（最常见）**	**不**	多不	会

⑤ 理顺知识点:
炎症的基本类型为变质、渗出、增生。急性期多为变质、渗出,慢性期多为增生。但伤寒是特例,是急性的增生性炎症。

注意抓规律记特殊,单核巨噬细胞吞噬伤寒杆菌等物质,称为伤寒细胞,类似的还有吞噬结核杆菌形成结核结节,吞噬纤维素样坏死物形成风湿细胞,吞噬狼疮小体形成狼疮细胞等。

⑥ 理顺知识点:
伤寒杆菌累及的是肠道的淋巴小结(肠结核累计肠黏膜的淋巴小管),根据结构基础,淋巴小结的排列与肠道的长轴平行。故伤寒形成的溃疡也与肠道的长轴平行,不易导致肠梗阻。

对比记忆,结核导致的肠道溃疡,其溃疡性状与淋巴管的走行一致,即与肠道长轴垂直。

补充:
肠伤寒按照病变发展的过程,分为四期,每期大约持续一周,即髓样肿胀期、坏死期、溃疡期、愈合期。肠道溃疡期最重要,一般发生于起病的第三周。

⑦ 理顺知识点:
累积直肠、乙状结肠的病变,多可出现黏液脓血便、里急后重(刺激到直肠)。细菌性痢疾、溃疡性结肠炎、直肠癌都可出现。

而肠伤寒好发于回肠末端,因此并无黏液脓血便、里急后重等临床表现。

⑧ 理顺知识点:
当黏膜发生纤维素渗出的炎症时,渗出的纤维蛋白粘连在黏膜上,好像形成了第二层膜,称为假膜性炎。
常见于细菌性痢疾、白喉。

溃疡的规律是深达肌层,但细菌性痢疾、溃疡性结肠炎为特例,其是浅溃疡,溃疡仅到达黏膜下层。
VS 胃癌的溃疡比胃溃疡的浅,但仍然为深溃疡。

补充:急性细菌性痢疾,其典型病变过程为初期的急性卡他性炎,随后特征性假膜性炎和溃疡形成,最后愈合

⑨ 理顺知识点:
中毒性痢疾,局部渗出以浆液为主,称为黏膜的浆液性炎。
纤维蛋白是蛋白质,浆液是液体,明显蛋白质的分子体积比液体大。因此,细菌性痢疾的肠道黏膜通透性更大,局部的病变更严重,中毒性痢疾的局部病变较轻。

液体从黏膜表面留下,类似感冒流鼻涕,称为卡他性炎。淋巴细胞聚集形成淋巴滤泡,再次表明,淋巴滤泡见于多种疾病,不能以此作为诊断线索。

注意：

	肠伤寒	急性肠菌痢	消化性溃疡	胃癌
出血	√	√	√	√
穿孔	√	多×	√	√
梗阻	×	多×	√	√

四、血吸虫病


（1）传播条件：带虫卵粪便入水、中间宿主钉螺孳生、人皮肤接触含尾蚴疫水
虫子生长的一个阶段

（2）童虫：引起血管及其周围炎，肺损害最明显同学废

（3）**虫卵**引起的损害最主要最严重（**肉芽肿**）

窦前型
主要沉着于直肠、乙状结肠、肝

IV型变态反应



⑪①急性虫卵结节着急喝酸汤、cao、之后流眼泪

放射状火焰样嗜酸性棒状物 虫卵分泌的一些抗原引起的免疫应答	**Hoeppli**
嗜酸性脓肿 状似脓肿	大量嗜酸性粒细胞
嗜酸性粒细胞崩解产物 **Charcot-Leyden 结晶**	嗜酸性粒细胞崩解产物
机化虫卵 虫卵周围的肉芽组织含大量嗜酸性粒细胞 特殊	抓规律记特殊 一般肉芽组织里炎细胞是巨噬细胞
晚期出现 ttsx 类上皮细胞	

急性虫卵结节只是一个过渡状态，只有晚期才有类上皮C，这时才算真正意义上的肉芽肿

②**慢性虫卵结节/假结核结节：类上皮细胞为主，少量异物巨细胞、淋巴细胞、成纤维细胞**
多核巨细胞

凌晨累异 VS 结核结节:凌晨累死

⑫注意：慢性虫卵结节与结核结节的共同点是**常钙化**（学姐钙化）、大量类上皮细胞/上皮样细胞；而它们的不同点是**慢性虫卵结节没有干酪样坏死、淋巴细胞少、含异物巨细胞、毛蚴已死亡** 结核结节内的结核杆菌是有活性的_内源性复发根源

血吸虫

多核巨细胞 { 血吸虫:异物巨细胞 / 结核:朗汉斯巨细胞

小凯笔记自行整理

结核结节	慢性虫卵结节
常钙化、大量类上皮细胞、成纤维细胞	
大量淋巴细胞 干酪样坏死 结核杆菌仍活 朗汉斯巨细胞	淋巴细胞少 无干酪样坏死 毛蚴死亡 含异物巨细胞

五、性传播疾病

（性传播是主要但非唯一途径）

⑩小结：　好发部位　典型溃疡特征

肠伤寒　回肠末端　圆形或椭圆形溃疡，溃疡长轴与肠管长轴平行

肠结核　回盲部　溃疡呈横带状/环形溃疡，其与肠管长轴垂直

急性菌痢　乙状结肠、直肠　地图状溃疡，大小不等、形状不一的浅溃疡

肠阿米巴病　盲肠、升结肠　口小底大的烧瓶状

肠血吸虫病　直肠、乙状结肠　大小不等的溃疡，无特殊形态

克罗恩病　回肠末端、邻近结肠　节段性纵行裂隙状深溃疡

溃疡性结肠炎　直肠、乙状结肠　连续弥漫性浅溃疡

胃癌　胃窦小弯　火山口状恶性溃疡

⑪理顺知识点：
急性虫卵结节的关键词是“酸”。
最外侧的是嗜酸性棒状物（抗原-抗体复合物），其中大量嗜酸性粒细胞聚集，形成嗜酸性脓肿。
虫卵周围同样有大量的嗜酸性粒细胞，当嗜酸性粒细胞崩解时，形成夏科-莱登结晶。
虫卵结节作为异物，可刺激机体产生肉芽组织机化包裹。随着病程的发展，肉芽组织层逐渐向从软结节中央生长，并出现围绕结节呈放射状排列的上皮样细胞，此时嗜酸性粒细胞显著减少，构成晚期急性虫卵结节。（此时急性虫卵结节才是肉芽肿）

⑫理顺知识点：
慢性虫卵结节与结核结节的异同，钙化为规律，特例是梅毒绝少钙化。

干酪样坏死是结核特征，在西医综合中，干酪样坏死几乎可以等于结核病，所以血吸虫没有干酪样坏死。

结核杆菌喜欢侵犯淋巴组织，所以结核结节中有大量的淋巴细胞，而慢性虫卵结节中淋巴细胞较少。即“结核喜欢林妹妹”

结核结节中结核杆菌仍然存活，为内源性复发的来源，而慢性虫卵结节中的毛蚴已经死亡。

上皮样细胞聚集形成多核巨细胞，若病因为结核、梅毒、麻风，则为朗汉斯巨细胞；若病因为异物（手术缝线/石棉）、慢性虫卵结节、亚甲炎，则为异物巨细胞。

（一）梅毒 本质血管炎

血管周围炎性渗出(浆C渗出)

1.**基本病变：闭塞性动脉内膜炎、小血管周围炎、肉芽肿（特征）** 周围塞车肿么办

胃溃疡溃疡底部
瘢痕组织也有

肉芽肿虽然是基本病变,但是肉芽肿只有三期才有

2.分期

（1）**一期：硬下疳** 会阴周围摸了就传染



（2）**二期**（传染性最大）：**梅毒疹** 随便摸哪都容易传染

（3）**三期**（传染性**最小**） 鞍鼻痴呆不想摸了

没有主狭窄　　不是结核

①主动脉炎、主**闭**、主动脉瘤（破裂致猝死）、麻痹性**痴呆**、**脊髓痨**、**马鞍鼻**

主主主延毕咯 mlb

主狭的主要原因是老龄退化,瓣膜出现钙化,梅毒绝少钙化,故不会引起主狭

病理学是形态学科目,B淋巴细胞和浆细胞虽然是同种细胞,但形态不同,要分开阐述

②**树胶样肿/梅毒瘤（肉芽肿）：浆细胞和淋巴细胞多见尤其浆细胞恒定出现**（乌梅子酱），

不典型肉芽肿

而**类上皮细胞和朗汉斯巨细胞少见，绝少钙化**，伴**凝固性坏死**（可见原有血管壁轮廓）

多核巨细胞　　VS 结核:更为彻底的凝固性坏死-干酪样坏死(无轮廓)

注意：朗汉斯巨细胞、异物巨细胞属于多核巨细胞 姐妹们 VS 异甲虫

①**结核、梅毒、麻风**所致肉芽肿的多核巨细胞为**朗汉斯巨细胞**

②**异物（手术缝线/石棉）、慢性虫卵结节、亚甲炎**所致肉芽肿的多核巨细胞为**异物巨细胞**

1 6 1

（二）尖锐湿疣

①**HPV-6、11** 型等

16、18型

与 HPV 密切相关的有尖锐湿疣、宫颈癌、喉癌

感染HPV引起

②**挖空/凹空细胞** 宫颈癌癌前病变_宫颈鳞状上皮内病变(异型增生、挖空C)

③好发于潮湿温暖的粘膜和皮肤交界处如外生殖器、肛门




图 18-14　尖锐湿疣
左上为挖空细胞，左下为 HPV 外壳蛋白免疫组织化学染色阳性。

（三）淋病（最常见的性病）

急性**化脓性炎**，主要累及泌尿、生殖系统

小叶性肺炎、流脑

真题解析·其它传染病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N55 A 在血吸虫病中，给病人造成最大危害的因素是
A.虫卵
B.童虫
C.成虫
D.尾蚴

2.2014N137-138 B
A.硬性下疳
B.树胶样肿
C.梅毒疹
D.脊髓痨
属于I期梅毒的病变是
属于II期梅毒的病变是

3.2015N166 X 以下选项中，属于梅毒的病变有
A.硬性下疳
B.梅毒疹
C.脊髓痨
D.黏液性水肿 甲减

4.2016N55 A 发生梅毒性增生性动脉内膜炎时，血管周围浸润的特征性炎细胞是
乌梅子酱
A.T 淋巴细胞
B.中性粒细胞
C.巨噬细胞
D.浆细胞

5.2018N126-127 B
A.巨噬细胞
B.淋巴细胞
C.浆细胞
D.多核巨细胞
构成伤寒肉芽肿的主要是
构成梅毒肉芽肿的主要是

6.2020N39 A 急性血吸虫病由虫卵引起的早期基本病理变化是
A.嗜酸性脓肿
B.假结核结节 } 慢性
C.钙化虫卵

放射状火焰样嗜酸性棒状物	**Hoeppli**
嗜酸性脓肿	大量嗜酸性粒细胞
Charcot-Leyden 结晶	嗜酸性粒细胞崩解产物
虫卵周围的肉芽组织含大量嗜酸性粒细胞	抓规律记特殊
晚期出现 ttsx 类上皮细胞	

答案：1-6 A AC ABC D AC A

D.肝纤维化

7.2022N35 A 中毒性细菌性痢疾的肠道病理变化特点是

A.假膜性肠炎

B.滤泡性肠炎

C.溃疡性肠炎

D.出血性肠炎

以题带动
知识点复习

8.2024N150 X 以肉芽肿为基本病变的疾病有

A.结核病

B.伤寒

C.阿米巴病 变质性炎

D.细菌性痢疾 假膜性炎

答案：7-8 B AB

专题串联·常考溃疡

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ttsx	好发部位	溃疡特点
肠结核 ⊥	**回盲部**	**环/横**形溃疡，其长轴与肠长轴**垂直** （与肠粘膜**淋巴管走向**一样）
肠伤寒 ‖	**回肠末端**	圆形/椭圆形溃疡，其长轴与肠长轴**平行** （与肠粘膜**淋巴小结形态**一样）
细菌性痢疾	**直肠和乙状结肠**	表**浅**不规则**地图状**溃疡
阿米巴	盲肠和升结肠	口小底大的烧瓶状溃疡
溃疡性结肠炎	**直肠和乙状结肠**	连续性**浅**溃疡　UC连续溃疡浅
克罗恩病	**回肠末端及邻近结肠**	早期鹅口疮样　CD节段鹅卵石 后期**节段**性**纵**行**裂隙状**深溃疡
消化性溃疡	十二指肠**球部前壁** **胃窦小弯**侧	圆形/椭圆形的深溃疡（镜下分 4 层） 黏膜皱襞**放射状**向溃疡集中
胃癌溃疡型	**胃窦小弯**侧	**火山口状**、凹凸不平、黏膜皱襞中断
胃泌素瘤	**十二指肠球部** 最开始承受酸的部位	不典型部位 更有特点 （十二指肠**降部和水平部**、空肠近段、食管远段）出现多发溃疡
应激性溃疡	**胃底胃体**	应激→GC↑→促进胃酸、胃蛋白酶原↑　壁C　主C

十二指肠降部水平部在胆总管开口处后,本应呈碱性(有胰液胆汁),但是因为胃泌素瘤导致胃酸分泌过多,在原本肠道碱性的地方都会受到胃酸影响发生溃疡

注意：好发于**直肠和乙状结肠**的有细菌性痢疾、血吸虫、溃疡性结肠炎、大肠癌

吸血鬼哎　好发于左半边离肛门近容易便血,只要累及直肠就会有里急后重

小凯笔记自行整理

好发于右侧的消化道疾病:


肠伤寒——回肠下段

克罗恩病——回肠末端

肠结核——回盲部

肠阿米巴病——盲肠,升结肠

上课结巴



- 肠结核
- 伤寒
- 克罗恩病
- 肠阿米巴病
- 细菌性痢疾
  血吸虫病
  溃疡性结肠炎
- 大肠癌

思维导图·其它传染病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄