核心精讲 • 风湿病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

阿姨　　不是感染性疾病

一、风湿病是与 A 组 β（乙）型溶血性链球菌感染有关的变态反应疾病

链球菌中的 M 蛋白抗原与人心瓣膜等组织存在交叉抗原性（交叉免疫反应） ①

由于心瓣膜上有类似抗原，所以针对M蛋白抗原的抗体也会攻击心瓣膜（变态反应疾病）

变质
- 变性（可逆）
- 坏死（不可逆）

二、风湿病的特征是 Aschoff 小体

胶原纤维坏死

1.**变质渗出期**：**黏液样变性**、**纤维素样坏死**、浆液和纤维素渗出等

风到这里就是黏　胃溃疡分成了四层：炎性渗出层、坏死组织层（纤维素样坏死）、肉芽组织层、瘢痕组织层

2.**增生期/肉芽肿期**　干扰
- 肉芽组织：成纤维细胞产生胶原纤维完成纤维性修复/纤维化
- 肉芽肿：单核巨噬细胞的增生性炎

②

①**最有诊断意义：Aschoff 小体/风湿小体/风湿肉芽肿**。Aschoff 小体由聚集在**纤维素样坏死灶**的成群**风湿细胞**、少量淋巴细胞（主要是 **T** 细胞）和浆细胞构成

单核巨噬细胞吞噬胶原纤维坏死物→风湿细胞增生

②风湿细胞由增生的**巨噬**细胞**吞噬纤维素样坏死物**后转变而来

③风湿细胞体积大、核大、核膜清晰、染色质集中于中央、核周可见明显的亮晕，核的横切面似**枭眼状** o 像眼、纵切面似 ttsx **毛虫状** ff 像毛虫，有时可见**多个核的 Aschoff 巨细胞**



图 9-21　风湿性心肌炎

A. 低倍；B. 高倍。

3.纤维化期/硬化期：风湿细胞转变为成纤维细胞→风湿小体机化形成**梭形小瘢痕**

成纤维细胞 ↓ 产生胶原纤维 ↓ 取代风湿小体

机化：肉芽组织取代…

三、风湿病可累及全身结缔组织的胶原纤维

（一）风湿性心脏病

1.风湿性**心内膜炎（最严重）**

累及心内膜就是累及心瓣膜

① 理顺知识点：

此处应注意区分链球菌造成的感染，与其引起的变态反应。

即若是链球菌产生的内外毒素，造成人体的炎症反应，此为链球菌的感染。

若是因链球菌中的M蛋白，作为一种抗原成分，与人体中很多正常的组织成分相类似，如心脏瓣膜和脑组织等。机体的免疫系统在识别到链球菌中的M蛋白，将其视为一种外来异物，发动免疫反应应对时，会误伤正常组织，此时为链球菌导致的变态反应疾病。

而风湿病正是一种与A组乙型溶血性链球菌感染有关的变态反应疾病。

② 理顺知识点：　区分肉芽组织与肉芽肿

人体的组织器官在遭受到损伤的时候，特别是慢性损伤，人体需要肉芽组织来进行修复，此时肉芽组织中的成纤维细胞产生胶原纤维，完成纤维性修复的纤维化过程，这一过程中涉及到的是肉芽组织，肉芽组织的感性认识就是修复。

但肉芽肿是炎症，是一种特异型增生性炎，具体是指单核巨噬细胞的增生。

应注意肉芽组织和肉芽肿，即修复与炎症，此为病理学考察时的经典干扰选项。

直接受到血流冲击的一面易遭受到损害

①**最常累及二尖瓣**，其次是二尖瓣（心房面）和主动脉瓣（心室面）同时受累

VS 感染性心内膜炎:联合性瓣膜损害(二尖瓣和主动脉瓣)最常见

②瓣膜闭锁缘形成**疣状赘生物**，**不**易脱落，呈灰白色、单行串珠状排列，由**血小板**等构成

变态反应性疾病赘生物:没有细菌而且扒的牢 VS 感染性心内膜炎赘生物有菌且容易脱落

（**白色血栓**）

血小板血栓:血流比较快的地方(心腔/动脉),血小板跟不上血流,析出形成血栓

③**病变反复发作可致慢性心瓣膜病**。由于病变所致瓣膜口狭窄或关闭不全，受 ttsx 血流反

临床上二尖瓣狭窄/关闭不全最常见的原因:风湿病

流冲击较重引起**心内膜**灶状增厚（**McCallum 斑**），多见于**左心房**后壁马后炮 ③

马氏斑





图 9-22 风湿性疣状心内膜炎
二尖瓣闭锁缘可见细小赘生物，有的呈溃疡改变。

2.风湿性心肌炎 胶原纤维存在于血管壁和细胞间质

①病变主要累及心肌**间质**结缔组织（间质性心肌炎）

慢波来自肌肉,不是来自肌细胞,而是来自间质细胞

②Aschoff 小体常位于**心肌间质小血管旁**

血液中的单核巨噬细胞穿过血管壁到达细胞间质,继而形成Aschoff小体

③Aschoff 小体机化形成小瘢痕（心肌纤维化） ④



④累及传导系统可致传导阻滞

3.风湿性心外膜炎/**心包炎**

①浆液渗出为主→心包积液；**纤维素渗出为主→绒毛心** 感性认识:纤维蛋白随心脏搏动拉丝

渗出的纤维素被大量的肉芽组织机化后,变成纤维瘢痕,非常硬

②渗出的大量**纤维素若不能被溶解吸收→缩窄性心包炎**感性认识:心脏穿了一个非常紧的外套



图 9-23 风湿性心外膜炎
心外膜表面有大量纤维蛋白渗出，呈绒毛状。



图 9-24 风湿性心外膜炎
渗出的纤维蛋白与心外膜紧密相连。

③ 此处可用马后炮的口诀来记忆,但原理如下:
当出现二尖瓣关闭不全时,左心室内的血液不仅向主动脉射血,同时会通过没有关闭完全的二尖瓣反流到左心房,如左图所示,反流的血液更易冲击到左房的后壁,血液反复的冲击此处,会导致此处的心内膜出现一个局灶性的增厚,我们将此处的增厚称为“马氏斑”。

④ 此处出现了“心肌纤维化”,但注意这与肺心病导致的心肌纤维化是完全不同的。

肺心病导致肺动脉高压,导致右心室后负荷增大,使右心室出现向心性肥厚,但长期的肥厚最终会出现失代偿。当心肌细胞失代偿死亡后无法再生,依靠肉芽组织进行纤维性修复,因此肺心病导致的心肌纤维化是心脏实质的纤维化

风湿病与其相反,风湿病是间质性心肌炎(发生纤维素样坏死的胶原纤维存在于血管壁和细胞间质),其机制是间质出现了纤维素样坏死,进而形成风湿小体/阿绍夫小体,随后风湿细胞转变为成纤维细胞,产生胶原纤维致使风湿小体机化形成梭形小瘢痕。此处的纤维化与心肌细胞是没有关系的,即心肌间质纤维化。

故两者虽同叫做心肌纤维化,但肺心病是实质纤维化,风湿病是间质纤维化。

（二）风湿性关节炎

1.病变呈游走性、反复发作

2.对比

	风湿	类风湿
炎症类型	慢性**肉芽肿**（特殊增生性炎）	慢性**非特异增生**性炎 浸润细胞“淋浆”
变态反应	II/细胞毒型 2 个字	III/免疫复合物/血管炎型 3 个字
主要侵犯	**大**关节（膝、肩关节等）	**小关节（腕、掌指、近端指间关节等）**
关节腔 主要渗出	**浆液**二大爷 （易被完全吸收）→不会遗留关节畸形	**纤维素** （不易被完全吸收）
关节畸形	**不**（舔过关节咬住心脏）	**常（天鹅颈样、纽扣花样等畸形）**

风湿病最严重的病变:风湿性心内膜炎

（三）皮肤病变（有诊断意义）

环形红斑	皮下结节
渗出性病变（没有 Aschoff 小体）见于增生期	增生性病变
⑤  Aschoff小体是风湿病的基本病变,但并不代表所有病变都有	

（四）风湿性动脉炎 ⑥

小动脉受累较常见，血管壁发生纤维素样坏死等

（五）风湿性脑病

①脑的风湿性动脉炎和皮质下脑炎

②累及锥体外系可引起**小舞蹈病**（肢体不自主运动）⑦

舞蹈病:新纹状体GABA能神经元病变,对黑质多巴胺能神经元抑制↓导致肌张力↓,随意运动↑,呈现不自主的舞蹈样运动

真题解析 • 风湿病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

⑤ 阿绍夫小体/风湿小体是风湿病重要的诊断标准,但不是所有的风湿病都一定会出现阿绍夫小体/风湿小体。
此时应注意风湿病的分期,即变质渗出期、增生/肉芽肿期、纤维化/硬化期。环形红斑是一种渗出性病变,而阿绍夫小体/风湿小体的本质是肉芽肿,肉芽肿的本质是特异性增生性炎,即只有风湿病发展到增生/肉芽肿期时,才会出现阿绍夫小体/风湿小体。故出现环形红斑时,风湿病处于变质渗出期,无阿绍夫小体/风湿小体。

注意一定具备普遍和特殊的学习方法,如一种疾病的普遍特点及特殊特点,做题时切记普遍与特殊的辩证思维,切忌机械性推断所有。

⑥ 风湿性动脉炎时大小动脉均可受累,以小动脉受累较易常见,包括冠状动脉,肾动脉,肠系膜动脉、脑动脉及肺动脉等。
急性期血管壁发生纤维蛋白样坏死,伴淋巴细胞浸润,并伴有风湿小体形成。病变后期,血管壁纤维化而增厚,管腔狭窄,可并发血栓形成。

VS 动脉粥样硬化AS常损害大、中动脉,其余疾病常常损害细、小动脉

⑦ 理顺知识点:
此处的舞蹈病,须与生理学中的亨廷顿舞蹈病做对比,生理学中的亨廷顿舞蹈病是由于新纹状体GABA能神经元病变导致对多巴胺能神经元的抑制作用减弱、易化大脑皮层发动运动,导致肌张力降低、随意运动增多,多见于老年人。

而风湿性脑病多见于5~12岁的儿童,女孩较多,累及锥体外系时出现肢体的不自主运动,称为“小舞蹈病”。

1. 2013N133-134 B

A.心内膜炎

B.心肌内 Aschoff 小体

C.心包内纤维蛋白性炎症

D.关节病变

对风湿病最有诊断意义的病变是

对风湿病人造成最严重危害的病变是

舔过关节咬住心脏

2.2015N48 A 风湿小结内的 Aschoff 细胞来源于

A.T 淋巴细胞

B.B 淋巴细胞

C.巨噬细胞

D.成纤维细胞

2.**增生期/肉芽肿期** 干扰
- 肉芽组织:成纤维细胞产生胶原纤维完成纤维性修复/纤维化
- 肉芽肿:单核巨噬细胞的增生性炎

①**最有诊断意义：Aschoff 小体/风湿小体/风湿肉芽肿**。Aschoff 小体由聚集在**纤维素样坏死灶**的成群**风湿细胞**、少量淋巴细胞（主要是 **T** 细胞）和浆细胞构成

②风湿细胞由增生的**巨噬**细胞**吞噬纤维素样坏死物**后转变而来

③风湿细胞体积大、核大、核膜清晰、染色质集中于中央、核周可见明显的亮晕，核的横切面似**枭眼状** o 像眼、纵切面似 ttsx **毛虫状** ff 像毛虫，有时可见**多个核的 Aschoff 巨细胞**

3.2016N168 X 在风湿热病变中，可出现 Aschoff 小体的有

A.风湿性心肌炎

B.环状红斑 渗出性病变

C.皮下结节

D.风湿性动脉炎

以趣带动
知识点复习

4.2018N34 A 以下关于风湿热的描述中，错误的是

A.属于变态反应性疾病

B.其发病与溶血性链球菌感染有关 阿姨

C.常可导致关节畸形 关节内主要渗出浆液

D.心脏病变的后果对人体危害最为严重

5.2024N35 A 风湿性心肌炎病理特征性细胞的来源是

A.中性粒细胞

B.浆细胞

C.巨噬细胞

D.肥大细胞

思维导图 • 风湿病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜

天天师兄

答案:1-5 BA C ACD C C