
核心精讲·乳腺疾病 乳腺癌来源：导管:导管癌；小叶(腺泡):小叶癌；特殊:乳头湿疹样乳腺癌(外科)

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图






图 14-21　乳腺解剖结构和各部位主要病变

一、乳腺导管增生

(细胞与细胞之间平行的关系,像水里面游动的鱼)

①**普通**型**导管**增生：增生细胞呈**流水样分布**（水-普通）

水一点:①急性普通型肝炎②甲状腺髓样癌③普通型导管增生

②**异型/非典型导管**增生：增生细胞分布**均匀**、**单一**形态

癌前病变

二、乳腺癌（女性最常见恶性肿瘤）女性最常见的肿瘤:子宫肌瘤

1.危险因素

①**雌**激素暴露时间延长，如月经**早**、绝经**晚**、**晚育不育**、**肥胖**、乳腺增生性病变（其中**导管上皮非典型/异型增生为癌前病变**）

雌激素暴露时间↑　脂肪组织富含芳香化酶→雄激素变为雌激素

孕激素来的晚　雌激素暴露时间↑

不是所有癌前病变都有异型增生,但只要看到异型增生一定是癌前病变

②遗传，如抑癌基因乳腺癌易感基因（Breast Cancer Susceptibility Genes,**BRCA**）缺陷

BRCA与卵巢癌也有关系


（安吉丽娜朱莉就是因为这个切除了乳腺）

出现不典型增生→浸润子宫肌层

小结：与雌激素过高相关的有子宫内膜增生症、子宫内膜腺癌、子宫平滑肌瘤、乳腺导管增生、乳腺癌

跟雌激素没有关系的疾病:滋养层细胞疾病-葡萄胎、侵袭性葡萄胎、绒癌

2.乳腺癌**缺失肌上皮细胞**（与乳腺硬化性腺病鉴别）复习：前列腺癌缺失基底细胞（鸡）

3.好发于**外上**象限 

① 理顺知识点:
不是所有的癌前病变都有异型增生,如肝硬化为原发性肝细胞癌的癌前病变,肝细胞并没有异型增生。但有异型增生的一定是癌前病变。
注意逻辑关系。

4.分类

(2)(1）非浸润癌 没有突破基底膜

恶性程度大一点

①**导管原位癌/导管内癌**：其中高级别者核分裂象常见、粉刺样坏死（**粉刺癌**）

一般不出现乳房内肿块

②小叶原位癌：核分裂象**罕见**、癌变间期**长**、多累及**双**侧乳房多个象限

恶性程度不大　特殊

（小这个字中间长、两边有点）ttsx




图 14-25　高级别导管原位癌

导管内癌细胞排列紧密，大小不一，胞质丰富，嗜酸，中央有大片坏死。

（2）浸润癌

从原位癌发展过来不特殊

癌的规律

①浸润癌**非特殊**型：以前称为**浸润性导管癌（最常见）**：巢状等结构、边界不清、间质纤维组织多 特殊:食管癌髓质型纤维组织少软软的 (3)

十版改变 ②浸润性小叶癌：由小叶原位癌穿透基膜向间质浸润所致。癌细胞大小一致、核分裂象少见，呈**单行串珠状/列兵样/细条索状排列、或环形排列在正常导管周围（牛眼样/靶环）**。常转移至脑脊液、浆膜表面、卵巢、子宫、骨髓（小孩站一排、围成圈、泡水里玩）

导管

胃肠道癌症晚期发生血道转移经门静脉至肝脏一牛眼征

e.g 心包膜、腹膜、胸膜


③浸润癌**特殊**型：(4)

分化程度高、异型性小

预后较好的类型 （比浸润癌非特殊型预后好） 软软的小实性乳头分泌黏液	**小管癌/高分化腺癌**：大量腺体形成 异型性小 **大量淋巴细胞浸润的髓样癌**：巢状等结构、边界清楚、癌细胞大、间质少（大清软软的）VS浸润性导管癌：巢状等结构、边界不清、间质纤维组织多 **黏液腺癌** **分泌性癌** **实性乳头状癌**
预后较差的类型	**炎性乳癌（预后最差）**、分期T4 浸润性微乳头状癌、富于脂质性癌、高级别化生性癌



5.临床



①**橘皮样变（皮肤水肿）**：阻塞真皮内**淋巴管** (5)

复习：由于淋巴回流受阻导致的组织水肿有丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变、丝虫病橡皮虫

②**酒窝征（皮肤凹陷）**：侵犯 Cooper/乳房悬**韧带**　一端连在皮肤上面，癌组织侵犯导致韧带收缩变短皮肤局部出现凹陷

③**淋巴转移**最早和最常见（首先至**同侧腋窝**淋巴结）；也易经**椎旁静脉**转移至**骨**、肺、肝、肾上腺、脑 (6)　乳腺癌一般肿块不痛，患者不明原因出现胸痛/腰痛警惕发生椎旁静脉系统骨转移

小结：易经椎旁静脉发生骨转移的有乳腺癌、前列腺癌、甲状腺癌、肾癌（甲乳省钱）

位于中线结构易通过椎旁静脉系统转移

④**雌激素受体 ER+**预后较**好**，可**内分泌**治疗；***HER2+***预后较**差**，可**靶向**治疗

串:乳腺癌的内分泌治疗

①绝经前用雌激素受体拮抗剂如他莫昔芬三苯氧胺（吃他三）

②绝经后用芳香化酶抑制剂如阿那曲唑、依西美坦（阿姨）

(2) 理顺知识点：

未突破基底膜的肿瘤，即原位癌，若其肿瘤细胞起源于导管上皮细胞，称为导管内癌/导管原位癌；若其肿瘤细胞起源于小叶细胞，称为小叶原位癌。

导管内癌/导管原位癌中，高级别即恶性程度高，易出现病理性核分裂象。若其出现坏死，形似粉刺，称为粉刺癌。（即注意导管内癌的不同叫法，导管内癌、粉刺癌都是其称谓）

小叶原位癌的感性认识就是“好”，例如癌变间期、核分裂象等，但其特殊在于累计双侧乳房多个象限，与感性认识相反，需特别注意。

(3) 理顺知识点：

浸润性导管癌的特征为肿瘤的一般规律，即肿瘤通常呈巢状生长，间质多实质少，边界不清。

需对比记忆的是，浸润性小叶癌的特点，此时癌细胞大小一致，核分裂象少见，但呈现单行串珠状排列或环形排列，且常转移部位怪异，如脑脊液、浆膜表面等。

(4) 理顺知识点：

注意理清乳腺癌分型的层级关系。乳腺癌首先分为原位癌/非浸润癌和浸润癌。

浸润癌中分为特殊型和非特殊型，其中非特殊型可感性认识为由原位癌发展过来，并不特殊，其预后较差；而特殊型中分为预后较好和预后较差的病理类型。（外科学中乳腺癌病理类型分类与病理学不同，需分开记忆）

需注意，名称记忆要准确，区分实性乳头癌和浸润型微乳头癌。

(5) 理顺知识点：

乳腺癌侵犯皮肤后出现橘皮样变的原因是癌细胞阻塞了真皮内的淋巴管。　即“橘林”

值得注意的是，酒窝征并非乳腺癌侵犯皮肤的表现（溃疡、卫星结节、橘皮样变），此时癌细胞侵犯Cooper/乳房悬韧带后，导致韧带收缩变短，牵拉皮肤出现局部凹陷，并非侵犯皮肤。

(6) 理顺知识点：

肿瘤的转移规律是淋巴转移最常见，而特例是绒毛膜癌、肝细胞癌、甲状腺髓样癌、肺腺癌易见血行转移。

乳腺癌最早最常见为同侧腋窝淋巴结转移，即淋巴转移最早最常见，但特殊的是血行转移也可在早期发生（肿瘤的一般规律，出现血行转移多为晚期），即易侵犯椎旁静脉转移至骨、肺、肝等部位。

位于中线结构的肿瘤，易经椎旁静脉系统发生骨转移，从上到下为甲状腺癌、乳腺癌、前列腺癌、（肾癌）。　即“一追三献爱”

真题解析·乳腺疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

浸润癌特殊型预后好的

1.2013N168 X 以下属于乳腺髓样癌形态特点的有

大清软软的

A.边界清楚
B.癌细胞体积大
C.有较多的淋巴细胞浸润
D.*HER2/neu* 过度表达 预后差

2.2014N47 A 女性，58 岁。左乳腺外上象限肿物，直径 2.0cm。组织学检查：肿瘤细胞小，在纤维组织中排列成单排细胞，浸润周围脂肪组织。该患者的诊断是

A.浸润性小叶癌
B.浸润性导管癌
C.导管内癌
D.小叶原位癌

预后较好的类型 （比浸润癌非特殊型预后好） 软软的小实性 乳头分泌黏液	小管癌/高分化腺癌：大量腺体形成 大量淋巴细胞浸润的髓样癌：巢状等结构、边界清楚、癌细胞大、间质少（大清软软的） 黏液腺癌 分泌性癌 实性乳头状癌
预后较差的类型	炎性乳癌（预后最差）、 浸润性微乳头状癌、富于脂质性癌、高级别化生性癌

3.2014N56 A 以下乳腺癌的病理学类型中，属于原位癌的是

导管原位癌/导管内癌

A.粉刺癌
B.黏液癌
C.小管癌 高分化腺癌
D.髓样癌

4.2015N56 A 以下乳腺癌的病理学类型中，恶性度较低的是

A.浸润性小叶癌
B.髓样癌
C.小管癌 高分化腺癌
D.浸润性导管癌 非特殊浸润癌

5.2018N39 A 乳腺浸润癌与乳腺硬化性腺病形态相似，鉴别两者最主要的依据是

A.浸润癌核分裂象多见
B.浸润癌腺体异型明显
C.浸润癌增生活跃
D.浸润癌腺腔周围无肌上皮细胞

思维导图·乳腺疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

以题带动 知识点复习

微信搜一搜 天天师兄

答案：1-5 ABC A A C D