
2.2015N153 X 以下微循环结构中，主要受局部代谢产物调节的有
A.毛细血管前括约肌　一前一后一冠脉
B.后微动脉
C.微动脉
D.微静脉

3.2016N7 A 在微循环中进行物质交换的血液，不流经的血管是
A.后微动脉　迂回通路(肠系膜)
B.微动脉
C.微静脉
D.通血毛细血管　有部分物质交换作用

选最佳答案



4.2017N116-117 B
A.毛细血管血压增高
B.毛细血管通透性增高
C.组织液胶体渗透压增高
D.血浆胶体渗透压降低
右心衰竭发生组织水肿的主要机制
肾病综合征发生组织水肿的主要机制

5.2018N138 X 在生理状态下，能使冠脉血流量增多的因素有
A.加快心率 →舒张期↓
B.降低动脉血压(平均动脉压)→舒张压↓
C.增加外周阻力 →舒张压↑
D.增强心肌代谢活动 →腺苷↑

冠脉流量影响因素
- 舒张期长短
- 舒张压大小
- 冠脉舒张程度

6.2020N6 A 发生右心衰竭时，引起水肿的主要原因是
A.组织液静水压降低
B.毛细血管血压升高
C.血浆胶体渗透压降低
D.毛细血管壁通透性增大

7.2024N5 A 调节毛细血管前括约肌舒缩活动的主要因素是
A.交感神经
B.副交感神经
C.血管紧张素
D.局部代谢产物


专题串联·血液循环相关考点的切入点

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

以题带动 知识点复习

答案：2-7 AB D AD CD B D

思考舒张期
主动脉和心室
在做什么？



16 需要注意:若后负荷突然↑→搏出量↓(瞬间)→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑→搏出量↑(异长调节)

理论上,心室收缩末期的剩余血量↑→回心血量会↓,此时心室舒张末期容积会受到两方面影响。一是心室收缩末期的剩余血量,二是舒张期的回心血量。
分析后负荷变化的代偿过程中,一般默认回心血量减少得不明显(控制变量,生理学实验得到结论时经常使用这种思想),即忽略回心血量的影响,则此时心室收缩末期容积增加时,心室舒张末期容积也会相应增加。若回心血量明显减少,那心室收缩末期剩余血量↑时,心室舒张末期容积未必会增加。

①心动周期变短→收缩期、舒张期都变短→以舒张期变短为主→主动脉向外周流血↓→留存在主动脉血↑→舒张压↑↑、收缩压↑ 方向一致,幅度不同

②搏出量↓→收缩压↓↓、舒张压↓（指动脉血压）

后负荷↑→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积或压力↑（指室内压）

③心脏射血能力↑→动脉血压↑、CVP↓

④微动脉收缩→外周阻力↑→动脉血压（后负荷）↑→等容收缩期延长

微动脉收缩→回心血量↓→CVP↓ 外周阻力↑ → 收缩压↑舒张压↑↑ → 平均动脉压↑(血压)

⑤急性失血→动脉血压↓、CVP↓、HCT↓

思维导图·微循环和冠脉循环

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜