专题串联 • 脊髓病变

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）概述

①**薄束楔束**：传导**同**侧**本体/深感觉**（位置、运动觉）+**精细触压觉**（本是同根生呀）

②**脊髓丘脑侧束**：传导**对**侧**痛觉、温度觉**（**浅**感觉）秋千、侧-交叉 只有脊髓丘脑束在脊髓平面交叉

感觉传导是上行的
运动传导是下行的



助记图



（二）不完全性脊髓损伤

（损伤平面以下保留某些感觉和运动功能）

前脊髓综合征 ⑪	最严重（钱最严重）
后脊髓综合征 分离性感觉障碍{浅感觉没有问题 深感觉有问题	锥体束 运动、痛温觉存在，而**本体感觉障碍**精细触压觉也障碍 深感觉 （后-深。薄束楔束位于脊髓后索）本是同根生呀
脊髓**中央管**周围综合征 ⑫	多见于**颈椎过伸**损伤 **没有感觉分离**，上肢瘫痪重于下肢 （中央-上级、不分离）
脊髓**半切**综合征（Brown-Sequard）  同侧:本体感觉 后 对侧:痛温觉 前:粗略触压觉	锥体束　深感觉　浅感觉 **同**侧**运动、本体感觉障碍**，而**对**侧**痛温觉障碍** （一同运动感情深、对面感情浅） 管运动的锥体束、管本体感觉的薄束楔束在脊髓不交叉 管浅感觉的脊髓丘脑侧束在脊髓交叉



⑪ 颈脊髓前方受压严重,有时可引起脊髓前中央动脉(脊髓供血最重要动脉)闭塞,出现四肢瘫痪,并且由于支配上肢平面的神经元"靠里面",支配下肢平面的神经元"偏外面",支配下肢的神经元此时血供更好,故下肢瘫痪重于上肢瘫痪,但下肢和会阴部仍保持位置觉和深感觉,有时甚至还保留浅感觉。

此型损伤的预后为不完全性脊髓损伤中最差。

⑫ 理顺知识点:
看手机(屈颈椎),仰脖子(伸颈椎),过伸颈椎导致黄韧带皱缩,椎间盘突出会挤压脊髓
与前脊髓综合征中下肢瘫痪重于上肢不同,脊髓中央管周围综合征上肢瘫痪重于下肢,因上肢神经元胞体更靠近中央管,中央管周围发生病变时,先损伤到支配上肢的神经元,故上肢瘫痪重于下肢。

只考对痛温觉影响

（三）脊髓肿瘤 ⑬

①若颈部和胸部的痛温觉丧失→脊髓内肿瘤（从脊髓中央向外压迫）

②若骶部和腰部的痛温觉丧失→脊髓外肿瘤（要抵制外面）

（纤维在脊髓的顺序——骶腰胸颈、依次由外向内）



图 10-18 躯体感觉传导通路（A）和感觉通路的横断面（B）示意图

S，骶；L，腰；T，胸；C，颈。

首先靠痛温觉丧失定位脊髓丘脑侧束有问题，通过丧失感觉的部位（颈/胸、腰/骶）来确定脊髓内/外肿瘤

思维导图 • 神经元及胶质细胞

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜

⑬ 理顺知识点：

生理学考察脊髓肿瘤的方式，一般是给出骶/腰/胸/颈部位的痛温觉丧失，要求判断是脊髓内或脊髓外肿瘤，解题的关键在于脊髓丘脑侧束的神经纤维是按照骶→腰→胸→颈由外向内伸入的，因此脊髓内肿瘤从脊髓中央向外压迫，故颈部和胸部的痛温觉丧失，而脊髓外肿瘤与之相反。