
# 核心精讲·消化道肿瘤

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、食管癌




⑤

1.好发于食管三个生理性狭窄部，以胸中段最多见

2.早期食管癌 按照深度分类

①肿瘤累及黏膜层、黏膜下层，但没有侵犯肌层

局部淋巴结

无论有无淋巴结转移 ⑥

（可有局部淋巴结转移，但无远处淋巴结转移、血道转移、种植性转移等）

②早期食管癌包括：原位癌（未突破基底膜）、黏膜内癌（未突破黏膜肌层）、黏膜下癌（未突破黏膜下层）

天天师兄

3.中晚期食管癌

（1）大体类型 阳伞虽窄、胸中有水

①髓质型（最多见）

②蕈伞/隆起型

③溃疡型：相对不易梗阻

不能认为不会导致狭窄，溃疡会引起肉芽组织修复，肉芽组织会变成老瘢痕，里面含有很多纤维组织，也会收缩导致狭窄

④缩窄/硬化型：环形狭窄致梗阻

软软的　　纤维收缩





图 11-11　食管癌大体类型

A. 溃疡型；B. 蕈伞型；C. 髓质型；D. 缩窄型。

⑤ 食管三个生理性狭窄部位：
起始部（环状软骨下缘）、左主支气管交叉处、穿过膈肌食管裂孔处

⑥ 理顺知识点：
消化道肿瘤的分期中，关于早期的定义是未侵犯肌层/固有肌层，不考虑局部淋巴结转移，不考虑肿瘤的大小。
因器官周围的淋巴结，一定会出现淋巴回流，此处的转移与是否为早期无关，但不可以有远处转移，考试时通过名字可区分是局部淋巴结，还是远处淋巴结。

VS 早期食管癌/胃癌是无论有无淋巴结转移（局部淋巴结），早期肺癌是一定无淋巴结转移，注意区分。

（2）组织学类型


①**鳞癌最多见**

⑦

②**腺癌：多来自 Barrett 食管**（食管下部的鳞状上皮被柱状上皮取代——**腺上皮化生**，多见于**胃食管反流病**，是食管腺癌的癌前病变，需**定期接受胃镜复查**）

在病理学中当成腺上皮也行

组胚中柱状上皮概念比腺上皮概念更大







柱状上皮薄，血管会显露出来，红彤彤

目前学过的腺上皮化生
- 慢性萎缩性胃炎
  - 假幽门腺上皮
  - 肠上皮化生
- Barrett食管

## 二、胃癌

1.好发于**胃窦小弯**侧

胃癌与幽门螺杆菌息息相关，幽门螺杆菌在幽门附近，所以胃窦小弯是好发部位

2.危险因素

胃溃疡癌变率<1%，但若有异型增生，癌变率会大大增加

⑧

①异型/不典型增生（如胃溃疡伴异型增生）

大2B

②Hp 感染、亚硝胺、慢性萎缩性胃炎特别是伴结肠型不完全肠化（与肠型胃癌密切相关）、胃腺瘤性息肉

⑨

①胃腺癌
②慢性萎缩性胃炎→肠化→胃癌(胃的柱状上皮和肠的柱状上皮不一样)

3.早期胃癌

①肿瘤累及黏膜层、黏膜下层，但**没有侵犯肌层**，**无论有无**淋巴结转移，包括原位癌、黏膜内癌、黏膜下癌

只能有局部淋巴转移

溃疡型

⑩

②类型：凹陷型/溃疡周边癌性糜烂（最多见）、隆起型、表浅型

胃溃疡癌变容易从边缘开始

③**早期胃癌的特殊类型**：微小癌（≤5mm 威武）、小胃癌（6-10mm 小时）、一点癌

一点癌:活检发现肿瘤,做手术时切下来标本没有发现肿瘤,取活检时已经取掉了

4.中晚期胃癌

（1）大体类型

①**溃疡型（最多见）**

②**息肉/蕈伞/结节蕈伞型**（这里就不要说隆起型了、因为隆起型是早期胃癌的类型之一）

③**浸润型**：局限性或弥漫性浸润，若为弥漫性浸润可致**革囊胃/皮革胃（预后最差）**

胃壁完全被浸润+纤维收缩



⑦ 理顺知识点：
胃食管反流病时,大量胃肠内容物反流进入食管,为了适应新环境,食管下端的鳞状上皮化生为胃肠道的柱状上皮(病理学中可认为是腺上皮)。
而此时腺上皮发生癌变时,出现食管腺癌。

化生:一种分化成熟的细胞组织转变为另一种形态功能不同的细胞组织。

⑧ 理顺知识点：
Hp幽门螺旋杆菌与慢性胃炎、胃溃疡、胃癌、胃淋巴瘤均有关,但大多数急性胃炎与Hp感染无关。同时,所有的慢性胃疾病都与胃癌有关,但不是所有的慢性胃疾病都属于癌前病变。
亚硝胺可导致胃癌、肝癌、食管癌

⑨ 理顺知识点：
化生是指一种分化成熟的细胞组织转变为另一种形态功能不同的细胞组织,即不仅仅是腺上皮与鳞状上皮的转变称为化生。
不同类型的腺上皮转变,也称为化生,如萎缩性胃炎的假幽门腺化生和肠上皮化生。

⑩ 理顺知识点：
对胃癌进行分型时,首先根据浸润深度判断是否为早期胃癌,要求局限于粘膜层、粘膜下层,再通过肿瘤大小即直径判断是否符合特殊类型。

早期胃癌中管状腺癌多见,其次为乳头状腺癌,最少见者为未分化癌

VS 外科学中,小于等于1cm为微小肝癌,小于等于5cm为小肝癌,小于等于10cm为大肝癌,大于10cm为巨大肝癌　“一五一十”





图 11-12　中晚期胃癌大体类型
A. 结节蕈伞型；B. 溃疡型；C. 革囊胃。





图 11-12　中晚期胃癌大体类型
A. 结节蕈伞型；B. 溃疡型；C. 革囊胃

（2）组织学类型　肺腺癌特殊类型:县城泡菜NB

①**腺癌最多见**。其中能分泌大量粘液的腺癌为**黏液腺癌/胶样癌**（肿瘤含>50%的黏液成分），肉眼可表现为**胶冻样外观**，但仍属于组织学类型。癌细胞分泌大量粘液至细胞外形成粘液湖；粘液潴留在细胞内为**印戒细胞癌（属于低黏附性癌）**(11)

癌细胞飘在粘液里面

容易发生种植性转移




②少见类型：鳞癌（贲门部）、腺鳞癌、未分化癌（无腺管结构）、类癌（起源嗜银细胞）

癌组织又有腺上皮的部分,又有鳞状上皮的部分　　正常胃是腺管结构

5.转移

①**最早、最常见：淋巴转移**。晚期易转移至**左**锁骨上淋巴结的 **Virchow** (12)

注意：食管癌、胃癌晚期易转移至左锁骨上淋巴结，而肺癌易转移至右锁骨上淋巴结

感性认识:食管、胃的解剖位置偏左

②血道转移：晚期最常转移至**肝脏**　胃肠道静脉血回流到肝脏　(13)

③特别是**胃的印戒细胞癌**常**种植**性转移至**双**侧**卵巢**，形成 **Krukenberg 瘤**

鉴别是原发性卵巢癌还是继发性卵巢癌:单侧还是双侧很有意义　(14)



(11) 再次强调感性认识的重要性,低黏附性癌是25届新增考点,但我们已知印戒细胞癌易脱落到腹腔,发生种植性转移,不难推理出印戒细胞癌是低黏附性癌。

(12) 胃癌最早、最常见淋巴道转移,首先转移到局部淋巴结,最常见于幽门下胃小弯的局部淋巴结,进一步转移至腹主动脉旁淋巴结、肝门或肠系膜根部淋巴结。晚期可经胸导管转移至左锁骨上淋巴结(即Vichow淋巴结)。

(13) 理顺知识点:
门静脉血流来自脾静脉、肠系膜上静脉、肠系膜下静脉、胆囊静脉等。因此,胃肠道肿瘤的血道转移,多转移到肝脏。随后肝脏再转移到肺,肺转移到脑,这些都是血流丰富的部位。

(14) 需注意,双侧卵巢的肿瘤倾向于考虑胃印戒细胞癌的种植转移。
单侧卵巢肿瘤倾向于考虑卵巢的原发性肿瘤。





图 11-13　胃癌常见转移途径和部位示意图






图 11-13　胃癌转移示意图


浅溃疡只见于 — 细菌性痢疾；溃疡性结肠炎
↓
溃疡深度没有达到肌层，只达到粘膜下层

## 6.胃癌溃疡型 VS 胃溃疡

| | 胃溃疡 ttsx 乖 | 胃癌溃疡型 |
|---|---|---|
| 外形 | 圆形或椭圆形 | **火山口或皿状** |
| 大小 | 多＜2cm | **多＞2cm** |
| 深度 | 较深 | 较浅<br>（不是浅溃疡-more than） |
| 边缘 | 整齐、不隆起 | 不整齐、隆起 |
| 底部 | 较平坦 | 凹凸不平，**坏死、出血明显** |
| 周围黏膜 | 黏膜皱襞呈**放射状**（瘢痕收缩）向溃疡集中 | 黏膜皱襞中断、结节状肥厚 |
| 龛影 | 位于胃腔轮廓之**外** | 位于胃腔轮廓之**内** ⑮ |
| 胃酸 | 多正常或↓ | 明显↓（缺乏）和A型胃炎一样 |

和B型胃炎一样，B型胃炎可以变成胃溃疡　　分化差，不具有正常分泌胃酸功能




胃酸明显↓(缺乏)见于 — A型胃炎；胃癌 ⑯






⑮ 理顺知识点：
胃癌首先是一个肿瘤，当肿瘤破溃后形成溃疡，即胃癌的溃疡型。肿瘤高于胃黏膜表面，则此时肿瘤的溃疡高于胃黏膜表面，侧面观类似富士山的火山口状。
当钡剂造影时，溃疡坑形成的龛影则位于胃腔的轮廓之内。


胃溃疡是胃黏膜的深度损伤，溃疡的坑低于胃黏膜，故钡剂造影时，龛影在胃壁之外。

⑯ 串联：


胃酸小结：（最大胃酸分泌）
①胃酸明显减少/缺乏（MAO=0）：A 型胃炎、胃癌
②胃酸减少：B 型胃炎伴大量 G 细胞丧失
③胃酸正常或减少：B 型胃炎、胃溃疡I/IV型 屏障功能↓
④胃酸增加：十二指肠溃疡、胃溃疡II/III型 胃酸分泌↑
⑤胃酸明显 ttsx 增加：胃泌素瘤

天天师兄








胃溃疡







壁外龛影

胃癌







充盈缺损


胃癌溃疡型









壁内龛影



实际胃轮廓
溃疡均被
钡剂所充填


良性
溃疡
龛影


恶性溃疡
腔内龛影

## 三、大肠癌

1.肿瘤只有突破黏膜肌层**到达黏膜下层**才称为癌，否则称为**上皮内瘤变**
原位癌、黏膜内癌预后好,定义成癌容易过度治疗


图 11-14　家族性腺瘤性息肉病

2.好发于**直肠壶腹部**、其次在**乙状结肠**

3.癌前病变⑰

| | |
|---|---|
| 息肉病 | ①家族性/遗传性腺瘤性息肉病 FAP：未经治疗 **100%**癌变<br>②增生性息肉**病**、幼年性息肉**病**　xx息肉❌<br>③**色素沉着黑斑息肉综合征 Peutz-Jeghers**<br>④**肠息肉病合并多发性骨瘤和软组织瘤 Gardner** Gu-骨<br>⑤胶质瘤息肉病综合征 Turcot 桃胶 |
| **腺瘤** | 管状腺瘤最常见、**绒毛状腺瘤易癌变**惹毛了就癌变、混合型腺瘤、息肉状腺瘤 |
| 其它 | 慢性**血吸虫**病、**溃疡性结肠炎**（克罗恩病也可）炎症性肠病:克罗恩病、溃疡性结肠炎 |




4.中晚期大肠癌 不讨论早期

（1）大体类型（左亲右拢溃疡多）


①**溃疡型**（**最多见**，因直肠癌以溃疡型最多见）


②**隆起/息肉/蕈伞型**（多分化较高）：**右**侧结肠癌隆起型多见，**腹部肿块和全身症状（低热/贫血/消瘦）多见**
肿瘤会消耗机体,会有一些免疫反应

⑱

③**浸润型**：**左**侧结肠癌浸润型多见，**肠梗阻（大便细）和便血多见** 离肛门近
肠道越到肛门越细,加之肿瘤浸润,水分少(被吸收)→容易发生肠梗阻,大便变细
癌容易出现坏死出血,但是便血跟出血的位置有关,如右侧结肠离肛门远,出血被稀释

注意：胶样型在 10 版教材 P219 已删除



胃鳞癌(在贲门部)

（2）组织学类型：**腺癌（最多见）**、鳞癌（直肠肛门附近）

**组织学类型中的黏液腺癌/胶样癌在大肠癌中预后最差**（黏液胶样预后差）
胃癌预后最差:弥漫性浸润导致革囊胃/皮革胃



⑰ 记忆技巧:
大肠癌的癌前病变记忆为:息肉病(强调"病",并非息肉)+腺瘤(强调管状腺瘤才是最常见的,绒毛状腺瘤易癌变)+慢性血吸虫病(虫卵易沉积在直肠、乙状结肠)+炎症性肠病(包括溃疡性结肠炎UC和克罗恩病CD),其中包括三个英文,即P-J综合征、Gardner综合征、Turcot综合征。

⑱ 理顺知识点:
左侧大肠癌以浸润型多见,但易发生梗阻。右侧大肠癌以隆起型多见,但易出现全身症状。这与直觉相反

右侧的大肠具有一定的吸收功能(消化吸收的主要部位在十二指肠、空肠上段),肿瘤影响其消化吸收,出现消瘦症状,并且肿瘤易出血,可出现贫血症状,低热是恶性疾病的一般表现。
左侧大肠较细,且水分已在近端消化道吸收完全,此时粪便干硬,即便是浸润型肿瘤,仍易发生肠梗阻,且左侧大肠更靠近肛门,易出现便血症状。

一般规律:癌转移最早最常见:淋巴转移

5.转移：**胃肠道癌晚期血道转移至肝可有牛眼征** (19)

外面一圈明显强化(血供丰富),越靠近里面就越黑(血供差,缺血坏死)



6.与大肠癌密切相关的基因（尤其 ***APC、KRAS、TP53***）ARDS

①原癌基因：*c-MYC*、*RAS*、*BRAF* RMB

吉尔救RAS咳咳咳

②抑癌基因：*p53*、*p16*、***APC*（遗传性腺瘤性息肉病）**、*DCC*、*MCC*、*DPC*（墨督督 app）

③**错配修复基因：*MLH* 和 *MSH*（遗传性非息肉病性大肠癌/Lynch 林奇综合征）**

非错不可霉死了





图 11-15　结直肠黏膜上皮逐步癌变的分子生物学基础

7.Dukes 分期 了解





图 11-16　结直肠癌 Dukes 分期示意图

A 期，肿瘤局限于黏膜层；$B_1$ 期，肿瘤未穿透肌层，无淋巴结转移；$B_2$ 期，肿瘤穿透肌层，但无淋巴结转移；$C_1$ 期，肿瘤未穿透肌层，但有淋巴结转移；$C_2$ 期，肿瘤穿透肠壁，并有淋巴结转移；D 期，有远处转移。

肿瘤只有突破黏膜肌层到达黏膜下层才称为癌,否则称为上皮内瘤变

A：黏膜内癌，无淋巴结转移（100%）

$B_1$：未穿透肌层，无淋巴结转移（67%）

$B_2$：穿透肠壁，无淋巴结转移（54%）

$C_1$：未穿透肌层，有淋巴结转移（43%）

$C_2$：穿透肠壁，有淋巴结转移（22%）

D：肝、肺、骨、皮肤的远处转移（存活率极低）

(19) 理顺知识点:

牛眼征是转移性肝癌的特殊影像学征象,而非大肠癌肝转移的特征,胃癌肝转移后,同样可出现牛眼征。

## 真题解析 • 消化道肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N165 X 中晚期食管癌的肉眼类型有
   A.胶样型　阳伞虽窄,胸中有水
   B.髓质型
   C.溃疡型
   D.隆起型

2. 2015N47 A 双侧卵巢肿大，活检发现癌细胞，首先应考虑癌细胞来源于
   A.胃　印戒细胞(低黏附癌)种植性转移
   B.肠
   C.卵巢
   D.子宫

3. 2015N133-134 B
   A.溃疡型
   B.隆起型　左亲右拢溃疡多,黏液胶样预后差
   C.浸润型
   D.胶样型
   组织学上表现为黏液癌的大肠癌类型是
   较易引起肠梗阻的大肠癌类型是

4. 2015N165 X 胃癌的肉眼类型有
   A.胶样型
   B.溃疡型
   C.浸润型
   D.蕈伞型

5. 2018N153 X 下列选项中，符合早期胃癌描述的有　用深度定义
   A.肿瘤最大径小于 2cm
   B.肿瘤尚未侵及肌层
   C.可有局部淋巴结转移 无论有无淋巴转移
   D.可有单个的肝转移灶 →晚期通过血道转移至肝

6. 2019N33 A 关于早期胃癌的叙述中，不正确的是
   A.癌细胞不能侵犯粘膜下层　不能侵犯肌层
   B.可有胃周淋巴结转移
   C.大多数属于腺癌
   D.无远处转移

   3.早期胃癌
   ①肿瘤累及黏膜层、黏膜下层，但没有侵犯肌层，无论有无淋巴结转移，包括原位癌、黏膜内癌、黏膜下癌　只能有局部淋巴转移

7. 2020N152 X 下列病变中，属于胃癌晚期的有
   A.癌细胞浸润至黏膜下层
   B.癌细胞转移至双侧卵巢 种植性转移
   C.癌细胞转移至局部淋巴结

答案:1-7 BCD A DC BCD BC A BD

D.癌细胞转移至左锁骨上淋巴结 远处淋巴结

8.2021N34 A 胃癌的好发部位是
A.胃窦 与幽门螺杆菌有关
B.胃后壁
C.胃前壁
D.胃底

9. 2022N39 A Virchow 淋巴结穿刺标本中发现癌细胞，最可能的原发灶是
A.大肠
B.胃
C.肝
D.肺

10.2023N153 X 与大肠癌发生有关的病变有
A.幼年性息肉病
B.溃疡性结肠炎
C.家族性腺瘤性息肉病
D.绒毛状腺瘤

3.癌前病变 危险因素plus

| | |
|---|---|
| 息肉病 | ①家族性/遗传性腺瘤性息肉病 FAP：未经治疗 **100%**癌变<br>②增生性息肉**病**、幼年性息肉**病** xx息肉❌<br>③**色素沉着黑斑息肉综合征 Peutz-Jeghers**<br>④**肠息肉病合并多发性骨瘤和软组织瘤 Gardner** Gu-骨<br>⑤胶质瘤息肉病综合征 Turcot 桃胶 |
| **腺瘤** | 管状腺瘤最常见、**绒毛状腺瘤易癌变** 惹毛了就癌变、混合型腺瘤、息肉状腺瘤 |
| 其它 | 慢性**血吸虫**病、**溃疡性结肠炎**（克罗恩病也可）炎症性肠病:克罗恩病,溃疡性结肠炎 |

华支睾吸虫→肝内胆管细胞癌　血吸虫→大肠癌

11. 2024N38 A “革囊胃”所对应的胃癌大体类型是
A.息肉型
B.蕈伞型
C.溃疡型
D.弥漫浸润型

12.2025N37 A 下列胃癌类型中，属于低黏附性癌的是
A.管状腺癌
B.印戒细胞癌
C.乳头状腺癌
D.腺鳞癌

**思维导图·消化道肿瘤**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心




答案:8-12 A B ABCD D B