


Phylum Composition of Dung Pellet


Relative Abundance (Phyla > 2%)



Phylum


- Neocallimastigomycota
- Mucoromycota
- Basidiomycota
- Ascomycota

Class Composition of Dung Pellets



Genus Composition of Dung Pellets

Relative Abundance (Class > 2%)



Class

- Ustilaginomycetes
- Tremellomycetes
- Taphrinomycetes
- Sordariomycetes
- Saccharomycetes
- Pezizomycetes
- Neocallimastigomycetes
- Leotiomycetes
- Eurotiomycetes
- Dothideomycetes
- Cystobasidiomycetes
- Agaricomycetes

Class Composition of Dung Pellets

Relative Abundance (Class > 2%)

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

Class

- Ustilaginomycetes
- Tremellomycetes
- Taphrinomycetes
- Sordariomycetes
- Saccharomycetes
- Pezizomycetes
- Neocallimastigomycetes
- Leotiomyces
- Eurotiomycetes
- Dothideomycetes
- Cystobasidiomycetes
- Agaricomycetes

Sample

A01 A16 A62 A68 A70 B01 B11 B14 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B69 B70 B71 B72 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B80 B81 B82 B83 B84 B85 B86 B87 B88 B89 B90 B91 B92 B93 B94 B95 B96 B97 B98 B99