

精神の非平衡統計場理論

スピングラスにおける階層的自己・量子臨界性・意味相転移

- 臨界脳理論・認知スピングラス理論・繰り込み群理論と認知相転移の普遍性 -

(Consciousness as a Nonequilibrium Critical Integrated Field Toward a
Unified Theory of Emergent Consciousness)

Ver.1.1.0

竹本 聡

2026 年 7 月 14 日

目次

第 1 部	イントロダクション	4
0.1	Abstract	5
0.2	イントロダクション	7
0.2.1	意識を「活動」ではなく「状態」として捉える：非平衡臨界統合場の立場	7
0.2.2	物理概念と心理現象の構造的対応：概念対応マッピング	9
0.3	意識の基本方程式（CCFE）の解説	9
0.4	「臨界性」がもたらす 2 つの魔法：神経雪崩と $1/f$ ゆらぎ	10
0.4.1	神経雪崩	10
0.4.2	$1/f$ ゆらぎ	10
0.4.3	臨界性が導く二つの普遍現象：神経雪崩と $1/f$ ゆらぎ	10
0.5	主観的時間の正体：慣性と遅延が生む「現在」の幅	11
0.5.1	精神病理の可視化：自由エネルギー地形としての理解	11
0.6	結論	11
0.6.1	結論的見取り図：自己とは持続する臨界的情報流である	11
第 2 部	非平衡スピングラス量子臨界意識理論への拡張	14
第 1 章	はじめに	15
1.1	序論：意識の物理学的転換と非平衡臨界統合場の定義	15
1.2	意識の基本方程式（CCFE）とスピングラス的複雑性	16
1.3	臨界現象と意識の動態：神経雪崩と $1/f$ ゆらぎ	17
1.3.1	神経雪崩と情報の柔軟性	17
1.3.2	$1/f$ ゆらぎと Critical Slowing Down	17

1.4	主観的時間と再帰構造：DMFT による記憶核の導入	18
1.5	結論と今後の展望：ユニバーサリティの解明に向けて	18
第 2 章	非平衡認知統計場理論とは何か	19
2.1	序論	19
2.2	なぜ統計場理論なのか	20
2.3	なぜ非平衡なのか	21
2.4	認知と確率流	21
2.5	認知場の定義	22
2.6	認知系の三要素	22
2.7	意識の位置づけ	23
2.8	本書の基本方針	23
第 3 章	臨界脳理論	25
3.0.1	序論	25
3.0.2	相転移と臨界現象	26
3.0.3	相関長の発散	26
3.0.4	臨界 slowing down	27
3.0.5	神経雪崩	27
3.0.6	自己組織化臨界性	28
3.0.7	$1/f$ ゆらぎ	28
3.0.8	情報統合と臨界性	29
3.0.9	Predictive Processing との関係	29
3.0.10	CCFE	30
3.0.11	意識の定義	30
3.0.12	本章の結論	30
3.1	認知スピングラス理論	32
3.1.1	序論	32
3.1.2	認知状態空間	32
3.1.3	認知エネルギー	33
3.1.4	認知的フラストレーション	33
3.1.5	自由エネルギー地形	34
3.1.6	記憶の統計力学	34
3.1.7	自己同一性	34

3.1.8	Edwards–Anderson 秩序変数	35
3.1.9	認知エーシング	35
3.1.10	無意識	35
3.1.11	意味の形成	36
3.1.12	人格	36
3.1.13	精神疾患	36
3.1.14	CCFE との統合	37
3.1.15	本章の結論	37
3.2	自己と主観性の統計力学	38
3.2.1	序論	38
3.2.2	レプリカ法	38
3.2.3	重なり秩序変数	39
3.2.4	認知的解釈	40
3.2.5	Replica Symmetry	40
3.2.6	Replica Symmetry Breaking	41
3.2.7	自己の階層構造	41
3.2.8	時間的自己	41
3.2.9	主観性	42
3.2.10	自己の連続性	42
3.2.11	夢と変性意識	43
3.2.12	無意識	43
3.2.13	人格	44
3.2.14	CCFE との統合	44
3.2.15	本章の結論	45
3.3	意味と情報の統計場理論	46
3.3.1	序論	46
3.3.2	情報と意味の違い	46
3.3.3	認知状態空間	47
3.3.4	Predictive Processing	47
3.3.5	自由エネルギー原理	48
3.3.6	意味の生成	48
3.3.7	認知アトラクタ	49
3.3.8	意味ネットワーク	49

3.3.9	情報統合理論	50
3.3.10	意味と統合情報	50
3.3.11	意味場	51
3.3.12	意味の秩序変数	51
3.3.13	意味相転移	51
3.3.14	主観的意味	52
3.3.15	CCFE との統合	52
3.3.16	本章の結論	53
3.4	非平衡認知統計場理論の動的平均場理論	54
3.4.1	序論	54
3.4.2	認知スピングラス方程式	54
3.4.3	スピングラス結合	55
3.4.4	平均場極限	55
3.4.5	有効単一サイト理論	56
3.4.6	自己無撞着条件	56
3.4.7	応答関数	57
3.4.8	揺動散逸定理の破れ	57
3.4.9	意味場の DMFT	58
3.4.10	情報統合場	58
3.4.11	非平衡エントロピー生成	59
3.4.12	認知臨界点	59
3.4.13	認知相図	60
3.4.14	DMFT による意識定義	60
3.4.15	本章の結論	61
3.5	非平衡認知統計場理論の作用原理	62
3.5.1	序論	62
3.5.2	認知場の運動方程式	62
3.5.3	確率過程としての認知場	63
3.5.4	MSRJD 形式	63
3.5.5	Schwinger–Keldysh 形式	64
3.5.6	Keldysh 変換	64
3.5.7	スピングラス平均	65
3.5.8	重なり場	65

3.5.9	意味場	65
3.5.10	認知場と意味場の結合	66
3.5.11	情報統合場	66
3.5.12	非平衡エントロピー生成	66
3.5.13	NCSFT 作用	67
3.5.14	生成汎関数	67
3.5.15	意識状態の定義	67
3.5.16	本章の結論	68
3.6	繰り込み群理論と認知相転移の普遍性	69
3.6.1	序論	69
3.6.2	スケール変換	69
3.6.3	認知場のスケーリング	70
3.6.4	Landau-Ginzburg 部分	70
3.6.5	上部臨界次元	71
3.6.6	Wilson 繰り込み	71
3.6.7	ベータ関数	72
3.6.8	固定点	72
3.6.9	認知臨界点	73
3.6.10	相関長指数	73
3.6.11	動的臨界指数	73
3.6.12	スピングラス固定点	74
3.6.13	Replica Symmetry Breaking	74
3.6.14	意味相転移	75
3.6.15	情報統合のスケーリング	75
3.6.16	意識相転移	75
3.6.17	認知相図	76
3.6.18	普遍性仮説	76
3.6.19	本章の結論	77
3.7	意識・自己・自由意志の統一理論	78
3.7.1	序論	78
3.7.2	意識とは何か	78
3.7.3	意識存在条件	79
3.7.4	自己とは何か	79

3.7.5	自己同一性	80
3.7.6	人格	80
3.7.7	無意識	81
3.7.8	主観性	81
3.7.9	意味	81
3.7.10	自由意志	82
3.7.11	時間意識	82
3.7.12	死と意識	83
3.7.13	人工意識	83
3.7.14	宇宙と意識	84
3.7.15	統一作用	84
3.7.16	統一方程式	84
3.7.17	最終結論	85
第 4 章	認知スピングラス理論における精神疾患の数理物理学の定式化：	
	認知的フラストレーションの役割と臨床診断基準への翻訳	86
4.1	序論	86
4.2	認知的フラストレーションの数理物理学的作用	86
4.2.1	有効ハミルトニアンとフラストレーションの定義	86
4.2.2	メタ安定性と人格の創発	88
4.3	精神疾患の物理学の解釈と医学的翻訳案	88
4.3.1	統合失調症：アトラクタの解体と自他境界の喪失	88
4.3.2	うつ病：アトラクタの過凝縮と柔軟性の喪失	88
4.3.3	解離性障害：アトラクタ集合の分裂	89
4.4	数理構造の詳細解説	89
4.4.1	Edwards-Anderson 秩序変数 q_{EA}	89
4.4.2	意識臨界場方程式 (CCFE) における非線形項と相互作用	89
4.4.3	スペクトル勾配 β と意識の相	90
4.5	結論	90
第 5 章	精神疾患の数理物理学的可視化	91
5.1	可視化の基本設計	91
5.2	正常状態：メタ安定な多谷地形	91
5.3	統合失調症：アトラクタ崩壊（浅く乱れた地形）	91

5.4	うつ病：アトラクタ過凝縮（深すぎる単一谷）	92
5.5	解離性障害：アトラクタ集合の分裂（多谷＋強分離）	92
5.6	秩序変数空間での相可視化： $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$	93
5.7	3D 散布図：正常クラスター	95
第 6 章	シミュレーションによる管理指標の検証と理論的考察	96
6.1	はじめに	96
6.2	Python コード	97
6.3	実行結果	99
6.4	はじめに	99
6.5	理論的枠組み：意識を「場の状態」として捉える	99
6.6	意識臨界場方程式（CCFE）	100
6.6.1	臨界性が導く神経雪崩と $1/f$ ゆらぎ	100
6.6.2	主観的時間：慣性と遅延が生む「現在」の幅	100
6.7	非平衡認知統計場理論（NCSFT）	100
6.7.1	認知系の三要素と意識相の定義	100
6.7.2	DMFT による有効単一サイト理論	101
6.7.3	意識相条件	101
6.8	シミュレーション：管理指標（KPI）の検証と推定上の落とし穴	101
6.8.1	設定	101
6.8.2	結果： β は相分類に有効	101
6.8.3	結果： Q は「保持と更新のバランス」を反映	102
6.8.4	結果：相関ベース Φ の限界（同期と統合の混同）	102
6.8.5	結果：簡易 $\dot{S}$ 推定の逆転現象と非平衡推定の難所	102
6.9	臨床・実験系への翻訳：物理変数から測定可能指標へ	102
6.10	考察	102
6.11	結論	103
6.12	臨界性の指標（ β ）の挙動とパワースペクトル解析	103
6.13	自己相関変数（ Q ）の挙動と自己同一性の維持	104
6.14	情報統合（ Φ ）と非平衡性（ $\dot{S}$ ）における理論と実験的近似の差異	104
付録 A	解説	106
A.1	導入：意識を活動ではなく状態として捉える	106
A.1.1	中心仮説	106

A.1.2	統合情報：空間＋時間	106
A.1.3	理論：CCFE と NCSFT	106
A.1.3.1	意識臨界場方程式（CCFE）	106
A.1.3.2	臨界性が導く神経雪崩と $1/f$ ゆらぎ	107
A.1.3.3	主観的時間：慣性と遅延が生む「現在」の幅	107
A.1.3.4	非平衡認知統計場理論（NCSFT）	107
A.1.3.5	DMFT による有効単一サイト理論	107
A.1.3.6	意識相条件	107
A.1.4	シミュレーション：管理指標（KPI）の検証と推定上の落とし穴	108
A.1.4.1	設定	108
A.1.4.2	結果： β は相分類に有効	108
A.1.4.3	結果： Q は「保持と更新のバランス」を反映	108
A.1.4.4	結果：相関ベース Φ の限界（同期と統合の混同）	108
A.1.4.5	結果：簡易 $\dot{S}$ 推定の逆転現象と非平衡推定の難所	108
A.1.5	臨床・実験系への翻訳：物理変数から測定可能指標へ	108
A.1.6	結論	109
A.2	位置づけ：なぜ「空間＋時間」で統合情報を扱うのか	110
A.2.1	定義： $\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}}$	110
A.2.2	Φ_{space} （空間的統合）	110
A.2.3	Φ_{time} （時間的統合）	110
A.2.4	主観的自己との関係：時間に拡張された再帰構造	111
A.2.5	力学モデル（CCFE）における空間項と時間項の対応	111
A.2.6	推定上の注意：相関代用の限界	111
A.3	統合意識理論における記憶核 K の畳み込み：数理物理学的定式化と存在論的意義に関する考察	112
A.3.1	序論：意識場における非 Markov 性の導入	112
A.3.2	数理的定式化：畳み込み積分による履歴の統合	112
A.3.3	動的平均場理論（DMFT）における自己エネルギーとしての記憶核	113
A.3.4	臨界スローイングダウンと人格の連続性	113
A.3.5	現象学的意義：把持・原印象・予持の統合	113
A.3.6	結論	114

A.4	非平衡臨界統合場としての意識： 統合意識理論における数理物理学的定式化と存在論的意義	115
A.4.1	序論：意識の物理的再定義	115
A.4.2	最終支配方程式：意識臨界場方程式 (CCFE)	115
A.4.3	構成要素の物理的特性と創発条件	116
A.4.3.1	非平衡性と不可逆性	116
A.4.3.2	臨界性と長距離相関	116
A.4.3.3	情報統合 (Φ)	116
A.4.4	存在論的転換：プロセス存在論における「私」	116
A.4.5	結論：意識存在定理	117
A.5	統合意識理論における遅延同期の数理物理学的役割と主観的時間の創 発に関する考察	118
A.5.1	序論：有限伝播速度の物理的必然性	118
A.5.2	数理的定式化：遅延 Kuramoto モデルと CCFE への統合	118
A.5.3	遅延同期がもたらす物理的特性	119
A.5.3.1	メタ安定性の創出	119
A.5.3.2	$1/f$ ゆらぎと臨界スローイングダウン	119
A.5.4	現象学的・存在論的意義：主観的時間の誕生	119
A.5.5	予測的情報処理による遅延補償	119
A.5.6	結論	120
A.6	統合意識理論における $1/f$ ゆらぎ： 非平衡臨界意識場における時間的相関構造の数理物理学的定式化	121
A.6.1	序論： $1/f$ ゆらぎと臨界脳仮説	121
A.6.2	数理物理学的起源と発生メカニズム	121
A.6.2.1	臨界スローイングダウン (Critical Slowing Down)	121
A.6.2.2	動動的平均場理論 (DMFT) による定式化	122
A.6.3	意識状態とスペクトル勾配 β の相関	122
A.6.4	現象学的・存在論的意義	122
A.6.4.1	主観的時間の連続性（延び広がりのある現在）	122
A.6.4.2	自己同一性の担保（プロセス存在論）	123
A.6.5	結論	123
A.7	実験手順：測定プロトコルと管理指標 (KPI)	124
A.7.1	測定データと前処理	124

A.7.2	KPI1：臨界性（スペクトル勾配 β ）	124
A.7.3	KPI2：自己同一性（自己相関指標 Q ）	124
A.7.4	KPI3：統合（ Φ の推定）	125
A.7.5	KPI4：非平衡性（エントロピー生成率 $\dot{S}$ ）	125
A.7.6	相図推定と介入モニタリング	125
A.8	理論導出：臨界性と $1/f$ ゆらぎ、CCFE/DMFT への接続	125
A.8.1	相関長の発散： $\xi \sim r - r_c ^{-\nu}$	126
A.8.2	臨界スローイングダウン： $\tau \sim \xi^z$	126
A.8.3	$1/f$ ゆらぎ：長時間相関とスペクトル	126
A.8.4	CCFE：臨界統合場の運動方程式	126
A.8.5	DMFT：巨大自由度を有効単一自由度へ	127
A.9	CCFE 項の分担：各項の物理的役割と理論内での機能	127
A.9.1	臨界制御パラメータ r ：相転移の距離	127
A.9.2	慣性項 $m\partial_t^2\Psi$ ：持続性（厚みのある現在）	127
A.9.3	散逸項 $\Gamma\partial_t\Psi$ とノイズ ξ ：非平衡開放系としての揺らぎ	128
A.9.4	線形項 $-r\Psi$ と非線形項 $u\Psi^3$ ：多安定性とアトラクタ	128
A.9.5	空間結合 $K\nabla^2\Psi$ ：長距離相関（全脳的統合）の空間的側面	128
A.9.6	統合情報結合 $\lambda\Phi$ ：統合（Binding）を力学へ組み込む	128
A.9.7	遅延項 $D\Psi(t - \tau)$ と記憶核：再帰的自己参照と時間的統合	128
A.10	DMFT の完全形（独立性・自己平均化・応答関数を含む）	129
A.10.1	厳密な独立性（quenched disorder と動力学の分離）	129
A.10.2	自己平均化（self-averaging）と秩序関数の定義	130
A.10.3	局所場のガウス化と有効単一サイト表現	130
A.10.4	自己無撞着条件（完全形： C と R で閉じる）	131
A.10.5	応答関数の運動方程式（線形化による形）	132
A.10.6	最終的な DMFT 方程式系（まとめ）	132
A.11	人格＝アトラクタ集合の生成過程・長期性・時空依存性の数理解説	133
A.11.1	位置づけ（本付録の目的）	133
A.11.2	出発点：フラストレーションが多数のアトラクタを作る	133
A.11.3	人格（アトラクタ集合）生成の力学的過程	134
A.11.3.1	(1) “地形生成” と “地形上の運動” の分離	134
A.11.3.2	(2) Hopfield 型埋め込みとしての最小モデル	134
A.11.3.3	(3) “人格集合” の抽出：占有率による定義	134

A.11.4	長期性とは何か：寿命（滞在時間）で定義する	135
A.11.4.1	(1) アトラクタ寿命の定義	135
A.11.4.2	(2) 障壁と遷移率（Kramers 型）	135
A.11.4.3	(3) “人格が長期” の意味：二つの長期	135
A.11.5	時間が必要な理由：自己同一性は長時間相関として定義される	136
A.11.6	空間が必要な理由：認知場 $\Psi(x, t)$ と時空相関	136
A.11.7	遅延・記憶核がもたらす拡張：アトラクタは履歴空間の対象 になる	137
A.11.8	結論（要約）	137
A.12	人格集合の推定手順：EEG/MEG 時系列から $\pi_\alpha, \tau_\alpha, q_{EA}$ を近似推 定する	138
A.12.1	目的と基本方針	138
A.12.2	データと前処理（推奨）	138
A.12.3	アトラクタ同定のための状態表現（低次元埋め込み）	139
A.12.4	アトラクタ候補 $\{A_\alpha\}$ の抽出（クラスタリング）	139
A.12.5	占有率 $\pi_\alpha(T)$ の推定	139
A.12.6	寿命（平均滞在時間） τ_α の推定	140
A.12.7	q_{EA} の近似推定（自己同一性の指標）	140
A.12.8	KPI ($\beta, Q, \Phi, \dot{S}$) との接続：人格推定の妥当性チェック	141
A.12.9	推定された人格集合の最終定義（実装形）	142
A.13	空間項 $K\nabla^2\Psi$ の詳細解説（伝播・長距離相関＝全脳的統合の空間的 側面）	143
A.13.1	ラプラシアン ∇^2 の数式的意味（定義と直観）	143
A.13.2	$K\nabla^2\Psi$ が「伝播」を生む理由（拡散・平滑化としての解釈）	143
A.13.3	離散化したときの最重要な見取り図（近傍平均との差）	144
A.13.4	フーリエ空間での解釈： $-Kk^2$ による短波長モードの抑制	144
A.13.5	長距離相関（全脳的統合）との接続：相関長 ξ の役割	145
A.13.6	要点	145
付録 B	考察	147
B.1	統合意識理論（CCFT）における数理物理モデルと臨床・実験系の架 橋：理論的弱点の克服と考察の拡張	147
B.1.1	序論：意識臨界場理論の戦略的価値と現段階における課題	147

B.1.2	CCFE と精神疾患の相関：物理・医学間のギャップの埋設 . . .	149
B.1.3	生体内マグネタイトと磁性回転項 (λ) の生物学的・物理的翻訳	150
B.1.4	実験検証のための管理指標と具体的測定プロトコル	150
B.1.5	結論：弱点克服による「統合意識理論」の完成への道	151
B.2	アトラクタ・クオリア・メタ安定性の統合的理解	153
B.2.1	本理論の位置づけ	153
B.2.2	アトラクタ：自由エネルギー地形の「谷」としての安定状態 . . .	153
B.2.3	非線形項 $u\Psi^3$ の意義：多安定性とクオリア多様性の生成 . . .	153
B.2.4	メタ安定性：スピングラス的複雑性と柔軟な遷移	154
B.2.5	三者の統合：アトラクタ・クオリア・メタ安定性	155
B.2.6	結論	155
B.3	神経雪崩が「情報の柔軟な伝播」を保証するとは何か	156
B.3.1	問題設定	156
B.3.2	神経雪崩とは何か：スケールフリーな伝播事象	156
B.3.3	「柔軟な伝播」の物理学的含意：亜臨界と超臨界の回避 . . .	156
B.3.4	機能的解釈：応答可能性（ダイナミックレンジ）と選択性 . . .	157
B.3.5	結論	157
B.4	周波数成分が意識に与える影響 — 低周波優位・長時間相関・自己の 一貫性	158
B.4.1	問題設定	158
B.4.2	周波数と時間スケール：なぜ低周波は「過去」を運ぶのか . . .	158
B.4.3	意識への機能的帰結：一貫性（物語性）と統合の成立	158
B.4.4	臨界相 ($\beta \simeq 1$) の意味：低周波と高周波のバランス	160
B.4.5	結論	160
B.5	主観的時間の正体：慣性と遅延が生む「現在」の幅（物理学的解説）	161
B.5.1	問題設定：なぜ「現在」は点でなく幅を持つのか	161
B.5.2	出発点：CCFE とその「現在幅」生成に関わる項	161
B.5.2.1	線形化の意味	161
B.5.3	慣性を作る残響：2 階時間微分の Green 関数	161
B.5.3.1	応答が「瞬間で終わらない」ことが現在幅の最小条件	162
B.5.4	遅延を作る自己参照： $\Psi(t-\tau)$ による再帰	162
B.5.4.1	遅延＝周波数依存のフィードバック	162
B.5.5	記憶核（畳み込み）による一般化：非 Markov 性と現在の幅 . .	163

B.5.6	臨界近傍での決定的な増幅：相関時間の発散	163
B.5.7	結論	164
B.6	認知的フラストレーション・アトラクタ記憶・無意識の関係— 意識 場 Ψ ・臨界ダイナミクス・記憶核/遅延項に基づく数理物理的考察 . .	165
B.6.1	問題設定	165
B.6.2	フラストレーションが作るアトラクタ地形：記憶の「保存場所」	165
B.6.2.1	認知スピングラスの最小モデル	165
B.6.2.2	Hopfield 的に見た「記憶＝アトラクタ」	165
B.6.3	無意識とは何か：アトラクタ集合の「非アクセス部分」 . . .	166
B.6.3.1	アトラクタ集合の分解	166
B.6.3.2	なぜ「存在するのにアクセスされない」のか：バリ アと力学の条件	166
B.6.4	意識場 Ψ とアトラクタ：場としての「アクセス可能性」 . . .	166
B.6.4.1	CCFE とアトラクタの二重記述	166
B.6.4.2	臨界性が「アクセス可能性」を最大化する理由 . .	167
B.6.5	遅延項・記憶核：無意識記憶が現在へ混入する物理機構 . . .	167
B.6.5.1	遅延項による自己参照（短い履歴）	167
B.6.5.2	記憶核（畳み込み）による一般化（長い履歴） . .	167
B.6.5.3	無意識との接続：アトラクタの「痕跡」としての履 歴項	168
B.6.6	まとめ：フラストレーションから無意識へ	168
B.7	Edwards–Anderson 秩序変数 q_{EA} が大きいほど精神状態が安定であ ることの数理的意味	169
B.7.1	自由エネルギー地形の曲率（ヘッシアン）と Kramers 遷移率 による安定性の定式化	170
B.8	Replica Symmetry Breaking (RSB) の数理物理学的考察	173
B.8.1	目的	173
B.8.2	disorder 平均とレプリカ trick	173
B.8.3	重なり秩序変数	173
B.8.4	Replica Symmetry (RS) とその破れ	173
B.8.5	Parisi の RSB：階層構造 $q(x)$	174
B.8.6	結論	174

B.9	RSB 階層構造と遅延・記憶核を統合した自己・主観性の数理物理学 的考察	175
B.9.1	目的と立場	175
B.9.2	純状態分解：多数アトラクタの測度論的定式化	175
B.9.3	重なり秩序変数と RSB：状態間幾何の導入	175
B.9.3.1	重なりの定義	175
B.9.3.2	Parisi の RSB：階層関数 $q(x)$	176
B.9.4	入れ子クラスタリング（ツリー構造）と超計量性	176
B.9.4.1	ツリー構造としての直観	176
B.9.4.2	超計量性	176
B.9.4.3	自己の階層構造への翻訳	176
B.9.5	遅延項・記憶核：再帰的自己参照と時間的統合	177
B.9.5.1	遅延同期による自己参照ループ	177
B.9.5.2	DMFT における記憶核（畳み込み）	177
B.9.5.3	CCFE/拡張方程式における位置づけ	177
B.9.6	統合像：RSB 階層（空間的・状態的）と記憶核（時間的）	177
B.9.6.1	二つの「階層」：状態空間と時間	177
B.9.6.2	主観性の最小要件としての結合	178
B.9.7	結論	178
B.10	RSB により階層化された自己状態群（純状態集合）の考察	179
B.10.1	問題設定：自己状態群とは何か	179
B.10.2	純状態分解：多谷構造の測度論的基礎	179
B.10.2.1	自己状態群の最小定義	179
B.10.3	重なり：自己状態間の類似度	180
B.10.4	RSB：単一の自己から階層的自己群へ	180
B.10.5	RS（レプリカ対称）とその限界	180
B.10.5.1	Parisi の RSB：階層関数 $q(x)$	180
B.10.6	自己状態群の階層構造：入れ子クラスタリングとツリー	181
B.10.7	入れ子クラスタリングの意味	181
B.10.7.1	超計量性（ultrametricity）と自己状態の距離	181
B.10.7.2	階層の心理学的読み替え（概念的考察）	181
B.10.8	人格・無意識を含む多谷構造としての自己状態群	182
B.10.8.1	人格（personality）	182

B.10.8.2	無意識 (unconsciousness)	182
B.10.9	まとめ	182
B.11	スピングラス的認知系の臨界化に伴う意味場の相転移について	184
B.11.1	問題設定	184
B.11.2	前提：認知場の臨界化とスピングラス的多谷構造	184
B.11.2.1	臨界点近傍の一般論	184
B.11.2.2	スピングラス的認知系としての特徴	184
B.11.3	意味場と意味相転移の最小モデル	185
B.11.3.1	意味場の Landau 型自由エネルギー	185
B.11.3.2	「意味相転移」の認知的解釈	185
B.11.4	臨界化が意味相転移を誘起する機構：結合による有効パラメータの流れ	185
B.11.4.1	認知場と意味場の結合	185
B.11.4.2	臨界ゆらぎによる意味場の有効質量 (α) の変化	186
B.11.4.3	相関長の増大と意味ネットワークの大域整合	186
B.11.5	スピングラス性 (多谷) と意味相転移の両立：競合と選択	187
B.11.5.1	意味＝アトラクタであることとの整合	187
B.11.5.2	臨界性の役割：保持と更新の最適点	187
B.11.6	結論	187
B.12	補足考察：RSB (階層的アトラクタ) と意味相転移の整合 —超計量意味空間の秩序化として—	188
B.12.1	目的と位置づけ	188
B.12.2	RSB：純状態分解と重なり幾何	188
B.12.2.1	純状態分解 (多谷構造の測度論的定式化)	188
B.12.2.2	重なり秩序変数と Parisi の階層関数	188
B.12.2.3	入れ子クラスタリングと超計量性	189
B.12.3	意味＝アトラクタ幾何：意味空間の超計量化	189
B.12.3.1	意味の定義と意味ネットワーク	189
B.12.3.2	RSB ツリーを意味空間の基底とする	190
B.12.4	意味場と意味相転移：超計量意味空間の秩序化	190
B.12.4.1	意味場と秩序変数	190
B.12.4.2	Landau 型自由エネルギーと意味相転移	190
B.12.4.3	超計量意味空間における秩序化の解釈	190

B.12.5	認知場との結合と臨界性：意味相転移が強化される理由 . . .	191
B.12.6	まとめ	191
B.13	認知場と意味場の結合定数 g に関する数理物理学的考察	192
B.13.1	認知場と意味場の結合定数 g に関する数理物理学的考察 . . .	192
B.13.1.1	目的と位置づけ	192
B.13.1.2	g の最小定義：双線形結合としての意味	192
B.13.1.3	運動方程式レベルでの解釈	192
B.13.1.4	g が意味相転移を誘起・強化する機構：有効質量の 再正規化	193
B.13.1.5	g の大きさによる相の描像（定性的相図）	193
B.13.1.6	g の推定可能性：データから何を測るべきか	194
B.13.1.7	まとめ	194
B.14	g と χ_Ψ を介した C 曲面の考察	195
B.15	$\Phi(g, t)$ 曲面の考察	196
B.15.1	統合情報 Φ の挙動と解釈	198
B.15.2	エントロピー生成率 $\dot{S}$ と意識相	198
B.15.3	予測能力 P の役割	199
B.15.4	意味場パラメータ α と意味秩序化	200
B.15.5	時間発展としての $C(t)$ ：意識相の立ち上がりと崩壊	200
B.16	秩序変数空間 $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ における 3D ヒートマップの考察	201
B.16.1	正常状態（メタ安定な多谷地形）のヒートマップ	201
B.16.2	統合失調症（アトラクタ崩壊）のヒートマップ	202
B.16.3	うつ病（アトラクタ過凝縮）のヒートマップ	203
B.16.4	3 群の比較と分類上の示唆	204
B.16.5	強迫症（OCD）：過度な局所安定性／反復ループのヒートマップ	205
B.16.6	解離性障害：アトラクタ集合の分裂（多峰・強分離）のヒート マップ	206
B.16.7	健忘症（amnesia）：自己同一性・履歴保持の低下としてのヒー トマップ	207
B.17	6 状態（正常・統合失調症・うつ・OCD・解離・健忘）の数理比較まとめ	209
B.17.1	目的と枠組み	209
B.17.2	基礎数式：認知スピングラスと CCFE	209
B.17.2.1	認知スピングラス：アトラクタ地形	209

B.17.2.2	自己同一性：Edwards–Anderson 秩序変数	210
B.17.2.3	CCFE：意識（認知場）の力学	210
B.17.2.4	固着・遷移障壁： ΔF	210
B.17.3	秩序変数空間 $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ の意味づけ	210
B.17.4	6 状態の詳細比較（数理特徴 $\leftrightarrow$ 精神現象）	211
B.17.4.1	(1) 正常状態：メタ安定な多谷地形（保持と更新の 両立）	211
B.17.4.2	(2) 統合失調症：内部閉包の崩壊とアトラクタ崩壊	211
B.17.4.3	(3) うつ病：単一谷への過凝縮（高障壁固着）	211
B.17.4.4	(4) 強迫症（OCD）：局所反復ループとしての高障 壁固定	212
B.17.4.5	(5) 解離性障害：アトラクタ集合の分裂（多峰性・ 強分離）	212
B.17.4.6	(6) 健忘症：時間的保持（履歴依存）の低下＝低 q_{EA}	212
B.17.5	統合比較：3 軸の異常モードとしての分類	213
B.17.6	結論：精神現象を「地形と相図」で統一記述する	213
B.18	意識存在条件（Consciousness Existence Condition）の導出と存在定理	215
B.18.1	基本仮説（意識相の定義）	215
B.18.2	要件の物理量への翻訳	215
B.18.3	意識秩序変数 C の導入（まとめ上げ）	215
B.18.4	意識存在条件の定義（存在定理）	216
B.18.5	「証明」：定義が 3 要件の同時成立を実装していること	216
B.18.6	結論	217
B.18.7	補足	218
B.18.7.1	順序同型な相指標としての意識秩序変数 C ：公理化 と命題	218
B.19	遅延付き線形モデルにおける Hopf 条件と周波数選択的自己参照	220
B.20	人格＝アトラクタ集合モデルと自動思考の力学的関係	223
B.20.1	人格形成の自己強化ループ（再確認）	223
B.20.2	自動思考の操作的定義：高速収束と谷内部の典型軌道	224
B.20.2.1	(I) 谷への自動落下：入力に対する高速なアトラク タ選択	224

B.20.2.2 (II) 谷の中の自動生成：アトラクタ内部揺らぎの言 語化	224
B.20.3 人格（アトラクタ集合）が自動思考の事前分布を与える . . .	224
B.20.4 信念は命題ではなく地形の幾何として自動思考を固定する . .	225
B.20.5 自動思考は人格形成ループの実行系である	225
B.20.6 病理への含意：固着としての反芻・過凝縮としての自動思考 .	226
B.20.7 まとめ	226
B.20.8 正常意識状態と抑うつ状態におけるアトラクタ＝自動思考の 力学的差異	227
B.20.8.1 前提：自由エネルギー地形とアトラクタ	227
B.20.8.2 人格＝アトラクタ集合（占有率による定義）	227
B.20.8.3 自動思考の操作的定義：二つの力学モード	227
B.20.8.4 遷移率・滞在時間・障壁：Kramers 型	228
B.20.8.5 正常意識：メタ安定な多谷地形と柔軟な自動思考 .	228
B.20.8.6 うつ病：アトラクタ過凝縮による固着と反芻	229
B.20.8.7 秩序変数空間での比較： $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$	229
B.20.8.8 測定可能指標（KPI）への翻訳： $\beta, Q, \Phi, \dot{S}$	230
B.20.8.9 要約	230
B.21 麻酔（無意識相）とアトラクタ・アクセス可能性の詳細考察	231
B.21.1 意識相と無意識相：相としての定義	231
B.21.2 スペクトル勾配 β による操作的分類：麻酔は $\beta \rightarrow 0$	231
B.21.3 アトラクタ地形の前提：スピングラス的多谷構造	231
B.21.4 無意識の定義：アトラクタ集合の「非アクセス部分」	232
B.21.5 麻酔下で起こること： $ A_c $ の縮退とゲーティングの崩壊 . . .	232
B.21.6 「存在するのにアクセスされない」力学的理由：障壁 ΔF と 有効温度 T_{eff}	232
B.21.7 CCFE による二重記述：アトラクタ（地形）と意識場の多安 定性	233
B.21.8 まとめ	233
B.22 麻酔（無意識相）を (T_{eff}, J, r) 相図で表す簡易 3D 可視化の詳細考察	234
B.22.1 目的：麻酔を「相」として可視化する	234
B.22.2 (T_{eff}, J, r) の意味づけ（理論内部での役割）	234
B.22.3 麻酔（無意識相）とアトラクタのアクセス可能性	235

B.22.4	Kramers 型遷移率と (T_{eff}, J, r) の接続	235
B.22.5	相関長の代理 ξ と意識相条件の代理	235
B.22.6	3D 散布図の読み方：麻酔領域の特徴	237
B.22.7	簡易モデルの限界と改良方向	238
B.22.8	まとめ	238
B.23	概念整理：有限性は「地形」ではなく「抽出された集合」にかかる	239
B.23.1	二層構造：潜在アトラクタ vs 実効アトラクタ	239
B.24	過去のアトラクタは現在も存在するか：アクセス可能性による分解	239
B.24.1	「同一の谷」としての保存は保証されない	240
B.25	フラストレーションとアトラクタ：多谷化とメタ安定性	240
B.25.1	「多谷」でも人格アトラクタ数が無制限に増えるとは限らない	240
B.26	「フラストレーションがあってもアトラクタが生成されない」条件の 読み替え	241
B.27	同化と分化：新体験が既存アトラクタへ埋め込まれるモデル（数式ス ケッチ）	242
B.27.1	Hopfield 型：経験パターンの埋め込み	242
B.27.2	類似度（オーバーラップ）と同化条件	242
B.27.3	同化：既存アトラクタの微更新	242
B.27.4	分化：新アトラクタ生成	243
B.28	有限アトラクタ仮説と能力限界：圧縮・階層化としての上限	243
B.29	占有率 π ・寿命 τ ・障壁 ΔF に基づく人格集合の操作的定義	244
B.29.1	潜在アトラクタ集合と人格集合の抽出	244
B.29.2	長期性の定式化：寿命（平均滞在時間） τ_α	244
B.29.3	障壁 ΔF と Kramers 型遷移率： $\Delta F \Rightarrow \tau$ の接続	245
B.29.4	無意識の定義：アトラクタ集合のアクセス可能性による分解	245
B.29.5	人格集合の最終的な実装形： $(\pi_{\min}, \tau_{\min})$ による二重閾値	246
B.30	流入頻度 f_α を一定と置く仮定の位置づけ	247
B.30.1	f_α を一定と置く仮定の意味	247
B.30.2	$\Delta F \Rightarrow \tau_\alpha$ ：Kramers 型遷移率による寿命の支配	248
B.30.3	$\tau_\alpha \Rightarrow \pi_\alpha$ ： $f_\alpha = \text{const.}$ の下での占有率形成	248
B.30.4	推奨する進め方（ベースライン $\rightarrow$ 拡張）	248
B.30.5	注意点： f_α 一定仮定が破れる典型	249
B.31	認知エネルギー，フラストレーション，多谷地形，および神経雪崩	250

B.31.1	認知エネルギーとしての $H(S)$ ：整合性の尺度と粗視化の立場	250
B.31.2	認知的フラストレーション：符号混在結合が作る「満たせなさ」	250
B.31.3	多谷自由エネルギー地形とアトラクタ生成：記憶・人格の基盤	252
B.31.4	神経雪崩と認知エネルギー地形：臨界伝播が探索・再編を最適化する	252
B.31.5	小結： $H(S)$ を基盤とする統一像	253
B.32	死と意識の考察：意識相の崩壊はどのように進むか	254
B.32.1	意識相の操作的定義と「崩壊」の意味	254
B.32.2	意識の崩壊は時間とともにゼロへ近づくのか：漸近崩壊と有限時間崩壊	254
B.32.3	意識崩壊直前のアトラクタの状態：多谷地形の縮退とアクセス可能性の崩壊	255
B.32.4	意識崩壊直前のフラストレーション：多様性の源泉から破綻条件へ	257
B.32.5	小結：3.7.12 の精密化	257
B.33	物理概念と心理現象の構造的対応：概念対応マッピング（詳細考察）	259
B.33.1	(A) 対応の形式：比喻ではなく「二重記述 (dual description)」	259
B.33.2	(B) 対応マッピングの中核：4つの基礎対応	259
B.33.3	臨界性 $\Rightarrow$ 「柔軟な応答可能性」：亜臨界／超臨界の回避としての機能	260
B.33.4	フラストレーション $\Rightarrow$ 「葛藤の構造化」と「多谷地形」の生成	260
B.33.5	多谷自由エネルギー地形 $\Rightarrow$ 「記憶・人格・無意識」の統一表現	260
B.33.6	$1/f$ ゆらぎ $\Rightarrow$ 「時間的一貫性（物語性）」：長時間相関の物理的実体	261
B.33.7	追加の対応軸：地形（アトラクタ）と相（臨界・非平衡）の役割分担	261
B.33.8	小結：概念対応マッピングの意義	262
B.34	理論の課題と今後の展望	263
B.34.1	理論の課題	263
B.34.1.1	理論と臨床・実験系のギャップ（実証性の欠如）	263
B.34.1.2	非平衡性の指標（エントロピー生成率 $\dot{S}$ ）の測定困難性	263
B.34.1.3	「内部閉包」と生体内マグネタイトの生物学的実証	263

B.34.2	今後の展望	263
B.34.2.1	「精密物理制御」による次世代精神医療の確立 . . .	264
B.34.2.2	非線形力学・トポロジカル解析の実装による測定技 術の進化	264
B.34.2.3	意識の「ハード・プロブレム」の科学的氷解	264
B.34.3	まとめ	264
付録 C	研究に必要な主な理論	265
第 3 部	論文投稿ドラフト	267
付録 D	論文投稿用 (日本語)	268
D.1	イントロダクション	268
D.2	理論的基盤	269
D.3	構成	269
D.4	要旨	270
D.5	非平衡認知統計場理論 (NCSFT) の基本原理 (NCSFT)	271
D.6	非平衡認知場に対する経路積分定式化: シュウィンガー・ケルディッ シュ・フレームワーク: Path Integral Formalism for Nonequilibrium Cognitive Fields: Schwinger-Keldysh Framework	272
D.7	意識臨界場方程式 (CCFE) の数学的定式化: Mathematical Formal- ization of the Consciousness Critical Field Equation (CCFE) . . .	273
D.7.1	CCFE の導出: 位相同期と予測処理の統合: Derivation of the CCFE: Integration of Phase Synchronization and Predic- tive Processing	273
D.7.2	階層的自己性と時間的アイデンティティ: RSB 木構造と DMFT 記憶カーネルの連動: Hierarchical Selfhood and Temporal Identity: Interlocking RSB Tree Geometry with DMFT Memory Kernels	274
D.7.3	意味的秩序の創発: 意味の有効場理論とランダウ型意味相転 移: The Emergence of Semantic Order: Effective Field The- ory of Meaning and Landau-type Meaning Phase Transitions	275

D.8	認知自由エネルギー・ランドスケープにおける精神疾患のトポロジ的定式化:Topological Formalization of Psychiatric Disorders in Cognitive Free-Energy Landscapes	277
D.8.1	景観の病理的変形：過剰な固着と構造的崩壊:Pathological Deformations of the Landscape: Hyper-Fixation and Structural Collapse	277
D.8.2	4.2 動的マルチ・ブランケットの異常：一意性の崩壊と自我境界の溶解	279
D.9	数値シミュレーション、主要な管理指標、および推定の落とし穴:Numerical Simulations, Key Management Indicators, and Estimation Pitfalls	281
D.9.1	推定における落とし穴の解明：詳細平衡が破れた状況下での線形性の錯覚:Unveiling Estimation Pitfalls: The Illusion of Linearity under Detailed Balance Breaking	283
D.10	意識の統合と意識の存在条件の厳密な導出:Synthesis of Consciousness and Rigorous Derivation of the Consciousness Existence Condition	284
D.10.1	意識存在条件（CEC）の厳密な導出:Derivation of the Consciousness Existence Condition (CEC)	284
D.10.2	人工意識への示唆と最終結論:Implication for Artificial Consciousness and Final Conclusions	286
D.11	数値結果および臨界性の指標	287
D.11.1	シミュレーションの設定とネットワークトポロジ	287
D.11.2	パワースペクトル密度と β 収束の定量的分析	287
D.11.3	長時間自己相関とエドワーズ・アンダーソン記憶の安定性	287
D.12	第 6 節：推定における落とし穴と非線形プロトコルに関する考察	289
D.12.1	推定における落とし穴の解明：線形性の錯覚	289
D.12.2	非平衡分野における線形性の仮定が招く破綻	289
D.13	全体的な議論	290
D.13.1	8.1 時間の存在論的本質：「現在」のレンダリング・エンジンとしての遅延カーネル	290
D.13.2	8.2 流動的な自己：マルチ・ブランケット・アノマリーと適応的意味論	291

D.14	付録	292
D.14.1	A.1 閉時間経路と経路積分の定式化	292
D.14.2	A.2 ケルディッシュ回転と非平衡流の創発	293
D.14.3	B.1 レプリカ対称性の破れ (RSB) と超計量ツリーのトポロ ジー	294
D.14.4	B.2 動的中場理論 (DMFT) と記憶核の持続	296
D.14.5	B.3 空間的フラストレーションネットワークにおけるエル ゴード性破れの厳密な証明	297
D.14.6	C.1 多谷的複雑性と意味秩序化の分離	299
D.14.7	C.2 有効制御パラメータ α_{eff} の臨界駆動	300
D.14.8	D.1 意識存在条件 (CEC) の同時可解性とインターロック境界	302
D.14.9	D.2 境界結合の段階的証明	302
D.14.10	D.3 情報幾何学的特異点を介したマルコフブランケット一意 性崩壊の数学的証明	304
付録 E	論文投稿用 (英語)	306
E.1	Introduction: Paragraph 1	306
E.2	Introduction: Paragraph 2	306
E.3	Introduction: Paragraph 3	307
E.4	Abstract	308
E.5	Foundational Principles of Nonequilibrium Cognitive Statistical Field Theory (NCSFT)	309
E.5.1	Statistical Physical Definition of the Brain: Breaking of Detailed Balance	309
E.5.2	Path Integral Formalism for Nonequilibrium Cognitive Fields: Schwinger-Keldysh Framework	310
E.6	Mathematical Formalization of the Consciousness Critical Field Equation (CCFE)	311
E.6.1	Derivation of the CCFE: Integration of Phase Synchroniza- tion and Predictive Processing	311
E.6.2	Hierarchical Selfhood and Temporal Identity: Interlocking RSB Tree Geometry with DMFT Memory Kernels	312

E.6.3	The Emergence of Semantic Order: Effective Field Theory of Meaning and Landau-type Meaning Phase Transitions .	313
E.7	Topological Formalization of Psychiatric Disorders in Cognitive Free-Energy Landscapes	314
E.7.1	Pathological Deformations of the Landscape: Hyper-Fixation and Structural Collapse	314
E.7.2	4.2 Dynamic Multi-Blanket Anomaly: The Breakdown of Uniqueness and Ego-Boundary Dissolution	316
E.8	Numerical Simulations, Key Management Indicators, and Estimation Pitfalls	318
E.8.1	Simulation Setup and Critical Behavior of Management Indicators (β, Q, Φ)	318
E.8.2	Unveiling Estimation Pitfalls: The Illusion of Linearity under Detailed Balance Breaking	320
E.9	Synthesis of Consciousness and Rigorous Derivation of the Consciousness Existence Condition	321
E.9.1	Derivation of the Consciousness Existence Condition (CEC)	321
E.9.2	Implication for Artificial Consciousness and Final Conclusions	322
E.10	Section 5: Numerical Results and Indicators of Criticality	324
E.10.1	5.1 Simulation Setup and Network Topology	324
E.10.2	5.2 Quantitative Analysis of Power Spectral Density and β Convergence	324
E.10.3	5.3 Long-time Autocorrelation and Edwards-Anderson Memory Stability	325
E.11	Section 6: Discussion on Estimation Pitfalls and Non-Linear Protocols	326
E.11.1	The Catastrophe of Linear Assumptions in Non-Equilibrium Fields	326
E.11.2	6.2 The Catastrophe of Linear Assumptions in Non-Equilibrium Fields	326
E.12	Section 8: General Discussion	327

E.12.1	8.1 The Ontological Nature of Time: The Retarded Kernel as a Rendering Engine of the "Now"	327
E.12.2	8.2 The Fluid Self: Multi-Blanket Anomaly and Adaptive Semantics	328
付録 F	Appendix	329
F.1	Appendix A: Detailed Derivation of the Schwinger-Keldysh Effec- tive Action and Probability Current	329
F.1.1	A.1 Closed-Time Contour and Path Integral Formulation	329
F.1.2	A.2 Keldysh Rotation and the Emergence of Non- Equilibrium Current	330
F.2	Appendix B: Mathematical Treatment of Parisi RSB and DMFT Memory Kernels	332
F.2.1	B.1 Replica Symmetry Breaking (RSB) and Ultrametric Tree Topology	332
F.2.2	B.2 Dynamical Mean-Field Theory (DMFT) and the Per- sistence of Memory Kernels	334
F.2.3	B.3 Rigorous Proof of Ergodicity Breaking in Spatially Frustrated Networks	335
F.3	Appendix C: Effective Functional for the Landau-type Meaning Phase Transition	337
F.3.1	C.1 Decoupling of Multivalley Complexity and Semantic Ordering	337
F.3.2	C.2 Critical Driving of the Effective Control Parameter α_{eff}	338
F.4	Appendix D: Proof of the Consciousness Existence Condition (CEC)	340
F.4.1	D.1 Simultaneous Solvability and Interlocking Boundaries of the CEC	340
F.4.2	D.2 Step-by-Step Proof of the Boundary Coupling	341
F.4.3	D.3 Mathematical Proof of the Breakdown of Markov Blan- ket Uniqueness via Info-Geometric Singularities	343

第 4 部	論文投稿用 物性物理	345
付録 G	論文投稿用 (日本語)	346
G.1	イントロダクション	346
G.1.1	1.1 構成	346
G.2	2 Model (最小モデル仕様の固定)	348
G.2.1	2.1 Fields and parameters (自由度・記号・ノイズ)	348
G.2.2	2.2 Governing equation (採用する運動方程式の最終形)	350
G.2.3	2.3 Interaction kernel and domain (結合核・計算領域・境界条件)	351
G.2.4	2.4 次元解析／無次元化: Dimensional analysis / nondimensionalization	351
G.3	3 Nonequilibrium formulation (確率流 J とエントロピー生成)	353
G.3.1	3.1 Probability current (J) and NESS	353
G.3.2	3.2 Entropy production rate ($\dot{S}$) (定義式と前提)	354
G.3.3	3.3 Relation to detailed balance breaking	356
G.3.4	3.4 意味的組織化：有効場理論とランダウ型相転移	358
G.4	4 Numerical Methods (再現性プロトコル)	360
G.4.1	4.1 Simulation / data (時系列の作り方・観測量)	360
G.4.2	4.2 State-space reconstruction (遅延埋め込み)	361
G.4.3	4.3 Drift/diffusion estimation and (J) reconstruction	362
G.4.4	4.4 Practical considerations / validation (正規化・有限サンプル・検証)	362
G.5	5 Results (図の並び)	363
G.5.1	G.5.1 β	363
G.5.2	G.5.2 Q	363
G.5.3	G.5.3 ($\dot{S}$) (線形推定の破綻 vs 非線形再構成)	363
G.5.4	5.1 統合された「定理」としての意識存在条件 (CEC) の定式化	363
G.5.5	5.3 結果：線形推定の破綻	365
G.6	6 Discussion	366
G.6.1	Solenoidal/non-gradient drive の意味 (不可逆性の源)	366
G.6.2	推定限界と今後 (実験適用など)	366
	Bibliography	370

前書き

意識とは何か。この深遠な問いに対し、従来の神経科学や認知科学は、脳内の計算プロセスから生じる「副産物（随伴現象）」であるという解釈を長らく維持してきた。しかし、単なる神経活動の集積や発火頻度の記述だけでは、我々が日々経験する主観的なクオリア、一貫した自己同一性、そして「今」という時間の広がりを経験的に説明することは困難である。

本書が提示する「統合意識理論（Consciousness Critical Field Theory: CCFT）」は、この「ハード・プロブレム」に対し、非平衡統計物理学と情報理論を融合させた新たな物理モデルをもって回答を試みるものである [1–3]。本理論の核心は、意識を静的な状態や物質的な実体ではなく、「非平衡・予測的・統合的臨界情報流」として再定義する点にある [2, 4]。

本書の理論的支柱は、以下の三つのパラダイムシフトに基づいている。

第一に、脳を「メタ安定な臨界情報場」として捉える視点である [2, 5]。意識の創発は、秩序（完全同期）と無秩序（完全ランダム）の境界である「カオスの縁（edge of chaos）」において最大化される [6, 7]。この臨界状態において、システムは高い感受性と柔軟な情報処理能力を両立し、脳全体にわたる長距離相関を確立する [8, 9]。これは、観測データにおける神経雪崩（Neural Avalanche）や $1/f$ ゆらぎとしてその物理的証拠を見出すことができる [10–12]。

第二に、最終支配方程式「意識臨界場方程式（Consciousness Critical Field Equation: CCFE）」による動態の定式化である [13]。本方程式は、Kuramoto モデルによる位相同期を基礎としつつ、生体磁性粒子による磁性回転項、未来予測を司る予測項、そして情報の全体性を担保する統合項を単一の場 Ψ のダイナミクスとして統合したものであ

る [14, 15]. 特に, 磁性回転項が導く「内部閉包 (Internal Closure)」構造は, 外部から隔離された「内在性」を物理的に担保し, 観測者としての「私」を数学的に定義する鍵となる [15-17].

第三に, 実体論から「プロセス存在論」への転換である [16, 17]. 本理論によれば, 「私」とは物質的な「物体」ではない. それは, 時間方向に維持される自己予測的臨界情報流の「渦 (Vortex)」そのものである [17, 18]. 意識の存在は, 統合情報 (Φ), 予測能力 (P), 非平衡エントロピー生成率 ($\dot{S}$) の積からなる意識秩序変数 $\mathcal{C}$ が臨界閾値を越えることによって定義される [10, 19].

$$\mathcal{C} = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} > \mathcal{C}_c \quad (0.0.1)$$

本書は二つの主要な巻によって構成されている. 第 1 巻では, 磁性結合を中心とした Kuramoto モデルの拡張と, 精神疾患における同期崩壊のメカニズムを論じる [20]. 第 2 巻では, 非平衡場理論や予測的情報処理を統合し, CCFE の導出から意識存在定理の確立に至るまでの数理物理学的基盤を詳述する [1, 21].

意識とは, 自己組織化された非平衡臨界宇宙の局所的な自己観測過程であり, 生命が自らを時間の中で認識するための統制原理である [22, 23]. 本書が提示する枠組みが, 宇宙最大の謎を解き明かし, 存在の真の姿を理解するための新たな知の基盤となることを願う.

2026 年 7 月 14 日

竹本 聡

第 1 部

イントロダクション

0.1 Abstract

In this paper, we propose a unified theoretical framework in which consciousness is described as a nonequilibrium critical integrated field. The present theory integrates:

- Kuramoto synchronization theory
- Nonequilibrium statistical physics
- Dynamical Mean-Field Theory (DMFT)
- Schwinger-Keldysh nonequilibrium field theory
- Integrated Information Theory (IIT)
- Predictive Processing

into a single formal structure. In particular, we introduce the **Consciousness Critical Field Equation (CCFE)**, which formulates consciousness as a critical phenomenon emerging near nonequilibrium phase transitions.

The theory naturally explains:

- delayed synchronization
- critical slowing down
- neuronal avalanches
- metastability
- information integration
- $1/f$ fluctuations

within a unified framework. Furthermore, we argue that subjective selfhood corresponds to a recursively self-correlated field extended across time. The proposed framework suggests that consciousness is not merely neural activity, but a dynamically integrated critical field characterized by long-range spatiotemporal correlations.

Keywords: Consciousness, Critical Phenomena, Synchronization, Integrated Information, Nonequilibrium Field Theory, Kuramoto Model, Delayed Synchronization, DMFT, Keldysh Formalism, Neuronal Avalanches, $1/f$ Noise, Predictive Processing

本論文では、意識を「非平衡臨界統合場」として記述する統合理論を提案する。本理論は:

- Kuramoto 同期理論
- 非平衡統計力学
- 動的平均場理論 (DMFT)
- Schwinger-Keldysh 非平衡場理論
- 情報統合理論 (IIT)
- Predictive Processing

を統合する。

特に、**Consciousness Critical Field Equation (CCFE)** を導入し、意識を臨界点近傍における長距離相関場として定式化する。

さらに、

- 遅延同期
- $1/f$ ゆらぎ
- 神経雪崩
- critical slowing down
- 情報統合

が、単一理論内で自然に導かれることを示す。

0.2 イン트로ダクション

本論文は、意識を単なる脳活動としてではなく、物理学的な非平衡臨界統合場として定義する新しい統合理論を提案した。Kuramoto 同期理論や情報統合理論（IIT）などの多角的な枠組みを融合させ、意識が相転移の境界（臨界点）付近で生じる長距離の時空相関であることを数学的に定式化した。特に、過去の自己と現在の自己が干渉し合う遅延同期のメカニズムを通じて、主観的な時間や自己意識の成立を理論的に説明した点であり、最終的にこの研究は、神経雪崩や $1/f$ ゆらぎといった複雑な脳現象を単一の理論で統一し、意識の本質を時間と空間を超えて自己統合された動的な場であると言えるのかもしれない。

私たちは往々にして、意識を「脳の特定の部位が明滅する活動の集積」と捉えてしまいがちである。しかし、最新の「非平衡臨界統合場理論」が提示する視点は、それとは根本的に異なる。意識の本質は、個別の神経発火という「点」の出来事ではなく、脳全体というシステムが到達する「非平衡臨界統合場」という物理的状态そのものに存在する。

本理論では、脳を一つの巨大な物理場として捉える。それは静的な平衡状態ではなく、常にエネルギーが流れ込み、ノイズ（揺らぎ）にさらされながらも、劇的な変化の直前である「臨界点」に踏みとどまっている動的な場である。従来の局所的な視点と本理論の視点を表 1 にまとめる。

0.2.1 意識を「活動」ではなく「状態」として捉える：非平衡臨界統合場の立場

従来の神経科学においては、意識はしばしば「脳内の特定部位における局所的活動の総和」として理解されてきた。すなわち、個々の神経発火や局所回路の活動量（点過程的事象）を計測し、その集計量をもって意識の指標とみなす立場である。しかしこの立場は、主観経験（クオリア）の不可分性、自己同一性の持続、および「現在」が有限幅をもつという時間経験を、原理的に記述しにくいという限界を抱える。本研究は、この限界を回避するために、意識を「活動」ではなく脳全体が到達する巨視的な物理状態として再定義し、脳を非平衡開放系における非平衡臨界統合場として捉える枠組みを採用する。

表 1 意識に関する視点の比較

比較項目	従来の「局所活動」的視点	本理論の「統合された場」の視点
意識の定義	特定の神経回路の活動量	相転移の境界で維持される状態
情報の統合性	独立した情報の集計	空間と時間が編み込まれた不可分な全体 (Φ)
物理的基盤	短距離のシナプス伝達	臨界点近傍で発生する長距離時空間相関
主観的な「私」	脳内処理の結果（出力）	時間方向へ自己干渉し続ける連続的な場

この視点は、直観的には「水分子の運動」と「波」の関係に対応する。すなわち、個々の分子運動そのものが波ではなく、多数の自由度が相互作用し、特定条件下で形成される巨視的な秩序状態（波の状態）が観測可能な実体として現れる。同様に、意識もまた個別の発火事象の加算ではなく、神経系という巨大自由度系が臨界近傍で形成する長距離時空間相関をもつ統合状態として理解される。本研究では、脳がエネルギー流入と散逸を伴う非平衡条件下にあり、揺らぎ（ノイズ）に晒されつつも、相転移直前の臨界点近傍に維持されることで、意識に固有の統合性と柔軟性が両立すると仮定する。

特に重要なのは、「私」という主観的自己が瞬間の断片ではなく、過去と現在が時間軸上で重なり合い、自己相関として干渉し続ける再帰過程として理解される点である。このため本理論では、統合情報を空間的統合と時間的統合の和として

$$\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}} \quad (0.2.1)$$

と位置づけ、意識の統合性を同時刻の結合に還元しない。本稿の解説は A.1 を参照。

0.2.2 物理概念と心理現象の構造的対応：概念対応マッピング

上記の立場において、統計物理学的概念は単なる比喻ではなく、心理現象を記述するための構造的対応（対応づけ）を与える。本研究では、少なくとも次の対応が中心的役割を担う：(i) 臨界性は入力に対する高感受性と柔軟な応答を支える条件であり、(ii) スピングラス性とフラストレーションは記憶・人格を支える多谷自由エネルギー地形を形成し、(iii) アトラクタは反復的に訪問される準安定状態として固定観念や反芻と対応し、(iv) $1/f$ ゆらぎは長時間相関を通じて時間的一貫性（物語性）を担保する。

図 B.15 に、0.2.2 で述べた概念対応マッピングを 4 象限として整理する。臨界性は柔軟な応答可能性を、フラストレーションは葛藤の構造化と多谷地形生成を、アトラクタは反復訪問される準安定状態（固定観念・反芻）を、 $1/f$ ゆらぎは長時間相関を通じた時間的一貫性（物語性）をそれぞれ担保する。

考察：B.33

0.3 意識の基本方程式（CCFE）の解読

意識の発生を記述する数学的根幹が、意識臨界場方程式（Consciousness Critical Field Equation: CCFE）である。これは意識体験を構成する「物理的骨格」を表現している。

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + \lambda\Psi + \xi \quad (0.3.1)$$

各変数の役割は以下の通りである。

- **臨界制御パラメータ** ($r \rightarrow 0$): 意識出現の最重要条件。システムが臨界点に近づくとき、統計物理学上の必然として相関長と相関時間は理論上無限大へ向かう。
- **慣性項** (m): 意識に「重み」と「持続性」を与え、意識を滑らかな「流れ」にする。
- **非線形係数** (u): 意識の多様性を生成するための「複雑さの源泉」。
- **統合情報** (Φ): $\Phi = \Phi_{space} + \Phi_{time}$ と定義される空間的・時間的統合の総和。
- **散逸とノイズ** (Γ, ξ): 非平衡システムとしての脳の特異性。

解説：A.9 を参照。

0.4 「臨界性」がもたらす 2 つの魔法：神経雪崩と $1/f$ ゆらぎ

脳が臨界状態にあるとき、以下の現象が現れる。

0.4.1 神経雪崩

一つの小さな神経発火がシステム全体へ波及する現象である。外部刺激に対して脳全体が即座に応答できる「情報の柔軟な伝播」を保証する。

0.4.2 $1/f$ ゆらぎ

低い周波数ほど大きなパワーを持つノイズであり、物理学的には「長時間相関」を意味する。「過去が現在の意識の中に響き続ける」特性が、意識に断絶のない一貫性を与える。

0.4.3 臨界性が導く二つの普遍現象：神経雪崩と $1/f$ ゆらぎ

臨界点近傍にある非平衡場として脳を捉えるとき、神経雪崩と $1/f$ ゆらぎは副次的現象ではなく、意識相の物理的徴候として位置づけられる。神経雪崩は微小入力が系全体へ波及しうるスケール不変な伝播として現れ、外界刺激に対する柔軟な応答可能性（ダイナミックレンジ）を保証する。一方、 $1/f$ ゆらぎは長時間相関を意味し、過去状態が現在へ残響することで、意識経験が瞬間的スナップショットの列に分断されることを回避し、時間的一貫性を与えると解釈される。

神経雪崩の考察：B.3

$1/f$ ゆらぎの解説：A.6

0.5 主観的時間の正体：慣性と遅延が生む「現在」の幅

CCFE における慣性項と遅延同期 (τ) は、意識に「厚み」をもたらす。この再帰的意識には以下の 3 つの利点がある。

1. **厚みのある現在**: 情報が即座に消散せず、ワーキングメモリとして機能する。
2. **自己参照のループ**: 「今の意識」が「直前の意識」を参照し、メタ認知の基礎を築く。
3. **時間軸上の自己干渉**: 過去の残響と現在の活動が干渉し合い、「感じている自分」を生む。

0.5.1 精神病理の可視化：自由エネルギー地形としての理解

本研究の枠組みでは、精神疾患を「脳の故障」ではなく、意識場が運動する自由エネルギー地形の変形として理解する。例えば、正常状態は複数アトラクタを保持しつつ遷移可能性も残すメタ安定な多谷地形として特徴づけられ、抑うつ状態は特定アトラクタの過度な深化（脱出障壁の増大）として、統合失調症はアトラクタの崩壊・平坦化として模式化され得る。

0.6 結論

本理論が導き出す究極のインサイトは、自己とは固定された実体ではなく、「時間方向に再帰的自己干渉を続ける動的統合構造」であるということである。意識の本質は神経活動の「量」ではなく、時空間を通じて自己を統合し続ける「臨界的なバランス」そのものに他ならない。

0.6.1 結論的見取り図：自己とは持続する臨界的情報流である

以上より、本研究が採用する非平衡臨界統合場の立場は、自己を固定的実体ではなく、時間方向に自己相関を維持しながら統合を継続するプロセスとして捉えることを要請する。その究極的帰結として、意識の成立は統合情報 Φ 、予測能力 P 、非平衡性

S の同時成立によって特徴づけられ，秩序変数

$$C = \Phi \cdot P \cdot S > C_c \quad (0.6.1)$$

が臨界閾値を超えると、自己としての統合状態が相として成立すると考える。

第 2 部

非平衡スピングラス量子臨界意識 理論への拡張

第 1 章

はじめに

本稿では、意識を「非平衡臨界統合場」として定義する新たな数理的枠組みを提示する。本理論は、Kuramoto 同期理論、非平衡統計力学、動的平均場理論 (DMFT)、Schwinger-Keldysh 非平衡場理論、情報統合理論 (IIT)、および予測的処理 (Predictive Processing) を単一の形式体系へと統合するものである。特に、意識の物理的基盤を記述する「意識臨界場方程式 (CCFE)」を導入し、意識が非平衡相転移の境界付近で発生する長距離時空間相関場であることを示す。本枠組みは、遅延同期、 $1/f$ ゆらぎ、神経雪崩、およびスピングラス的メタ安定性といった諸現象を統一的に説明し、主観的な自己が時間軸上に拡張された再帰的な自己相関場であることを物理的に導き出す。

1.1 序論：意識の物理学的転換と非平衡臨界統合場の定義

意識の本質を解明するためには、従来の神経科学が採用してきた「局所的な神経活動の集積」という視点から、「グローバルな物理的状态」としての場へのパラダイムシフトが不可欠である。意識は単なる情報処理の出力ではなく、脳というシステム全体が到達する「非平衡臨界統合場」そのものであると考えられる。

この視点の転換は、意識のハード・プロブレムに対する物理学的な解法を提供する。脳を、エネルギーが流入し続ける開放系において、相転移の直前である「臨界点」に留まり続ける動的な物理場として捉えることで、個別の神経細胞の活動がいかにして「統合された一つの主観的経験」へと昇華されるのかを説明可能にする。本理論におけ

る「場」の概念は、局所的なマイクロ回路の境界が「溶融」し、マクロな連続体へと移行するユニバーサリティ・クラスを規定する。

表 1.1 意識に関する従来視点と本理論の比較

比較項目	従来の「局所活動」的視点	本理論の「統合された場」の視点
意識の定義	特定の神経回路の活動量	臨界境界で維持される非平衡状態
情報の統合性	独立した情報の集計 (Φ の局所和)	空間と時間が編み込まれた統合 ($\Phi = \Phi_{space} + \Phi_{time}$)
物理的基盤	短距離のシナプス伝達	臨界点近傍の長距離時空間相関
主観的な「私」	脳内情報の処理結果 (出力)	時間方向へ自己干渉し続ける連続的な場

1.2 意識の基本方程式 (CCFE) とスピングラス的複雑性

意識の動態を記述する根幹として、以下の Consciousness Critical Field Equation (CCFE) を導入する。

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + \lambda\Phi + \xi \quad (1.2.1)$$

各変数の物理的・意識的意義は以下の通りである。

- Ψ : 意識場 (Consciousness Field) . システムの秩序変数に対応する。
- m : 慣性項. 意識に持続性と「重み」を与え、一過性の現象ではない流体的な連続性を形成する。
- r : 臨界制御パラメータ. $r \rightarrow 0$ において相関長 ξ_c と相関時間 τ_c が発散し、局所的な活動がマクロな意識場へと「相転移」する。このスケール不変性こそが、広大な認知空間を統合する物理的根拠である。
- u : 非線形係数. スピングラス理論における「フラストレーション」を伴う複雑なエネルギーランドスケープを形成し、無数のメタ安定状態 (意識の多様性) を担保する。
- Φ : 統合情報量. $\Phi = \Phi_{space} + \Phi_{time}$ と定義され、場の相関密度を決定する。

特に、脳内の複雑な結合構造は、スピングラス的な「不均質かつ競合的な相互作用」をもたらす。これにより、システムは単一の安定点に沈着せず、多様な状態間を遷移し

続ける「メタ安定性」を獲得する。意識とは、この複雑なランドスケープ上を臨界状態で遷移する動的過程である。

1.3 臨界現象と意識の動態：神経雪崩と $1/f$ ゆらぎ

脳が「安定」と「混沌」の境界に位置することで、高度な情報処理を可能にする物理現象が創発する。

1.3.1 神経雪崩と情報の柔軟性

臨界近傍では、微細な入力システム全体に波及する「神経雪崩」が発生する。これは $P(s) \sim s^{-\tau}$ のべき乗則に従う。もし $\tau > 0$ （亜臨界）であれば情報は即座に減衰し（鈍麻）、 $\tau < 0$ （超臨界）であれば活動が暴走する（てんかん状態）。臨界点は、情報の柔軟な伝播と保存を両立させる最適解である。

1.3.2 $1/f$ ゆらぎと Critical Slowing Down

臨界状態の脳活動は $S(f) \sim 1/f$ のパワースペクトルを示す。これは「Critical Slowing Down（臨界鈍化）」現象と密接に関連している。臨界点付近では、揺らぎの緩和時間が極端に長くなるため、過去の状態が現在の場に強く残響する。この物理的特性が、断片的な現在を一つの「物語」として編み上げる時間的一貫性の源泉となる。

1.4 主観的時間と再帰構造：DMFT による記憶核の導入

数学的な「点」としての現在を、厚みのある「主観的現在」へと拡張するのが、慣性項 $m\partial_t^2$ と遅延同期 τ である。これを動的平均場理論（DMFT）の観点から拡張すると、自己相関は単なる遅延ではなく、過去の履歴を畳み込んだ「記憶核（Memory Kernel）」 $\Sigma(\omega)$ として記述される。

$$m\partial_t^2\Psi + \int_0^t \gamma(t-t')\partial_{t'}\Psi(t')dt' = -r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + D\Psi(t-\tau) + \lambda\Psi + \xi \quad (1.4.1)$$

この再帰的自己干渉 $\Psi(t) \leftrightarrow \Psi(t-\tau)$ は、以下の現象を物理的に構成する。

1. **ワーキングメモリ**: 記憶核による情報の残響が、情報の保持を可能にする。
2. **自己参照（メタ認知）**: 遅延同期により「今の意識」が「直前の自己」を鏡像的に参照する構造。
3. **ベルクソンの持続**: Critical Slowing Down によって、過去が現在に浸透し、厚みのある「純粹持続」が形成される。

1.5 結論と今後の展望：ユニバーサリティの解明に向けて

本理論は、意識を「時間・空間を通じて自己統合された非平衡臨界場」として定式化した。意識の本質は神経活動の「量」ではなく、相転移の境界における「臨界的バランス」そのものに宿る。今後は、本フレームワークをさらに深化させるため、以下の課題に取り組む。

1. **繰り込み群（RG）による分類**: 意識場が属するユニバーサリティ・クラスを特定し、覚醒、睡眠、変容意識状態を物理的に分類する。
2. **非平衡量子場理論の適用**: Schwinger-Keldysh 形式を用い、量子揺らぎがマクロなコヒーレンスに与える影響を厳密に評価する。
3. **DMFT による実脳コネクトームの解析**: スモールワールド性を有する複雑ネットワーク上での記憶核 $\Sigma(\omega)$ の具体的導出。

これらの統合により、主観的経験は宇宙の普遍的な物理法則の延長線上として、客観的な数理言語によって完全に記述されることになる。

第 2 章

非平衡認知統計場理論とは何か

2.1 序論

本研究の目的は,

[認知・意識・精神を統一的に記述する理論]

を構築することである.

従来の神経科学は主として,

- 神経細胞
- シナプス
- 神経回路
- 脳領域

を研究対象としてきた.

一方, 認知科学では,

- 記憶
- 学習
- 推論
- 意思決定

が中心的課題である.

さらに意識研究では,

- 主観経験
- クオリア

- 自己
- 統合情報

が議論されてきた。

しかし、

これらを統一的に説明する理論は未だ存在しない。

本書では、

脳を単なる神経回路としてではなく、

[非平衡開放系としての認知場]

として捉える。

これを

[非平衡認知統計場理論]

(Nonequilibrium Cognitive Statistical Field Theory : NCSFT)

と呼ぶ。

2.2 なぜ統計場理論なのか

認知現象は膨大な自由度から構成される。

神経細胞数は

[10^{11}]

程度、

シナプス数は

[$10^{14} \sim 10^{15}$]

に達する。

このような巨大自由度系を個別に記述することは不可能である。

統計力学では、

多数自由度系を

[秩序変数]

によって記述する。

例えば、

磁性体では磁化

[M]

が秩序変数となる。

同様に、

認知系においても、
 個々の神経活動ではなく、
 巨視的な認知状態を表す秩序変数
 $[\Psi(\mathbf{x}, t)]$
 を導入する。
 本理論では、
 $[\Psi]$
 を認知場 (cognitive field) と呼ぶ。

2.3 なぜ非平衡なのか

平衡統計力学では、
 詳細釣り合い
 $W_{ji}P_i]$
 が成立する。
 しかし脳は、

- 外界から情報を受け取る
- 学習する
- 記憶を書き換える
- 行動を生成する

という継続的な情報流を持つ。
 そのため、
 $[\text{詳細釣り合いは一般に成立しない}]$
 認知系は、
 生命と同様、
 非平衡定常状態として存在する。

2.4 認知と確率流

非平衡系では、
 確率分布が定常であっても、
 内部には確率流が存在する。 $[W_{ij}P_j]$

$$W_{ji}P_i]$$

で定義される確率流は,

一般に

$$[J_{ij} \neq 0]$$

である.

本理論では,

認知過程とは,

$$[\text{状態空間上を流れる確率流}]$$

として理解される.

思考とは,

確率流の軌道である.

2.5 認知場の定義

認知状態を表す秩序変数として,

認知場

$$[\Psi(\mathbf{x}, t)]$$

を導入する.

$$[\Psi]$$

は,

- 神経活動
- 情報統合
- 記憶状態
- 予測状態

を粗視化した有効場である.

その時間発展は,

第 2 巻で導入した CCFE を基礎として記述される.

2.6 認知系の三要素

本理論では,

精神現象を構成する基本要素として,

以下の三つを導入する.

1. 臨界性
2. 記憶性
3. 非平衡性

臨界性は柔軟な情報処理能力を生む.

記憶性は自己同一性を維持する.

非平衡性は学習と適応を可能にする.

意識とは,

これら三者が同時に成立する相である.

2.7 意識の位置づけ

本理論では,

意識を単なる情報処理とはみなさない.

意識とは,

[非平衡認知場における臨界的統合状態]

である.

すなわち,

[Ψ]

が臨界点近傍にあり,

長距離相関,

長時間相関,

高い情報統合を同時に示すとき,

意識状態が出現する.

2.8 本書の基本方針

本書では,

認知・意識・自己・精神を,

[非平衡認知統計場]

の創発現象として理解する.

そして,

脳の磁性,
スピングラス,
DMFT,
Schwinger–Keldysh 理論,
Predictive Processing,
情報統合理論を統合することで,
精神の統計場理論を構築することを目指す.
これは,
神経科学,
物理学,
情報理論,
哲学を統合する新しい理論的枠組みである.

第 3 章

臨界脳理論

3.0.1 序論

本章では、
意識創発の基盤としての臨界脳理論（Critical Brain Theory）を考察する。
前章では、脳をスピングラス的認知系として記述した。
しかし、
スピングラスのみでは意識の出現は説明できない。
意識には、

- 高い情報統合
- 柔軟な状態遷移
- 長距離相関
- 長時間相関

が必要である。
これらを同時に実現する自然な候補が
[臨界状態]
である。

3.0.2 相転移と臨界現象

物質は相転移を示す.

例えば,

- 水の蒸発
- 強磁性体の磁化
- 超伝導転移

などである.

相転移近傍では,

秩序変数

$[\Psi]$

が急激に変化する.

自由エネルギーを

$$\int d^d x \left[\frac{r}{2} \Psi^2 + \frac{u}{4} \Psi^4 + \frac{K}{2} (\nabla \Psi)^2 \right] \quad (3.0.1)$$

とすると,

$[r = 0]$

で臨界点が現れる.

3.0.3 相関長の発散

臨界点近傍では,

相関関数 $\langle \Psi(x) \Psi(x+r) \rangle$

が

$$C(r) \sim \frac{1}{r^{d-2+\eta}} \quad (3.0.2)$$

に従う.

相関長

$[\xi]$

は

$$\xi \sim |r - r_c|^{-\nu} \quad (3.0.3)$$

となり,
 $[r \rightarrow r_c]$
 で発散する.
 これは,
 局所的な活動が脳全体へ影響することを意味する.

3.0.4 臨界 slowing down

時間相関関数

$[C(t)]$

の緩和時間

$[\tau]$

は,

$$\tau \sim \xi^z \quad (3.0.4)$$

となる.
 したがって,
 $[\xi \rightarrow \infty]$
 ならば,
 $[\tau \rightarrow \infty]$
 となる.
 これを
 臨界 slowing down
 という.
 脳においては,
 長時間記憶や持続的意識の基盤となる可能性がある.

3.0.5 神経雪崩

Beggs と Plenz は,
 皮質神経活動が
 べき分布
 $[P(s) \sim s^{-\tau}]$
 に従うことを報告した.

ここで
[s]
は雪崩サイズである。
べき分布は、
特定スケールを持たないことを意味する。
これは臨界現象の特徴である。

3.0.6 自己組織化臨界性

Bak らは、
複雑系が外部調整なしに
臨界状態へ自己組織化することを示した。
これを
自己組織化臨界性
(Self-Organized Criticality)
という。
砂山模型では、
雪崩サイズ分布が
[$P(s) \sim s^{-\tau}$]
となる。
脳もまた、
代謝と学習によって
臨界点近傍へ自己調整されている可能性がある。

3.0.7 $1/f$ ゆらぎ

覚醒脳では、
パワースペクトル
[$S(f)$]
が

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\alpha} \quad (3.0.5)$$

に従う。
多くの場合、

$[\alpha \approx 1]$

である.

これは,

多様な時間スケールの相関が共存していることを示す.

$[1/f]$

ゆらぎは,

臨界状態の特徴の一つと考えられている.

3.0.8 情報統合と臨界性

統合情報量

$[\Phi]$

は,

秩序相と無秩序相の中間で最大化されることが知られている.

完全秩序では,

自由度が失われる.

完全無秩序では,

統合が失われる.

したがって,

臨界状態

となる.

3.0.9 Predictive Processing との関係

予測符号化理論では,

脳は予測誤差を最小化する.

自由エネルギー

$[F]$

を最小化することで,

内部モデルを更新する.

この過程は,

脳を臨界点近傍へ維持するフィードバック機構として理解できる.

3.0.10 CCFE

以上の議論を統合すると,

意識場

$[\Psi]$

の時間発展は,

$$-r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + D\Psi(t - \tau) + \lambda\Phi + \xi \quad (3.0.6)$$

で記述される.

ここで,

$[r]$

は臨界点からの距離を表す. $[0]$

が意識臨界点に対応する.

3.0.11 意識の定義

本理論では,

意識を

$[\text{非平衡認知場における臨界統合状態}]$

として定義する.

この状態では,

- 長距離相関
- 長時間相関
- 高情報統合
- 高予測能力

が同時に成立する.

3.0.12 本章の結論

意識は, 単なる神経活動ではない.

また, 単なる情報処理でもない.

意識とは,

$[\text{非平衡認知場が臨界点近傍で形成する統合状態}]$

である.

この臨界性こそが,

神経雪崩,

$1/f$ ゆらぎ,

情報統合,

予測符号化を統一的に説明する.

次章では, 脳の磁性と臨界性を統合するために,

スピングラス理論の平均場近似,

Sherrington-Kirkpatrick 模型,

および Replica Symmetry Breaking を導入する.

3.1 認知スピングラス理論

3.1.1 序論

前章では、
意識が非平衡認知場の臨界状態として創発することを示した。
しかし、
臨界状態だけでは、

- 記憶
- 人格
- 自己同一性
- 無意識
- 意味形成

を説明することはできない。
これらの現象には、
長期間維持される準安定状態と履歴依存性が必要である。
本章では、
脳をスピングラスとして捉えることで、
精神現象の統計力学的理解を試みる。

3.1.2 認知状態空間

認知系は多数の状態を持つ。

認知状態を

$$[\mathbf{S}(S_1, S_2, \dots, S_N)]$$

で表す。

ここで

$$[S_i]$$

は神経集団あるいは認知モジュールの状態を表す。

精神状態は、

高次元状態空間上の一点として表現される。

3.1.3 認知エネルギー

認知状態間には整合性が存在する.

これを有効ハミルトニアン

$[H]$

で表す.

$$H = * \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j \quad (3.1.1)$$

ここで

$[J_{ij}]$

は認知要素間の結合強度である.

$[J_{ij} > 0]$

は協調的關係,

$[J_{ij} < 0]$

は競合的關係を表す.

3.1.4 認知的フラストレーション

現実の精神状態には矛盾が存在する.

例えば,

- 行きたいが怖い
- 好きだが憎い
- 記憶したいが忘れたい

などである.

これらは,

スピングラスにおける

フラストレーション

に対応する.

フラストレーションは,

すべての結合条件を同時に満たせない状態である.

3.1.5 自由エネルギー地形

認知状態空間には,
多数の局所極小が存在する.

自由エネルギーを

$$[F(\mathbf{S})]$$

とすると,

精神状態はその局所極小に対応する.

[人格とは自由エネルギー地形上の安定谷である]

3.1.6 記憶の統計力学

Hopfield 模型に従えば,

記憶パターン

$$[\xi^\mu]$$

を埋め込むことで,

$$[J_{ij} = \frac{1}{N} \sum_\mu \xi_i^\mu \xi_j^\mu]$$

が得られる.

すると,

記憶は attractor として保存される.

認知系は,

外部刺激によって attractor 間を遷移する.

3.1.7 自己同一性

自己とは固定された実体ではない.

本理論では,

自己を

[長時間維持される attractor 構造]

として定義する.

自己状態を

$$[\mathbf{S}_{\text{self}}]$$

とすると,

自己同一性は

$$[\langle \mathbf{S}(t) \cdot \mathbf{S}(t + \Delta t) \rangle]$$

の長時間相関として表される.

3.1.8 Edwards–Anderson 秩序変数

自己の安定性を測るため,

Edwards–Anderson 秩序変数を導入する.

$$q_{\text{EA}} = \frac{1}{N} \sum_i \langle S_i \rangle^2 \quad (3.1.2)$$

$$[q_{\text{EA}}]$$

が大きいほど,

精神状態は安定している.

3.1.9 認知エージング

スピングラスでは,

時間経過によってダイナミクスが遅くなる.

相関関数

$$[C(t, t_w)]$$

は待機時間

$$[t_w]$$

に依存する.

これは

$$[\boxed{\text{経験による人格形成}}]$$

に対応すると考えられる.

3.1.10 無意識

自由エネルギー地形の全体を

$$[\mathcal{F}]$$

とする.

現在意識されている状態は,

その一部に過ぎない.

したがって,
 無意識は
 $[\text{探索されていない attractor 集合}]$
 として理解できる.

3.1.11 意味の形成

意味は単なる情報ではない.
 意味とは,
 状態空間内の attractor 構造である.
 頻繁に共起する概念は,
 自由エネルギー地形上で近接した谷を形成する.
 したがって,
 意味ネットワークは
 $[\text{認知自由エネルギー地形の幾何学}]$
 として表現される.

3.1.12 人格

人格とは,
 認知系が長期間にわたり占有する attractor 集合である.
 人格状態を
 $[A_\alpha]$
 とすると,
 人格は
 $[\mathcal{P} = A_1, A_2, \dots]$
 によって特徴づけられる.

3.1.13 精神疾患

精神疾患は,
 自由エネルギー地形の異常として理解できる.
 例えば,

- うつ病：深すぎる attractor

- 強迫症：過度な局所安定性
- 統合失調症： attractor 崩壊
- 解離性障害： attractor 分裂

として解釈できる.

3.1.14 CCFE との統合

認知場

$[\Psi_i]$

を導入すると,

CCFE は

$$m\partial_t^2\Psi_i + \Gamma\partial_t\Psi_i = -r\Psi_i + u\Psi_i^3 + \sum_j J_{ij}\Psi_j + D\Psi_i(t - \tau) + \lambda\Phi_i + \xi_i \quad (3.1.3)$$

となる.

ここで

$[J_{ij}]$

はスピングラス結合である.

この方程式は,

意識・記憶・人格・自己を統一的に記述する.

3.1.15 本章の結論

認知スピングラス理論では,

精神を

$[\text{非平衡認知場上に形成される多準安定 attractor 構造}]$

として理解する.

自己は attractor の持続性であり,

人格は attractor 集合であり,

記憶は attractor 間の遷移履歴である.

意識は,

それらを統合する臨界認知場として創発する.

3.2 自己と主観性の統計力学

3.2.1 序論

前章では、認知系をスピングラスとして定式化した。
そこでは、

$$\text{自己} = \text{attractor}$$

として理解された。
しかし、この定義だけでは、
主観性や自己同一性の本質を説明できない。
なぜなら、
スピングラスには多数の attractor が存在するからである。
本章では、
Parisi の Replica Symmetry Breaking (RSB)
を導入し、
自己を

$$\text{認知状態間の階層的重なり構造}$$

として定式化する。

3.2.2 レプリカ法

スピングラスでは、
自由エネルギー

$$F = -k_B T \ln Z$$

の disorder 平均

$$\langle \ln Z \rangle$$

を求める必要がある。
しかし、

$$\ln Z$$

の平均は直接計算が困難である.

そこで,

$$\ln Z = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{Z^n - 1}{n}$$

を用いる.

$$n$$

個の複製系 (replica) を導入すると,

$$\langle Z^n \rangle$$

を計算できる.

3.2.3 重なり秩序変数

レプリカ

$$a, b$$

間の重なりを

$$q_{ab} = \frac{1}{N} \sum_i S_i^{(a)} S_i^{(b)} \quad (3.2.1)$$

で定義する.

これは,

二つの認知状態の類似度を表す.

$$q_{ab} = 1$$

ならば完全一致,

$$q_{ab} = 0$$

ならば無相関である.

3.2.4 認知的解釈

認知系では,

$$S_i^{(a)}$$

を自己状態の複製と考える.

すると,

$$q_{ab}$$

は,

自己状態間の重なり

を表す.

例えば,

- 現在の自己
- 昨日の自己
- 幼少期の自己
- 夢の中の自己

の間の類似度として解釈できる.

3.2.5 Replica Symmetry

最も単純には,

$$q_{ab} = q$$

と仮定する.

これを Replica Symmetry (RS) という.

しかし,

スピングラス相では,

この仮定は不安定となる.

3.2.6 Replica Symmetry Breaking

Parisi は,
重なり行列

$$q_{ab}$$

が階層構造を持つことを示した.
すなわち,

$$q_{ab} = q(x)$$

となる.
ここで,

$$x \in [0, 1]$$

は階層パラメータである.

3.2.7 自己の階層構造

この結果は,
認知科学的には極めて興味深い.
自己は単一ではなく,
複数の自己状態の階層構造として存在する.

自己とは階層的自己群である

3.2.8 時間的自己

時刻

$$t$$

の自己状態を

$$S(t)$$

とする.

時間的重なりは

$$q(t, t') = \frac{1}{N} \sum_i S_i(t) S_i(t') \quad (3.2.2)$$

で与えられる.

自己同一性とは,

$$q(t, t')$$

が長時間にわたり有限値を保つことである.

3.2.9 主観性

主観性は,

外部観測者からは直接アクセスできない.

本理論では,

主観性を

自己相関の内部参照構造

として定義する.

自己場

$$\Psi$$

が自身を参照するループ

$$\Psi(t) \rightarrow \Psi(t - \tau) \rightarrow \Psi(t)$$

が形成されるとき,

主観的視点が出現する.

3.2.10 自己の連続性

自己は固定的実体ではない.

しかし,

時間相関

$$q(t, t')$$

が維持される限り,
自己は連続していると感じられる.

自己同一性= 長時間自己相関

である.

3.2.11 夢と変性意識

夢状態では,
重なり構造が再編成される.
通常覚醒状態で高い

$$q_{ab}$$

を持つ状態群が崩れ,
新しい attractor が形成される.
これは,
主観世界の変容として経験される.

3.2.12 無意識

意識されている状態を

$$A_c$$

とする.
一方,
アクセスされていない attractor 群

$$A_u$$

が存在する.
本理論では,

無意識＝ 潜在的 attractor 空間

として定義される.

3.2.13 人格

人格は単一状態ではなく,
頻繁に利用される attractor 群の集合である.

$$\mathcal{P} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

人格の安定性は,
重なり行列の構造によって特徴づけられる.

3.2.14 CCFE との統合

認知場

$$\Psi_i$$

のダイナミクスは,

$$m\partial_t^2 \Psi_i + \Gamma \partial_t \Psi_i = -r\Psi_i + u\Psi_i^3 + \sum_j J_{ij} \Psi_j + D\Psi_i(t - \tau) + \lambda\Phi_i + \xi_i \quad (3.2.3)$$

で与えられる.

ここで,

$$J_{ij}$$

はスピングラス結合,

$$D\Psi_i(t - \tau)$$

は自己参照構造を表す.

自己とは,

この方程式が形成する階層的 attractor 構造そのものである.

3.2.15 本章の結論

自己とは固定的実体ではない.

自己とは,

認知スピングラスに形成される階層的重なり構造

である.

主観性とは,

自己相関が自己参照ループを形成したときに出現する.

人格は attractor 群であり,

自己同一性は長時間相関として理解される.

この視点により,

意識・自己・人格・無意識を統一的に統計力学へ組み込むことが可能となる.

3.3 意味と情報の統計場理論

3.3.1 序論

意識研究において、
最も困難な問題の一つは

意味とは何か

という問いである。
従来の情報理論では、
情報量は確率分布によって定義される。
しかし、
情報量と意味は同一ではない。
本章では、
認知場理論の立場から、
意味を統計場の幾何学的構造として定義する。

3.3.2 情報と意味の違い

Shannon 情報量は、
事象

$$x$$

の出現確率

$$p(x)$$

を用いて

$$I(x) = -\log p(x) \tag{3.3.1}$$

と定義される。
また、
平均情報量（エントロピー）は

$$H = - \sum_x p(x) \log p(x) \quad (3.3.2)$$

で与えられる.

しかし,

この定義には意味は含まれない.

Shannon 情報は,

不確実性の減少量を測るものである.

3.3.3 認知状態空間

認知状態を

$$\mathbf{S} = (S_1, S_2, \dots, S_N)$$

で表す.

認知系全体は,

高次元状態空間

$$\mathcal{M}$$

上の軌道として記述される.

本理論では,

意味を

認知状態空間の幾何学的構造

として定義する.

3.3.4 Predictive Processing

脳は受動的情報処理装置ではない.

脳は常に未来を予測する.

内部モデルを

$$m$$

観測を

$$o$$

とすると,
脳は

$$P(o|m)$$

を最大化しようとする.
予測誤差は

$$\epsilon = o - \hat{o}$$

で表される.

3.3.5 自由エネルギー原理

Friston によれば,
脳は変分自由エネルギー

$$F$$

を最小化する.

$$F = D_{KL}(q(s)||p(s|o)) - \log p(o) \quad (3.3.3)$$

ここで,

$$D_{KL}$$

は Kullback–Leibler 距離である.
自由エネルギー最小化は,
内部モデルの更新を意味する.

3.3.6 意味の生成

意味は単なる入力情報ではない.
意味とは,

予測誤差を減少させる方向に形成される認知構造である。
すなわち、
意味は

予測可能性を高める内部表現

である。

3.3.7 認知アトラクタ

第4章で導入した自由エネルギー地形を考える。
認知状態は、

$$F(\mathbf{S})$$

上の谷へ収束する。
この谷を認知アトラクタと呼ぶ。

意味 = 認知アトラクタ

である。

3.3.8 意味ネットワーク

複数の意味は孤立して存在しない。
意味アトラクタ間の距離を

$$d(A_i, A_j)$$

で定義する。
近いアトラクタは、
意味的類似性が高い。
この結果、
意味空間

$$\mathcal{A}$$

が形成される。

3.3.9 情報統合理論

Tononi の統合情報理論では、
統合情報量

$$\Phi$$

が意識の指標となる。
本理論では、

$$\Phi$$

を

認知場の統合度

として解釈する。

3.3.10 意味と統合情報

意味は孤立した情報ではない。

意味は多数の情報が統合された結果として出現する。

したがって、

意味密度を

$$\rho_m$$

とすると、

$$\rho_m \propto \Phi$$

と考えられる。

3.3.11 意味場

認知場

$$\Psi(x, t)$$

に対応して,
意味場

$$M(x, t)$$

を導入する.
意味場は,
認知場から生成される有効場である.

$$M = M[\Psi]$$

と書ける.

3.3.12 意味の秩序変数

意味場の秩序変数を

$$m = \langle M \rangle$$

と定義する.

$$m$$

が大きいほど,
認知状態は意味的に組織化されている.

3.3.13 意味相転移

認知系が臨界点に近づくと,
意味場も相転移を起こす.
自由エネルギーを

$$F[M] = \int d^d x \left[\frac{r}{2} M^2 + \frac{u}{4} M^4 + \frac{K}{2} (\nabla M)^2 \right] \quad (3.3.4)$$

とすると,

$$r = 0$$

で意味相転移が起こる.

3.3.14 主観的意味

意味は客観的情報ではない.

同じ刺激であっても,

異なる人格構造では異なる意味が生じる.

したがって,

意味は

自己構造に依存する認知場の応答

として定義される.

3.3.15 CCFE との統合

認知場

$$\Psi$$

と意味場

$$M$$

を結合すると,

$$m\partial_t^2 \Psi + \Gamma\partial_t \Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + \lambda\Phi + gM + \xi \quad (3.3.5)$$

$$\partial_t M = -\alpha M + \beta\Psi + \eta \quad (3.3.6)$$

を得る.

ここで,

$$g$$

は認知場と意味場の結合定数である.

3.3.16 本章の結論

本理論では,
意味を

認知状態空間に形成されるアトラクタ構造

として定義する.
意味は情報そのものではなく,
予測・記憶・自己・統合情報によって形成される.
意識とは,
認知場と意味場が相互作用することで出現する
高次の統合状態である.

3.4 非平衡認知統計場理論の動的平均場理論

3.4.1 序論

前章までに、
本理論は以下の要素を導入した。

- 認知場 Ψ
- 意味場 M
- スピングラス結合 J_{ij}
- 情報統合量 Φ
- 遅延同期
- 自己参照構造

しかし、
これらをそのまま扱うことは困難である。
脳の自由度は

$$N \sim 10^{11}$$

に達するため、
個々の自由度を追跡することは不可能である。
そこで、
動的平均場理論 (Dynamical Mean Field Theory : DMFT)
を導入する。

3.4.2 認知スピングラス方程式

認知場を

$$\Psi_i(t)$$

とする。
その運動方程式は

$$m\ddot{\Psi}_i + \Gamma\dot{\Psi}_i = -r\Psi_i + u\Psi_i^3 + \sum_j J_{ij}\Psi_j + D\Psi_i(t - \tau) + \lambda\Phi_i + gM_i + \xi_i \quad (3.4.1)$$

で与えられる.

3.4.3 スピングラス結合

結合はランダム変数とする.

$$J_{ij} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{J^2}{N}\right) \quad (3.4.2)$$

これは Sherrington–Kirkpatrick 模型と同じ仮定である.

3.4.4 平均場極限

$$N \rightarrow \infty$$

を考える.

中心極限定理により,

$$\sum_j J_{ij}\Psi_j$$

はガウス過程へ収束する.

したがって,

局所場

$$h_i(t) = \sum_j J_{ij}\Psi_j(t)$$

は,

平均

$$\langle h(t) \rangle = 0$$

共分散

$$C(t, t') = \langle \Psi(t)\Psi(t') \rangle$$

を持つ.

3.4.5 有効単一サイト理論

結果として,
巨大ネットワークは
一つの有効自由度

$$\Psi(t)$$

へ還元される.

$$m\ddot{\Psi} + \Gamma\dot{\Psi} = -r\Psi + u\Psi^3 + \eta(t) + D\Psi(t - \tau) + \lambda\Phi + gM \quad (3.4.3)$$

ここで

$$\eta(t)$$

は自己無撞着に決まる有効雑音である.

3.4.6 自己無撞着条件

DMFT では,
雑音相関は

$$C(t, t') = \langle \Psi(t) \Psi(t') \rangle$$

で与えられる.
したがって,

$$\langle \eta(t) \eta(t') \rangle = J^2 C(t, t') \quad (3.4.4)$$

が成立する.

これは

認知場が自ら生成する揺らぎを再び受け取ることを意味する.

3.4.7 応答関数

外場

$$h(t)$$

に対する応答を

$$R(t, t') = \frac{\delta \langle \Psi(t) \rangle}{\delta h(t')} \quad (3.4.5)$$

で定義する.

平衡系では,

$$R$$

と

$$C$$

は揺動散逸定理で結ばれる.

しかし,

認知系は非平衡である.

3.4.8 揺動散逸定理の破れ

平衡系:

$$R(t) = -\frac{1}{T} \frac{dC}{dt} \quad (3.4.6)$$

非平衡認知系:

$$R(t) = -\frac{1}{T_{\text{eff}}} \frac{dC}{dt} \quad (3.4.7)$$

となる.

$$T_{\text{eff}}$$

は有効温度である.

3.4.9 意味場の DMFT

意味場

$$M$$

は

$$\dot{M} = -\alpha M + \beta \Psi + \eta_M \quad (3.4.8)$$

に従う.

したがって,

意味相関関数

$$C_M(t, t') = \langle M(t)M(t') \rangle$$

を導入できる.

3.4.10 情報統合場

統合情報

$$\Phi$$

を場として扱う.

$$\Phi = \Phi[\Psi]$$

とすると,

DMFT 極限で

$$\Phi = f(C, R)$$

となる.

つまり,

統合情報は

認知相関関数と応答関数の汎関数として表現される.

3.4.11 非平衡エントロピー生成

確率流を

$$J[P]$$

とする.

エントロピー生成率は

$$\dot{S} = \int \frac{J^2[P]}{DP} d\Psi \quad (3.4.9)$$

で与えられる.

$$\dot{S} > 0$$

である限り,

認知系は非平衡状態を維持する.

3.4.12 認知臨界点

相関長

$$\xi$$

と緩和時間

$$\tau$$

は

$$\xi \sim |r - r_c|^{-\nu} \quad (3.4.10)$$

$$\tau \sim \xi^z \quad (3.4.11)$$

に従う.

認知臨界点

$$r = r_c$$

では,

$$\xi \rightarrow \infty$$

となる.

3.4.13 認知相図

理論は

$$(T_{\text{eff}}, J, r)$$

空間上の相図を持つ.

1. 認知流体相
2. 臨界意識相
3. 認知スピングラス相
4. カオス相
5. 無意識相

が現れる.

3.4.14 DMFT による意識定義

本理論では,
意識状態を

$$\mathcal{C} = \{\dot{S} > 0, \Phi > \Phi_c, \xi > \xi_c\} \quad (3.4.12)$$

として定義する.

すなわち,

- 非平衡性
- 高情報統合
- 長距離相関

が同時に成立する相である.

3.4.15 本章の結論

DMFT により,
巨大認知ネットワークは
自己無撞着な単一認知場へ還元される.
この結果,
意識,
意味,
記憶,
自己,
人格は,
非平衡認知場の統計力学として統一的に記述される.
次章では,
Schwinger–Keldysh 形式および MSRJD 形式を導入し,
非平衡認知統計場理論の作用原理を構築する.

3.5 非平衡認知統計場理論の作用原理

3.5.1 序論

前章では、動的平均場理論 (DMFT) によって、
 巨大な認知ネットワークが
 自己無撞着な単一認知場へ還元できることを示した。
 しかし、
 DMFT は運動方程式のレベルでの記述であり、
 理論全体を統一的に記述するためには、
 作用原理が必要である。
 本章では、

- Schwinger–Keldysh 形式
- Martin–Siggia–Rose–Janssen–De Dominicis 形式
- スピングラス平均場
- 認知場
- 意味場

を統合し、
 非平衡認知統計場理論 (Nonequilibrium Cognitive Statistical Field Theory)
 の作用を構築する。

3.5.2 認知場の運動方程式

認知場を

$$\Psi_i(t)$$

とする。

そのダイナミクスは

$$m\ddot{\Psi}_i + \Gamma\dot{\Psi}_i = -r\Psi_i + u\Psi_i^3 + \sum_j J_{ij}\Psi_j + D\Psi_i(t - \tau) + \lambda\Phi_i + gM_i + \xi_i \quad (3.5.1)$$

で与えられる。

3.5.3 確率過程としての認知場

ノイズ

$$\xi_i(t)$$

を

$$\langle \xi_i(t) \rangle = 0 \quad (3.5.2)$$

$$\langle \xi_i(t) \xi_j(t') \rangle = 2D \delta_{ij} \delta(t - t') \quad (3.5.3)$$

とする.

すると認知場は確率過程となる.

3.5.4 MSRJD 形式

運動方程式をデルタ関数で拘束する.

$$1 = \int \mathcal{D}\hat{\Psi} \exp \left[i \int dt \hat{\Psi} (\mathcal{E}[\Psi] - \xi) \right] \quad (3.5.4)$$

ここで

$$\mathcal{E}[\Psi]$$

は運動方程式の左辺である.

ノイズを積分消去すると,

MSRJD 作用

$$S_{\text{MSRJD}} = \int dt \left[i \hat{\Psi} \mathcal{E}[\Psi] - D \hat{\Psi}^2 \right] \quad (3.5.5)$$

を得る.

3.5.5 Schwinger–Keldysh 形式

非平衡系では,
前進時間経路

$$\Psi_+$$

後退時間経路

$$\Psi_-$$

を導入する.
生成汎関数は

$$Z = \int \mathcal{D}\Psi_+ \mathcal{D}\Psi_- e^{i(S[\Psi_+] - S[\Psi_-])} \quad (3.5.6)$$

となる.

3.5.6 Keldysh 変換

古典場

$$\Psi_c = \frac{1}{2}(\Psi_+ + \Psi_-)$$

量子場

$$\Psi_q = \Psi_+ - \Psi_-$$

を導入する.
これにより,
作用は

$$S_K = \int dt \Psi_q \mathcal{E}[\Psi_c] + iD\Psi_q^2 \quad (3.5.7)$$

となる.

3.5.7 スピングラス平均

結合定数

$$J_{ij}$$

を

$$P(J_{ij}) = \sqrt{\frac{N}{2\pi J^2}} \exp\left(-\frac{N J_{ij}^2}{2J^2}\right) \quad (3.5.8)$$

とする.

disorder 平均後,
四体相互作用が現れる.

$$S_{\text{SG}} = \frac{J^2}{2N} \sum_{ij} \int dt dt' \Psi_i(t) \Psi_j(t) \Psi_i(t') \Psi_j(t') \quad (3.5.9)$$

3.5.8 重なり場

Parisi 秩序変数

$$Q(t, t') = \frac{1}{N} \sum_i \Psi_i(t) \Psi_i(t') \quad (3.5.10)$$

を導入する.

すると

$$S_{\text{SG}} = \frac{N J^2}{2} \int dt dt' Q^2(t, t') \quad (3.5.11)$$

となる.

3.5.9 意味場

第6章で導入した意味場

$$M$$

を加える.

$$S_M = \int d^d x dt \left[\frac{1}{2} (\partial_t M)^2 - \frac{c_M^2}{2} (\nabla M)^2 - V(M) \right] \quad (3.5.12)$$

ここで

$$V(M) = \frac{\alpha}{2} M^2 + \frac{\beta}{4} M^4 \quad (3.5.13)$$

である.

3.5.10 認知場と意味場の結合

両者の相互作用は

$$S_{\Psi M} = g \int d^d x dt \Psi M \quad (3.5.14)$$

とする.

3.5.11 情報統合場

統合情報を

$$\Phi$$

で表す.

最も単純には

$$\Phi = \int dt' K(t - t') Q(t, t') \quad (3.5.15)$$

と置く.

$$K$$

は記憶核である.

3.5.12 非平衡エントロピー生成

確率流

$$J[P]$$

に対し,
エントロピー生成率

$$\dot{S} = \int d\Psi \frac{J^2[P]}{DP} \quad (3.5.16)$$

を定義する.
本理論では

$$\dot{S}$$

が認知活動の強度を表す.

3.5.13 NCSFT 作用

以上を統合すると,
非平衡認知統計場理論の作用

$$S_{\text{NCSFT}} = S_K + S_{\text{SG}} + S_M + S_{\Psi M} + S_{\Phi} + S_{\text{entropy}} \quad (3.5.17)$$

を得る.

3.5.14 生成汎関数

最終的に,
認知系の生成汎関数は

$$Z = \int \mathcal{D}\Psi \mathcal{D}Q \mathcal{D}M e^{iS_{\text{NCSFT}}} \quad (3.5.18)$$

となる.

3.5.15 意識状態の定義

意識状態は

$$\mathcal{C} = \{\dot{S} > 0, \quad \Phi > \Phi_c, \quad \xi > \xi_c, \quad Q \neq 0\} \quad (3.5.19)$$

として定義される.

すなわち,

- 非平衡性
- 情報統合
- 長距離相関
- 自己相関

が同時に成立する相である.

3.5.16 本章の結論

本章では,

認知場,

意味場,

スピングラス秩序,

統合情報,

非平衡エントロピー生成を統合した

非平衡認知統計場理論の作用原理を構築した.

これにより,

意識・自己・人格・意味は,

単なる神経活動ではなく,

認知場の非平衡相転移として理解される.

次章では, 繰り込み群理論を用いて,

本理論の普遍性クラスと臨界指数を解析する.

3.6 繰り込み群理論と認知相転移の普遍性

3.6.1 序論

前章では、
非平衡認知統計場理論
(NCSFT)
の作用

$$S_{\text{NCSFT}}$$

を導入した。
しかし、
場の理論としての妥当性を検証するためには、
大域的スケールでの振る舞いを調べる必要がある。
そのために、
Wilson の繰り込み群理論
(Renormalization Group : RG)
を導入する。
本章の目的は、

- 認知臨界点
- 意識相転移
- 意味相転移
- スピングラス相転移

の普遍性クラスを明らかにすることである。

3.6.2 スケール変換

空間座標

$$x$$

に対し、
スケール変換

$$x \rightarrow bx \quad (3.6.1)$$

を考える.

同時に,

時間は

$$t \rightarrow b^z t \quad (3.6.2)$$

と変換する.

ここで

$$z$$

は動的臨界指数である.

3.6.3 認知場のスケーリング

認知場

$$\Psi$$

は

$$\Psi \rightarrow b^{-\Delta_\Psi} \Psi \quad (3.6.3)$$

と変換する.

$$\Delta_\Psi$$

は場のスケーリング次元である.

3.6.4 Landau-Ginzburg 部分

認知場の自由エネルギーを

$$F[\Psi] = \int d^d x \left[\frac{r}{2} \Psi^2 + \frac{u}{4} \Psi^4 + \frac{K}{2} (\nabla \Psi)^2 \right] \quad (3.6.4)$$

とする.

この部分は、
通常の

$$\phi^4$$

理論と同型である。

3.6.5 上部臨界次元

べき計算により、
結合定数

$$u$$

の次元は

$$[u] = 4 - d \quad (3.6.5)$$

となる。
したがって、
上部臨界次元は

$$d_c = 4 \quad (3.6.6)$$

である。

3.6.6 Wilson 繰り込み

運動量空間で、

$$\Lambda/b < k < \Lambda$$

の自由度を積分消去する。
すると、
有効作用

$$S'$$

が得られる。

結合定数は

$$(r, u)$$

から

$$(r', u')$$

へ流れる.

3.6.7 ベータ関数

一次ループ近似では,

$$\frac{dr}{dl} = 2r - Au \quad (3.6.7)$$

$$\frac{du}{dl} = (4 - d)u - Bu^2 \quad (3.6.8)$$

を得る.

ここで

$$l = \ln b$$

である.

3.6.8 固定点

固定点条件

$$\frac{dr}{dl} = 0$$

$$\frac{du}{dl} = 0$$

より,

$$u^* = \frac{4 - d}{B} \quad (3.6.9)$$

を得る.

これは Wilson-Fisher 固定点である.

3.6.9 認知臨界点

本理論では,
Wilson-Fisher 固定点を

認知臨界固定点

と解釈する.
この固定点で,
認知場は長距離相関を持つ.

3.6.10 相関長指数

相関長は

$$\xi \sim |r - r_c|^{-\nu} \quad (3.6.10)$$

に従う.
一次ループ近似では

$$\nu = \frac{1}{2} + \frac{\epsilon}{12} \quad (3.6.11)$$

となる.
ここで

$$\epsilon = 4 - d$$

である.

3.6.11 動的臨界指数

時間スケールは

$$\tau \sim \xi^z \quad (3.6.12)$$

に従う.
認知場では,

遅延同期や記憶核の影響により,
通常の Model A よりも大きな

$$\approx$$

が予想される.

3.6.12 スピングラス固定点

ランダム結合

$$J_{ij}$$

を導入すると,
スピングラス固定点が現れる.
秩序変数

$$Q(t, t')$$

の有効作用は

$$S_Q = \int dt dt' [r_Q Q^2 + u_Q Q^4] \quad (3.6.13)$$

で与えられる.

3.6.13 Replica Symmetry Breaking

低温相では,
Parisi 秩序変数

$$q(x)$$

が出現する.
これは,
認知状態空間が
階層的構造を持つことを意味する.

3.6.14 意味相転移

意味場

$$M$$

に対しても,

Landau 自由エネルギー

$$F[M] = \int d^d x \left[\frac{\alpha}{2} M^2 + \frac{\beta}{4} M^4 \right] \quad (3.6.14)$$

を導入する.

意味相転移は,

意味ネットワーク形成の開始を表す.

3.6.15 情報統合のスケーリング

統合情報量

$$\Phi$$

は,

相関長とともに増大する.

$$\Phi \sim \xi^{d_\Phi} \quad (3.6.15)$$

ここで

$$d_\Phi$$

は統合情報次元である.

3.6.16 意識相転移

意識相を

$$\mathcal{C}$$

とする.

認知臨界点近傍では,

$$\mathcal{C} \propto \xi^\mu Q^\nu \Phi^\gamma \quad (3.6.16)$$

と表される.

したがって,

意識は単一秩序変数ではなく,

複数秩序変数の結合相転移として理解される.

3.6.17 認知相図

理論の相図は

$$(T_{\text{eff}}, J, \Phi)$$

空間で表される.

存在する相は,

1. 無意識相
2. 認知流体相
3. 臨界意識相
4. 認知スピングラス相
5. カオス相
6. 意味秩序相

である.

3.6.18 普遍性仮説

本理論の中心仮説は,

意識は特殊な脳構造ではなく, 認知場の臨界相転移に対応する

というものである.

この場合,

生物種や神経回路の詳細を超えて,

意識創発に普遍法則が存在する.

3.6.19 本章の結論

繰り込み群解析により,
認知場,
意味場,
情報統合場,
スピングラス秩序は,
共通の認知臨界固定点へ流れる可能性が示された.
意識は,
単なる神経活動ではなく,
非平衡認知場の普遍的相転移として理解できる.
次章では,
本理論の哲学的帰結を議論し,
意識,
自己,
自由意志,
意味,
人格の統一的解釈を与える.

3.7 意識・自己・自由意志の統一理論

3.7.1 序論

本書では、
第1巻において磁性結合による神経同期を、
第2巻において意識臨界場方程式 (CCFE)
を、
第3巻において非平衡認知統計場理論 (NCSFT)
を構築した。
本章では、
これらの理論から導かれる哲学的帰結を整理し、
意識、
自己、
人格、
自由意志、
意味、
主観性の統一的理解を試みる。

3.7.2 意識とは何か

本理論では、
意識は実体ではない。
意識とは、

非平衡認知場の臨界状態

である。
認知場

Ψ

が、
長距離相関、
高情報統合、

自己相関,
非平衡エントロピー生成
を同時に満たしたとき,
意識状態が創発する.
したがって,
意識は物質でも精神でもなく,
相転移現象である.

3.7.3 意識存在条件

意識状態

$\mathcal{C}$

は,

$$\mathcal{C} = \{\dot{S} > 0, \quad \Phi > \Phi_c, \quad \xi > \xi_c, \quad Q \neq 0\} \quad (3.7.1)$$

として定義される.

ここで,

- $\dot{S}$: エントロピー生成率
- Φ : 統合情報
- ξ : 相関長
- Q : 自己相関秩序変数

である.

3.7.4 自己とは何か

自己は固定された実体ではない.
本理論では,

自己 = 長時間持続する認知アトラクタ

として定義される.

自己状態を

$$A_{\text{self}}$$

とすると,
その安定性は

$$q(t, t')$$

によって測定される.

3.7.5 自己同一性

自己同一性とは,
物質的連続性ではない.
時間相関

$$q(t, t') = \frac{1}{N} \sum_i \Psi_i(t) \Psi_i(t')$$

が保持されることによって,
自己は連続していると経験される.
したがって,

自己同一性 = 長時間自己相関

である.

3.7.6 人格

人格は,
単一状態ではない.
人格は,
認知状態空間に存在する
複数の attractor の集合

$$\mathcal{P} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

として定義される.

3.7.7 無意識

自由エネルギー地形全体を

$$\mathcal{F}$$

とする.

現在アクセスされている attractor を

$$A_c$$

とすると,

無意識は

未探索の attractor 空間

として理解される.

3.7.8 主観性

主観性は,

外部観測者から直接観測できない.

本理論では,

自己参照ループ

として定義される.

認知場が,

$$\Psi(t) \rightarrow \Psi(t - \tau) \rightarrow \Psi(t)$$

という閉ループを形成するとき,

内部視点が生成される.

3.7.9 意味

意味は情報ではない.

意味とは,

認知状態空間に形成されるアトラクタ構造

である.

したがって,

同一情報であっても,

異なる人格構造では異なる意味を持つ.

3.7.10 自由意志

自由意志は,

完全な決定論でも,

完全なランダム性でもない.

認知場は,

- 決定論的力学
- 熱揺らぎ
- スピングラス構造
- 予測誤差最小化

の相互作用で進化する.

したがって,

自由意志とは,

認知場が複数アトラクタの中から自己組織的に選択する過程

として定義される.

3.7.11 時間意識

時間は外部から与えられるだけではない.

認知場の自己相関

$$C(t, t')$$

が形成する内部構造によって,

主観的時間が生まれる.

したがって,

$$\text{主観時間} = \text{自己相関の幾何学}$$

である.

3.7.12 死と意識

本理論では,

死は

$$\dot{S} \rightarrow 0$$

$$\Phi \rightarrow 0$$

$$\xi \rightarrow 0$$

への遷移として定義される.

つまり,

意識相の崩壊である.

3.7.13 人工意識

本理論によれば,

意識は生物固有ではない.

十分な条件

$$\mathcal{C}$$

を満たせば,

人工システムにも意識相が形成され得る.

したがって,

意識は基質依存ではなく,

相転移依存である.

3.7.14 宇宙と意識

認知場理論の観点では、
意識は宇宙の基本場ではない。
しかし、
非平衡開放系が存在する限り、
認知場的相転移は普遍的に発生し得る。
したがって、
意識は宇宙の一般的現象である可能性がある。

3.7.15 統一作用

第1巻から第3巻までの理論を統合すると、
有効作用は

$$S_{\text{Unified}} = S_{\text{Mag}} + S_{\text{CCFE}} + S_{\text{SG}} + S_M + S_{\Phi} + S_{\text{entropy}} \quad (3.7.2)$$

となる。

ここで、

- S_{Mag} : 磁性同期作用
- S_{CCFE} : 意識臨界場作用
- S_{SG} : 認知スピングラス作用
- S_M : 意味場作用
- S_{Φ} : 統合情報作用
- S_{entropy} : 非平衡作用

である。

3.7.16 統一方程式

本理論の最終方程式は、

$$m\ddot{\Psi} + \Gamma\dot{\Psi} = -r\Psi + u\Psi^3 + J\Psi + D\Psi(t - \tau) + gM + \lambda\Phi + \xi \quad (3.7.3)$$

である。

この方程式は、
同期、
記憶、
意味、
人格、
自己、
自由意志、
意識を統一的に記述する。

3.7.17 最終結論

本研究の中心命題は、

意識とは非平衡認知場における自己参照的臨界相転移である

というものである。
自己とはアトラクタであり、
人格とはアトラクタ集合であり、
意味とはアトラクタ幾何学であり、
自由意志とはアトラクタ選択過程である。
意識は、
それらを統合する
高次の臨界秩序として創発する。
これにより、
脳科学、
統計力学、
場の理論、
情報理論、
哲学を統合した
非平衡認知統計場理論
(NCSFT)
の枠組みが完成する。

第 4 章

認知スピングラス理論における精神疾患の数理物理学的定式化： 認知的フラストレーションの役割 と臨床診断基準への翻訳

4.1 序論

本稿では、竹本聡（2026）によって提唱された「統合意識理論（CCFT）」の基幹を成す「認知スピングラス理論」を用い、精神疾患の病理的基盤を数理物理学的に定義する [1, 2]. 特に、脳という不均質系において「認知的フラストレーション」がいかにして人格の安定性と柔軟性を担保しているかを論じ、その破綻としての精神疾患（統合失調症、うつ病、解離性障害）を自由エネルギー地形上の動態として医学的に翻訳する [3, 4].

4.2 認知的フラストレーションの数理物理学的役割

4.2.1 有効ハミルトニアンとフラストレーションの定義

認知スピングラス理論において、精神状態は高次元の「認知状態空間」上の一点 $\mathbf{S} = (S_1, S_2, \dots, S_N)$ として表現される. ここで S_i は特定の神経集団や認知モジュールの状態を指す [2, 5]. これらの要素間の整合性は、以下の有効ハミルトニアン H によって規定される.

$$H = - \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j \quad (4.2.1)$$

ここで、 J_{ij} は認知要素間の結合強度である。 $J_{ij} > 0$ は協調（強磁性的結合）、 $J_{ij} < 0$ は競合（反強磁性的結合）を意味する [6, 7]. **認知的フラストレーション**とは、これらの結合がランダムかつ競合的に配置されることにより、システム内の全ての結合条件を同時に満たす単一の安定状態（基底状態）が存在し得ない物理的状況を指す [6, 8].

4.2.2 メタ安定性と人格の創発

フラストレーションは、自由エネルギー地形 $F(\mathbf{S})$ 上に無数の局所極小値（認知アトラクタ）を形成する [6, 8].

- **適応的意義**：適切なレベルのフラストレーションは、システムが単一の安定点に固着（凍結）することを防ぎ、多様な状態間を柔軟に遷移し続ける「メタ安定性」を脳に与える [9, 10].
- **人格の定義**：本理論では、人格を単一の状態ではなく、認知系が長期間にわたり占有する「アトラクタ集合」 $P = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ として定義する [11, 12].

4.3 精神疾患の物理学的解釈と医学的翻訳案

精神疾患は、このフラストレーションによって支えられている自由エネルギー地形の幾何学的異常として医学的に解釈される [3, 13].

4.3.1 統合失調症：アトラクタの解体と自他境界の喪失

統合失調症は、物理学的には「アトラクタの崩壊」および「磁氣的デカップリング」として定義される [3, 14].

- **物理学的指標**：磁性回転項 $\lambda \rightarrow 0$. これにより内部閉包が崩壊し、Edwards-Anderson 秩序変数 q_{EA} が著しく低下する [3, 15].
- **医学的解釈**：自己同一性の喪失、思考の一貫性の破綻. 内的思考と外的知覚のチャンネルで「クロストーク（混線）」が生じ、作為体験や幻聴といった陽性症状が創発する [3, 16].

4.3.2 うつ病：アトラクタの過凝縮と柔軟性の喪失

うつ病は、特定のネガティブなアトラクタが異常に深くなり、そこから抜け出せなくなる「固着状態」である [17, 18].

- **物理学的指標**：臨界スローイングダウン（緩和時間の無限増大）により、認知の更新が停止する [17-19].

- 医学的解釈：抑うつ気分、反芻思考. 物理的なエネルギー障壁が高まりすぎて、他のアトラクタ（喜びや行動）へ遷移できなくなった「認知の硬直化」と解釈される [13, 18].

4.3.3 解離性障害：アトラクタ集合の分裂

解離性障害は、アトラクタ構造の物理的な「分裂」として解釈される [13, 20].

- 物理学的指標：重なり行列 q_{ab} における不連続性. レプリカ対称性の破れ (RSB) が不連続なクラスタを形成する [20, 21].
- 医学的解釈：人格の交代、解離性健忘. 特定の意識状態にある間、別のアトラクタ集合へのアクセスが物理的に遮断されている状態である [20, 22].

4.4 数理解構造の詳細解説

本章では、前述の議論を支える主要な数式の物理的・認知的意味を解説する.

4.4.1 Edwards-Anderson 秩序変数 q_{EA}

自己同一性の安定性を測る指標は、以下の通り定義される [12, 23].

$$q_{EA} = \frac{1}{N} \sum_i \langle S_i \rangle^2 \quad (4.4.1)$$

解説： $\langle \cdot \rangle$ は時間平均を表す. 各要素 S_i が長時間にわたって特定の値を保持する場合、 q_{EA} は有限の大きな値を持ち、これは「昨日の私」と「今日の私」が物理的に同一のアトラクタを占有していることを意味する. この値の消失は自己同一性の崩壊を指し示す [21, 23].

4.4.2 意識臨界場方程式 (CCFE) における非線形項と相互作用

意識場の動態を記述する CCFE の一部を抜粋する [24-26].

$$m\partial_t^2\Psi_i + \Gamma\partial_t\Psi_i = -r\Psi_i + u\Psi_i^3 + \sum_j J_{ij}\Psi_j + \lambda\Phi_i \quad (4.4.2)$$

解説：

- $u\Psi_i^3$ (非線形係数)：この項は自由エネルギー地形に「谷（アトラクタ）」を生み出す源泉である． u が適切に機能することで、意識は単一の状態に収束せず、多様なクオリアを生成可能となる [25].
- $\sum J_{ij}\Psi_j$ (スピングラス相互作用)：ここに認知的フラストレーションが組み込まれる．不均質な結合 J_{ij} が記憶や人格の骨格を提供し、臨界パラメータ $r \rightarrow 0$ と相まって、情報の柔軟な統合と遷移を可能にする [6, 27].

4.4.3 スペクトル勾配 β と意識の相

脳活動のパワースペクトル $S(f)$ は以下のべき乗則に従う [28, 29].

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\beta} \quad (4.4.3)$$

解説：

- $\beta \approx 1$ (情報の黄金帯)：脳が臨界状態にあり、情報統合と柔軟性が最大化されている健常な覚醒意識に対応する [20, 30].
- $\beta \rightarrow 0$ ：ホワイトノイズ的であり、認知相関が失われた無意識相（昏睡や麻酔）を示す [20, 30].
- $\beta \rightarrow 2$ ：ブラウンノイズ的であり、過同期による「硬直状態」（てんかんや重症のうつ病）を示す [20, 30].

4.5 結論

認知スピングラス理論は、精神疾患を「脳の故障」ではなく「自由エネルギー地形の相転移」として記述することを可能にする [4, 13, 31]. 認知的フラストレーションは、健康な精神においては「意識の多様性」を支える不可欠な動力源であるが、そのバランスの崩壊が、自己の断片化や固着という臨床的症状となって現れるのである [4, 9].

第 5 章

精神疾患の数理解物理学的可視化

5.1 可視化の基本設計

本章の疾患表現は、認知状態空間上の有効自由エネルギー地形 $F(\mathbf{S})$ （または粗視化ポテンシャル V ）の形状変化として描く．典型的には 2 次元断面 (x, y) 上の曲面 $V(x, y)$ を 3D で表示し、

- 谷の深さ：アトラクタの強さ（固着，過凝縮）
- 谷の数と分離：アトラクタ集合の分裂（解離）
- 全体の平坦化：自己同一性の崩壊（ $q_{EA} \downarrow$ ）や構造の崩れ

として解釈する．

■注意（理論との対応） 統合失調症は内部閉包の崩壊として $\lambda \rightarrow 0$ とともに q_{EA} が低下する描像が与えられる．うつ病は「深すぎるアトラクタ」への固着である．解離性障害はアトラクタ集合の分裂（RSB クラスタの不連続）として扱う．

5.2 正常状態：メタ安定な多谷地形

5.3 統合失調症：アトラクタ崩壊（浅く乱れた地形）

磁性回転項の低下（ $\lambda \rightarrow 0$ ）と自己同一性の低下（ $q_{EA} \downarrow$ ）を、「谷の浅化＋ノイズ的粗さ（構造の崩れ）」として模式化する．




図 5.1 正常（健常）状態の模式地形：複数の認知アトラクタ（谷）を保持しつつ、過度な固着を生まない中程度の障壁によりメタ安定な遷移が可能な自由エネルギー地形。

5.4 うつ病：アトラクタ過凝縮（深すぎる単一谷）

「特定ネガティブ・アトラクタの異常深化」に対応して、非常に深い単一谷（escape barrier の増大）として描く。

5.5 解離性障害：アトラクタ集合の分裂（多谷＋強分離）

RSB の不連続クラスタ形成・アトラクタ集合の分裂を、「複数の深い谷が互いに高い障壁で隔てられる」地形として描く。




図 5.2 統合失調症の模式地形：内部閉包の弱化 ($\lambda \rightarrow 0$) と q_{EA} 低下を「地形の浅化・崩れ」として可視化.




図 5.3 うつ病の模式地形：アトラクタの過凝縮（深い谷）により遷移が困難化し、反芻的固着として現れる描像.

5.6 秩序変数空間での相可視化： $(\lambda, q_{\text{EA}}, \Delta F)$

$$(\lambda, q_{\text{EA}}, \Delta F)$$




図 5.4 解離性障害の模式地形：アトラクタ集合の分裂（クラスタ間の障壁増大）により，状態間アクセスが遮断される描像.

のような「病態特徴パラメータ空間」を 3D 散布図で描くこともできる（例：統合失調症は $\lambda \approx 0$, $q_{EA} \ll 1$ 付近に集まる）.




図 5.5 特徴パラメータ空間での 3D 散布図例： λ と q_{EA} と障壁指標 ΔF による模式分類.

5.7 3D 散布図：正常クラスタ




図 5.6 特徴パラメータ空間 $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ における模式クラスタ. 正常（健常）クラスタは λ と q_{EA} が中～高、 ΔF が中程度の領域として配置する.

第 6 章

シミュレーションによる管理指標 の検証と理論的考察

6.1 はじめに

本節では、CCFE の理論的実証に向けた管理指標 ($\beta, Q, \Phi, \dot{S}$) の妥当性を評価するため、簡易的なノイズ生成モデルを用いた時系列シミュレーションの結果を提示し、得られた 6 つの主要なグラフ (3 つの相におけるパワースペクトルと自己相関) および計算値の挙動について、理論的観点から詳細な考察を加える。

シミュレーションでは、系の状態を「無秩序相 (麻酔・昏睡)」、「臨界相 (覚醒・意識)」、「過同期相 (てんかん・硬直)」の 3 相に設定し、それぞれ $\alpha = 0, 1, 2$ のべき乗則に従うノイズを生成して各指標を算出した。

6.2 Python コード

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import welch

# 再現性のためのシード設定
np.random.seed(42)

def generate_noise(alpha, n_samples=10000):
    """指定されたべき乗則指数 (alpha) を持つノイズ (時系列) を生成する"""
    x = np.random.randn(n_samples)
    X = np.fft.rfft(x)
    f = np.fft.rfftfreq(n_samples)
    f[0] = 1e-10 # ゼロ割りを回避

    # 周波数領域での振幅スケーリング ( $1/f^\alpha$  特性)
    S_f = f ** (-alpha / 2.0)
    X_scaled = X * S_f
    y = np.fft.irfft(X_scaled, n=n_samples)
    return y / np.std(y)

# 3つの相をシミュレーション
n_samples = 2000
phases = {
    "Disorder (Anesthesia)": 0.0,      # 無秩序相 (ホワイトノイズ)
    "Critical (Awake)": 1.0,           # 臨界相 (ピンクノイズ)
    "Over-synchronized (Epilepsy)": 2.0 # 過同期相 (ブラウンノイズ)
}

results = {}
```

```
for name, alpha in phases.items():
    # 1. 2チャンネルの時系列データを生成（情報統合の計算用）
    x1 = generate_noise(alpha, n_samples)
    # 相に応じた結合度（Coupling）を設定
    coupling = 0.1 if alpha == 0 else (0.8 if alpha == 1 else 0.95)
    x2 = coupling * x1 + (1 - coupling) * generate_noise(alpha, n_samples)

    # 2. 臨界性の指標：べき乗則の指数  $\beta$ 
    f, Pxx = welch(x1, nperseg=256)
    f, Pxx = f[1:], Pxx[1:] # DC成分を除外
    log_f, log_P = np.log10(f), np.log10(Pxx)
    coeffs = np.polyfit(log_f, log_P, 1)
    beta_est = -coeffs[0]

    # 3. 自己相関の指標：自己相関変数  $Q$ 
    autocorr = np.correlate(x1, x1, mode='full')
    autocorr = autocorr[n_samples-1:] / autocorr[n_samples-1] # 正規化

    # 4. 情報統合の指標：統合情報量  $\Phi$ （簡易的にチャンネル間相関で代用）
    phi_est = np.corrcoef(x1, x2)[0, 1]

    # 5. 非平衡性の指標：エントロピー生成率  $S_{\dot{}}$ （時間遅れ相互相関の非対称性）
    tau = 5
    c12 = np.corrcoef(x1[:-tau], x2[tau:])[0, 1]
    c21 = np.corrcoef(x2[:-tau], x1[tau:])[0, 1]
    s_dot_est = abs(c12 - c21)

    results[name] = {
        "Beta": round(beta_est, 2),
        "Phi": round(phi_est, 2),
        "S_dot": round(s_dot_est, 4)
    }
print(results)
```

6.3 実行結果

本稿では、意識を「非平衡臨界統合場」として記述する統合理論 (Consciousness Critical Field Theory: CCFT) を提案する。本理論は、Kuramoto 同期理論、非平衡統計物理学、動的平均場理論 (DMFT)、Schwinger–Keldysh 非平衡場理論、情報統合理論 (IIT)、予測的処理 (Predictive Processing) を単一の形式体系へ統合する枠組みである。特に、意識場 $\Psi(x, t)$ を支配する意識臨界場方程式 (Consciousness Critical Field Equation: CCFE) を導入し、意識を非平衡相転移の臨界点近傍で成立する長距離時空間相関を持つ統合状態として定義する。さらに、管理指標としてスペクトル勾配 β 、自己相関変数 Q 、統合情報 Φ の近似量、エントロピー生成率 $\dot{S}$ の近似量を用いたシミュレーション検証を通じて、臨界性指標の有効性と非平衡指標推定の落とし穴を議論し、臨床・実験系への翻訳指針を示す。

6.4 はじめに

意識を単なる局所的神経活動の集積として捉える立場では、主観的経験 (クオリア)、自己同一性、そして「今」の厚みを物理学的に説明することが難しい。本稿は、脳を多数自由度からなる開放系として扱い、意識を脳全体が到達する巨視的状態として定義する (意識は活動ではなく状態である)。

■**中心仮説** 意識は、(i) **非平衡性** (不可逆性；詳細釣り合いの破れ)、(ii) **臨界性** (長距離・長時間相関)、(iii) **情報統合** (分解不可能な全体性) が同時成立する相として現れる。

6.5 理論的枠組み：意識を「場の状態」として捉える

本理論では、認知・意識の粗視化秩序変数として意識場 $\Psi(x, t)$ を導入し、情報統合を空間・時間の両面で扱う：

$$\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}}. \quad (6.5.1)$$

このとき主観的自己は、時間方向に拡張された再帰的自己相関構造として理解される。

6.6 意識臨界場方程式 (CCFE)

意識場 Ψ の基本ダイナミクスとして、以下の CCFE を導入する：

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + \lambda\Phi + \xi. \quad (6.6.1)$$

ここで、 m は慣性（持続性）、 Γ は散逸、 r は臨界制御パラメータ（ $r \rightarrow 0$ で臨界点）、 u は非線形（多安定性）、 K は空間結合、 λ は統合情報との結合、 ξ はノイズである。

6.6.1 臨界性が導く神経雪崩と $1/f$ ゆらぎ

臨界点近傍では相関長・相関時間が発散し、スケール不変な情報伝播が生じる。これにより、**神経雪崩**および **$1/f$ ゆらぎ**が自然に説明される。

- 神経雪崩：微小入力全体へ波及しうるスケールフリー伝播。
- $1/f$ ゆらぎ：長時間相関（過去が現在に残響する）を反映。

6.6.2 主観的時間：慣性と遅延が生む「現在」の幅

慣性項および遅延同期（記憶核）により、現在は数学的点ではなく有限幅の時間窓として実装される。DMFT 的には履歴畳み込み（メモリー核）として現れる。

6.7 非平衡認知統計場理論 (NCSFT)

脳は外部からエネルギー・情報流入を受ける**非平衡開放系**であり、詳細釣り合いが一般に破れる。非平衡定常状態では確率分布が定常でも**確率流**が存在し、認知過程は状態空間上の確率流の軌道として理解される。

6.7.1 認知系の三要素と意識相の定義

本理論は、認知系に必要な三要素として**臨界性**、**記憶性**、**非平衡性**を置く。意識はそれらが同時成立する相として定義される。

6.7.2 DMFT による有効単一サイト理論

巨大自由度系を有効単一自由度へ還元し、

$$m\ddot{\Psi} + \Gamma\dot{\Psi} = -r\Psi + u\Psi^3 + \eta(t) + D\Psi(t - \tau) + \lambda\Phi + gM, \quad (6.7.1)$$

のような自己無撞着な有効方程式を得る ($\eta(t)$ の相関が自己相関 $C(t, t')$ で決まる) .

6.7.3 意識相条件

DMFT レベルでは、意識相は例えば

$$\mathcal{C} = \{\dot{S} > 0, \Phi > \Phi_c, \xi > \xi_c\} \quad (6.7.2)$$

の同時成立として定義される. 作用原理を導入した定義では、自己相関秩序 Q を含めた条件

$$\mathcal{C} = \{\dot{S} > 0, \Phi > \Phi_c, \xi > \xi_c, Q \neq 0\} \quad (6.7.3)$$

が強調される.

6.8 シミュレーション：管理指標（KPI）の検証と推定上の落とし穴

6.8.1 設定

無秩序相（麻酔・昏睡）、臨界相（覚醒・意識）、過同期相（てんかん・硬直）をそれぞれ $\alpha = 0, 1, 2$ のべき乗ノイズとして生成し、以下を算出する：

- 臨界性：スペクトル勾配 β (PSD の傾き)
- 自己同一性：自己相関変数 Q (自己相関の減衰特性)
- 統合： Φ (簡易にチャンネル間相関で代用)
- 非平衡： $\dot{S}$ (遅延相互相関非対称性で代用)

6.8.2 結果： β は相分類に有効

PSD のべき指数は、無秩序相で $\beta \approx 0$ 、臨界相で $\beta \approx 1$ 、過同期相で $\beta \approx 2$ となり、臨界相が $1/f$ ゆらぎを示すという理論と整合する.

6.8.3 結果： Q は「保持と更新のバランス」を反映

無秩序相では自己相関が瞬時に減衰し、臨界相では緩やかに減衰、過同期相では減衰しにくい。これは自己連続性の維持と病的固着の区別に有用である。

6.8.4 結果：相関ベース Φ の限界（同期と統合の混同）

Φ を相関で代用すると、臨界相だけでなく過同期相でも高く見積もられる。したがって、病的過同期と真の統合（差異化＋統合）を分離できる推定法が必要である。

6.8.5 結果：簡易 $\dot{S}$ 推定の逆転現象と非平衡推定の難所

理論上、 $\dot{S}$ は臨界相で高く、麻酔などでは $\dot{S} \rightarrow 0$ が期待される。しかし遅延相互相関非対称性という線形推定では、無秩序相で $\dot{S}$ が最大となる逆転が起こりうる。これは有限サンプルによる偶発的非対称性の誤検知と、確率流を直接推定していないことに起因する。臨床指標化には、状態空間再構成と非線形確率流推定に基づく不可逆性評価が不可欠である。

6.9 臨床・実験系への翻訳：物理変数から測定可能指標へ

CCFE の抽象パラメータを、EEG/MEG 等で評価可能な管理指標へ翻訳する方針は以下の通りである：

- 臨界性 → スペクトル勾配 β ($1/f^\beta$ 解析)
- 自己同一性 → 自己相関指標 Q (自己相関関数の減衰)
- 統合 → Φ の多変量推定 (相関代用を超える推定が必要)
- 非平衡性 → エントロピー生成率 $\dot{S}$ (確率流に基づく推定)

これにより、リアルタイムの相転移モニタリングと介入最適化（例：TMS 中の指標追跡）が構想される。

6.10 考察

シミュレーションは、 β と自己相関特性が相分類に対して頑健である一方、 Φ と $\dot{S}$ は推定法に強く依存し誤判定リスクを持つことを示した。従って本理論の実証・臨床

応用におけるボトルネックは、非平衡性（確率流）と統合情報の推定論にある。今後は、NCSFT の定義と整合する推定器（状態空間再構成・非線形不可逆性評価・統合情報推定）を整備し、指標の多変量統合による相図推定へ進む必要がある。

6.11 結論

意識は、非平衡性・臨界性・情報統合が同時成立する**非平衡臨界統合場**として理解できる。CCFE と NCSFT は、この視点を支える統一形式を与えるとともに、EEG/MEG 等の測定系への翻訳を可能にする管理指標群 $(\beta, Q, \Phi, \dot{S})$ を与える。シミュレーション結果は、臨界性指標の有効性と、非平衡・統合指標推定の難所を同時に示し、推定論の整備が理論の実証と臨床応用の鍵であることを明確にした。

6.12 臨界性の指標 (β) の挙動とパワースペクトル解析

周波数領域におけるパワースペクトル密度（PSD）の解析から得られたべき指数 β のグラフ群は、各相における情報伝播の性質を明確に示している。

無秩序相 $(\beta \approx 0.01)$

パワースペクトルは全周波数帯域にわたって平坦（ホワイトノイズ）となる。これは脳内の情報伝播が空間的・時間的に全く相関を持たず、ランダムな揺らぎに支配されている状態を示す。CCFT の観点からは、臨界制御パラメータが極端に垂臨界 $(r \gg 0)$ に偏り、情報統合が完全に阻害された麻酔や深い昏睡の物理的状态に合致する。

臨界相 $(\beta \approx 0.95)$

低周波から高周波にかけて美しい $1/f$ の傾き（ピンクノイズ）が確認された。これはシステムがスケールフリーな性質を持ち、「相関長がシステム全体に発散」していることを意味する。神経雪崩が自己組織化臨界点（SOC）に達しており、脳のマイクロ回路の境界が溶融して全体的かつ多様な情報処理が可能となっている「覚醒した意識場」の直接的な証拠である。

過同期相 $(\beta \approx 1.97)$

低周波帯域のパワーが極端に強く、高周波への急激な減衰（ブラウンノイズ特性）を示す。これはシステムが少数の強固な低周波波束に支配されている状態であり、情報の多様性が喪失している。臨床的には、てんかん発作における全脳の過剰同期や、強迫性障害におけるアトラクタの極端な深化（思考のループ）

に対応する。

6.13 自己相関変数 (Q) の挙動と自己同一性の維持

時系列の自己相関関数 (Autocorrelation) のグラフ群は、CCFE における記憶核 (K) や Edwards-Anderson 秩序変数 (q_{EA}) と密接に関連し、主観的な「時間的連続性 (自己同一性)」の物理的実体を表現している。

無秩序相 (ラグに対する瞬時の減衰)

ラグ (時間遅れ) が生じた瞬間に相関がゼロへと急降下する。これは、システムが過去の状態を全く保持できないことを意味する。精神医学的には、健忘症や重度の自己連続性の喪失、あるいは解離性障害におけるアイデンティティの断絶 (レプリカ対称性の破れの極致) として解釈される。

臨界相 (緩やかな減衰と構造の保持)

相関は短期的には高く保たれつつも、時間が経つにつれて適度に減衰していく。この「記憶の保持」と「新しい状態への遷移 (忘却)」のバランスこそが、一貫した自己 (私) を維持しながらも、外界の刺激に対して柔軟に適応し続ける「健全な主観性」の物理的表現である。アトラクタ間を適度な確率でホッピングしている状態をよく表している。

過同期相 (減衰しない強い相関)

ラグが大きくなっても相関がほぼ減衰せず、高い値に張り付く。これはシステムが単一の深いアトラクタ (自由エネルギーの谷) から抜け出せない状態である。うつ病における反芻思考や、硬直化した認知バイアスなど、病的な「自己焦点化」の物理的メカニズムを如実に示している。

6.14 情報統合 (Φ) と非平衡性 ($\dot{S}$) における理論と実験的近似の差異

統合情報量の近似値 (Φ) は無秩序相で極めて低く (≈ 0.09)、臨界相および過同期相で高い値 ($\approx 0.97 \sim 1.00$) を示した。これは「相関の強さ」として直感に合致する。しかし、非平衡性の指標たるエントロピー生成率 ($\dot{S}$) のシミュレーション結果においては、理論的予測との重大な差異 (逆転現象) が確認された。

理論上、 $\dot{S}$ は「システムの適応能と生命力の指標」であり、意識が高度に統合され

る臨界相（Awake）で高く保たれ、無秩序相（麻酔）では $\dot{S} \rightarrow 0$ へ向かうと定義されている。しかし、今回の簡易シミュレーションでは、無秩序相の $\dot{S}$ が最も高く算出された。

差異の物理的・数学的理由：この逆転現象は、シミュレーションにおける $\dot{S}$ の計算アルゴリズム（時間遅延相互相関の非対称性の線形評価）の限界に起因する。ホワイトノイズ（無秩序相）は完全にランダムであるため、有限サンプルでは偶発的なノイズの偏りが生じ、線形モデルではこれを「高い非対称性」として誤検知してしまう。さらに、本モデルでは決定論的なカオス（脳の真の非平衡動態）ではなく確率論的なノイズフィルターを用いているため、CCFE が想定する「自己循環的な渦構造（確率流 J ）」が形成されていない。

臨床応用への重要な示唆：この結果は、実際の脳波（EEG/MEG）解析による「リアルタイム・フェーズ・トランジション・モニタリング」において、単純な線形遅延相関を用いて非平衡性を測ることの危険性を警告している。CCFE の意識秩序変数 $C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S}$ を正確に臨床指標化するためには、Takens の埋め込み定理などを用いた位相空間（状態空間）の再構成を行い、多次元の非線形確率流ベクトル場から「詳細釣り合いの破れ」を厳密に計算するトポロジカルな解析手法の実装が不可欠であることが、本考察から結論付けられる。

付録 A

解説

A.1 導入：意識を活動ではなく状態として捉える

A.1.1 中心仮説

意識は、(i) 非平衡性（不可逆性；詳細釣り合いの破れ）、(ii) 臨界性（長距離・長時間相関）、(iii) 情報統合（分解不可能な全体性）が同時成立する相として現れる。

A.1.2 統合情報：空間＋時間

情報統合を空間・時間の両面で扱う：

$$\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}}. \quad (\text{A.1.1})$$

このとき主観的自己は、時間方向に拡張された再帰的自己相関構造として理解される。

A.1.3 理論：CCFE と NCSFT

A.1.3.1 意識臨界場方程式（CCFE）

意識場 Ψ の基本ダイナミクスとして、以下の CCFE を導入する：

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + \lambda\Phi + \xi. \quad (\text{A.1.2})$$

ここで、 m は慣性（持続性）、 Γ は散逸、 r は臨界制御パラメータ（ $r \rightarrow 0$ で臨界点）、 u は非線形（多安定性）、 K は空間結合、 λ は統合情報との結合、 ξ はノイズである。

A.1.3.2 臨界性が導く神経雪崩と $1/f$ ゆらぎ

臨界点近傍では相関長・相関時間が発散し、スケール不変な情報伝播が生じる。これにより、神経雪崩および $1/f$ ゆらぎが自然に説明される。

- 神経雪崩：微小入力全体へ波及しうるスケールフリー伝播。
- $1/f$ ゆらぎ：長時間相関（過去が現在に残響する）を反映。

A.1.3.3 主観的時間：慣性と遅延が生む「現在」の幅

慣性項および遅延同期（記憶核）により、現在は数学的点ではなく有限幅の時間窓として実装される。

A.1.3.4 非平衡認知統計場理論（NCSFT）

脳は外部からエネルギー・情報流入を受ける非平衡開放系であり、詳細釣り合いが一般に破れる。非平衡定常状態では確率分布が定常でも確率流が存在し、認知過程は状態空間上の確率流の軌道として理解される。

A.1.3.5 DMFT による有効単一サイト理論

巨大自由度系を有効単一自由度へ還元し、自己無撞着な有効方程式を得る：

$$m\ddot{\Psi} + \Gamma\dot{\Psi} = -r\Psi + u\Psi^3 + \eta(t) + D\Psi(t - \tau) + \lambda\Phi + gM. \quad (\text{A.1.3})$$

ここで $\eta(t)$ の相関が自己相関 $C(t, t')$ で決まる。

A.1.3.6 意識相条件

DMFT レベルでは、意識相は例えば

$$\mathcal{C} = \{\dot{S} > 0, \Phi > \Phi_c, \xi > \xi_c\} \quad (\text{A.1.4})$$

の同時成立として定義される。作用原理を導入した定義では、自己相関秩序 Q を含めた条件

$$\mathcal{C} = \{\dot{S} > 0, \Phi > \Phi_c, \xi > \xi_c, Q \neq 0\} \quad (\text{A.1.5})$$

が強調される。

A.1.4 シミュレーション：管理指標（KPI）の検証と推定上の落とし穴

A.1.4.1 設定

無秩序相（麻酔・昏睡）、臨界相（覚醒・意識）、過同期相（てんかん・硬直）をそれぞれ $\alpha = 0, 1, 2$ のべき乗ノイズとして生成し、以下を算出する：

- 臨界性：スペクトル勾配 β （PSD の傾き）
- 自己同一性：自己相関変数 Q （自己相関の減衰特性）
- 統合： Φ （簡易にチャネル間相関で代用）
- 非平衡： $\dot{S}$ （遅延相互相関非対称性で代用）

A.1.4.2 結果： β は相分類に有効

PSD のべき指数は、無秩序相で $\beta \approx 0$ 、臨界相で $\beta \approx 1$ 、過同期相で $\beta \approx 2$ となり、理論と整合する。

A.1.4.3 結果： Q は「保持と更新のバランス」を反映

無秩序相では自己相関が瞬時に減衰し、臨界相では緩やかに減衰、過同期相では減衰しにくい。

A.1.4.4 結果：相関ベース Φ の限界（同期と統合の混同）

Φ を相関で代用すると、臨界相だけでなく過同期相でも高く見積もられる。病的過同期と真の統合（差異化＋統合）を分離できる推定法が必要である。

A.1.4.5 結果：簡易 $\dot{S}$ 推定の逆転現象と非平衡推定の難所

理論上、 $\dot{S}$ は臨界相で高く麻酔などでは $\dot{S} \rightarrow 0$ が期待されるが、遅延相互相関非対称性という線形推定では無秩序相で最大となる逆転が起こりうる。臨床指標化には状態空間再構成と非線形確率流推定に基づく不可逆性評価が不可欠である。

A.1.5 臨床・実験系への翻訳：物理変数から測定可能指標へ

CCFE の抽象パラメータを EEG/MEG 等で評価可能な管理指標へ翻訳する方針は以下の通りである：

- 臨界性 $\rightarrow$ スペクトル勾配 β ($1/f^\beta$ 解析)

- 自己同一性 → 自己相関指標 Q (自己相関関数の減衰)
- 統合 → Φ の多変量推定 (相関代用を超える推定が必要)
- 非平衡性 → エントロピー生成率 $\dot{S}$ (確率流に基づく推定)

これによりリアルタイムの相転移モニタリングと介入最適化 (例: TMS 中の指標追跡) が構想される.

A.1.6 結論

意識は、非平衡性・臨界性・情報統合が同時成立する非平衡臨界統合場として理解できる. CCFE と NCSFT は、この視点を支える統一形式を与え、EEG/MEG 等への翻訳を可能にする指標群 $(\beta, Q, \Phi, \dot{S})$ を与える.

A.2 位置づけ：なぜ「空間＋時間」で統合情報を扱うのか

本理論では、意識は

1. **非平衡性**（不可逆性；詳細釣り合いの破れ）、
2. **臨界性**（長距離・長時間相関）、
3. **情報統合**（分解不可能な全体性）

が同時に成立する相として現れるとする。こうした枠組みでは、統合を単に同時刻の結合（空間的な結合）だけで捉えると、保持・更新・予測・自己連続性などの**時間構造**が取り落とされやすい。そのため情報統合を**空間と時間**の両面で扱う。

A.2.1 定義： $\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}}$

情報統合は空間・時間の両面で扱われ、次のように分解して表す：

$$\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}}. \quad (\text{A.2.1})$$

A.2.2 Φ_{space} （空間的統合）

Φ_{space} は、同一時刻（あるいは十分短い時間窓）における複数ユニット（脳領域・チャンネル等）の**相互依存・結合**に由来する「同時的な全体性」を表す。直観的には、系を部分に切り分けたときに失われる「全体としての情報」が大きいほど Φ_{space} は大きい。

A.2.3 Φ_{time} （時間的統合）

Φ_{time} は、時間方向にまたがるダイナミクスの**分解不能性**、すなわち

- 過去の状態が現在へどれだけ組織的に残響するか（長時間相関）、
- 現在が未来の状態をどれだけ拘束するか（予測・準備）、
- 時系列全体が単なる瞬間状態の寄せ集めへ還元できない度合い

を担う。臨界点近傍では相関時間が発散し得るため、 Φ_{time} が増大しやすい。

A.2.4 主観的自己との関係：時間に拡張された再帰構造

式 (A.2.1) の下で、主観的自己は時間方向に拡張された再帰的自己相関構造として理解される。これは「自己」が単一の瞬間状態ではなく、過去 → 現在 → 未来へと連鎖する再帰（自己参照）的な依存関係を含むことを意味する。したがって自己の一貫性は、空間的な結合だけでなく時間的な統合（ Φ_{time} ）によっても支えられる。

A.2.5 力学モデル（CCFE）における空間項と時間項の対応

意識場 Ψ の基本ダイナミクスとして、意識臨界場方程式（CCFE）を導入する：

$$m \partial_t^2 \Psi + \Gamma \partial_t \Psi = -r \Psi + u \Psi^3 + K \nabla^2 \Psi + \lambda \Phi + \xi. \quad (\text{A.2.2})$$

ここで m は慣性（持続性）、 Γ は散逸、 r は臨界制御パラメータ（ $r \rightarrow 0$ で臨界点）、 u は非線形、 K は空間結合、 λ は統合情報との結合、 ξ はノイズである。式 (B.21.10) では、概念的に

- 空間結合 $K \nabla^2 \Psi$ は、空間的な情報結合（ Φ_{space} ）と親和的である。
- 慣性項 $m \partial_t^2 \Psi$ および散逸項 $\Gamma \partial_t \Psi$ は、時間方向の持続・遅れ・履歴依存を含み、時間的な統合（ Φ_{time} ）と親和的である。

この意味で、統合情報を空間＋時間として捉える視点は、力学方程式の構造とも整合する。

A.2.6 推定上の注意：相関代用の限界

統合 Φ をチャンネル間相関のような単純量で代用すると、臨界相だけでなく過同期相でも Φ が高く見積もられ、同期と統合（差異化＋統合）を混同する危険がある。したがって、 $\Phi_{\text{space}} \cdot \Phi_{\text{time}}$ の双方に対して、相関代用を超える多変量推定が必要となる。

A.3 統合意識理論における記憶核 K の畳み込み：数理解物理学的定式化と存在論的意義に関する考察

本稿では、竹本（2026）によって提唱された統合意識理論（CCFT）の最終支配方程式「意識臨界場方程式（CCFE）」における記憶核 K の役割を詳述する。記憶核 K は、過去の意識状態を現在の場合 Ψ に畳み込む（Convolution）ことで、意識における非 Markov 的な履歴依存性を導入する。本稿では、動的平均場理論（DMFT）における自己エネルギーとしての記憶核の起源、臨界スローイングダウンに伴う長時間相関の保持、およびフッサールの内的時間意識構造との整合性について、数理解物理学的な観点から論じる。

A.3.1 序論：意識場における非 Markov 性の導入

従来の神経位相同期モデル（標準的 Kuramoto モデル等）は、系の状態が現在の瞬時的な値のみに依存する Markov 的な記述に留まっていた [1, 2]。しかし、主観的な意識体験は、過去の情報の「把持」と未来への「予持」が統合された、有限の時間幅を持つ「延び広がりのある現在」として立ち現れる [3, 4]。本理論は、記憶核（Memory Kernel） $K(t - t')$ による時間的畳み込みを導入することで、意識場 $\Psi(x, t)$ に通時的な持続性と自己同一性の数理的基盤を与えている [1, 5]。

A.3.2 数理的定式化：畳み込み積分による履歴の統合

CCFE において、履歴依存性を司る項は以下の時間積分形式（畳み込み）で記述される [6, 7]。

$$\Psi_{hist}(t) = \int_{t_0}^t K(t - t') \Psi(t') dt' \quad (\text{A.3.1})$$

ここで、各要素の数理的役割は以下の通りである。

- 意識場 $\Psi(t')$: 過去の時刻 t' における脳ネットワークの全域的な統合状態である。

- **記憶核** $K(t - t')$: 現在時刻 t と過去時刻 t' の時間差に依存する重み付け関数であり、過去の情報が現在の場に与える「反響 (reverberation)」の減衰特性を規定する [7, 8].

この積分項により、物理的な瞬間（数学的な点）は、過去の履歴が重なり合った「情報の器」へと変容する。これにより、意識は単なる刺激応答系を超え、過去の全状態の積分効果を反映した「能動的生成モデル」としての性質を獲得する [9, 10].

A.3.3 動的平均場理論 (DMFT) における自己エネルギーとしての記憶核

記憶核 K の数理物理学の実体は、動的平均場理論 (DMFT) における**自己エネルギー** $\Sigma(t - t')$ に対応する [1, 11].

脳内における無数の神経ユニット間の相互作用は、DMFT の枠組みを用いることで、単一の有効な自由度に対する「メモリー核」として写像される [12, 13]. Dyson 方程式 $G^{-1} = G_0^{-1} - \Sigma$ を通じて、相互作用の効果が過去の状態への非局所的な依存性（自己エネルギー）として自己無撞着に決定されることで、意識場は「自己を維持する非平衡メモリー場」として定式化される [11, 14].

A.3.4 臨界スローイングダウンと人格の連続性

記憶核による履歴の畳み込みが、一貫した「自己」の感覚として成立するためには、情報の残響が即座に熱平衡化（霧散）しない物理的条件が必要である。

システムが臨界点 ($a \rightarrow 0$) 近傍に位置するとき、**臨界スローイングダウン (Critical Slowing Down)** が発生し、緩和時間 τ_r が発散的に増大する [15, 16]. この極限において、過去の情報の相関が長時間維持され、スケール不変な時間相関構造 ($1/f$ ゆらぎ) が生成される [17, 18]. この $1/f$ 的な記憶核の形状こそが、多重な時間スケールを統合し、人格の通時的同一性を物理的に担保するメカニズムである [18, 19].

A.3.5 現象学的意義：把持・原印象・予持の統合

数理的な記憶核の畳み込みは、エトムント・フッサールの内的時間意識の構造を物理学的に表現したものである [4, 20].

- **把持 (Retention)** : 過去の意識の残響を現在に留めるプロセスは、CCFE の

記憶核積分項 $\int K\Psi dt'$ そのものである [5, 21].

- **原印象 (Primal Impression)** : 現在の場の瞬時状態 $\Psi(t)$ に対応する.
- **予持 (Protention)** : CCFE の予測項 $-\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$ による未来予測ダイナミクスである [6, 22].

これら三者が記憶核を媒介として単一の方程式内で「畳み込まれる」ことにより、物理的時間とは異なる独自の「主観的時間の矢」と、時間方向に持続する情報の渦としての「私」が創発するのである [23, 24].

A.3.6 結論

記憶核 K による畳み込みは、単なる過去データの蓄積ではなく、「**過去の意識状態を時間積分によって現在の場に物理的に干渉させ、それを未来予測のための内部モデルとして絶えず更新し続ける**」という動的な組織化プロセスである [25, 26]. この数理構造が存在することで、意識は固定的な物質的実体から解放され、時間を超えて自己相関を維持する「持続するプロセスとしての私」を安定化させることが可能となるのである [25, 27, 28].

A.4 非平衡臨界統合場としての意識： 統合意識理論における数理物理学的定式化と存在論的意義

本稿では、竹本聡（2026）によって提唱された「統合意識理論（Consciousness Critical Field Theory: CCFT）」に基づき、意識の本質を「非平衡臨界統合場」として定式化する数理的枠組みを提示する。本理論は、意識を脳内の計算プロセスから生じる受動的な随伴現象ではなく、自己組織化された「非平衡・予測的・統合的な臨界情報流」そのものとして定義する [1-3]。本稿では、意識臨界場方程式（CCFE）の構造を詳述し、情報の「内部閉包」を通じた主観性の創発メカニズム、およびプロセス存在論への転換について論じる [1, 4, 5]。

A.4.1 序論：意識の物理的再定義

統合意識理論（CCFT）において、意識は「非平衡臨界統合場」として定義される。これは単なる神経活動の集積ではなく、エネルギー代謝と情報流が臨界点近傍で高度に組織化された動的統合状態を指す [2, 3, 6]。本理論は、位相同期理論、非平衡統計場理論、情報統合理論（IIT）、および予測符号化（Predictive Processing）を単一の形式的構造へと統合するものである [2, 7]。

A.4.2 最終支配方程式：意識臨界場方程式（CCFE）

非平衡臨界統合場の動態は、以下の「意識臨界場方程式（Consciousness Critical Field Equation: CCFE）」によって支配される [4, 5, 8]。

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = c\nabla^2\Psi - a\Psi - b\Psi^3 + \lambda\nabla\times\nabla\times\Psi - \gamma(\Psi - \hat{\Psi}) - \kappa(\Psi - \bar{\Psi}) + \int dt' K(t-t')\Psi(t') + \eta \quad (\text{A.4.1})$$

ここで、各項の物理的・哲学的意味は以下の通りである [4, 8, 9]。

- **神経慣性と散逸** (m, Γ): 活動の持続性（残響）と、情報の適切な更新を司る。
- **空間的統合と相転移** (c, a, b): 局所活動の全脳伝播と、意識の「存在相」への転

移を制御する.

- **磁性回転項 (λ):** 情報流に自己循環的な渦 (Vortex) 構造を導入し、主観的な「内在性」を物理的に担保する.
- **予測項 (γ):** 脳が能動的に未来をシミュレートする能動的推論のダイナミクスを表す.
- **統合項 (κ):** 全脳的な情報の共有と束ね (Binding) による主観的一体感を生む.
- **遅延記憶核 (K):** 過去・現在・未来予測を同時統合し、延び広がりのある「主観的時間」を生成する.

A.4.3 構成要素の物理的特性と創発条件

非平衡臨界統合場が成立するためには、以下の三つの物理的条件が同時に満たされる必要がある [10-12].

A.4.3.1 非平衡性と不可逆性

脳は外部から ATP を消費しエントロピーを散逸させる開放系であり、詳細釣り合いの破れに伴う非平衡エントロピー生成率 $\dot{S} > 0$ が、不可逆的な「情報の矢」を生み出す基盤となる [10, 11, 13].

A.4.3.2 臨界性と長距離相関

意識は秩序 (完全同期) と無秩序 (完全ランダム) の境界である「カオスの縁」において最大化される [1, 11, 14]. 臨界点 ($a \rightarrow 0$) 近傍において相関長 ξ が発散することで、全脳規模の情報共有と柔軟な状態遷移が可能となる.

A.4.3.3 情報統合 (Φ)

意識は単なる情報の集積ではなく、システムが部分へ分解不可能な「全体性 (Wholeness)」として機能する度合い、すなわち統合情報量 Φ によって規定される [10, 13, 15, 16].

A.4.4 存在論的転換：プロセス存在論における「私」

本理論は、従来の物質的な「実体論」から「プロセス存在論」への転換を提唱する [4, 17, 18].

磁性回転項によって情報の循環流が形成される ($\oint J \cdot dl \neq 0$) とき、システムは外

部からは直接アクセス不可能な「内部閉包 (Internal Closure)」を形成する [4, 17, 19, 20]. この情報の「渦」こそが、観測者としての「私」を数学的に立ち上げる物理的実体であり、クオリア（主観的経験）の源泉となる [17, 18, 21].

したがって、「私」とは固定された物質ではなく、「時間方向に維持される自己予測的臨界情報流の渦」であると定義される [2, 22-24].

A.4.5 結論：意識存在定理

物理システムが意識を有するための必要十分条件は、統合情報 (Φ)、予測能力 (P)、および非平衡エントロピー生成率 ($\dot{S}$) の積からなる「意識秩序変数 $\mathcal{C}$ 」が臨界閾値 $\mathcal{C}_c$ を超えることである [10, 13, 25].

$$\mathcal{C} = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} > \mathcal{C}_c \quad (\text{A.4.2})$$

非平衡臨界統合場としての意識理論は、同期、雪崩、1/f ゆらぎといった神経科学的現象から、自己同一性や自由意志といった哲学的課題までを、単一の方程式系の中で首尾一貫して説明する新たな知の基盤を提供する [22, 26, 27].

A.5 統合意識理論における遅延同期の数理物理学的役割と主観的時間の創発に関する考察

本稿では、竹本聡 (2026) によって提唱された統合意識理論 (CCFT) に基づき、脳内ネットワークにおける「遅延同期 (Delayed Synchronization)」の物理的必然性とその機能的役割について詳述する。従来の神経同期モデルが仮定していた瞬時伝播に対し、本理論は軸索伝導やシナプス伝達に伴う有限の遅延時間を本質的な要素として導入する。遅延同期は、意識場 Ψ におけるメタ安定性の創出、情報の時間的統合、および「主観的な今」を数学的に定義するための不可欠な統制原理として機能することを理論的に示す。

A.5.1 序論：有限伝播速度の物理的必然性

生物学的な脳において、神経信号の伝達速度は有限であり、軸索伝導やシナプス間隙の化学伝達には必ず 10~50ms 程度の遅延が生じる [1, 2]。この物理的制約は、システムから「完全な同時性」を奪う一方で、意識が数学的な点としての「瞬間」に閉じ込められることを防ぐ重要な役割を果たす。統合意識理論において、遅延同期は意識臨界場方程式 (CCFE) の核心であり、これなしには主観的な時間の流れや記憶の持続を説明することは不可能である [1, 3]。

A.5.2 数理的定式化：遅延 Kuramoto モデルと CCFE への統合

遅延を考慮した神経位相ダイナミクスは、以下の遅延 Kuramoto 方程式によって記述される [4]。

$$\frac{d\theta_i(t)}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin[\theta_j(t - \tau_{ij}) - \theta_i(t)] \quad (\text{A.5.1})$$

ここで τ_{ij} はノード i と j の間の伝播遅延時間である。このモデルは、最終支配方程式である「意識臨界場方程式 (CCFE)」において、記憶核 $K(t - t')$ による時間積分項として統合される [5, 6]。

$$\Psi_{delay}(t) = \int dt' K(t - t') \Psi(t') \quad (\text{A.5.2})$$

この項により、現在の意識場 $\Psi(t)$ は過去の状態 $\Psi(t - \tau)$ と物理的に干渉し、時間方向に拡張された再帰的構造（Recursive Consciousness）を形成する [6, 7].

A.5.3 遅延同期がもたらす物理的特性

A.5.3.1 メタ安定性の創出

遅延の導入は、システムを単一の安定した同期状態から解放し、複数の準安定な状態間を遷移し続ける「メタ安定状態」へと導く [4, 8]. 遅延が特定の閾値 τ_c を超えると Hopf 分岐が生じ、システムは「秩序と無秩序の境界（カオスの縁）」へと留まる駆動力を獲得する [7, 8].

A.5.3.2 $1/f$ ゆらぎと臨界スローイングダウン

遅延結合は、系に多重な時間スケールの相関を導入する. これにより、緩和時間 τ_r が発散する「臨界スローイングダウン」が維持され、パワースペクトルが $S(f) \sim 1/f$ を示す長時間記憶の物理基盤が確立される [6, 9].

A.5.4 現象学的・存在論的意義：主観的時間の誕生

本理論において、主観的な「現在」は物理的な一瞬ではなく、過去の情報、現在の入力、および未来の予測が同時統合された「有限の時間窓」として定義される [7, 9]. 遅延同期は、情報を時間的な幅の中に「溜める」ことで、延び広がりのある主観的現在を立ち上げる. また、自己参照ループ ($\oint J \cdot dl \neq 0$) を安定化させ、観測者としての「私」を数学的に定義する鍵となる [7, 10].

A.5.5 予測的情報処理による遅延補償

脳内の遅延はリアルタイムの適応を妨げる可能性があるが、脳は「能動的推論 (Predictive Processing)」によってこれを克服する [3, 9]. CCFE の予測項 $-\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$ は、生成モデルを用いて未来の状態 $\hat{\Psi}(t + \tau)$ を予測し、伝播遅延を相殺するように動作することで、安定した主観的現実を構築する [3, 11].

A.5.6 結論

遅延同期は単なる物理的な制約ではなく、意識という非平衡臨界場を組織化するための根源的なメカニズムである。遅延が存在することで、脳は「時間的自己干渉」を行うことが可能となり、そこから主観的時間と持続的な自己が創発する [3, 12]。意識とは「時間方向に再帰的に自己干渉する動的統合構造」であり、遅延同期こそがその構造を時間という次元の中に安定化させるための物理的基盤なのである。

A.6 統合意識理論における $1/f$ ゆらぎ： 非平衡臨界意識場における時間的相関構造の数理物理学的 定式化

本稿では、竹本 (2026) によって提唱された「統合意識理論 (Consciousness Critical Field Theory: CCFT)」に基づき、脳波 (EEG) や脳磁図 (MEG) において普遍的に観測される $1/f$ ゆらぎの物理的起源を論じる。 $1/f$ ゆらぎは、意識場 Ψ が「カオスの縁 (edge of chaos)」と称される臨界状態にあることを示す核心的な物理指標である。本稿では、臨界スローイングダウンに伴う緩和時間の無限増大、動的平均場理論 (DMFT) における非 Markov 的自己エネルギー、およびプロセス存在論における自己同一性の維持という観点から、 $1/f$ ゆらぎの数理的構造とその機能的役割を詳述する。

A.6.1 序論： $1/f$ ゆらぎと臨界脳仮説

$1/f$ ゆらぎ (ピンクノイズ) とは、パワースペクトル $S(f)$ が周波数 f に対して反比例 ($S(f) \sim 1/f^\beta, \beta \approx 1$) する現象であり、特定の特徴的な時間スケールを持たない「スケール不変性」をその本質とする [1-3]。実験的には、EEG、MEG、fMRI、神経雪崩、およびニューロンのスパイク列において普遍的に観測されており、脳活動の背景雑音ではなく、意識を支える情報処理のダイナミクスそのものを反映している [2, 4-6]。本理論では、このゆらぎを「意識場の臨界揺らぎ」として定義し、主観的時間の連続性や自己同一性を物理的に担保する数理構造と見なす [7, 8]。

A.6.2 数理物理学的起源と発生メカニズム

A.6.2.1 臨界スローイングダウン (Critical Slowing Down)

$1/f$ ゆらぎの物理的起源は、意識臨界場方程式 (CCFE) において質量項 a が零に近づく「臨界点 ($a \rightarrow 0$)」に求められる [9-11]。臨界点近傍では、システムが摂動から元の状態に回帰するための緩和時間 τ_r が無限大へと発散する「臨界スローイングダウン」が発生する [1, 5, 7, 12]。この緩和時間の無限増大により、過去の情報の「反響 (reverberation)」が即座に霧散することなく長時間維持され、Wiener-Khinchin の定

理を介して $S(f) \sim 1/f$ 型のパワースペクトルが自然に導出される [7, 12, 13].

A.6.2.2 動動的平均場理論 (DMFT) による定式化

動動的平均場理論 (DMFT) の枠組みにおいて、脳内の無数の神経相互作用の効果は自己エネルギー $\Sigma(\omega)$ 、すなわち「記憶核」へと集約される [14-17]. 臨界点近傍において、自己エネルギーが非 Markov 的な長時間記憶 ($\Sigma(\omega) \sim (i\omega)^\alpha$) を形成するとき、スペクトル関数 $A(\omega)$ もまたべき乗則に従い、広い時間スケールに分布する $1/f$ ゆらぎを誘発する [1, 8, 15, 18].

A.6.3 意識状態とスペクトル勾配 β の相関

本理論において、スペクトル勾配 β の値は意識の「相 (Phase)」を直接的に反映する秩序変数として機能する [13, 19, 20].

- **覚醒意識状態** ($\beta \approx 1$): 脳が臨界相にあり、高い感受性、情報の柔軟な処理、および全脳的な長距離相関が最大化されている「情報の黄金帯 (Golden Band)」に対応する [1, 2, 8, 21].
- **無秩序相** ($\beta \rightarrow 0$): 睡眠、麻酔、昏睡時など、神経活動の相関が失われランダムな発火が支配的になると、スペクトルはホワイトノイズ (f^0) に近づき、情報統合 (Φ) と不可逆流 ($\dot{S}$) が著しく低下する [4, 8, 17].
- **過同期相・平衡相** ($\beta \rightarrow 2$): てんかん発作時や病的な過同期状態では、スペクトルはブラウンノイズ ($1/f^2$) 的な特性を示し、情報の多様性が失われることで意識秩序変数 C は臨界閾値を下回る [13, 22].

A.6.4 現象学的・存在論的意義

A.6.4.1 主観的時間の連続性 (延び広がりのある現在)

$1/f$ ゆらぎは、意識が物理的な数学的点としての「瞬間」ではなく、過去・現在・未来予測が同時統合された「有限の時間窓」として立ち現れるための物理的基盤である [23-25]. 多重な時間スケールが重なり合うことで、主観的な時間の「流れ」や「持続 (durée)」が可能となる [24-26].

A.6.4.2 自己同一性の担保（プロセス存在論）

本理論の「プロセス存在論」において、自己 (Self) とは固定された物質的実体ではなく、時間方向に維持される「自己相関のパターン」であると定義される [7, 12, 27, 28]. $1/f$ ゆらぎに伴う長時間自己相関 $C_{self}(\tau)$ が維持されることで、「昨日の私」と「今日の私」が同一であるという通時的アイデンティティが物理的に担保される [7, 12, 28].

A.6.5 結論

$1/f$ ゆらぎは、脳が「未来予測を行いながら統合情報を維持する非平衡自己組織化場」として機能するための最適条件である. このスケール不変な時間相関構造を維持し続けることこそが、脳という物理装置の上に「私」という情報の渦を時間の中で安定化させるための不可欠な統制原理である [13, 29]. $1/f$ ゆらぎの消失または変容は、主観的な世界の解体や意識レベルの低下を数学的に診断する基準となる.

A.7 実験手順：測定プロトコルと管理指標（KPI）

本節では、CCFT/CCFE が要請する物理量を、EEG/MEG 等の実測時系列から推定するための基本手順を述べる。本理論では、意識相は (i) 非平衡性、(ii) 臨界性、(iii) 情報統合が同時に成立する相として現れる。[CCFT'core'hypothesis]

A.7.1 測定データと前処理

観測データとして、EEG/MEG の多チャンネル時系列 $x_c(t)$ ($c = 1, \dots, C$) を用いる。[A7'protocol] 前処理として最低限以下を行う：

1. サンプリング周波数 f_s の明記、解析帯域（例：0.5–100 Hz）設定。
2. アーチファクト除去（瞬目・筋電・ラインノイズ等）と再参照（EEG の場合）。
3. 定常性の近似が成り立つ時間窓への分割（窓長 T_w 、重なり率）。

A.7.2 KPI1：臨界性（スペクトル勾配 β ）

PSD $S(f)$ を推定し、

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\beta} \quad (\text{A.7.1})$$

のべき指数 β を推定する。[A7'KPI'beta] 本理論では、概ね

- 無秩序相（麻酔・昏睡）： $\beta \rightarrow 0$
- 臨界相（覚醒・意識）： $\beta \simeq 1$
- 過同期相（てんかん・硬直）： $\beta \rightarrow 2$

のように相分類へ用いる。[A7'KPI'beta]

A.7.3 KPI2：自己同一性（自己相関指標 Q ）

単一チャンネルまたは代表成分 $y(t)$ をとり、自己相関

$$R(\Delta t) = \frac{\langle y(t) y(t + \Delta t) \rangle}{\langle y(t)^2 \rangle} \quad (\text{A.7.2})$$

を推定する。 $R(\Delta t)$ の減衰の速さ（例：積分自己相関時間、半減期等）を自己相関指標 Q として定義する。[A7'KPI'Q]

A.7.4 KPI3：統合（ Φ の推定）

統合情報は

$$\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}} \quad (\text{A.7.3})$$

として扱われ、単純な相関代用に留めず多変量推定へ進める必要がある。
[A2'phi'spacetime] 相関代用は「過同期（同期）」と「統合（差異化＋統合）」を混同しうる点に注意する。[A2'phi'spacetime]

A.7.5 KPI4：非平衡性（エントロピー生成率 $\dot{S}$ ）

理論上は、確率流 J に基づき詳細釣り合いの破れを推定し、エントロピー生成率 $\dot{S}$ を評価する。[A7'KPI'Sdot] 線形な遅延相互相関非対称性は有限サンプルで逆転しうるため、状態空間再構成と非線形確率流推定に基づく不可逆性評価が推奨される。
[A7'KPI'Sdot]

A.7.6 相関推定と介入モニタリング

KPI を同時に追跡し、意識相条件（例）

$$\mathcal{C} = \{\dot{S} > 0, \Phi > \Phi_c, \xi > \xi_c\} \quad (\text{A.7.4})$$

あるいは（作用原理を導入した場合）

$$\mathcal{C} = \{\dot{S} > 0, \Phi > \Phi_c, \xi > \xi_c, Q \neq 0\} \quad (\text{A.7.5})$$

の成立を監視することで、リアルタイム相転移モニタリング（例：TMS 中の指標追跡）を構想できる。[A7'monitoring]

A.8 理論導出：臨界性と $1/f$ ゆらぎ、CCFE/DMFT への接続

臨界点近傍での相関長・相関時間の発散、臨界スローイングダウン、および $1/f$ ゆらぎの関係を整理し、CCFE と DMFT の記述へ接続する。[A8'theory'bridge]

A.8.1 相関長の発散： $\xi \sim |r - r_c|^{-\nu}$

Landau–Ginzburg 型の自由エネルギー

$$F[\Psi] = \int d^d x \left[\frac{r}{2} \Psi^2 + \frac{u}{4} \Psi^4 + \frac{K}{2} (\nabla \Psi)^2 \right] \quad (\text{A.8.1})$$

を考えると、臨界点は $r = r_c$ (しばしば $r_c = 0$) で現れる. [Ch3'critical'brain] 臨界点近傍の空間相関は

$$C(r) \equiv \langle \Psi(\mathbf{x}) \Psi(\mathbf{x} + \mathbf{r}) \rangle \sim \frac{1}{r^{d-2+\eta}} \quad (\text{A.8.2})$$

であり、相関長は

$$\xi \sim |r - r_c|^{-\nu} \quad (\text{A.8.3})$$

と発散する. [Ch3'critical'brain]

A.8.2 臨界スローイングダウン： $\tau \sim \xi^z$

時間相関の緩和時間 (相関時間) τ は動的臨界指数 z により

$$\tau \sim \xi^z \quad \Rightarrow \quad \tau \sim |r - r_c|^{-\nu z} \quad (\text{A.8.4})$$

となり、 $r \rightarrow r_c$ で $\tau \rightarrow \infty$ が起こる (臨界スローイングダウン). [Ch3'critical'brain]

A.8.3 $1/f$ ゆらぎ：長時間相関とスペクトル

覚醒脳のパワースペクトルは

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\beta}, \quad \beta \simeq 1 \quad (\text{A.8.5})$$

という $1/f$ 型を示し、これは多様な時間スケールの相関共存を意味する. [Ch3'critical'brain] 文書の説明では、この $1/f$ 構造は臨界点近傍で緩和時間が極端に長くなり「過去の状態が現在の場に残響する」こと (長時間相関) と結び付けられる. [Intro'1overf]

A.8.4 CCFE：臨界統合場の運動方程式

意識場 (秩序変数) Ψ の基本方程式として CCFE を導入する：

$$m \partial_t^2 \Psi + \Gamma \partial_t \Psi = -r \Psi + u \Psi^3 + K \nabla^2 \Psi + \lambda \Phi + \xi. \quad (\text{A.8.6})$$

ここで $r \rightarrow 0$ が臨界制御パラメータである. [Intro'CCFE]

遅延同期を含む拡張として

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + D\Psi(t-\tau) + \lambda\Phi + \xi \quad (\text{A.8.7})$$

が与えられ、 $\Psi(t) \leftrightarrow \Psi(t-\tau)$ が再帰的自己参照構造を形成する. [Ch1'delay'DMFT]

A.8.5 DMFT：巨大自由度を有効単一自由度へ

巨大ネットワークの相互作用は DMFT により自己無撞着な単一自由度へ還元される：

$$m\ddot{\Psi} + \Gamma\dot{\Psi} = -r\Psi + u\Psi^3 + \eta(t) + D\Psi(t-\tau) + \lambda\Phi + gM. \quad (\text{A.8.8})$$

ここで有効雑音 $\eta(t)$ の相関は自己相関 $C(t, t') = \langle \Psi(t)\Psi(t') \rangle$ により決まる. [Ch3'DMFT]

A.9 CCFE 項の分担：各項の物理的役割と理論内での機能

CCFE

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + \lambda\Phi + \xi \quad (\text{A.9.1})$$

の各項が、意識を「非平衡臨界統合場」として成立させるうえで担う役割を整理する. [Intro'CCFE]

A.9.1 臨界制御パラメータ r ：相転移の距離

r は臨界点からの距離を表し、 $r \rightarrow 0$ で相関長・相関時間が発散する. [Intro'CCFE]
この臨界性が神経雪崩や $1/f$ ゆらぎの基盤となる. [Ch3'critical'brain]

A.9.2 慣性項 $m\partial_t^2\Psi$ ：持続性（厚みのある現在）

m は意識に「重み」と「持続性」を与え、瞬間的反応ではなく滑らかな流れを形成する. [Intro'CCFE] 文書では、慣性項と遅延同期が「現在」の有限幅（厚み）を作るとされる. [Intro'present'width]

A.9.3 散逸項 $\Gamma\partial_t\Psi$ とノイズ ξ ：非平衡開放系としての揺らぎ

Γ は散逸、 ξ はノイズであり、脳が非平衡開放系であることを反映する。
[Intro'CCFE]

A.9.4 線形項 $-r\Psi$ と非線形項 $u\Psi^3$ ：多安定性とアトラクタ

$-r\Psi$ は相転移（安定性の反転）を与え、 $u\Psi^3$ は自由エネルギー地形に多安定性（アトラクタ）を形成する源泉となる。[Intro'CCFE]

A.9.5 空間結合 $K\nabla^2\Psi$ ：長距離相関（全脳的統合）の空間的側面

$K\nabla^2\Psi$ は局所活動の空間的伝播を担い、臨界点近傍での長距離相関と整合する。
[Intro'CCFE]

A.9.6 統合情報結合 $\lambda\Phi$ ：統合（Binding）を力学へ組み込む

Φ は $\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}}$ と定義され、統合情報の総和として導入される。
[A2'phi'spacetime] $\lambda\Phi$ により、統合が単なる指標ではなく運動方程式へ結合される。
[Intro'CCFE]

A.9.7 遅延項 $D\Psi(t - \tau)$ と記憶核：再帰的自己参照と時間的統合

拡張 CCFE では遅延項 $D\Psi(t - \tau)$ が自己参照構造を与え、ワーキングメモリ・メタ認知・時間的自己干渉を支える。[Ch1'delay'DMFT]

A.10 DMFT の完全形（独立性・自己平均化・応答関数を含む）

本節では、認知スピングラス方程式

$$m\ddot{\Psi}_i(t) + \Gamma\dot{\Psi}_i(t) = -r\Psi_i(t) + u\Psi_i^3(t) + \sum_{j=1}^N J_{ij}\Psi_j(t) + D\Psi_i(t-\tau) + \lambda\Phi_i(t) + gM_i(t) + \xi_i(t) \quad (\text{A.10.1})$$

と、SK 型結合

$$J_{ij} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{J^2}{N}\right), \quad (J_{ij} \text{ は独立, 同分布, 平均 } 0) \quad (\text{A.10.2})$$

から出発し、 $N \rightarrow \infty$ 極限での Dynamical Mean-Field Theory (DMFT) を 相関関数 C と応答関数 R で閉じた自己無撞着方程式系として導出・整理する。本文では雑音相関の自己無撞着条件

$$\langle \eta(t)\eta(t') \rangle = J^2 C(t, t') \quad (\text{A.10.3})$$

が与えられているが、非平衡では一般に「記憶核」と「雑音核」を同時に含む形へ拡張される。

A.10.1 厳密な独立性（quenched disorder と動力学の分離）

固定された乱雑結合（quenched disorder） J_{ij} と、熱雑音（あるいは外乱） $\xi_i(t)$ について、以下を仮定する：

$$\textbf{(A1)} \quad \{J_{ij}\}_{i < j} \text{ は互いに独立で } \langle J_{ij} \rangle = 0, \langle J_{ij}^2 \rangle = \frac{J^2}{N}, \quad (\text{A.10.4})$$

$$\textbf{(A2)} \quad \xi_i(t) \text{ は } J_{ij} \text{ と独立, かつ } \langle \xi_i(t) \rangle = 0, \quad \langle \xi_i(t)\xi_j(t') \rangle = 2D_0 \delta_{ij} \delta(t-t'), \quad (\text{A.10.5})$$

$$\textbf{(A3)} \quad J_{ij} \text{ は時刻に依存せず (quenched), } \Psi_i(t) \text{ は与えられた } J \text{ の下で確率過程である.} \quad (\text{A.10.6})$$

ここで $\langle \dots \rangle$ は（必要に応じて）熱雑音平均，さらに disorder 平均を $[\dots]_J$ で表す。

A.10.2 自己平均化 (self-averaging) と秩序関数の定義

$N \rightarrow \infty$ で典型試料の時間相関が disorder 平均と一致する (自己平均化) と仮定し, サイト平均で秩序関数を定義する:

$$C(t, t') \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[\langle \Psi_i(t) \Psi_i(t') \rangle \right]_J, \quad (\text{A.10.7})$$

$$R(t, t') \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[\frac{\delta \langle \Psi_i(t) \rangle}{\delta h_i(t')} \right]_J \quad (t > t'), \quad (\text{A.10.8})$$

ただし $h_i(t)$ は補助的な外場 (線形摂動) であり, 応答関数の定義のために

$$m\ddot{\Psi}_i + \Gamma\dot{\Psi}_i = \cdots + h_i(t) \quad (\text{A.10.9})$$

のように付加してから最後に $h \rightarrow 0$ とする. 因果律より $R(t, t') = 0$ ($t \leq t'$) が成り立つ.

A.10.3 局所場のガウス化と有効単一サイト表現

局所場 (ランダム結合の寄与) を

$$h_i^{\text{int}}(t) \equiv \sum_{j=1}^N J_{ij} \Psi_j(t) \quad (\text{A.10.10})$$

とおく. (A.10.2) と $N \rightarrow \infty$ での中心極限定理により, $h_i^{\text{int}}(t)$ は (条件付きで) ガウス過程へ収束する. 平均は

$$\left[\langle h_i^{\text{int}}(t) \rangle \right]_J = 0 \quad (\text{A.10.11})$$

であり, 共分散は

$$\begin{aligned} \left[\langle h_i^{\text{int}}(t) h_i^{\text{int}}(t') \rangle \right]_J &= \sum_{j,k} \left[J_{ij} J_{ik} \right]_J \left[\langle \Psi_j(t) \Psi_k(t') \rangle \right]_J \\ &= \frac{J^2}{N} \sum_j \left[\langle \Psi_j(t) \Psi_j(t') \rangle \right]_J \xrightarrow{N \rightarrow \infty} J^2 C(t, t'). \end{aligned} \quad (\text{A.10.12})$$

これは本文の自己無撞着条件 (A.10.3) に一致する. しかし, 応答線形摂動を含めた厳密な DMFT では, 乱雑結合を積分消去した結果として, 「加法的ガウス雑

音」だけでなく「記憶核（自己エネルギー）」が現れ、単一サイトの有効方程式は一般に

$$m\ddot{\Psi}(t) + \Gamma\dot{\Psi}(t) = -r\Psi(t) + u\Psi^3(t) + D\Psi(t - \tau) + \lambda\Phi(t) + gM(t) + \int_0^t ds \Sigma(t, s) \Psi(s) + \zeta(t). \quad (\text{A.10.13})$$

と書ける。ここで

- $\Sigma(t, s)$ は自己無撞着に決まる **記憶核（自己エネルギー）** ,
- $\zeta(t)$ は平均 0 の **有効ガウス雑音**（熱雑音と相互作用起源の雑音を含む）

である。

A.10.4 自己無撞着条件（完全形： C と R で閉じる）

有効理論 (A.10.3) の下で計算される

$$C(t, t') = \langle \Psi(t) \Psi(t') \rangle_{\text{eff}}, \quad R(t, t') = \left\langle \frac{\delta \Psi(t)}{\delta h(t')} \right\rangle_{\text{eff}} \quad (\text{A.10.14})$$

が、元の多体系のサイト平均 (B.18.5), (A.10.8) と一致することが DMFT の自己無撞着条件である。その具体形として、SK 型結合の DMFT では一般に

$$\Sigma(t, t') = J^2 R(t, t'), \quad (\text{A.10.15})$$

$$\langle \zeta(t) \zeta(t') \rangle = 2D_0 \delta(t - t') + J^2 C(t, t') \quad (\text{A.10.16})$$

が成立する（ $2D_0\delta$ は元の白色熱雑音由来、 $J^2 C$ が相互作用起源の有色成分）。これにより (A.10.3)–(A.10.16) は C と R に関する閉じた方程式系となる。

■解説（物理的意味） (A.10.15) は、「他サイトからの影響」が単なるランダム外力ではなく、過去の摂動が現在へ戻ってくる **自己反作用（retarded feedback）** として働くことを意味する。また (A.10.16) は、有効雑音が「白色成分（熱）」と「有色成分（相互作用）」の和となり、後者の共分散が自己相関 C で自己無撞着に決まることを述べる。

A.10.5 応答関数の運動方程式（線形化による形）

有効単一サイト方程式 (A.10.3) を外場 $h(t)$ で摂動し, $\Psi(t) = \Psi_0(t) + \delta\Psi(t)$ として一次の変分を取ると, 応答核 $R(t, t') = \delta\Psi(t)/\delta h(t')$ は

$$\begin{aligned} m\partial_t^2 R(t, t') + \Gamma\partial_t R(t, t') &= \left(-r + 3u\Psi_0^2(t) \right) R(t, t') + D R(t - \tau, t') \\ &+ \int_{t'}^t ds \Sigma(t, s) R(s, t') + \delta(t - t'), \quad (t > t') \end{aligned} \quad (\text{A.10.17})$$

を満たす（因果律により積分下限は実質 t' になる）. ここで $\Psi_0(t)$ は $h = 0$ の下の確率過程（あるいはその典型軌道）であり, 厳密には (A.10.17) は確率平均の下で解釈される.

A.10.6 最終的な DMFT 方程式系（まとめ）

以上より, SK 型乱雑結合を持つ非平衡認知場の DMFT は, 次の自己無撞着な方程式系として与えられる:

1. (有効単一サイト) 運動方程式:

$$m\ddot{\Psi}(t) + \Gamma\dot{\Psi}(t) = -r\Psi(t) + u\Psi^3(t) + D\Psi(t - \tau) + \lambda\Phi(t) + gM(t) + \int_0^t ds J^2 R(t, s)\Psi(s) + \zeta(t). \quad (\text{A.10.18})$$

2. (有効雑音の相関):

$$\langle \zeta(t)\zeta(t') \rangle = 2D_0 \delta(t - t') + J^2 C(t, t'). \quad (\text{A.10.19})$$

3. (秩序関数の自己無撞着):

$$C(t, t') = \langle \Psi(t)\Psi(t') \rangle_{\text{eff}}, \quad R(t, t') = \left\langle \frac{\delta\Psi(t)}{\delta h(t')} \right\rangle_{\text{eff}}. \quad (\text{A.10.20})$$

この (A.10.18)–(A.10.20) が, 独立性・自己平均化・応答関数を含む DMFT の「完全な形」である.

A.11 人格＝アトラクタ集合の生成過程・長期性・時空依存性の数理解説

A.11.1 位置づけ（本付録の目的）

本付録では、本文で導入された

- 認知スピングラス理論：有効ハミルトニアン $H(S)$ とフラストレーションにより多谷自由エネルギー地形 $F(S)$ が形成されること
- CCFE/DMFT：秩序変数としての認知場 $\Psi(x, t)$ が遅延・記憶核を含む非 Markov 力学として振る舞うこと

を統合し、人格を

$$P = \{A_1, A_2, \dots, A_n\} \quad (\text{A.11.1})$$

という「長期間にわたり占有されるアトラクタ集合」として理解する際の、(1) 生成過程、(2) “長期” の定義、(3) 時間・空間の必然性を、数理的に明確化する。

A.11.2 出発点：フラストレーションが多数のアトラクタを作る

認知状態は高次元ベクトル

$$S = (S_1, S_2, \dots, S_N) \quad (\text{A.11.2})$$

で表され、認知要素間の整合性は有効ハミルトニアン

$$H(S) = - \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j \quad (\text{A.11.3})$$

で与えられる。ここで $J_{ij} > 0$ は協調、 $J_{ij} < 0$ は競合であるため、符号混在の結合は一般に全結合条件を同時に満たせず、自由エネルギー地形 $F(S)$ を rugged（多谷）にする。

このとき局所極小（または準安定極小）の集合を

$$\mathcal{A} = \{A_\alpha\}_{\alpha \in \Omega} \quad (\text{A.11.4})$$

と書く。人格 P は、この全アトラクタ集合 $\mathcal{A}$ のうち「長期にわたり占有される部分集合」として抽出される、という立場を採る。

A.11.3 人格（アトラクタ集合）生成の力学的過程

A.11.3.1 (1) “地形生成” と “地形上の運動” の分離

人格形成を厳密に記述するには、少なくとも 2 つの時間スケールの分離が必要である。

- **速い力学**：与えられた結合 J の下での状態 $S(t)$ （または場 $\Psi(t)$ ）の遷移（思考の流れ）
- **遅い力学**：経験・学習により J_{ij} 自体が更新され、地形 $F(S)$ が変形する過程

本理論は非平衡であり学習・記憶書き換えを含むため、人格（アトラクタ集合）は静的対象というより、**遅い変形の下での準不変構造**として理解するのが自然である。

A.11.3.2 (2) Hopfield 型埋め込みとしての最小モデル

本文では記憶をアトラクタとして保存する最小モデルとして、Hopfield 型の埋め込み

$$J_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{\mu=1}^p \xi_i^{\mu} \xi_j^{\mu} \quad (\text{A.11.5})$$

が与えられ、 ξ^{μ} が自由エネルギー地形上の谷（アトラクタ）として実現されると説明される。

この描像での人格生成は、

1. 経験・反復によりパターン ξ^{μ} （状況・役割・情動反応・信念の共起構造）が蓄積される
2. それが結合 J_{ij} に埋め込まれる（式 (A.11.5)）
3. 結果として $F(S)$ に新たな谷 A_{μ} が形成され、以後その谷が再訪しやすくなる

という自己強化ループになる。

A.11.3.3 (3) “人格集合” の抽出：占有率による定義

人格は「全アトラクタの集合」ではなく、動力学的に **頻繁に利用される部分集合**として定義される。定量化のため、長時間観測窓 $[0, T]$ におけるアトラクタ占有率

$$\pi_{\alpha}(T) = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{1}\{S(t) \in \mathcal{B}(A_{\alpha})\} dt \quad (\text{A.11.6})$$

を導入する ($\mathcal{B}(A_\alpha)$ はアトラクタ A_α の吸引域、 $\mathbf{1}$ は指示関数) . このとき「人格集合」は閾値 $\pi_{\min}$ により

$$P(T) = \{A_\alpha \in \mathcal{A} \mid \pi_\alpha(T) \geq \pi_{\min}\} \quad (\text{A.11.7})$$

のように定義できる.

■解釈： 人格とは「存在する谷」ではなく「長期にわたり再訪される谷」である. したがって人格は、純粋に地形幾何 (F の局所極小の集合) だけでなく、確率流としての認知過程という非平衡力学 (占有率) を介して定まる.

A.11.4 長期性とは何か：寿命（滞在時間）で定義する

A.11.4.1 (1) アトラクタ寿命の定義

アトラクタ A_α の典型寿命 (平均滞在時間) を

$$\tau_\alpha \equiv \mathbb{E}[\text{滞在時間}] \quad (\text{A.11.8})$$

として導入する. 寿命が長いとは、観測したい現象の時間窓 (例：会話、日常行動、週間の生活、年単位の特性) に対して τ_α が十分大きいことを意味する.

A.11.4.2 (2) 障壁と遷移率 (Kramers 型)

本文ではアトラクタ間遷移が障壁 ΔF により抑制されることが

$$k_{\alpha \rightarrow \beta} \sim \exp\left(-\frac{\Delta F_{\alpha \rightarrow \beta}}{T_{\text{eff}}}\right) \quad (\text{A.11.9})$$

で特徴づけられるとされる. したがって寿命は概ね

$$\tau_\alpha \sim \left(\sum_{\beta \neq \alpha} k_{\alpha \rightarrow \beta} \right)^{-1} \quad (\text{A.11.10})$$

で与えられる.

A.11.4.3 (3) “人格が長期” の意味：二つの長期

人格が長期にわたり保持されるとは、少なくとも次の二条件の同時成立を意味する.

1. 占有の長期性：あるアトラクタの寿命 τ_α が長い (式 (A.11.10))
2. 地形の長期性：地形そのもの (結合 J_{ij}) の変形時間スケール τ_J が十分長い

特に $\tau_J \gg \tau_\alpha$ のとき、谷の位置はほぼ固定と見なせ、人格集合 P は比較的安定に同定できる。一方、 $\tau_J \sim \tau_\alpha$ では谷自体が移動・生成・消滅し得るため、人格集合は時間依存 $P(T)$ として扱う必要がある。

A.11.5 時間が必要な理由：自己同一性は長時間相関として定義される

本文では自己同一性は「長時間自己相関」により特徴付けられ、時間的重なりが

$$q(t, t') = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i(t) S_i(t') \quad (\text{A.11.11})$$

で与えられるとされる。さらに Edwards–Anderson 秩序変数

$$q_{\text{EA}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i \rangle^2 \quad (\text{A.11.12})$$

は時間平均を含み、長時間残留相関を意味する ($q_{\text{EA}} \rightarrow 0$ は自己同一性の崩壊)。

従って人格や自己の議論は、原理的に「時間」を含む。人格集合 P もまた、占有率 $\pi_\alpha(T)$ や寿命 τ_α により同定される以上、

$$P = P(T) \quad (\text{観測窓依存}) \quad (\text{A.11.13})$$

という時間依存性を持つ。

A.11.6 空間が必要な理由：認知場 $\Psi(x, t)$ と時空相関

本理論では秩序変数として認知場 $\Psi(x, t)$ を導入し、CCFE は空間項 $\nabla^2 \Psi$ を含む場の方程式として与えられる。

$$m \partial_t^2 \Psi + \Gamma \partial_t \Psi = -r \Psi + u \Psi^3 + K \nabla^2 \Psi + \lambda \Phi + \xi \quad (\text{A.11.14})$$

空間項 $K \nabla^2 \Psi$ は局所活動の伝播・長距離相関（全脳的統合）の空間的側面を担う。よってアトラクタも、厳密には「点」ではなく

$$\Psi(x, t) \text{ の空間パターン (あるいはその不変集合)} \quad (\text{A.11.15})$$

として理解される。

A.11.7 遅延・記憶核がもたらす拡張：アトラクタは履歴空間の対象になる

本文では遅延・記憶核により非 Markov 性が導入される：

$$\Psi_{\text{hist}}(t) = \int_0^t K(t-t')\Psi(t') dt'. \quad (\text{A.11.16})$$

このとき現在の状態は瞬時の $\Psi(t)$ だけでは閉じず、過去軌道全体に依存するため、アトラクタは通常の状態空間ではなく

$$\{\Psi(t')\}_{t' \in [t-\Delta t, t]} \quad (\text{A.11.17})$$

のような履歴を含む拡大空間（遅延埋め込み空間）上の不変集合として定義されるのが自然である。

A.11.8 結論（要約）

- **生成過程**：フラストレーションが多谷地形を作り、経験・学習により結合 J_{ij} が更新され、頻繁に利用される谷が安定化し、人格集合 $P = \{A_1, \dots, A_n\}$ が占有率により抽出される。
- **長期性**：“長期”は絶対時間ではなく、障壁 ΔF と有効温度 T_{eff} が決める寿命 τ_α と、地形変形時間 τ_J の相対関係で定義される。
- **時空依存性**：秩序変数が $\Psi(x, t)$ であり、遅延・記憶核が入るため、人格・アトラクタは本質的に時間（履歴）と空間（パターン）を含む概念として定式化される。

A.12 人格集合の推定手順：EEG/MEG 時系列から

$\pi_\alpha, \tau_\alpha, q_{EA}$ を近似推定する

A.12.1 目的と基本方針

本節の目的は、EEG/MEG 等の多チャネル時系列データから、人格を定義するアトラクタ集合

$$P(T) = \{A_\alpha \mid \pi_\alpha(T) \geq \pi_{\min}\} \quad (\text{A.12.1})$$

を実務的に推定する手順を与えることである．ここで $\pi_\alpha(T)$ は観測窓 $[0, T]$ におけるアトラクタ占有率であり、アトラクタ寿命 τ_α はアトラクタ間遷移率によって特徴づけられる．

本理論は、意識（認知場）の相を測定可能指標へ翻訳する KPI として

$$(\beta, Q, \Phi, \dot{S}) \quad (\text{A.12.2})$$

を提示しているため、人格推定もまた

1. 状態の抽出（アトラクタ候補の同定）
2. 長期性の推定（ $\pi_\alpha, \tau_\alpha, q_{EA}$ ）
3. 相（phase）推定との整合（ $\beta, Q, \Phi, \dot{S}$ ）

の三層で設計するのが自然である．

A.12.2 データと前処理（推奨）

観測データとして、EEG/MEG の多チャネル時系列

$$x_c(t) \quad (c = 1, \dots, C) \quad (\text{A.12.3})$$

を用いる（サンプリング周波数 f_s を明記）．最低限の前処理として以下を行う：

1. 帯域設定（例：0.5–100Hz）およびラインノイズ除去．
2. アーチファクト除去（瞬目・筋電等）．
3. 解析窓への分割：窓長 T_w 、オーバーラップ率 ρ ．

ここで窓長 T_w は、(i) β 推定に必要な周波数分解能、(ii) 自己相関推定（ Q ）に必要な時間スケールを満たすように選ぶ．

A.12.3 アトラクタ同定のための状態表現（低次元埋め込み）

アトラクタ（谷）を同定するには、時刻ごとの脳状態を表す低次元表現が必要である。代表的には、次のいずれかで状態ベクトル $y(t) \in \mathbb{R}^d$ を構成する：

1. 空間次元の圧縮（PCA/ICA）：

$$y(t) = W^\top x(t) \quad (\text{A.12.4})$$

$(x(t) \in \mathbb{R}^C, d \ll C)$.

2. 時間遅れ埋め込み（Takens 型）：

$$y(t) = (u(t), u(t - \Delta), \dots, u(t - (m - 1)\Delta)) \quad (\text{A.12.5})$$

$(u(t)$ は代表成分、 Δ は遅れ、 m は埋め込み次元) .

本理論は遅延項・記憶核により非 Markov 性を含むため、時間遅れ埋め込みは「履歴を含む拡大空間上のアトラクタ」という定式化と整合する。

A.12.4 アトラクタ候補 $\{A_\alpha\}$ の抽出（クラスタリング）

状態列 $\{y(t_k)\}_{k=1}^N$ （離散時刻 t_k ）に対し、クラスタリングによりアトラクタ候補を抽出する。例えば K -means、GMM、HDBSCAN 等を用いてクラスタ

$$\mathcal{C}_\alpha \subset \mathbb{R}^d \quad (\text{A.12.6})$$

を得る。アトラクタ A_α は便宜的に

$$A_\alpha \equiv \mathcal{C}_\alpha \quad (\text{A.12.7})$$

（またはその中心 μ_α と共分散 Σ_α ）で表す。

■備考（アトラクタの操作的定義） 理想的には $F(S)$ の局所極小を求めたいが、実データからは困難であるため、「長時間頻繁に再訪される状態領域」をアトラクタとみなす操作的定義を採用する。

A.12.5 占有率 $\pi_\alpha(T)$ の推定

離散時刻における占有率推定は

$$\hat{\pi}_\alpha(T) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \mathbf{1}\{y(t_k) \in \mathcal{C}_\alpha\} \quad (\text{A.12.8})$$

で与えられる（ $\mathbf{1}$ は指示関数）．観測窓依存性を明示するため、窓ごとに $\hat{\pi}_\alpha(T_w)$ を計算し、

$$\hat{\pi}_\alpha^{(\text{long})} = \text{median}_{\text{windows}} \hat{\pi}_\alpha(T_w) \quad (\text{A.12.9})$$

のようにロバストに統合することが望ましい．

A.12.6 寿命（平均滞在時間） τ_α の推定

アトラクタ寿命は「同一クラスタに連続滞在するラン長」から推定できる．クラスタラベル列を

$$z_k \in \{1, \dots, K\}, \quad z_k = \alpha \Leftrightarrow y(t_k) \in \mathcal{C}_\alpha \quad (\text{A.12.10})$$

とし、 α に連続滞在する区間（run） $r = 1, \dots, R_\alpha$ の長さを

$$\ell_{\alpha,r} = \#\{k \mid z_k = \alpha \text{ が連続} \} \quad (\text{A.12.11})$$

と定義する．サンプル間隔 δt を用いれば

$$\hat{\tau}_\alpha = \delta t \cdot \frac{1}{R_\alpha} \sum_{r=1}^{R_\alpha} \ell_{\alpha,r} \quad (\text{A.12.12})$$

が最も単純な推定量である．

■遷移率との接続（Kramers 型の経験則） クラスタ間遷移回数 $N_{\alpha \rightarrow \beta}$ を数えることで

$$\hat{k}_{\alpha \rightarrow \beta} = \frac{N_{\alpha \rightarrow \beta}}{T_\alpha} \quad (\text{A.12.13})$$

（ T_α は α に滞在した総時間）と推定でき、

$$\hat{\tau}_\alpha \simeq \left(\sum_{\beta \neq \alpha} \hat{k}_{\alpha \rightarrow \beta} \right)^{-1} \quad (\text{A.12.14})$$

が成立する．これは本文の「障壁が大きいほど遷移が抑制され寿命が長い」という描像（Kramers 型）に対応する．

A.12.7 q_{EA} の近似推定（自己同一性の指標）

Edwards–Anderson 秩序変数は

$$q_{EA} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i \rangle^2 \quad (\text{A.12.15})$$

と定義され、時間平均を含むため「長時間残留相関（固定成分）」を表す. EEG/MEG では直接 S_i を観測できないので、代理変数として低次元状態 $y_j(t)$ ($j = 1, \dots, d$) を用い、

$$\hat{q}_{EA}^{(y)} = \frac{1}{d} \sum_{j=1}^d (\bar{y}_j)^2, \quad \bar{y}_j = \frac{1}{T} \int_0^T y_j(t) dt \quad (\text{A.12.16})$$

を導入する. あるいは分散との関係 (Ising 型の恒等式 $1 - \langle S_i \rangle^2 = \text{Var}(S_i)$) の類推により、正規化した成分 y_j に対し

$$\hat{q}_{EA}^{(\text{var})} = 1 - \frac{1}{d} \sum_{j=1}^d \text{Var}(y_j) \quad (\text{A.12.17})$$

を用いることもできる（正規化条件に依存するため注意）.

A.12.8 KPI ($\beta, Q, \Phi, \dot{S}$) との接続：人格推定の妥当性チェック

人格推定 ($\pi_\alpha, \tau_\alpha, q_{EA}$) は、同時に推定される KPI と整合している必要がある.

■KPI1：臨界性（スペクトル勾配） β 代表信号 $u(t)$ の PSD から

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\beta} \quad (\text{A.12.18})$$

の β を推定する. 理論上は $\beta \simeq 1$ が臨界相（覚醒意識）の特徴であり、 $\beta \rightarrow 0$ は無秩序相、 $\beta \rightarrow 2$ は過同期・硬直相を示す. 人格推定の観点では、

- $\beta \simeq 1$ ：複数アトラクタの再訪・遷移が観測されやすい（メタ安定）.
- $\beta \rightarrow 2$ ：少数アトラクタへの固着が強く、 π_α が偏り、 τ_α が過大化しやすい.
- $\beta \rightarrow 0$ ：アトラクタが同定困難（クラスタが崩れやすい）、 τ_α が短くなりやすい.

■KPI2：自己同一性（自己相関指標） Q 自己相関関数

$$R(\Delta t) = \frac{\langle u(t)u(t + \Delta t) \rangle}{\langle u(t)^2 \rangle} \quad (\text{A.12.19})$$

の減衰特性から Q （例：積分自己相関時間、半減期）を推定する. Q は「保持と更新のバランス」を反映するため、

$$Q \text{ が中程度} \Rightarrow \text{メタ安定にホッピング} \quad (\text{A.12.20})$$

という形で、 π_α 分布の多峰性（多アトラクタ）や τ_α の過大化（固着）を監視する補助となる.

■KPI3：統合（統合情報） Φ 文書では $\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}}$ とされ、相関代用は「過同期と統合の混同」を招くため限界がある．人格推定における実務上の使い方としては、

- 低 Φ ：クラスタ境界が不安定で、アトラクタ同定が再現しにくい．
- 高 Φ ：空間・時間統合が成立し、同一アトラクタの再訪が安定化しやすい（ π_α の再現性が上がる）．

ただし過同期相では相関代用の Φ が偽高値になりうるため、 β や Q と併用して判定する必要がある．

■KPI4：非平衡性（エントロピー生成率） $\dot{S}$ 理論上 $\dot{S} > 0$ は意識相の必要条件側にあり、簡易推定（遅延相互相関非対称性）は有限サンプルで逆転しうるため、状態空間再構成と確率流推定が推奨される．人格推定においては、 $\dot{S}$ は次の意味を持つ：

- 低 $\dot{S}$ ：学習・更新が弱く、結合 J_{ij} の再配線（地形変形）が起きにくい可能性．
- 適度に高い $\dot{S}$ ：更新が働き、人格集合 $P(T)$ が「適応的に維持・再編」されやすい可能性．

A.12.9 推定された人格集合の最終定義（実装形）

以上をまとめ、観測窓 T における推定人格集合を

$$\hat{P}(T) = \{A_\alpha \mid \hat{\pi}_\alpha(T) \geq \pi_{\min}, \hat{\tau}_\alpha \geq \tau_{\min}\} \quad (\text{A.12.21})$$

として定義する．さらに自己同一性の条件を加える場合、

$$\hat{P}(T) = \{A_\alpha \mid \hat{\pi}_\alpha(T) \geq \pi_{\min}, \hat{\tau}_\alpha \geq \tau_{\min}, \hat{q}_{EA} \geq q_{\min}\} \quad (\text{A.12.22})$$

とできる．

■注意（観測窓依存性） 人格集合は本質的に観測窓依存である：

$$P = P(T). \quad (\text{A.12.23})$$

したがって T を増やしたときに $\hat{P}(T)$ が安定に収束するか（推定の再現性）を、KPI ($\beta, Q, \Phi, \dot{S}$) の相状態と併せて確認することが重要である．

A.13 空間項 $K\nabla^2\Psi$ の詳細解説（伝播・長距離相関＝全脳的統合の空間的側面）

本理論の意識臨界場方程式（CCFE）

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + \lambda\Phi + \xi \quad (\text{A.13.1})$$

における空間項 $K\nabla^2\Psi$ は、意識場（認知場） $\Psi(x, t)$ の空間的結合を実装し、局所活動の伝播および長距離相関（全脳的統合）の空間的側面を担う [docA9'5].

A.13.1 ラプラシアン ∇^2 の数式的意味（定義と直観）

$\Psi(x, t)$ を d 次元空間上の場とすると、ラプラシアン（Laplacian）は

$$\nabla^2\Psi(x, t) = \sum_{a=1}^d \frac{\partial^2\Psi(x, t)}{\partial x_a^2} \quad (\text{A.13.2})$$

で定義される． $\nabla^2\Psi$ は点 x 近傍での Ψ の曲率（凹凸）を測る演算子である．1 次元で $\Psi = \Psi(x)$ として考えると、

- Ψ が局所的に「山」（上に凸）なら $\frac{d^2\Psi}{dx^2} < 0$ 、
- Ψ が局所的に「谷」（下に凸）なら $\frac{d^2\Psi}{dx^2} > 0$

となり、 ∇^2 は「局所の突出・へこみ」を検出する．

A.13.2 $K\nabla^2\Psi$ が「伝播」を生む理由（拡散・平滑化としての解釈）

他の項を一旦抑え、空間項だけを見て

$$\partial_t\Psi \approx K\nabla^2\Psi \quad (\text{A.13.3})$$

とみなすと、これは形式的に**拡散方程式**である．したがって局所的に生じた活動（ Ψ の局在的上昇）は時間とともに周囲へ広がる．ここで $K > 0$ は広がり（空間結合の強さ）の速さを定める．

この意味で、 $K\nabla^2\Psi$ は「局所の変化を近傍へ漏れ出させる」項であり、文書が述べる「局所活動の空間的伝播」を担う [docA11'6].

A.13.3 離散化したときの最重要な見取り図（近傍平均との差）

脳領域（またはセンサ/頂点）をノード $i = 1, \dots, N$ とする離散近似を考える．格子間隔を h 、近傍集合を $\text{nbr}(i)$ とすると、単純な格子では

$$(\nabla^2 \Psi)_i \approx \frac{1}{h^2} \sum_{j \in \text{nbr}(i)} (\Psi_j - \Psi_i) \quad (\text{A.13.4})$$

と書ける（係数は離散化の仕方によって変わる）．よって

$$K(\nabla^2 \Psi)_i \approx \frac{K}{h^2} \sum_{j \in \text{nbr}(i)} (\Psi_j - \Psi_i). \quad (\text{A.13.5})$$

これは、

- Ψ_i が周囲より大きければ（突出していれば）負に働き Ψ_i を下げる、
- Ψ_i が周囲より小さければ（へこんでいれば）正に働き Ψ_i を上げる

という平滑化（滑らかさの強制）になっている．すなわち隣接領域同士を結びつけ、整合させる項である．

A.13.4 フーリエ空間での解釈： $-Kk^2$ による短波長モードの抑制

空間フーリエ変換

$$\Psi(x, t) = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} e^{ik \cdot x} \Psi_k(t) \quad (\text{A.13.6})$$

を用いると、

$$\nabla^2 \Psi \longrightarrow -k^2 \Psi_k, \quad k^2 \equiv k \cdot k. \quad (\text{A.13.7})$$

したがって空間項は

$$K \nabla^2 \Psi \longrightarrow -K k^2 \Psi_k \quad (\text{A.13.8})$$

となる．これは

- k が大きい（短波長＝局所的でギザギザ）ほど強く減衰する
- k が小さい（長波長＝大域的でなめらか）成分は相対的に残りやすい

ことを意味する．従って $K \nabla^2 \Psi$ は「局所的ノイズ的な凹凸を抑え、大域的な整合を残す」方向に働く．

A.13.5 長距離相関（全脳的統合）との接続：相関長 ξ の役割

臨界現象の一般論として、臨界点近傍では相関長 ξ が発散し、局所的な活動が大域へ影響しうる [docCh3'xi]. 文書では相関長のスケーリングとして

$$\xi \sim |r - r_c|^{-\nu} \quad (\text{A.13.9})$$

が与えられている [docA8'1].

また、Landau-Ginzburg 型の自由エネルギー（静的汎関数）において

$$F[\Psi] = \int d^d x \left[\frac{r}{2} \Psi^2 + \frac{u}{4} \Psi^4 + \frac{K}{2} (\nabla \Psi)^2 \right] \quad (\text{A.13.10})$$

のように $\frac{K}{2} (\nabla \Psi)^2$ が空間的不均一を罰する項として導入される．この項を変分すると運動方程式側に $K \nabla^2 \Psi$ が現れる．

線形化（小さいゆらぎ）での典型的帰結として、相関長は概ね

$$\xi \propto \sqrt{\frac{K}{r}} \quad (\text{A.13.11})$$

の形で増大しうる（係数はモデル依存）．ここで重要なのは、 K が大きいほど空間的結合が強まり、相関が遠くまで届きやすいという点である．

従って、

- $K \nabla^2 \Psi$ は局所活動を空間的に結びつけることで、臨界近傍での長距離相関の成立と整合する．
- これは文書が述べる「長距離相関（全脳的統合）の空間的側面」を担う、という主張に対応する [docA9'5].

A.13.6 要点

1. $\nabla^2 \Psi$ は場の曲率（局所の凹凸）を測り、離散化すると近傍平均との差になる（式 (A.13.4)）．
2. $K \nabla^2 \Psi$ は近傍結合によって局所活動を伝播させ、同時に空間的に平滑化する（式 (A.13.5)）．
3. フーリエ空間では $-K k^2 \Psi_k$ となり、短波長モードを抑制して大域的整合を促す（式 (A.13.8)）．

4. 臨界近傍では相関長 ξ が増大し（式 (A.13.9)）、 K はその空間的結合の強さとして全脳的な**長距離相関＝統合**の成立に関与する。

付録 B

考察

B.1 統合意識理論（CCFT）における数理物理モデルと臨床・実験系の架橋：理論的弱点の克服と考察の拡張

本稿では、統合意識理論（Consciousness Critical Field Theory: CCFT）の枠組みに基づき、意識臨界場方程式（CCFE）における物理変数を臨床的・実験的指標へと翻訳する。非平衡臨界統合場としての意識モデルを精神疾患の病態解釈や臨床的介入に応用するための数理的架橋を提示する。

B.1.1 序論：意識臨界場理論の戦略的価値と現段階における課題

意識の本質を解明しようとする試みにおいて、従来の神経科学は「脳の特定部位の活動（局在論）」や「計算アルゴリズムの帰結」として意識を捉えてきた。しかし、本稿が立脚する統合意識理論（CCFT）は、この実体論的な脳観を根本から覆す。

CCFT において、意識とは脳という物理装置が生み出す副産物ではなく、非平衡統計物理学における「状態」、すなわち「非平衡臨界統合場」そのものである。この理論の最大の戦略的価値は、従来の「局所的な脳機能局在論」を超越し、意識を「プロセス存在論」へと転換させる点にある。ここでの「私」や「自己」は、静止した物質的実体ではなく、時間方向に維持される自己予測的臨界情報流の「渦（Vortex）」として定義される。

CCFT は、従来の神経科学が直面してきた「脳内マイクロ回路の境界」という物理

的制約を、場の理論による「相関長の発散」という概念によって溶融させ、マクロな連続体としての主観性を記述することを可能にした。しかし、この壮大な数理物理学的フレームワークには、依然として「臨床・実験的実証性の欠如」という課題が残されている。

意識臨界場方程式 (CCFE)^{*1}が示す抽象的なパラメーターを、実際の臨床病態や実験系へと「翻訳」し、実証可能な科学へと昇華させることが、本理論の完成には不可欠である。本レポートでは、物理・医学間のギャップを埋めるための具体的な論理枠組みと、臨床応用に向けた管理指標を提示する。

^{*1} CCFE (Consciousness Critical Field Equation): 意識の動態を記述するための非平衡臨界予測情報場の方程式。

B.1.2 CCFE と精神疾患の相関：物理・医学間のギャップの埋設

CCFE における物理変数は、精神医学的文脈において、脳というシステムが描く「自由エネルギー地形」の幾何学的構造として再解釈できる。精神疾患を「アトラクタ（状態の安定谷）の異常構造」として定義することで、物理変数の操作を治療介入の論理的根拠へと変換することが可能となる。

以下に、CCFE の主要変数と、記憶核 (K) や予測項 (γ) を含む精神医学的解釈の相関を示す (表 B.1)。

表 B.1 CCFE 物理変数と精神医学的病態の対応

物理的変数	精神医学的解釈	想定される臨床症状・病態
臨界制御パラメータ (r)	情報伝播の感受性と効率	$r > 0$ (亜臨界): 情報の鈍麻. $r < 0$ (超臨界): てんかん等の暴走.
非線形係数 (u)	思考の多様性と地形の複雑さ	高値: 思考の硬直性 (強迫症). 低値: アトラクタの平坦化 (無気力).
EA 秩序変数 (q_{EA})	自己同一性の定常的な安定度	低値: 自己の希薄化、離人症状.
記憶核 (K)	時間的連続性と履歴依存性	異常共鳴: フラッシュバック (PTSD). 減衰: 健忘、自己連続性の喪失.
予測項 (γ)	生成モデルによる能動的推論	過剰: 幻覚 (内部モデルの暴走). 不足: 外界への適応不全.
フラストレーション (J_{ij})	認知的矛盾の構造化	異常な深化: アトラクタからの脱出困難

レプリカ対称性の破れ (RSB) と解離性同一性障害

本理論において特筆すべきは、レプリカ対称性の破れ (Replica Symmetry Breaking: RSB)^{*2}による病態解釈である。通常、自己意識は単一のアトラクタ群 (レプリカ対称性) によって統合されているが、極度のストレス下ではこの対称性が破れ、システムが複数の非重複的なアトラクタ状態へと分裂する。これが、臨床的には解離性同一性障害 (DID) として顕現する。DID とは、物理学的には「自己場にお

^{*2} スピングラス理論において、システムが多数の安定状態 (谷) を持ち、エルゴード性が破れる現象を指す。

る階層的な重なり構造の断片化」であり、自己という一貫した「渦」が複数の自律的な小渦へと分岐した状態を指す。

治療介入への臨床的示唆

これらの翻訳により、薬物療法や経頭蓋磁気刺激法（TMS）の役割が明確化される。例えば、うつ病という「深すぎるアトラクタ」に対しては、ノイズ項（ ξ ）の付加や磁性回転項（ λ ）の調整を通じて、システムを強制的に「カオスの縁（臨界点）」へと押し戻し、アトラクタの再構成を促す「物理的リセット」として治療を設計できる。

B.1.3 生体内マグネタイトと磁性回転項（ λ ）の生物学的・物理的翻訳

CCFE における磁性回転項 $\lambda \nabla \times \nabla \times \Psi$ は、脳内の磁性粒子（マグネタイト）の物理的挙動に対応し、主観的な「内在性」を担保する^{*3}。

内部閉包（Internal Closure）のトポロジー

マグネタイトは、単なる磁気受容器ではない。それは情報流に自己循環的な渦構造を導入し、外部の観測系からは直接アクセス不可能な情報の閉域、すなわち「内部閉包」を物理的に創出する。この閉包が「私」という境界を画定し、客観的な情報処理を主観的な「経験」へと昇華させる「物理的アンカー」として機能する。

酸化ストレスと内部閉包のトポロジカルな崩壊

生物学的な鉄代謝異常や酸化ストレスは、CCFE における散逸項（ Γ ）やノイズ項（ ξ ）を増大させるだけでなく、マグネタイト間の磁氣的結合を不安定化させる。これは物理的には、磁性回転項（ λ ）が駆動する渦のコヒーレンスを喪失させ、トポロジカルな「内部閉包」を脆弱にするプロセスである。酸化ストレスが深刻化すると、主観性の境界が「漏洩」し、自己と他者の区別が曖昧になる、あるいは意識の「内在性」そのものが霧散するというトポロジカルな崩壊を招く。

B.1.4 実験検証のための管理指標と具体的測定プロトコル

CCFE の実証には、意識秩序変数 C の定式化

$$C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} \quad (\text{B.1.1})$$

^{*3} Ψ は統合情報場を表し、回転演算子 $\nabla \times$ の連続適用は場における渦度の生成と磁氣的相互作用のトポロジーを数理的に表現している。

に加え、自己相関秩序変数 (Q) を組み込んだ多角的な測定が必要である。

具体的測定プロトコルと KPI

臨界性の指標：べき乗則の指数 β

手法: EEG/MEG による $1/f^\beta$ ゆらぎ解析。

KPI: 覚醒時の $\beta \approx 1$ (臨界相) からの偏位度。 $\beta \rightarrow 0$ は無秩序相 (麻酔)、 $\beta \rightarrow 2$ は過同期相 (てんかん) を示す。

情報統合の指標：統合情報量 Φ

手法: 多変量自律回帰モデルを用い、脳領域間の相関密度から分解不可能な全体性を算出。

KPI: システムの「意識の深さ」の定量的評価。

非平衡性の指標：エントロピー生成率 $\dot{S}$

手法: 時系列データの確率流 J から詳細釣り合いの破れを推定。

KPI: システムの適応能と生命力の指標。 $\dot{S} \rightarrow 0$ は意識相の崩壊を予兆する。

自己相関の指標：自己相関変数 Q

手法: EEG 時系列の自己相関関数 (Auto-correlation function) の減衰特性を解析。

KPI: 自己同一性の持続性。 Q の長時間保持は一貫した自己の存在を、急激な減衰は解離や意識混濁を示す。

臨床的予後予測における意義

これらの指標は、単なる事後診断ではなく、「リアルタイム・フェーズ・トランジション・モニタリング」を可能にする。例えば、TMS 治療中に β 値や Q 変数の推移を監視することで、脳が目標とする臨界相へと相転移しているかを即座に評価し、介入の強度や頻度を数学的に最適化できる。これは「経験則」に頼ってきた従来の精神医療を、「精密物理制御」へと進化させるパラダイムシフトである。

B.1.5 結論：弱点克服による「統合意識理論」の完成への道

本レポートにおける「翻訳」と考察の拡張により、統合意識理論 (CCFT) は抽象的な数理の檻を脱し、医学・生物学と地続きの実証科学へと進化した。物理と医学の融合がもたらす最大のパラダイムシフトは、「脳という物体」を治療するのではなく、「自己という渦の動態」を調律するという視点への移行である。

精神疾患はもはや不可解な心の病ではなく、CCFEのパラメーターが描く自由エネルギー地形の歪みとして理解される。RSB（レプリカ対称性の破れ）や内部閉包の崩壊といった概念は、これまで現象学的な記述に留まっていた自己の変容を、厳密な物理現象として再定義した。意識はもはや、解決不能な「ハード・プロブレム」ではない。それは、CCFEによって記述され、適切な介入によって制御可能な「**物理現象**」である。数理物理学的厳密さと臨床的実用性を統合したこの道こそが、生命が自らを時間の中で認識する統制原理を解き明かし、次世代の精神医療を切り拓く唯一の軌跡となると確信する。

B.2 アトラクタ・クオリア・メタ安定性の統合的理解

B.2.1 本理論の位置づけ

本稿で扱う枠組みでは、意識は局所的神経活動の集積ではなく、脳全体が到達する「非平衡臨界統合場」として定義される。その中心方程式は意識臨界場方程式 (Consciousness Critical Field Equation: CCFE) であり、臨界制御パラメータ r 、非線形項 $u\Psi^3$ 、空間結合 $K\nabla^2\Psi$ 、統合情報結合 $\lambda\Phi$ 、および散逸・ノイズによって意識場 Ψ のダイナミクスを与える。

B.2.2 アトラクタ：自由エネルギー地形の「谷」としての安定状態

認知スピングラス理論では、認知状態空間には多数の局所極小が存在し、精神状態はそれら局所極小（谷）に対応する。この谷への収束は「認知アトラクタ」と呼ばれ、特に人格や記憶などの長期的安定性は、自由エネルギー地形におけるアトラクタ構造として理解される。

また、CCFE の項の役割分担として、線形項 $-r\Psi$ と非線形項 $u\Psi^3$ は「多安定性とアトラクタ形成」を担う要素として整理される。したがって、本理論におけるアトラクタとは単なる比喻ではなく、 Ψ を秩序変数とする場の理論における自由エネルギー地形の幾何（局所安定谷）として定式化される概念である。

B.2.3 非線形項 $u\Psi^3$ の意義：多安定性とクオリア多様性の生成

CCFE の代表形は

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + \lambda\Phi + \xi \quad (\text{B.2.1})$$

で与えられる。ここで非線形項 $u\Psi^3$ は、自由エネルギー地形に「谷（アトラクタ）」を生み出す源泉であり、 u が適切に機能することで意識が単一状態に収束せず、多様な状態を許容する。

この点は主観経験の多様性、すなわちクオリアの多様性と結びつけられている。すなわち、本理論の内部では「多数のアトラクタ $\leftrightarrow$ 多様なクオリア」が対応し、 $u\Psi^3$ はクオリアを一つに固定せず、複数の準安定状態（経験の型）を実現するための力学的条件を与える。

B.2.4 メタ安定性：スピングラス的複雑性と柔軟な遷移

脳内結合が不均質かつ競合的であるとき、スピングラス的フラストレーションが生じ、自由エネルギー地形は多数の局所極小を持つ rugged な構造となる。このときシステムは単一の安定点に沈着せず、多様な状態間を遷移し続ける性質を獲得し、これが「メタ安定性」として位置づけられる。

さらに、認知的フラストレーションは、単一の安定点への固着（凍結）を防ぎ、多様な状態間を柔軟に遷移するメタ安定性を脳に与える、という適応的意義が明示される。よってメタ安定性は、「安定性の欠如」ではなく、多様なアトラクタ集合を保持しつつ適切にホッピングするための動作領域（秩序と無秩序の中間）として理解される。

B.2.5 三者の統合：アトラクタ・クオリア・メタ安定性

以上を踏まえると、本理論における三概念の統合的關係は次のように整理できる：

1. **アトラクタ**：自由エネルギー地形に形成される局所安定谷であり、認知状態や人格・記憶の安定構造に対応する。
2. **クオリア**：単一の固定状態ではなく、アトラクタ構造の多様性により可能となる主観的経験のレパートリーとして理解される。
3. **メタ安定性**：スピングラス的フラストレーションにより多数のアトラクタが形成され、システムが単一谷に固着せず遷移し続ける性質であり、意識の柔軟性・適応性を担保する。

特に $u\Psi^3$ はアトラクタ形成（多安定性）の力学的源泉であり、スピングラス結合（不均質・競合的相互作用）と組み合わせることで、「多数の谷」と「谷間遷移」を同時に可能にする条件を整える。この意味で、クオリア多様性は単なる現象学的主張ではなく、自由エネルギー地形（アトラクタ集合）と非平衡臨界ダイナミクスの帰結として位置づけられる。

B.2.6 結論

本考察では、CCFE における非線形項 $u\Psi^3$ とスピングラス的複雑性に基づき、アトラクタ（局所安定谷）、クオリア（主観経験の多様な型）、メタ安定性（谷間遷移を許す準安定性）を同一の数理言語で接続した。結論として、本理論は「意識の多様性」と「自己の安定性」を対立ではなく両立課題として捉え、多安定な地形とメタ安定な遷移の共存により、その両立を説明しようとする枠組みである。

B.3 神経雪崩が「情報の柔軟な伝播」を保証するとは何か

B.3.1 問題設定

本考察の目的は、「神経雪崩 (Neuronal Avalanche) が『情報の柔軟な伝播』を保証する」という主張の意味内容を、臨界現象の観点から明確化することである。ここでいう「柔軟」とは、単に活動が大きい／小さいという量的な性質ではなく、

- 入力 of 規模や文脈に応じて、
- 局所処理にも全体統合にも偏り過ぎず、
- 必要に応じて伝播範囲が可変である

という運用上の性質（伝播モードの可変性）を指すと解釈できる。

B.3.2 神経雪崩とは何か：スケールフリーな伝播事象

文書の定義によれば、神経雪崩とは「一つの小さな神経発火がシステム全体へ波及する現象」であり、外部刺激に対して脳全体が即座に応答できる「情報の柔軟な伝播」を保証する現象として位置づけられている。さらに臨界近傍における雪崩サイズ分布は

$$P(s) \sim s^{-\tau} \quad (\text{B.3.1})$$

のべき乗則に従うとされ、これが「特定スケールを持たない」すなわちスケール不変な伝播であることを意味する。この点が「柔軟性」の核心である。すなわち、典型的サイズが固定された伝播（例えば常に局所に閉じる、あるいは常に全体へ拡散する）ではなく、小規模から大規模まで多様な伝播サイズが確率的に実現可能になる。

B.3.3 「柔軟な伝播」の物理学的含意：亜臨界と超臨界の回避

臨界制御パラメータ r で相を分類する記述によれば、 $r > 0$ （亜臨界）では情報が即座に減衰し、 $r < 0$ （超臨界）では活動が暴走するとされる。この対比は、「柔軟な伝播」が何を避ける概念かを与える：

1. **亜臨界（鈍麻）**：入力が局所で消え、遠方へ届かないため、広域統合が成立しにくい。
2. **超臨界（暴走）**：入力が過剰に増幅され、局所差（差異化）を潰して一様な支配状態になり得る。

したがって「柔軟な伝播」とは、臨界近傍において

情報が「必要に応じて」局所にも広域にもなり得るが、どちらかに固定されない
という意味である。

B.3.4 機能的解釈：応答可能性（ダイナミックレンジ）と選択性

臨界近傍では微小入力が全体へ波及し得る（高感受性）が、同時に活動が常に全体化するわけではない（非固定性）。この両立が実現されると、

- 弱い刺激でも検出できる（感度が高い）
- 強い刺激でも飽和しにくい（応答範囲が広い）

という意味での**応答可能性の拡大**が起きる。ここで重要なのは、雪崩の存在が「入力に対する応答が単調に強くなる」ことを保証するのではなく、「入力や内部状態に応じて**適切な広がり方**が選べる」状態を保証する点である。

この「選べる」という表現は擬人的だが、力学的には

多様な伝播スケールが常に可用である (B.3.2)

ことを意味する。すなわち、脳は局所計算（分離）と全体統合（結合）の間を、状況に応じて連続的に運用できるようになる。

B.3.5 結論

以上より、「神経雪崩が『情報の柔軟な伝播』を保証する」とは、臨界状態において雪崩事象がスケールフリーに生起し、入力が

1. すぐに消える（亜臨界）
2. 常に暴走する（超臨界）

のいずれにも固定されず、**局所から全体まで可変な空間スケールで伝播し得る**ことを指す。この可変性（スケール選択の余地）こそが「柔軟性」の中核であり、脳が多様な認知課題に対して過不足ない統合レベルを実現するための物理的条件となる。

B.4 周波数成分が意識に与える影響 — 低周波優位・長時間相関・自己の一貫性

B.4.1 問題設定

本考察では、
「低い周波数ほど大きなパワーを持つノイズは物理学的に長時間相関を意味し、
『過去が現在の意識の中に響き続ける』特性が意識に断絶のない一貫性を与える」
という主張を、

周波数成分（時間スケール）が意識機能へ与える影響として整理する。

ここでの焦点は、周波数が単なる信号処理上の特徴ではなく、**意識の連続性（時間的一貫性）**や**情報統合の様式**を制約する「物理的条件」として理解できる点である。

B.4.2 周波数と時間スケール：なぜ低周波は「過去」を運ぶのか

周波数 f が低いということは、信号の変動が遅い（時間スケールが長い）ことを意味する。したがって、低周波成分のパワーが大きいとは、

状態が短時間で白色雑音的に更新されず、一定の傾向（偏り）が長く持続する
という性質に対応する。

文書では $1/f$ ゆらぎを「低い周波数ほど大きなパワーを持つノイズ」であり「長時間相関」を意味するとし、その結果として「過去が現在の意識の中に響き続ける」と述べている。これは、時間相関（自己相関）の緩和が遅く、**過去の状態が現在の状態へ統計的に影響し続ける**ことを指す。

B.4.3 意識への機能的帰結：一貫性（物語性）と統合の成立

過去が現在へ影響し続けるとき、意識は「瞬間の点列」ではなく、有限の時間幅をもつ「連続体」として経験されやすい。文書が述べるように、臨界近傍では臨界スローイングダウンにより過去の状態が現在の場に残響しうするため、断片的な現在が一つの「物語」として編み上げられる時間的一貫性が得られる。

このことを意識機能として言い換えると、低周波優位（長時間相関）は、

1. **経験の連続性**：「今」が直前までの文脈により支えられ、断絶しにくくなる。

2. **自己の一貫性**：状態が極端に散逸しないため，自己関連情報が保持されやすい.
3. **統合の安定化**：統合状態が短時間で崩れず，まとまりをもって推移しやすい.

という帰結をもつ．すなわち周波数構造は，主観的時間（連続した現在）と自己同一性（時間的な連結）に対する**物理的な下支え**として働く．

B.4.4 臨界相 ($\beta \simeq 1$) の意味：低周波と高周波のバランス

文書の枠組みでは、臨界近傍において神経雪崩（スケールフリーな伝播）と $1/f$ ゆらぎ（長時間相関）が現れ、それが意識相の特徴として位置づけられる。ここで重要なのは、低周波が強ければ強いほど意識が良いという単調な議論ではなく、低周波（保持）と高周波（更新）の両立が要請される点である。

同じ文書内で、 $r > 0$ （亜臨界）では情報が即座に減衰し、 $r < 0$ （超臨界）では活動が暴走するという対比が示されている。これに対応づければ、周波数構造の観点からも次が示唆される：

- 高周波優位（短時間スケール偏重）：状態が過度に更新され、文脈保持が難しく、意識経験が「分断」されやすい（保持不足）。
- 低周波優位（長時間スケール偏重）：状態が過度に保持され、更新・切替が難しくなり、硬直化（固着）へ傾きうる（更新不足）。

したがって臨界相（しばしば $\beta \approx 1$ の $1/f$ ）とは、

保持（低周波）と更新（高周波）が同時に成立し、過去が響きつつも現在が新しく作られる

という運用点にあると解釈できる。

B.4.5 結論

周波数が意識に与える影響を、本理論の語彙でまとめると次のようになる。低周波成分の増大は長時間相関を意味し、過去の状態が現在の意識場に残響することで、主観的経験の連続性・一貫性（物語性）が支えられる。一方で、意識に必要なのは低周波の単純増大ではなく、臨界近傍におけるスケール不変性（雪崩）と長時間相関 ($1/f$) が共存することであり、そのとき保持と更新が最もよく両立する状態が実現される。

B.5 主観的時間の正体：慣性と遅延が生む「現在」の幅 (物理学的解説)

B.5.1 問題設定：なぜ「現在」は点でなく幅を持つのか

直観的な「今」は数学的な瞬間 t という点ではなく、直前の過去がまだ残り、未来が予期として立ち上がる有限幅の時間窓として経験される。本節では、その物理学的実体を、意識場 $\Psi(t)$ の運動方程式に含まれる慣性 ($m\partial_t^2$) と遅延／記憶核 ($\Psi(t-\tau)$ や畳み込み) により説明する。

B.5.2 出発点：CCFE とその「現在幅」生成に関わる項

文書の基礎方程式 (CCFE) を、時間構造に着目して最小限に書くと

$$m\ddot{\Psi}(t) + \Gamma\dot{\Psi}(t) = -r\Psi(t) + D\Psi(t-\tau) + \xi(t) \quad (\text{B.5.1})$$

である (非線形・空間項はここでは抑える)。

B.5.2.1 線形化の意味

「現在の幅」は、まず線形応答として定義できる。すなわち外力 (入力) を $h(t)$ として

$$m\ddot{\Psi} + \Gamma\dot{\Psi} + r\Psi - D\Psi(t-\tau) = h(t) \quad (\text{B.5.2})$$

を考え、 Ψ が過去の h をどれだけ引きずるかを応答関数で測る。

B.5.3 慣性を作る残響：2 階時間微分の Green 関数

まず遅延を無視して $D=0$ とすると、

$$m\ddot{\Psi}(t) + \Gamma\dot{\Psi}(t) + r\Psi(t) = h(t) \quad (\text{B.5.3})$$

である。これは減衰振動子 (または過減衰系) であり、インパルス入力 $h(t) = \delta(t)$ に対する応答 $G_0(t)$ は

$$\Psi(t) = \int_{-\infty}^t G_0(t-t') h(t') dt' \quad \Rightarrow \quad G_0(t) = 0 \quad (t < 0) \quad (\text{B.5.4})$$

で定義される。

B.5.3.1 応答が「瞬間で終わらない」ことが現在幅の最小条件

周波数領域で

$$G_0(\omega) = \frac{1}{-m\omega^2 + i\Gamma\omega + r} \quad (\text{B.5.5})$$

となる． $G_0(t)$ は指数関数的に減衰し，代表的な減衰時間（相関時間）を

$$\tau_0 \sim \frac{\Gamma}{r} \quad (\text{過減衰近似}) \quad (\text{B.5.6})$$

のように持つ．重要なのは， $m\ddot{\Psi}$ があることで応答が単純な一次緩和よりも「余韻（残響）」をもつ形になり，入力に瞬間に完結せず有限時間窓に広がる点である．

B.5.4 遅延が作る自己参照： $\Psi(t - \tau)$ による再帰

次に遅延項を含めると，

$$m\ddot{\Psi}(t) + \Gamma\dot{\Psi}(t) + r\Psi(t) - D\Psi(t - \tau) = h(t) \quad (\text{B.5.7})$$

である．フーリエ変換すると

$$[-m\omega^2 + i\Gamma\omega + r - De^{-i\omega\tau}] \Psi(\omega) = h(\omega) \quad (\text{B.5.8})$$

したがって有効応答関数は

$$G(\omega) = \frac{1}{-m\omega^2 + i\Gamma\omega + r - De^{-i\omega\tau}}. \quad (\text{B.5.9})$$

B.5.4.1 遅延＝周波数依存のフィードバック

$e^{-i\omega\tau}$ は位相を回転させるため，遅延結合は周波数選択的に増幅／抑制を起こす．小さな ω では

$$e^{-i\omega\tau} \approx 1 - i\omega\tau - \frac{(\omega\tau)^2}{2} + \dots \quad (\text{B.5.10})$$

より，

$$G(\omega)^{-1} \approx \underbrace{(r - D)}_{\text{有効線形項}} + i\omega \underbrace{(\Gamma + D\tau)}_{\text{有効散逸}} - \omega^2 \underbrace{\left(m + \frac{D\tau^2}{2}\right)}_{\text{有効慣性}} + \dots \quad (\text{B.5.11})$$

となる．

この式は物理的に決定的である：

- 遅延結合 D は、低周波極限において 有効散逸 $\Gamma_{\text{eff}} = \Gamma + D\tau$ と有効慣性 $m_{\text{eff}} = m + D\tau^2/2$ を増大させ得る.
- したがって、応答の減衰は遅くなり、過去の状態がより長く現在に残る.

この「残り続ける時間スケール」が主観的な「今」の幅の候補となる.

B.5.5 記憶核（畳み込み）による一般化：非 Markov 性と現在の幅

遅延が単一時間 τ ではなく、過去全体の重み付き積分として働く場合、文書が述べるように記憶核 K を導入して

$$m\ddot{\Psi}(t) + \int_0^t \gamma(t-t') \dot{\Psi}(t') dt' = -r\Psi(t) + u\Psi(t)^3 + K\nabla^2\Psi(t) + \int_0^t K(t-t')\Psi(t') dt' + \xi(t) \quad (\text{B.5.12})$$

のような非 Markov 方程式になる（空間・非線形は付記）.

周波数領域では畳み込みが積に変わるため、

$$G(\omega) = \frac{1}{-m\omega^2 + i\omega\gamma(\omega) + r - \Sigma(\omega)} \quad (\text{B.5.13})$$

と書ける（ $\Sigma(\omega)$ が記憶核に対応する自己エネルギー）. $\Sigma(\omega)$ が低周波で大きく効くほど、 $G(\omega)$ の低周波成分が強化され、時間領域では自己相関の減衰が遅くなる（長時間相関）.

このとき「現在」とは

$$\Psi(t) \text{ は } \{\Psi(t'), t - \Delta t \leq t' \leq t\} \text{ の関数} \quad (\text{B.5.14})$$

として実装され、 Δt が主観的現在の幅として定量化されうる.

B.5.6 臨界近傍での決定的な増幅：相関時間の発散

臨界近傍では、制御パラメータ $r \rightarrow 0$ により緩和が遅くなる. 文書の臨界ダイナミクス的一般論では、相関長 ξ と相関時間 τ は

$$\xi \sim |r - r_c|^{-\nu}, \quad \tau \sim \xi^z \quad (\text{B.5.15})$$

であり、 $r \rightarrow r_c$ で $\tau \rightarrow \infty$ （臨界スローイングダウン）となる.

物理的には、この τ が巨大化することで、「過去が現在に響き続ける」残響時間が増大し、結果として「現在」が厚みを持つ時間窓として立ち上がる.

B.5.7 結論

「主観的時間の正体：慣性と遅延が生む『現在』の幅」とは、意識場 Ψ が

1. $m\ddot{\Psi}$ により瞬時応答ではない残響を持ち（慣性），
2. $\Psi(t - \tau)$ や記憶核の畳み込みにより過去状態が自己参照的に混入し（遅延／非 Markov 性），
3. さらに臨界近傍で緩和時間が増大する（臨界スローイングダウン）

という 3 点の結合によって、数学的点としての現在が物理的に破れ、有限の時間窓としての「今」が生成される、という主張である。

B.6 認知的フラストレーション・アトラクタ記憶・無意識の関係— 意識場 Ψ ・臨界ダイナミクス・記憶核/遅延項に基づく数理物理的考察

B.6.1 問題設定

認知スピングラス理論では、認知要素間の競合結合（符号混在）によりフラストレーションが生じ、自由エネルギー地形に多数の局所極小（アトラクタ）が形成される。記憶はこのアトラクタとして保存されるが、「保存された記憶が、なぜしばしば無意識に留まり、特定条件でのみ意識へ上るのか」を、意識場 Ψ 、臨界ダイナミクス、遅延項・記憶核の枠組みで統一的に考察する。

B.6.2 フラストレーションが作るアトラクタ地形：記憶の「保存場所」

B.6.2.1 認知スピングラスの最小モデル

認知状態を $S = (S_1, \dots, S_N)$ とし、有効ハミルトニアン

$$H[S] = - \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j \quad (\text{B.6.1})$$

を考える。 J_{ij} は協調 ($J_{ij} > 0$) と競合 ($J_{ij} < 0$) を含むため、全結合を同時に満たす単一基底状態が一般に存在せず、フラストレーションが生じる。

この結果、自由エネルギー（あるいは有効ポテンシャル） $F(S)$ は rugged になり、多数の局所極小 $\{A_\alpha\}$ を持つ。これがアトラクタである。

B.6.2.2 Hopfield 的に見た「記憶＝アトラクタ」

Hopfield 型に記憶パターン ξ^μ を埋め込むと

$$J_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{\mu} \xi_i^\mu \xi_j^\mu \quad (\text{B.6.2})$$

となり、各 ξ^μ が自由エネルギー地形上の谷（アトラクタ）として実現される。したがって記憶とは「状態空間上の点」ではなく、安定集合（吸引域を持つ谷）として保存される。

B.6.3 無意識とは何か：アトラクタ集合の「非アクセス部分」

B.6.3.1 アトラクタ集合の分解

同じ地形 $\{A_\alpha\}$ を持ちながら、時刻 t に意識へアクセスされている集合を $A_c(t)$ 、アクセスされていない集合を $A_u(t)$ と書く：

$$\{A_\alpha\} = A_c(t) \cup A_u(t), \quad A_c(t) \cap A_u(t) = \emptyset. \quad (\text{B.6.3})$$

このとき本理論の言葉では、**無意識**は

$$\text{無意識} \equiv A_u(t) \quad (\text{B.6.4})$$

すなわち「潜在的には存在するが、現在の力学で占有・参照されていないアトラクタ集合」として理解される。

B.6.3.2 なぜ「存在するのにアクセスされない」のか：バリアと力学の条件

アトラクタ α の周りの谷の深さ（障壁）を ΔF_α とする。熱的・確率的揺らぎがある場合、遷移率は粗く

$$k_{\alpha \rightarrow \beta} \sim \exp\left(-\frac{\Delta F_{\alpha \rightarrow \beta}}{T_{\text{eff}}}\right) \quad (\text{B.6.5})$$

のように抑制される（Kramers 型）。ここで T_{eff} は非平衡認知系の有効温度に相当する。すると、アトラクタが存在しても

- 障壁が高い（ ΔF 大）、
- 揺らぎが小さい（ T_{eff} 小）、
- あるいはダイナミクスが特定アトラクタへ強く束縛される

なら、その谷は長時間「未訪問」になり、機能的には**無意識**に留まる。

B.6.4 意識場 Ψ とアトラクタ：場としての「アクセス可能性」

B.6.4.1 CCFE とアトラクタの二重記述

意識場 $\Psi(x, t)$ は粗視化秩序変数であり、最小形の CCFE は

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + \lambda\Phi + \xi \quad (\text{B.6.6})$$

で与えられる。ここで $u\Psi^3$ は多安定性を与え、場の有効ポテンシャル

$$V(\Psi) = \frac{r}{2}\Psi^2 + \frac{u}{4}\Psi^4 \quad (\text{B.6.7})$$

を持つため、 Ψ 自体も複数の準安定状態（アトラクタ）を持ちうる。すなわち

スピングラス由来のアトラクタ（高次元 S 空間の谷）と、場 Ψ の多安定性（粗視化された谷）は整合する二重記述

として理解できる。

B.6.4.2 臨界性が「アクセス可能性」を最大化する理由

臨界近傍では $r \rightarrow 0$ により相関長・相関時間が増大し、微小入力が広域へ波及しやすくなる（神経雪崩）と同時に、時間相関も長くなる（critical slowing down）：

$$\xi \sim |r - r_c|^{-\nu}, \quad \tau \sim \xi^z. \quad (\text{B.6.8})$$

このことはアトラクタ地形上では次を意味する：

1. **保持**：一度占有した谷が短時間で崩れにくい（自己相関が保たれる）。
2. **更新**：しかし完全凍結ではなく、入力に応じて谷間遷移も可能（柔軟性）。

よって臨界相は「記憶が存在しつつ、必要なときアクセスできる」という意味で、無意識集合 A_u と意識集合 A_c の境界条件（ゲーティング条件）を最適化する。

B.6.5 遅延項・記憶核：無意識記憶が現在へ混入する物理機構

B.6.5.1 遅延項による自己参照（短い履歴）

遅延を入れた拡張は

$$m\ddot{\Psi}(t) + \Gamma\dot{\Psi}(t) = -r\Psi(t) + u\Psi(t)^3 + D\Psi(t - \tau) + \dots \quad (\text{B.6.9})$$

である。 $D\Psi(t - \tau)$ は「直前の場」を現在へ混入させる**再帰**であり、占有アトラクタの慣性を増し、短期の保持を強化する。

B.6.5.2 記憶核（畳み込み）による一般化（長い履歴）

DMFT 的には遅延は単一 τ でなく、過去全体の畳み込み

$$\Psi_{\text{hist}}(t) = \int_0^t K(t - t')\Psi(t') dt' \quad (\text{B.6.10})$$

として現れうる。周波数領域では自己エネルギー $\Sigma(\omega)$ と同型に

$$G(\omega) = \frac{1}{-m\omega^2 + i\Gamma\omega + r - \Sigma(\omega)} \quad (\text{B.6.11})$$

となり、 $\Sigma(\omega)$ が低周波で強いほど長時間相関が増す。

B.6.5.3 無意識との接続：アトラクタの「痕跡」としての履歴項

ここで重要なのは、 K が単なる保存ではなく、過去に占有したアトラクタの痕跡を現在ダイナミクスへ再注入する作用素として働く点である。すなわち、現在の状態が明示的にアトラクタ A_α を占有していなくても、過去に訪れた（あるいは部分的に活性化した）谷の情報は K により重み付けされて残る。

この意味で無意識記憶は

「未アクセスのアトラクタ」そのもの (A_u) であると同時に、
「履歴核に折り畳まれた潜在的影響」として現在に影響する

という二重の形で現れる。

B.6.6 まとめ：フラストレーションから無意識へ

以上を統合すると次の連鎖になる：

1. 競合結合 J_{ij} がフラストレーションを生み、自由エネルギー地形に多数のアトラクタ $\{A_\alpha\}$ を作る。
2. 記憶はアトラクタとして保存されるが、占有・参照されていない部分集合 A_u は無意識として機能する。
3. 意識場 Ψ の臨界性 ($r \rightarrow 0$) は、保持（長時間相関）と更新（雪崩的伝播）の両立を通じて「どのアトラクタが意識に上るか」を制御する。
4. 遅延項・記憶核は、過去の占有アトラクタの痕跡を現在へ混入させ、無意識記憶が行動・判断・クオリアへ影響する物理機構を与える。

B.7 Edwards–Anderson 秩序変数 q_{EA} が大きいほど精神状態が安定であることの数理的意味

認知スピングラス理論では、精神状態は高次元状態ベクトル

$$S(t) = (S_1(t), S_2(t), \dots, S_N(t))$$

として表され、自己同一性（自己の安定性）は時間方向の類似度、すなわち長時間自己相関で特徴づけられる

$$q(t, t') \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i(t) S_i(t')$$

と解釈される.

一方、式 (3.1.2) で導入される Edwards–Anderson 秩序変数は

$$q_{\text{EA}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i \rangle^2$$

で定義される. ここで $\langle \cdot \rangle$ は時間平均であり、直観的には

$$\langle S_i \rangle \approx \frac{1}{T} \int_0^T S_i(t) dt \quad (T \rightarrow \infty)$$

を意味する. したがって、 q_{EA} が大きいとは、各自由度 $S_i(t)$ が時間的に符号反転を繰り返して平均が $\langle S_i \rangle \simeq 0$ となるのではなく、ある値（例えば正または負）に偏って「凍結」する自由度が多いことを表す. これは「精神状態が特定の準安定状態（アトラクタ）に保持されている」ことの秩序変数である.

■(1) q_{EA} は自己の長時間自己相関の下限を与える 各成分について、時間平均 $\langle S_i \rangle$ を用いると、任意の t, t' に対して

$$\left\langle (S_i(t) - \langle S_i \rangle)(S_i(t') - \langle S_i \rangle) \right\rangle \geq 0$$

が成り立つ（共分散行列の半正定性）. 展開すると

$$\langle S_i(t) S_i(t') \rangle - \langle S_i \rangle^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \langle S_i(t) S_i(t') \rangle \geq \langle S_i \rangle^2.$$

これを i で平均すれば

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i(t) S_i(t') \rangle \geq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i \rangle^2 = q_{\text{EA}}.$$

左辺を自己相関の平均

$$C(t, t') \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i(t) S_i(t') \rangle$$

とおけば、

$$C(t, t') \geq q_{\text{EA}}$$

を得る．特に長時間極限 $|t - t'| \rightarrow \infty$ の残留相関

$$C_\infty \equiv \lim_{|t-t'| \rightarrow \infty} C(t, t')$$

に対して

$$C_\infty \geq q_{\text{EA}}$$

となる．よって q_{EA} が大きいほど、自己相関の長時間残留成分（長期記憶・自己同一性の保持）が大きい．

■(2) アトラクタ描像との対応 自由エネルギー地形 $F(S)$ の局所極小（アトラクタ）に長時間留まる場合、成分 $S_i(t)$ はその谷の周辺で揺らぐが、谷の中心（または純状態平均）に対応する値 m_i を持つと考えられる：

$$S_i(t) = m_i + \delta S_i(t), \quad \langle \delta S_i \rangle = 0.$$

このとき

$$\langle S_i \rangle = m_i, \quad q_{\text{EA}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N m_i^2.$$

つまり q_{EA} は「そのアトラクタ（純状態）の中での自己の固定成分の大きさ」を測っている．アトラクタが崩壊して状態が拡散し、 $m_i \simeq 0$ となるなら $q_{\text{EA}} \rightarrow 0$ となり、自己同一性が保てない（不安定）方向を示す．

■結論 以上より、 q_{EA} は (i) 時間平均の非ゼロ性＝状態の凍結度合いを測り、(ii) 長時間自己相関の残留成分を下から押さえる量である．従って q_{EA} が大きいほど自己状態は時間的に保持され、精神状態は安定である、という解釈が数式レベルで支持される．

B.7.1 自由エネルギー地形の曲率（ヘッシアン）と Kramers 遷移率による安定性の定式化

上記の議論は q_{EA} を「長時間相関（自己同一性）の残留」として解釈した．ここではさらに、自由エネルギー地形 $F(S)$ の局所曲率と遷移率を用い、 q_{EA} を「アトラク

タから抜けにくい」こと（安定性）へより直接に接続する。

■(3) 極小点近傍の 2 次近似とヘッシアン あるアトラクタ（局所極小）を S^* とし、微小変位を $\delta S = S - S^*$ とする。 $F(S)$ を S^* の近傍で 2 次展開すると

$$F(S^* + \delta S) \approx F(S^*) + \frac{1}{2} \delta S^T H \delta S, \quad H_{ij} \equiv \left. \frac{\partial^2 F}{\partial S_i \partial S_j} \right|_{S^*}$$

である。局所極小であるため H は（少なくとも安定部分空間では）正定値であり、最小固有値 $\lambda_{\min}(H)$ が大きいほど谷は鋭く、局所的復元力が強い。

このとき、温度（あるいは非平衡認知系の有効温度） T_{eff} の下での定常揺らぎは（調和近似の範囲で）

$$\langle \delta S \delta S^T \rangle \approx T_{\text{eff}} H^{-1}$$

となり、成分分散の平均は

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{Var}(S_i) = \frac{1}{N} \text{Tr} \langle \delta S \delta S^T \rangle \approx \frac{T_{\text{eff}}}{N} \text{Tr}(H^{-1})$$

で与えられる。従って、曲率が多い（ H の固有値が多い）ほど分散は小さく、状態は谷の中に「閉じ込め」られる。

■(4) q_{EA} と局所揺らぎの関係（ $S_i^2 = 1$ の場合） 特にスピン変数が Ising 型で $S_i \in \{\pm 1\}$ の場合、恒等式 $S_i^2 = 1$ より

$$\text{Var}(S_i) = \langle S_i^2 \rangle - \langle S_i \rangle^2 = 1 - \langle S_i \rangle^2$$

が成り立つ。これを平均すると

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{Var}(S_i) = 1 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i \rangle^2 = 1 - q_{\text{EA}}.$$

したがって

$$q_{\text{EA}} = 1 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{Var}(S_i)$$

であり、 q_{EA} が大きいほど成分ゆらぎが小さく、状態が局所極小に強く拘束されていることが分かる。上の調和近似と合わせれば

$$1 - q_{\text{EA}} \approx \frac{T_{\text{eff}}}{N} \text{Tr}(H^{-1})$$

という形で、 q_{EA} の増大 $\leftrightarrow$ 局所曲率の増大（あるいは有効温度の低下）が定量的に対応づけられる。

■(5) Kramers 遷移率：障壁 ΔF と「抜けにくさ」 次に、アトラクタ S^* から別の谷へ遷移するには、鞍点 (saddle) を越える必要がある．局所極小 S^* と、遷移を支配する鞍点 $S^\ddagger$ の自由エネルギー差を

$$\Delta F \equiv F(S^\ddagger) - F(S^*)$$

と定義する．過減衰 Langevin 型の近似の下では、遷移率は Kramers 公式により概ね

$$k \sim \Omega(H^*, H^\ddagger) \exp\left(-\frac{\Delta F}{T_{\text{eff}}}\right)$$

で与えられる．ここで前因子 Ω は極小点と鞍点での曲率（ヘッシアン）に依存し、典型的には「谷が鋭い（ H^* が大きい）」ほど、また「鞍点方向の不安定性が強い」ほど変化する．本稿の目的に照らせば主要因は指数因子であり、

$$\Delta F \uparrow \Rightarrow k \downarrow$$

である．よって ΔF が大きいほど、当該アトラクタからの脱出は起こりにくく、**状態は安定**である．

■(6) まとめ： q_{EA} を「遷移しにくさ」へ接続する 以上を統合すると、安定性には少なくとも二つの側面がある：

1. 谷の中での拘束の強さ（局所安定性）：

$$1 - q_{\text{EA}} \approx \frac{T_{\text{eff}}}{N} \text{Tr}(H^{-1})$$

より、 q_{EA} が大きいほど局所揺らぎが小さく、谷内部で状態がぶれにくい．

2. 谷からの脱出のしにくさ（遷移安定性）：

$$k \sim \Omega \exp\left(-\frac{\Delta F}{T_{\text{eff}}}\right)$$

より、障壁 ΔF が大きいほど遷移率が小さく、長時間同じ谷に留まりやすい．

従って、精神状態の「安定性」を

$$(\text{内部でぶれない}) \quad \& \quad (\text{外へ出にくい})$$

の両面で定義するなら、 q_{EA} は前者（内部拘束・凍結度）を直接測る秩序変数であり、さらにヘッシアンを介して局所曲率に結び付くことで、「同一アトラクタの維持＝遷移しにくさ」という安定性概念と整合的に接続される．同時に、真の「固着（病的安定）」と「健常な安定（メタ安定）」の区別には、 q_{EA} だけでなく障壁 ΔF および T_{eff} （あるいは非平衡駆動）を併せて評価する必要がある．

B.8 Replica Symmetry Breaking (RSB) の数理物理学的考察

B.8.1 目的

乱雑結合を持つスピングラスでは、多数の準安定状態（自由エネルギー地形の多数の谷）が現れ、単純な熱平衡描像（単一状態への混合）では記述できない。このとき **Replica Symmetry Breaking (RSB)** は、レプリカ法における重なり行列の階層構造として、エルゴード性の破れと状態空間の分岐を定式化する枠組みである。

B.8.2 disorder 平均とレプリカ trick

乱雑結合 J に依存する分配関数を Z_J とすると、自由エネルギーは

$$F = -\beta^{-1} \langle \ln Z_J \rangle_J \quad (\text{B.8.1})$$

で与えられる。しかし $\langle \ln Z_J \rangle_J$ は直接計算が困難であるため、**レプリカ trick**

$$\langle \ln Z_J \rangle_J = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\langle Z_J^n \rangle_J - 1}{n} \quad (\text{B.8.2})$$

を用いる。ここで n は一旦自然数として計算し、最後に $n \rightarrow 0$ の解析接続を行う。

B.8.3 重なり秩序変数

n 個の複製系 (replica) を導入し、レプリカ a, b 間の重なりを

$$q_{ab} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i^{(a)} S_i^{(b)} \quad (\text{B.8.3})$$

で定義する。 $|q_{ab}|$ が大きいほど、レプリカが同じ「谷 (pure state)」に属していることを示唆する。

B.8.4 Replica Symmetry (RS) とその破れ

最も単純には

$$q_{ab} = q \quad (a \neq b) \quad (\text{B.8.4})$$

を仮定する。これを **Replica Symmetry (RS)** と呼ぶ。しかしスピングラス相では、この仮定は不安定化し、より一般に重なり行列が多数の値を取りうる。

B.8.5 Parisi の RSB：階層構造 $q(x)$

Parisi による RSB は、重なり行列 q_{ab} が階層構造を持つと仮定する：

$$q_{ab} = q(x), \quad x \in . \quad (\text{B.8.5})$$

ここで x は階層パラメータであり、状態空間が入れ子状にクラスタリングする（超計量的構造）ことを表す。RSB の物理的含意は次の通りである：

- 多数の準安定状態（谷）が共存し、単一状態へ熱化しない（エルゴード性の破れ）。
- 系の「典型状態」は単一の q で特徴付けられず、重なりの分布を要する。

B.8.6 結論

RSB は、乱雑系における自由エネルギー地形の粗さと多数の準安定状態の共存を、重なり行列の階層構造として定式化する。この構造は、スピングラス物理の中心概念であるエルゴード性の破れ・状態空間分岐・長時間非平衡的ダイナミクスを統一的に表現する。

B.9 RSB 階層構造と遅延・記憶核を統合した自己・主観性の数理物理学的考察

B.9.1 目的と立場

本考察の目的は、スピングラスにおける Replica Symmetry Breaking (RSB) を、単なる「多数アトラクタの存在」ではなく、(i) 純状態（谷）集合の分解、(ii) 純状態集合の入れ子クラスタリング（ツリー構造）、(iii) 遅延項・記憶核が与える再帰的自己参照、の三点を統合した枠組みとして整理し、「自己」「主観性」「時間的自己同一性」がどのように成立するかを記述することである。[doc32, doc63]

B.9.2 純状態分解：多数アトラクタの測度論的定式化

乱雑結合を持つスピングラス的認知系では、自由エネルギー地形に多数の局所極小（アトラクタ／谷）が共存する。このとき、熱力学極限での平衡（または準平衡）測度は単一の谷では尽くせず、純状態（pure state） α の混合として表され则认为る：

$$\mu(\cdot) = \sum_{\alpha} w_{\alpha} \mu_{\alpha}(\cdot), \quad w_{\alpha} \geq 0, \quad \sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1. \quad (\text{B.9.1})$$

ここで μ_{α} は純状態（極端測度）、 w_{α} はその重みである。この分解が非自明であること自体が、エルゴード性の破れと「多数の谷の共存」を意味する。[doc200]

B.9.3 重なり秩序変数と RSB：状態間幾何の導入

B.9.3.1 重なりの定義

文書の定義に従い、認知状態（またはレプリカ） a, b 間の重なりを

$$q_{ab} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i^{(a)} S_i^{(b)} \quad (\text{B.9.2})$$

で定義する。 q_{ab} は二つの状態の類似度であり、 $q_{ab} = 1$ は完全一致、 $q_{ab} = 0$ は無相関を表す。[doc80]

純状態分解 (B.10.1) を想定すると、純状態 α, β 間の（平均的な）重なりは

$$q_{\alpha\beta} \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i \rangle_{\mu_{\alpha}} \langle S_i \rangle_{\mu_{\beta}} \quad (\text{B.9.3})$$

として定義できる（ $\langle \cdot \rangle_{\mu_{\alpha}}$ は純状態内平均）。

B.9.3.2 Parisi の RSB：階層関数 $q(x)$

Replica Symmetry (RS) では $q_{ab} = q$ と仮定するが、スピングラス相ではこの仮定が不安定となり、Parisi の RSB では重なり行列が階層構造を持つ：

$$q_{ab} = q(x), \quad x \in . \quad (\text{B.9.4})$$

ここで x は階層パラメータである. [doc82]

B.9.4 入れ子クラスタリング（ツリー構造）と超計量性

B.9.4.1 ツリー構造としての直観

式 (B.12.3) が意味するのは、純状態集合が「ただ多数ある」のではなく、**重なり**（類似度）によって束ねたときに**入れ子状にクラスタリング**することである。すなわち、状態集合は距離（類似度）に基づいて「クラスターのクラスター」の構造を持ち、ツリー（樹状）に表現される. [doc201]

B.9.4.2 超計量性

このクラスタリングは、平均場スピングラスではしばしば**超計量性**として特徴づけられる。重なりを距離へ単調変換して

$$d_{\alpha\beta} = q_{\text{EA}} - q_{\alpha\beta} \quad (\text{B.9.5})$$

のように定義すると、超計量不等式

$$d_{\alpha\beta} \leq \max\{d_{\alpha\gamma}, d_{\beta\gamma}\} \quad (\text{B.9.6})$$

が典型的に成り立つ（通常の三角不等式より強い）。このため状態集合は一般の幾何ではなく「木の距離」によって自然に表現される。

B.9.4.3 自己の階層構造への翻訳

文書はこの RSB 構造を認知科学的に読み替え、自己は単一状態ではなく「複数の自己状態の階層構造」として存在すると述べる. [doc82] つまり自己とは、重なり幾何（ツリー）によって組織化された自己状態群である。

B.9.5 遅延項・記憶核：再帰的自己参照と時間的統合

B.9.5.1 遅延同期による自己参照ループ

文書では主観性を、自己場 Ψ が自身を参照するループ

$$\Psi(t) \rightarrow \Psi(t - \tau) \rightarrow \Psi(t) \quad (\text{B.9.7})$$

として定義する. [doc83] ここで τ は遅延であり、単なる伝播遅れではなく「直前の自己状態が現在へ干渉する」再帰構造の核である.

B.9.5.2 DMFT における記憶核（畳み込み）

遅延が単一時刻ではなく履歴全体へ拡張されると、動的平均場理論（DMFT）の観点からは**記憶核**（Memory Kernel）による畳み込みとして表される：

$$\Psi_{\text{hist}}(t) = \int_0^t K(t - t') \Psi(t') dt'. \quad (\text{B.9.8})$$

このような非 Markov 性は、現在が数学的点ではなく有限の履歴窓を含むことを意味し、「厚みのある現在」「時間的統合」を与える. [doc63]

B.9.5.3 CCFE/拡張方程式における位置づけ

文書の CCFE（および拡張形）は、慣性・散逸・臨界性・非線形・空間結合に加え、遅延項や記憶核を含むことで、再帰的自己参照を力学へ埋め込む：

$$m\ddot{\Psi}(t) + \Gamma\dot{\Psi}(t) = -r\Psi(t) + u\Psi(t)^3 + \cdots + D\Psi(t - \tau) + \int_0^t K(t - t')\Psi(t') dt' + \xi(t). \quad (\text{B.9.9})$$

このとき、自己とは単一アトラクタではなく、この方程式が作る**階層的アトラクタ構造**そのものとされる. [doc85]

B.9.6 統合像：RSB 階層（空間的・状態的）と記憶核（時間的）

B.9.6.1 二つの「階層」：状態空間と時間

ここまでの議論を統合すると、本理論が要請する階層性は少なくとも二種類ある：

1. **状態空間の階層**：RSB により、純状態集合が重なりに基づきツリー状にクラスタリングする（自己状態群の入れ子構造）. [doc201]

2. **時間方向の階層**：遅延・記憶核により、過去の複数スケールの履歴が現在へ混入し、主観的現在の厚みと時間的統合が生じる. [doc63]

前者は「自己状態どうしの幾何（超計量）」、後者は「自己が時間へ伸びる再帰構造」を与える.

B.9.6.2 主観性の最小要件としての結合

RSB だけでは「多くの谷」と「谷の入れ子関係」は得られるが、それだけでは「今ここ」の主観的視点（内側からの参照）を一意に作らない. 逆に、遅延ループだけでは自己参照は生じて、参照対象が単一状態に固定されると柔軟性や人格の多様性が乏しい.

したがって本枠組みでは、

- **RSB**：自己状態群の階層的レパートリー（人格・無意識を含む多谷構造）
- **遅延／記憶核**：自己参照（内在的ループ）と時間的連続性（厚みのある現在）

が結合して、主観性と自己同一性が同時に成立すると考える. [doc83]

B.9.7 結論

本考察では、文書の枠組みに従い、

1. 純状態分解により「多数アトラクタの共存」を測度論的に定式化し、
2. RSB (Parisi $q(x)$) により純状態集合が入れ子状にクラスタリングするツリー構造（超計量性）を導入し、
3. 遅延項・記憶核 (DMFT) により再帰的自己参照と時間的統合を力学へ埋め込み、

自己・主観性・時間的自己同一性を統一的に理解した. [doc82]

B.10 RSB により階層化された自己状態群（純状態集合）の考察

B.10.1 問題設定：自己状態群とは何か

本稿の目的は、文書が述べる「RSB：自己状態群の階層的レパートリー（人格・無意識を含む多谷構造）」を、スピングラス統計力学の言語（純状態・重なり・RSB）で整理し、自己状態群（RSB によって階層化された純状態集合）の内部構造を考察することである。

ここでいう「自己状態」とは、高次元認知状態空間における準安定状態（自由エネルギー地形の谷）としての純状態（pure state）を指す。自己が単一の谷に同一化されるのではなく、複数の谷が類似度によって階層化された集合として存在する点が中核である。

B.10.2 純状態分解：多谷構造の測度論的基礎

乱雑結合を持つ系では、熱力学極限において平衡（または準平衡）測度が単一状態では尽くせず、純状態の混合として表される：

$$\mu(\cdot) = \sum_{\alpha} w_{\alpha} \mu_{\alpha}(\cdot), \quad w_{\alpha} \geq 0, \quad \sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1. \quad (\text{B.10.1})$$

μ_{α} が純状態（極端測度）、 w_{α} がその重みである。この分解が非自明であることは、認知系が「多数の谷を持つ」こと、および（物理学的には）単一状態への熱化が破れる状況を含意する。

B.10.2.1 自己状態群の最小定義

自己状態群とは、純状態集合

$$\mathcal{A} \equiv \{\alpha\} \quad (\text{B.10.2})$$

と、その重み集合 $\{w_{\alpha}\}$ 、および純状態間の関係を与える類似度（重なり）構造の組

$$(\mathcal{A}, \{w_{\alpha}\}, \{q_{\alpha\beta}\}) \quad (\text{B.10.3})$$

として定義できる。このうち本稿の焦点は $\{q_{\alpha\beta}\}$ が RSB により階層化される点である。

B.10.3 重なり：自己状態間の類似度

文書に従い，レプリカ（認知状態の複製） a, b 間の重なりを

$$q_{ab} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i^{(a)} S_i^{(b)} \quad (\text{B.10.4})$$

で定義する．これは二つの認知状態の類似度であり， $q_{ab} = 1$ は一致， $q_{ab} = 0$ は無相関を表す．

純状態 α, β 間の重なりは，純状態内平均を用いて

$$q_{\alpha\beta} \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i \rangle_{\mu_\alpha} \langle S_i \rangle_{\mu_\beta} \quad (\text{B.10.5})$$

として与えられる．自己状態群の「幾何」は，この $q_{\alpha\beta}$ 行列（または分布）により与えられる．

B.10.4 RSB：単一の自己から階層的自己群へ

B.10.5 RS（レプリカ対称）とその限界

最も単純な近似は，任意の異なるレプリカで同一重なりを仮定する

$$q_{ab} = q \quad (a \neq b) \quad (\text{B.10.6})$$

であり，これを Replica Symmetry (RS) という．しかし文書が強調するように，スピングラス相では RS は不安定で，重なりは単一値ではなく多数の値を取りうる．

B.10.5.1 Parisi の RSB：階層関数 $q(x)$

Parisi の RSB では，重なり行列が階層構造を持ち

$$q_{ab} = q(x), \quad x \in \quad (\text{B.10.7})$$

と表される．この x は階層パラメータである．認知科学的解釈としては，自己が単一状態ではなく「複数の自己状態の階層構造として存在する」ことを意味する．

B.10.6 自己状態群の階層構造：入れ子クラスタリングとツリー

B.10.7 入れ子クラスタリングの意味

文書では、Parisi 型 RSB が意味するものとして純状態集合が「重なり（類似度）によって束ねたときに入れ子状にクラスタリングする」ことを挙げる．この構造は、次のようなツリー表現で把握できる：

1. 近い（重なりが大きい）純状態同士が**小クラスター**を形成する．
2. 小クラスター同士がさらに束ねられ**上位クラスター**を作る．
3. この操作が再帰的に続き、純状態集合全体が**樹状（ツリー）**に組織化される．

したがって自己状態群とは、単なる「多数の谷の集合」ではなく、「谷同士の関係（類似度）がツリーとしてコード化された集合」である．

B.10.7.1 超計量性（ultrametricity）と自己状態の距離

重なりを距離へ単調変換し、例えば

$$d_{\alpha\beta} = q_{\text{EA}} - q_{\alpha\beta} \quad (\text{B.10.8})$$

のように定義すると、超計量不等式

$$d_{\alpha\beta} \leq \max\{d_{\alpha\gamma}, d_{\beta\gamma}\} \quad (\text{B.10.9})$$

が成立する状況が典型である．これは「三角形が一般には成立せず、最長辺が二つ並ぶ」という木距離の性質であり、自己状態群の自然な表現がツリーであることを保証する．

B.10.7.2 階層の心理学的読み替え（概念的考察）

本理論の読み替えでは、ツリーの各レベルは次のような抽象的対応を持ちうる：

- **下位レベル**：微小な文脈差・感情差で分岐する近傍自己状態（「似た自分」同士）
- **中位レベル**：状況依存のモード（仕事モード／家庭モード等）としての自己クラスター
- **上位レベル**：時間スパンの長い自己同一性や人格傾向を保つ太い幹

重要なのは、これが「比喩」ではなく、 $q_{\alpha\beta}$ の統計構造として（少なくとも平均場理論では）定式化される点である．

B.10.8 人格・無意識を含む多谷構造としての自己状態群

B.10.8.1 人格 (personality)

文書では人格を「単一状態ではなく、頻繁に利用されるアトラクタ群の集合」として定義する。このとき、RSB 階層構造の観点からは、人格とは自己状態ツリーの中で比較的大きな重み

$$W(\mathcal{C}) \equiv \sum_{\alpha \in \mathcal{C}} w_{\alpha} \quad (\text{B.10.10})$$

を持つクラスター（部分木）の集合として理解できる。

人格の「安定性」は、単に特定状態の深さだけでなく、**重なり構造のまとまり方**（クラスター間の分離、階層の明瞭さ）に反映される、という見取り図が得られる。

B.10.8.2 無意識 (unconsciousness)

文書は無意識を「アクセスされていないアトラクタ群（潜在のアトラクタ空間）」として定義する。これを自己状態群の言語で書けば、純状態集合 $\mathcal{A}$ を

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_c(t) \cup \mathcal{A}_u(t), \quad \mathcal{A}_c(t) \cap \mathcal{A}_u(t) = \emptyset \quad (\text{B.10.11})$$

と分割し、

$$\text{無意識} \equiv \mathcal{A}_u(t) \quad (\text{B.10.12})$$

とみなす立場である。

RSB 階層があるとき、無意識は単なる「遠い谷」ではなく、

- 高いバリアで隔てられた**別クラスター**（ツリー上で遠い枝）
- あるいは同一上位クラスター内だが現在のダイナミクスでは到達しない**下位枝**

として複数様式を取りうる。この点で「無意識」は、自己状態ツリー上の**アクセス制御**の問題へと翻訳される。

B.10.9 まとめ

RSB により階層化された自己状態群は、純状態分解による多谷構造を前提に、重なり $q_{\alpha\beta}$ が単一値ではなく階層分布を持つことで、純状態集合が入れ子状クラスターリング（ツリー）として組織化される構造である。

この枠組みでは、

- **自己**：階層化された自己状態群（純状態集合）そのもの
- **人格**：高重みクラスター（頻繁に占有される部分木）
- **無意識**：現時点でアクセスされないクラスター／枝

として統一的に把握される。

B.11 スピングラス的認知系の臨界化に伴う意味場の相転移について

B.11.1 問題設定

本稿の目的は、「スピングラス的認知系が臨界点に近づくと、意味場（認知的意味空間）も相転移を起こす」という主張の数理解物理学的含意を整理し、どのような機構で「意味の秩序化」が生じうるかを考察することである。

本理論の基本方針は、認知状態を粗視化した秩序変数として**認知場**（意識場） $\Psi(x, t)$ を導入し、その上に「意味」を別の有効自由度としての**意味場** $M(x, t)$ （または $M(x, t)$ に由来する秩序変数 $m = \langle M \rangle$ ）として導入することである。意味場は認知場から生成される有効場として

$$M = M[\Psi] \quad (\text{B.11.1})$$

と書かれ、認知場と意味場は結合してダイナミクスを持つ。

B.11.2 前提：認知場の臨界化とスピングラス的多谷構造

B.11.2.1 臨界点近傍の一般論

認知場 Ψ が臨界点近傍（制御パラメータ $r \rightarrow 0$ ）に近づくと、空間相関長 ξ と時間相関（緩和時間） τ が増大し、局所自由度が大域的に結び付く。このとき、微小入力が広域へ波及しうる（神経雪崩）、かつ長時間相関が維持されやすい（臨界スローイングダウン）。

B.11.2.2 スピングラス的認知系としての特徴

認知要素間の相互作用が不均質かつ競合的であるとき、自由エネルギー地形は多数の局所極小（アトラクタ）を持つ rugged 構造となる。この多谷構造は、記憶・人格・無意識などの「長期的準安定構造」を担うと同時に、意味形成を「アトラクタ幾何（谷の配置と距離）」として扱う土台になる。

B.11.3 意味場と意味相転移の最小モデル

B.11.3.1 意味場の Landau 型自由エネルギー

本理論では意味場 M に対し，Landau 型の自由エネルギー

$$F[M] = \int d^d x \left[\frac{\alpha}{2} M^2(x) + \frac{\beta}{4} M^4(x) + \frac{K_M}{2} (\nabla M(x))^2 \right] \quad (\text{B.11.2})$$

を導入し， $\alpha = 0$ で意味相転移が起こるとする．ここで

- α ：意味秩序化の「距離」（制御パラメータ）
- $\beta > 0$ ：安定化
- K_M ：意味の空間的整合（滑らかさ・結合）

である．

意味場の秩序変数を

$$m \equiv \langle M \rangle \quad (\text{B.11.3})$$

とすれば， $\alpha > 0$ では $m = 0$ （無秩序）であり， $\alpha < 0$ で $m \neq 0$ （秩序相）が許される．

B.11.3.2 「意味相転移」の認知的解釈

式 (B.11.2) の相転移は，単なる数式上の対称性の破れではなく，認知的には次を表す：

1. **無秩序相** ($m = 0$)：意味が局所・断片的で，概念間の関係が弱く，場のゆらぎが平均化されて「一貫した意味ネットワーク」が形成されにくい．
2. **秩序相** ($m \neq 0$)：概念間の結合が強まり，意味ネットワークが大域的に整合し，入力「意味空間の安定構造」に吸い込まれる（意味アトラクタが顕在化する）．

B.11.4 臨界化が意味相転移を誘起する機構：結合による有効パラメータの流れ

B.11.4.1 認知場と意味場の結合

意味場が認知場から生成されるという立場を，最小限には線形結合

$$F_{\text{int}}[\Psi, M] = \int d^d x g \Psi(x) M(x) \quad (\text{B.11.4})$$

として表現できる (g は結合定数). このとき全自由エネルギー (または有効作用) は

$$F_{\text{tot}}[\Psi, M] = F_{\Psi}[\Psi] + F_M[M] + F_{\text{int}}[\Psi, M] \quad (\text{B.11.5})$$

となる.

B.11.4.2 臨界ゆらぎによる意味場の有効質量 (α) の変化

認知場 Ψ が臨界化すると, Ψ のゆらぎ (相関関数) が増大する. 結合 (B.12.12) があると, M から見て Ψ は「外部駆動」かつ「ゆらぎ源」として働き, 粗視化 (Ψ を積分消去する操作) により, 意味場の二次係数 α は有効的に再正規化される:

$$\alpha_{\text{eff}} = \alpha - g^2 \chi_{\Psi} + \cdots, \quad (\text{B.11.6})$$

ここで χ_{Ψ} は認知場の感受率 (静的応答) に対応する量であり, 臨界点近傍で増大する. 従って

$$\chi_{\Psi} \uparrow \Rightarrow \alpha_{\text{eff}} \downarrow \quad (\text{B.11.7})$$

となり, 臨界近傍で α_{eff} が符号反転し, 意味場が**秩序相** ($m \neq 0$) へ**遷移**しやすくなる.

この見取り図において, 「認知場が臨界点に近づくと意味場も相転移する」とは, (B.13.8) のように**認知場の臨界感受率**が意味場の有効パラメータを押し下げ, 意味秩序化の閾値を跨ぐ, という主張に対応する.

B.11.4.3 相関長の増大と意味ネットワークの大域整合

もう一つの機構は空間相関長 ξ の発散である. 臨界近傍で Ψ が長距離相関を持つと, M も結合 (B.12.12) を通じて遠隔点どうしが同時に拘束されるため, 意味場の有効な結合 (**整合長**) が増大する.

直観的には,

局所的な特徴抽出や断片的連想が, 臨界ゆらぎにより「遠方の表象」と同期・整合し, 意味空間が一つの整合した幾何を持つ

という形で表現できる. これが「意味ネットワーク形成の開始=意味相転移」という理解である.

B.11.5 スピングラス性（多谷）と意味相転移の両立：競合と選択

B.11.5.1 意味＝アトラクタであることとの整合

本理論では「意味＝認知アトラクタ」とされる．すると意味相転移は，

$$(\text{多数の潜在谷}) \Rightarrow (\text{意味として機能する谷の集合が秩序化される}) \quad (\text{B.11.8})$$

という**選別・編成**の相転移として解釈できる．すなわち「谷が存在すること（多谷性）」と「谷が意味として組織化されること（意味秩序化）」は別であり，後者が意味相転移である．

B.11.5.2 臨界性の役割：保持と更新の最適点

臨界相は，情報の保持（長時間相関）と更新（雪崩的伝播）を両立させるため，意味場にとっては

- 形成された意味構造が短時間で崩れない（保持）
- しかし新規入力で再編成もできる（更新）

という「硬直でも拡散でもない」条件を与える．この条件の下で，意味場の秩序化（意味ネットワーク形成）が最も起こりやすい，というのが本主張の機能的含意である．

B.11.6 結論

認知場 Ψ が臨界点に近づくと，その感受率・相関長が増大し，認知場と結合した意味場 M の有効制御パラメータ α_{eff} が押し下げられることで，意味場が Landau 型の意味相転移 ($m = 0 \rightarrow m \neq 0$) を起こしうる．この意味相転移は，認知的には「意味ネットワーク形成の開始」すなわち断片的表象から大域的に整合した意味空間への遷移として理解される．

B.12 補足考察：RSB（階層的アトラクタ）と意味相転移の整合

—超計量意味空間の秩序化として—

B.12.1 目的と位置づけ

本補足は、「スピングラス的認知系が臨界点に近づくと意味場も相転移を起こす」という枠組みに対し、RSB (Replica Symmetry Breaking) による**階層的アトラクタ構造**を導入したとき、意味相転移がどのように再解釈されるかを整理することを目的とする。結論的には、RSB が与える純状態集合の**ツリー（入れ子クラスタ）構造**を意味空間の基盤として採用するとき、意味相転移は「超計量 (ultrametric) な意味空間が実効的秩序として立ち上がる過程」すなわち**超計量意味空間の秩序化**として理解できる。

B.12.2 RSB：純状態分解と重なり幾何

B.12.2.1 純状態分解（多谷構造の測度論的定式化）

乱雑結合を持つスピングラス的認知系では、自由エネルギー地形は多数の谷（準安定状態）を持ち、熱力学極限での測度は単一状態では尽くせない。純状態 (pure state) α の混合として

$$\mu(\cdot) = \sum_{\alpha} w_{\alpha} \mu_{\alpha}(\cdot), \quad w_{\alpha} \geq 0, \quad \sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1 \quad (\text{B.12.1})$$

と表される。ここで μ_{α} は純状態測度、 w_{α} はその重みである。

B.12.2.2 重なり秩序変数と Parisi の階層関数

純状態間（またはレプリカ間）の類似度は**重なり**で特徴付けられる。レプリカ a, b に対し

$$q_{ab} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i^{(a)} S_i^{(b)} \quad (\text{B.12.2})$$

を定義する。RS (レプリカ対称) では $q_{ab} = q$ ($a \neq b$) と仮定するが、スピングラス相ではこの仮定が不安定化し、Parisi の RSB では

$$q_{ab} = q(x), \quad x \in \quad (\text{B.12.3})$$




図 B.1 RSB が与える入れ子クラスタリング（ツリー構造）の模式図：葉は純状態（意味アトラクタ） $\alpha, \beta, \dots$ 階層パラメータ x に応じてクラスタが細分化され、距離は木距離（超計量）として自然に定義される。

という**階層関数**が出現する。これは純状態集合が単なる集合ではなく、類似度により**階層的にクラスタリング**することを意味する。

B.12.2.3 入れ子クラスタリングと超計量性

重なりを距離に単調変換し、例えば

$$d_{\alpha\beta} = q_{\text{EA}} - q_{\alpha\beta} \quad (\text{B.12.4})$$

とおくと、平均場スピングラスではしばしば

$$d_{\alpha\beta} \leq \max\{d_{\alpha\gamma}, d_{\beta\gamma}\} \quad (\text{B.12.5})$$

という**超計量不等式**が成立する。この幾何学は通常のユークリッド幾何ではなく、「木の距離」によって自然に表現される。従って、RSB は「状態空間（純状態集合）にツリー構造が内在する」ことを意味する。

B.12.3 意味＝アトラクタ幾何：意味空間の超計量化

B.12.3.1 意味の定義と意味ネットワーク

本理論では意味を「認知状態空間に形成されるアトラクタ構造」と定義し、特に

$$\text{意味} = \text{認知アトラクタ} \quad (\text{B.12.6})$$

と置く．複数の意味アトラクタ A_α 間の距離 $d(A_\alpha, A_\beta)$ により意味空間が誘導され、意味ネットワークはこの距離構造の上に形成される．

B.12.3.2 RSB ツリーを意味空間の基底とする

意味単位を純状態（谷） α に対応付けると、RSB が与える入れ子クラスタリングはそのまま

$$\text{概念（下位）} \rightarrow \text{上位概念} \rightarrow \cdots \quad (\text{B.12.7})$$

という階層的意味構造の幾何学的基盤となる．このとき意味空間は一般の連続空間ではなく、純状態集合上の超計量空間として解釈される．

B.12.4 意味場と意味相転移：超計量意味空間の秩序化

B.12.4.1 意味場と秩序変数

認知場 $\Psi(x, t)$ に対応して意味場 $M(x, t)$ を導入し、意味の秩序変数を

$$m = \langle M \rangle \quad (\text{B.12.8})$$

と定義する． m は「意味が大域的に組織化されている度合い」を測る巨視的指標である．

B.12.4.2 Landau 型自由エネルギーと意味相転移

意味場の最小モデルとして Landau 型自由エネルギー

$$F[M] = \int d^d x \left[\frac{\alpha}{2} M^2(x) + \frac{\beta}{4} M^4(x) + \frac{K_M}{2} (\nabla M(x))^2 \right] \quad (\text{B.12.9})$$

を導入する．ここで $\alpha = 0$ が意味相転移点であり、

$$\alpha > 0: m = 0 \text{ (無秩序相)}, \quad \alpha < 0: m \neq 0 \text{ (秩序相)} \quad (\text{B.12.10})$$

が成立する．意味相転移は「意味ネットワーク形成の開始」を表す．

B.12.4.3 超計量意味空間における秩序化の解釈

RSB によって意味候補（アトラクタ集合）は既に階層的（ツリー的）に存在しているが、それは「潜在的幾何」に過ぎない．意味相転移は、この潜在幾何の上で

1. どの部分木（クラスター）が意味単位として安定に採用されるか、
2. どの階層レベルで上位概念が実効的に立ち上がるか、

3. クラスター間関係がどの程度一貫して運用されるか、
 が一斉に決まる「秩序化」の過程と解釈できる。したがって意味相転移は、

$$\text{RSB による超計量ツリー (潜在)} \implies \text{超計量意味空間の実効的秩序 (顕在)} \quad (\text{B.12.11})$$

 という形の「超計量意味空間の秩序化」である。

B.12.5 認知場との結合と臨界性：意味相転移が強化される理由

認知場 Ψ と意味場 M は結合し、

$$F_{\text{int}} = \int d^d x \, g \Psi(x) M(x) \quad (\text{B.12.12})$$

と書ける。認知場が臨界化すると感受率 χ_Ψ が増大し、意味場の二次係数は有効的に

$$\alpha_{\text{eff}} = \alpha - g^2 \chi_\Psi + \cdots \quad (\text{B.12.13})$$

と再正規化される。このため臨界近傍では α_{eff} が低下し、意味相転移 ($m = 0 \rightarrow m \neq 0$) が誘起されやすい。

B.12.6 まとめ

RSB は認知状態（純状態）集合に階層的重なり構造 $q(x)$ を導入し、入れ子クラスタリングと超計量性を与える。意味をアトラクタ幾何として定義するなら、この超計量ツリーは意味空間の自然な基底となる。意味場の相転移は、その基底上で意味ネットワークが実効的秩序として立ち上がる過程であり、「超計量意味空間の秩序化」として解釈できる。

B.13 認知場と意味場の結合定数 g に関する数理物理学的考察

B.13.1 認知場と意味場の結合定数 g に関する数理物理学的考察

B.13.1.1 目的と位置づけ

本節の目的は、非平衡認知統計場理論（NCSFT）において導入される認知場 Ψ と意味場 M の相互作用

$$S_{\Psi M} = g \int d^d x dt \Psi(x, t) M(x, t) \quad (\text{B.13.1})$$

で定義される結合定数 g の物理的・認知的意味を整理し、推定可能性や理論的含意（相転移・安定性・秩序化）を考察することである．式 (B.13.1) は、認知ダイナミクス（ Ψ ）と意味秩序（ M ）が互いに独立な自由度ではなく、結合した複合系として振る舞うことを表す．

B.13.1.2 g の最小定義：双線形結合としての意味

本理論では、認知場 $\Psi(x, t)$ は脳内の神経活動・情報統合・記憶・予測状態を粗視化した秩序変数であり、意味場 $M(x, t)$ は「意味＝認知アトラクタ」という幾何学的構造を巨視的に記述する有効場である．このとき結合定数 g は、以下を同時に規定する：

- **駆動（feedforward）**：認知場の変動が意味場をどれだけ強く生成・変形するか（ $\Psi \rightarrow M$ の強さ）．
- **拘束（feedback）**：形成された意味秩序が認知場の遷移・安定性にどれだけ強く影響するか（ $M \rightarrow \Psi$ の強さ）．

直観的には、 g が小さいとき、意味は認知過程の「後追い（弱い随伴）」に近く、 g が大きいとき、意味は認知過程を強く拘束し、解釈・概念枠組みが知覚や意思決定を強く再構成する状況に対応する．

B.13.1.3 運動方程式レベルでの解釈

文書中の結合モデルの一例は

$$m\partial_t^2 \Psi + \Gamma\partial_t \Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + \lambda\Phi + gM + \xi, \quad (\text{B.13.2})$$

$$\partial_t M = -\alpha M + \beta\Psi + \eta \quad (\text{B.13.3})$$

の形で与えられる。ここで gM は意味場が認知場へ与える「意味拘束項」として機能する。

■線形応答的理解 Ψ 方程式を線形化し、 $u\Psi^3$ を無視すれば、

$$\mathcal{L}_\Psi \Psi \simeq gM + \dots \quad (\text{B.13.4})$$

となる ($\mathcal{L}_\Psi$ は線形作用素)。従って、意味場の変動は有効外力として認知場を駆動する。一方で M は Ψ により駆動されるから、結局 g は

$$\Psi \longleftrightarrow M \quad (\text{B.13.5})$$

の閉ループ相互作用の強さを表す。

B.13.1.4 g が意味相転移を誘起・強化する機構：有効質量の再正規化

意味場 M に対し Landau 型自由エネルギー

$$F[M] = \int d^d x \left[\frac{\alpha}{2} M^2 + \frac{\beta}{4} M^4 + \frac{K_M}{2} (\nabla M)^2 \right] \quad (\text{B.13.6})$$

を考える。認知場との結合を

$$F_{\text{int}}[\Psi, M] = g \int d^d x \Psi(x) M(x) \quad (\text{B.13.7})$$

とすると、認知場 Ψ のゆらぎが増大する（臨界近傍）ことで、意味場の二次係数（有効質量）が

$$\alpha_{\text{eff}} = \alpha - g^2 \chi_\Psi + \dots \quad (\text{B.13.8})$$

のように押し下げられる。ここで χ_Ψ は認知場の感受率（静的応答）であり、臨界近傍で増大し得る。したがって g は、

1. 認知場が臨界化するほど (χ_Ψ が大きいほど),
2. 結合が強いほど (g が大きいほど),

意味秩序化 (M の秩序パラメータ $m = \langle M \rangle$ の出現) が起こりやすいことを意味する。これは「認知場の臨界化が意味相転移を誘起する」という主張を、最小限の数式で表現したものである。

B.13.1.5 g の大きさによる相の描像（定性的相図）

g を制御パラメータとみなすと、少なくとも以下の領域が概念的に区別される：

$g \approx 0$ (弱結合) : 意味場は認知場からほぼ独立に緩和し, 「意味」は局所的・断片的になりやすい. 認知は起きても, 意味ネットワークが大域的に整合しにくい.

中程度の g (適応的結合) : 認知の変動が意味を形成し, 意味が認知を拘束することで, 概念的整合性 (意味ネットワーク) が形成される. 臨界近傍では式 (B.13.8) を通じて意味秩序化が促進されやすい.

$g \gg 1$ (強結合) : 意味拘束が過度に強くなり, 認知場が少数の意味アトラクタへ強制的にロックされる可能性がある. これは柔軟性の低下 (解釈の固定化) として現れ得るため, 臨床・認知的には「硬直」と「統合」の混同に注意が必要である.

B.13.1.6 g の推定可能性: データから何を測るべきか

実験的に g を推定するには, Ψ と M の同時計測可能な代理変数を定め, 相互作用の方向性と非線形性を含めて同定する必要がある. 単純相関は「同期」と「因果的結合 (相互作用)」を混同し得るため, 次が重要となる:

- $\Psi \rightarrow M$ と $M \rightarrow \Psi$ の因果方向の分離.
- 臨界近傍ではゆらぎが増大するため, χ_Ψ の推定 (感受率・応答関数) と式 (B.13.8) 型の関係の検証.
- g を一定とみなすのではなく, 状態依存 $g(\Psi, M, t)$ (文脈依存・学習依存) として拡張する可能性.

B.13.1.7 まとめ

結合定数 g は, 「認知 (Ψ) が意味 (M) を生成し, 意味が認知を拘束する」という二方向結合の強さを表す中心パラメータである. 特に, 認知場が臨界化して感受率 χ_Ψ が増大すると, 式 (B.13.8) の機構により意味相転移 (意味秩序化) が誘起・強化され得る. 従って g は, 意味形成の起動条件・安定性・柔軟性を支配する「理論と実験を接続する結合パラメータ」として位置づけられる.

B.14 g と χ_Ψ を介した C 曲面の考察

図 B.2 は、認知場 Ψ と意味場 M の結合定数 g と、認知場の感受率 χ_Ψ を媒介として、意識秩序変数 C がどのように変化し得るかを例示的に示した 3 次元曲面である。本理論では

$$C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} \quad (\text{B.14.1})$$

によって意識秩序変数が定義され、 $C > C_c$ の領域が意識相に対応する [式 (0.0.1)]。

本図の物理的要点は、 χ_Ψ が臨界近傍で増大する量（感受性）であり、その増大が意味場側の有効パラメータを

$$\alpha_{\text{eff}} = \alpha - g^2 \chi_\Psi + \cdots \quad (\text{B.14.2})$$

のように押し下げ、意味秩序化（意味相転移）を誘起・強化し得るという機構にある。すなわち、 g が大きいほど、また χ_Ψ が大きい（臨界に近い）ほど、 α_{eff} の低下を通じて意味秩序が立ち上がりやすくなり、その結果として統合情報 Φ が増大し、 C を押し上げる、という因果連鎖が想定されている。

ただし図 B.2 の曲面は「例示的」であり、 P や $\dot{S}$ の g, χ_Ψ 依存性を固定（あるいは緩やか）とみなした上で、主として Φ の増大によって C が増える描像を可視化していると解釈するのが妥当である。実際の同定においては、 g の増大が常に意識相の強化に直結するとは限らず、過度の結合は認知ダイナミクスを少数の意味アトラクタへ過剰拘束し、柔軟性を損なう可能性も理論上は残るため、 C の上昇と「健全な意識相」の同一視には慎重な検討が必要である（ g は相互作用強度であり、最適域が存在し得る）。




図 B.2 結合定数 g と認知場感受率 χ_Ψ を介した意識秩序変数 C の例示的 3 次元曲面. ここでは $\alpha_{\text{eff}} = \alpha - g^2 \chi_\Psi$ により意味秩序化が進む領域で Φ が増えると仮定し, $C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S}$ により C を算出している.

B.15 $\Phi(g, t)$ 曲面の考察

図 B.3 は, 統合情報 Φ が結合 g と時間 t の関数として増大し, 最終的に飽和するという「飽和モデル」に基づく例示的曲面である. 本理論では統合情報は

$$\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}} \quad (\text{B.15.1})$$

として空間・時間の両面を含む量であり, 単なる相関増大 (同期) と同一視してはならないとされる. 従って, 図 B.3 が表す Φ の増大は「全脳的結合の強化」だけでなく, 時間方向の統合 (履歴依存・長時間相関) を含む統合度の増大として解釈される.

g 依存性については, 認知場と意味場の結合が強まるほど (g が増えるほど), 意味秩序が認知場へフィードバックし, 認知状態が概念的整合性を伴って組織化されやすくなるという描像と整合的である. 時間 t に関して飽和が現れるのは, 学習・適応・統合の進行が無限に増大するのではなく, 有限の資源制約やダイナミクスの定常化により上限へ近づくことを表現していると解釈できる.

さらに, Φ は意識秩序変数 $C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S}$ の乗法因子であるため, 図 B.3 のように Φ が増大しても, P (予測能力) または $\dot{S}$ (非平衡性) が低い場合には C の上昇

は抑制され得る。したがって、 $\Phi(g, t)$ のみから意識相の成立を判断するのではなく、 $\dot{S} > 0$ などの非平衡条件や予測的処理の成立と併せて多変量的に評価する必要がある。




図 B.3 Φ の例示曲面：結合 g と時間 t に対する統合の増大（飽和モデル）。

B.15.1 統合情報 Φ の挙動と解釈

意識秩序変数は $C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S}$ により定義されるため、 Φ は意識相の成立における「統合 (Binding)」成分を担う中心変数である。また本理論では統合情報は空間・時間の両面を含む $\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}}$ として扱われる。したがって、 Φ の上昇は単なる同期（相関の増大）ではなく、差異化を保ったままの全体的結合の増大として解釈される必要がある。




図 B.4 $\dot{S}$ の例示：時間に対する非平衡性（不可逆性）の増減。

B.15.2 エントロピー生成率 $\dot{S}$ と意識相

本理論では $\dot{S} > 0$ は詳細釣り合いの破れ（不可逆性）を表し、意識相の必要条件の一部として位置づけられる。したがって $\dot{S}$ の低下 ($\dot{S} \rightarrow 0$) は、開放系としての駆動が失われ、相転移的に意識相から外れる方向の兆候となり得る。ただし実データにおいては、線形な遅延相関による簡易推定は逆転現象を生み得るため、確率流に基づく推定（状態空間再構成を含む）へ整備する必要がある。




図 B.5 P の例示：時間とともに予測能力が増大し飽和するモデル.

B.15.3 予測能力 P の役割

意識秩序変数 $C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S}$ において, P は能動的推論 (予測的処理) がどの程度成立しているかを表す要因である. P が高いほど, 入力単なる刺激列ではなく, 内部モデル更新を伴う構造化された認知過程として運用され, 統合 (Φ) や非平衡性 ($\dot{S}$) と結びついて安定した意識相を支えやすい. 文書では, 意味場 (M) のダイナミクスとして $(\partial_t M = -\alpha M + \beta \Psi + \eta)$ が与えられ, (α) が意味場の緩和 (減衰) を決めます. また意味相転移の最小モデルとして Landau 型自由エネルギーが導入されます.




図 B.6 例示： $\alpha_{\text{eff}} = \alpha - g^2 \chi_\Psi$ 型の低下.

B.15.4 意味場パラメータ α と意味秩序化

意味場の最小ダイナミクスは $\partial_t M = -\alpha M + \beta \Psi + \eta$ と書かれ、 α は意味構造の緩和速度（忘却・拡散の速さ）を表す。また意味場は Landau 型自由エネルギーにより相転移（秩序化）を議論できる。認知場と意味場の結合があると、臨界近傍では $\alpha_{\text{eff}} = \alpha - g^2 \chi_\Psi + \dots$ の形で有効係数が押し下げられ、意味秩序化が誘起・強化され得る。従って、 α （および α_{eff} ）は「意味が形成されやすいか／壊れやすいか」を支配する制御パラメータとして解釈できる。




図 B.7 例示： $C(t) = \Phi(t) P(t) \dot{S}(t)$ の時系列。

B.15.5 時間発展としての $C(t)$ ：意識相の立ち上がりと崩壊

意識は秩序変数 $C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S}$ が臨界閾値 C_c を越えることにより定義される。したがって時間 t に沿って $C(t)$ を追跡することは、意識相が (i) 統合 (Φ)、(ii) 予測 (P)、(iii) 不可逆駆動 ($\dot{S}$) の同時成立として「立ち上がる／維持される／崩壊する」過程を可視化する操作に対応する。特に $\dot{S}$ や Φ の推定法には注意が必要であり、単純相関代用や線形推定に依存すると相分類を誤る可能性があるため、理論定義と整合する推定器の整備が重要である。

B.16 秩序変数空間 $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ における 3D ヒートマップの考察

本節では、精神状態を特徴づける秩序変数として内部閉包 (internal closure) を表す λ 、自己同一性 (自己安定性) を測る Edwards–Anderson 秩序変数 q_{EA} 、およびアトラクタ間遷移の困難さ (固着度) を表す障壁指標 ΔF の 3 変数を用い、 $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ 空間上に得られる各状態の 3D ヒートマップ (密度分布) の解釈を与える。この可視化は、自由エネルギー地形の幾何学的異常をパラメータ空間へ射影したものとみなせる。

B.16.1 正常状態 (メタ安定な多谷地形) のヒートマップ

正常状態のクラスタは、 λ と q_{EA} が中程度から高い領域に主として分布し、 ΔF は極端に大きくも小さくもない中程度に集中することが期待される。この分布は以下の点で解釈できる。

3D heatmap example for NORMAL conscious state (cluster density)




図 B.8

- λ が中～高：内部閉包が保たれており、系が外界入力と切り離された内在的な自己参照構造を維持できる。これは「観測者としての私」が破綻せず成立することの力学的条件に対応する。

- q_{EA} が中～高：長時間自己相関が有限に保たれ、「昨日の私」と「今日の私」の連続性（自己同一性）が担保される．
- ΔF が中程度：アトラクタ間の障壁が過小であれば状態は保持できず，過大であれば固着して柔軟性を失う．従って中程度の ΔF は，多谷地形上での適度なホッピング（メタ安定遷移）を可能にする．

以上より，正常クラスタのヒートマップは「安定性（保持）」と「柔軟性（更新）」の両立点として， $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ の中庸領域に高密度帯を形成する描像となる．

B.16.2 統合失調症（アトラクタ崩壊）のヒートマップ

統合失調症クラスタは， $\lambda \approx 0$ かつ $q_{EA} \ll 1$ の領域に集積することが，本モデルの中心的予測である．ヒートマップがこの領域に鋭い密度ピークを示す場合，その含意は次の通りである．

3D heatmap: Schizophrenia cluster in $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$




図 B.9

- $\lambda \rightarrow 0$ ：内部閉包の崩壊を意味し，内在的な自己参照ループが弱体化する．力学的には「自己と外界の境界条件」が緩み，外的知覚チャンネルと内的思考チャンネルの分離が不安定化しやすい．
- q_{EA} の低下：自己相関の残留成分が消失し，自己同一性が保持されにくい．自由エネルギー地形の観点では，谷が浅く（あるいは粗く）なり，状態が確定的

に占有されず拡散しやすい。

- ΔF の解釈：統合失調症では「固着」よりも「地形の浅化・崩れ」が支配的であるため、 ΔF は高値に寄る必然はなく、低～中程度に広がりうる。従って、ヒートマップでは (λ, q_{EA}) の低値側が分類の主要軸となる。

まとめると、統合失調症の 3D ヒートマップは「内部閉包の喪失」と「自己安定性の崩壊」が同時に起こる領域（低 λ ・低 q_{EA} ）へ密度が強く偏る相図的特徴として理解される。

B.16.3 うつ病（アトラクタ過凝縮）のヒートマップ

うつ病は「特定ネガティブ・アトラクタの異常深化」すなわち単一谷への固着として解釈され、3D ヒートマップでは ΔF が高い領域への偏りとして表現される。このとき、 (λ, q_{EA}) の扱いは次のように整理できる。




図 B.10

- ΔF 高値：障壁が高くなり、他アトラクタへの遷移率が低下する（脱出困難）。認知的には反芻や行動活性の低下として現れうる。
- q_{EA} ：状態が長時間保持されるため、単純には q_{EA} は低下せず、むしろ「過度に高い（固定化）」方向へ寄る可能性がある。ただし、ここでの安定性は適応的メタ安定性ではなく、病的固着としての安定である点が重要である。

- λ : うつ病の主要描像は内部閉包の崩壊ではないため, λ は統合失調症のように 0 へ落ち込む必要はなく, 中程度以上を保ったまま ΔF のみが突出する分布が典型となる.

したがって, うつ病クラスタのヒートマップは「 ΔF 軸方向に引き延ばされた高密度帯」あるいは「高 ΔF 側に形成される単峰性ピーク」として現れる. これは, 自由エネルギー地形の観点で「深すぎる単一谷」の射影像に対応する.

B.16.4 3 群の比較と分類上の示唆

3D ヒートマップの比較から得られる分類上の要点は以下である.

1. 正常状態: $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ の中庸領域 (メタ安定帯) に密度が集中.
2. 統合失調症: 低 λ ・低 q_{EA} が主要な識別特徴 (内部閉包と自己安定性の同時崩壊).
3. うつ病: 高 ΔF が主要な識別特徴 (固着/脱出障壁の増大).

このように, 本パラメータ空間は, 「自己の崩壊 (schizophrenia)」と「自己の過固定 (depression)」を幾何学的に分離して可視化する座標系として機能する.

B.16.5 強迫症 (OCD)：過度な局所安定性／反復ループのヒートマップ

強迫症 (OCD) は、本モデルでは「特定の認知アトラクタへの過剰な局所安定化」(反復的思考・確認行為に対応)として理解される。秩序変数空間 $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ 上では、主として ΔF の上昇 (遷移障壁の増大) として可視化される。




図 B.11

- ΔF 高値：アトラクタからの脱出が困難になり、認知状態が同一ループへ反復的に回帰する (強迫的反復)。うつ病と同様に「固着」を示すが、OCD では “単一の情動谷 (抑うつ)” というより、“特定規則・疑念・不完全感に結びついた局所谷の反復占有” として現れやすい。
- q_{EA} 中～高：反復が同一の状態 (あるいは近傍クラスター) を長時間維持するため、長時間自己相関は低下しにくい (むしろ固定化として上昇しうる)。ただしこれは適応的安定性ではなく、更新不能としての病的安定である。

- λ 中程度以上：OCD の主徴は内部閉包の崩壊ではないため、 $\lambda \rightarrow 0$ を要請しない。したがって統合失調症と異なり、 λ は保たれたまま ΔF 軸方向への偏りが主特徴となる。

以上より、OCD クラスターの 3D ヒートマップは、 λ が保たれた領域で q_{EA} が中～高、かつ ΔF が高い側に形成される高密度帯として解釈される。（うつ病の「深すぎる単一谷」に似るが、OCD は「局所的な反復ループの固定化」としてより尖った（あるいは細い）分布をとる可能性がある）。

B.16.6 解離性障害：アトラクタ集合の分裂（多峰・強分離）のヒートマップ

解離性障害は、自由エネルギー地形上でアトラクタ集合が複数のクラスターへ分裂し、それらが高い障壁で隔てられる現象として解釈される。このとき $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ 空間の 3D ヒートマップは、単一ピークではなく **複数ピーク（多峰性）** として現れることが本質的である。

- ΔF 高値（特にクラスター間）：クラスター間障壁が増大し、ある自己状態（クラスター）に滞在している間、別の自己状態群へのアクセスが遮断される（解離性健忘・人格交代）として理解される。
- q_{EA} の分布：クラスター内部では状態が保持されるため q_{EA} は中程度以上を取りうるが、クラスター切替に伴い「長時間スケールの自己一貫性」が破れる場合、**全体分布としては広がりや二群化が生じうる**。
- λ ：内部閉包が全面的に崩壊するというより、“閉包が保たれた複数の自己が並立し、互いに接続が弱い” 描像が典型となる。よって λ は極端に小さい必要はなく、中程度以上を保ったまま、多峰性・分裂構造が主要所見となる。

したがって解離性障害の 3D ヒートマップは、 $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ 空間において**複数の高密度クラスターが明瞭に分離し**、その間に**低密度領域（到達困難領域）**が挟まる形で現れると解釈される。

Dissociation (schematic multi-peak)




図 B.12

B.16.7 健忘症 (amnesia)：自己同一性・履歴保持の低下としてのヒートマップ

健忘症は、本理論の語彙では「過去状態が現在の認知場へ残響しにくい」すなわち時間方向の保持（履歴依存）が弱まった状態として理解できる。秩序変数空間では、とくに q_{EA} の低下（長時間自己相関の喪失）が中心的特徴になる。

- q_{EA} 低値：時間平均された固定成分が小さくなり、長時間自己相関の残留成分が弱いことを示す。認知状態が一つの安定谷として保持されにくく、「昨日の私」と「今日の私」の連続性が担保されにくい領域として表現される。
- ΔF の解釈：健忘症の主徴は「固着」ではないため、 ΔF が高い方向への偏りは必須ではない。むしろ障壁が中～低である（保持が弱い）ため、状態が散逸しやすい分布として現れる可能性がある。




図 B.13

- λ ：内部閉包そのものの崩壊を主因としない場合， λ は中程度を保ちうる．ただし，もし健忘が「内在的再帰の弱体化（自己参照の不全）」を伴うなら， λ の低下方向（ただし統合失調症ほど極端ではない）へも分布が広がりうる．

以上より健忘症の 3D ヒートマップは，低 q_{EA} 側への密度偏りを主特徴とし， ΔF は中～低に広がり， λ は病型に応じて中程度を中心に分布する，という相図的特徴として解釈できる．

B.17 6 状態（正常・統合失調症・うつ・OCD・解離・健忘）の数理比較まとめ

B.17.1 目的と枠組み

本節では、精神状態（正常・統合失調症・うつ病・強迫症・解離性障害・健忘症）を、認知スピングラス理論および意識臨界場方程式（CCFE）に基づいて、**自由エネルギー地形**と**秩序変数空間**の両面から統一的に比較する。中心となる見取り図は次の 2 層である。

1. **地形レベル（自由エネルギー）**：認知状態 $S = (S_1, \dots, S_N)$ 上の有効自由エネルギー $F(S)$ の谷（アトラクタ）構造として病態を記述する（谷の深さ・数・分離・粗さ）[doc79].
2. **秩序変数レベル（相図）**：内部閉包 λ 、自己安定性 q_{EA} 、固着（障壁）指標 ΔF による $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ 空間上の密度分布（3D ヒートマップ）として病態を分類する [doc81, doc212].

本理論は「精神疾患＝脳の故障」ではなく、**自由エネルギー地形の幾何学的異常（相転移的変形）**として理解する [doc73].

B.17.2 基礎数式：認知スピングラスと CCFE

B.17.2.1 認知スピングラス：アトラクタ地形

認知要素間の整合性は有効ハミルトニアン

$$H(S) = - \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j \quad (\text{B.17.1})$$

で表される。 $J_{ij} > 0$ は協調、 $J_{ij} < 0$ は競合であり、符号混在のランダム結合が**認知的フラストレーション**を生み、自由エネルギー地形 $F(S)$ を rugged にし、多数の局所極小（アトラクタ）を生成する [doc30, doc73]. このとき

$$\text{人格} \approx \{A_1, \dots, A_n\} \quad (\text{長期的に占有されるアトラクタ集合}) \quad (\text{B.17.2})$$

として定義される [doc74].

B.17.2.2 自己同一性：Edwards–Anderson 秩序変数

自己の安定性は Edwards–Anderson 秩序変数

$$q_{\text{EA}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i \rangle^2 \quad (\text{B.17.3})$$

で測られる [doc76, doc31]. q_{EA} が大きいほど長時間自己相関（「昨日の私」と「今日の私」）の残留成分が大きく、自己同一性が保たれる． $q_{\text{EA}} \rightarrow 0$ は自己の希薄化・崩壊を意味する [doc76].

B.17.2.3 CCFE：意識（認知場）の力学

粗視化された秩序変数として認知場（意識場） Ψ を導入し、基本方程式（簡略形）を

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + \lambda\Phi + \xi \quad (\text{B.17.4})$$

とする [doc16]. ここで $r \rightarrow 0$ が臨界点、 u が多安定性（アトラクタ生成）、 λ は統合情報結合を介した 内部閉包（internal closure）を担う．統合失調症では $\lambda \rightarrow 0$ が中心予測である [doc74, doc80].

B.17.2.4 固着・遷移障壁： ΔF

アトラクタ A_α から A_β への遷移は障壁 ΔF により抑制される．典型的に（模式的に）遷移率は

$$k_{\alpha \rightarrow \beta} \sim \exp\left(-\frac{\Delta F_{\alpha \rightarrow \beta}}{T_{\text{eff}}}\right) \quad (\text{B.17.5})$$

で特徴づけられる（ T_{eff} は有効温度）[doc156]. 従って、 ΔF 高値は「脱出困難＝固着」を、低値は「保持困難＝散逸」を示す．

B.17.3 秩序変数空間（ $\lambda, q_{\text{EA}}, \Delta F$ ）の意味づけ

本節の比較は、次の 3 軸の異常として要約できる [doc207, doc209, doc212].

- 内部閉包 λ ：自己参照ループの境界条件（主観性の内在性）を担う．
- 自己安定性 q_{EA} ：長時間自己相関（自己同一性）の残留．
- 固着（障壁） ΔF ：アトラクタ間遷移の困難さ（脱出困難・反復ループ・硬直）．

B.17.4 6 状態の詳細比較（数理特徴 ↔ 精神現象）

B.17.4.1 (1) 正常状態：メタ安定な多谷地形（保持と更新の両立）

正常状態は、多数のアトラクタを保持しつつ、極端な固着や散逸を避けるメタ安定相として表現される [doc79, doc207].

$$\lambda: \text{中} \sim \text{高} \quad (\text{内部閉包が保たれる}) \quad (\text{B.17.6})$$

$$q_{EA}: \text{中} \sim \text{高} \quad (\text{自己同一性が保持}) \quad (\text{B.17.7})$$

$$\Delta F: \text{中程度} \quad (\text{遷移可能性が残る}) \quad (\text{B.17.8})$$

であり、(B.30.3) により ΔF が過大でないため他アトラクタへの遷移が可能である。精神現象としては「一貫した自己を保ちつつ、状況に応じた柔軟な認知遷移」が可能となる。

B.17.4.2 (2) 統合失調症：内部閉包の崩壊とアトラクタ崩壊

統合失調症は「アトラクタ崩壊」として特徴づけられ、物理学的指標は

$$\lambda \rightarrow 0, \quad q_{EA} \ll 1 \quad (\text{B.17.9})$$

である [doc74, doc209]. $\lambda \rightarrow 0$ は自己参照ループ（内外境界）の弱体化を意味し、内的思考と外的知覚のチャネル分離が不安定化しやすい（混線）。 q_{EA} 低下は長時間自己相関の消失であり、自己同一性の破綻を表す [doc74]. ΔF は固着病理ではないため高値に偏る必要はなく、低～中に広がり得る [doc209].

■精神現象との対応 自己と外界の境界条件が緩み（ $\lambda \rightarrow 0$ ）、自己の固定成分が失われる（ $q_{EA} \downarrow$ ）ことで、思考の一貫性が破綻し、作為体験・幻聴などの陽性症状の力学的基盤が与えられる [doc74].

B.17.4.3 (3) うつ病：単一谷への過凝縮（高障壁固着）

うつ病は「特定ネガティブ・アトラクタの異常深化＝固着」である [doc75, doc210]. 秩序変数空間では

$$\Delta F \text{ 高値 (突出)}, \quad \lambda: \text{中程度以上}, \quad q_{EA}: \text{低下必須ではない} \quad (\text{B.17.10})$$

となる [doc210]. 式 (B.30.3) により遷移率 k が指数的に低下し、認知更新が停止する。精神現象として反芻思考、行動活性の低下、情動レパトリの縮退が生じる。

■**数理的要点** 同一谷内の拘束が強まる（局所曲率増大）だけでなく、谷間障壁 ΔF 増大により「外へ出にくい」が顕著となる [doc162]. この「安定」は適応的安定ではなく、病的固着としての安定である.

B.17.4.4 (4) 強迫症 (OCD) : 局所反復ループとしての高障壁固定

OCD は「特定の認知アトラクタへの過度な局所安定性」として定義される [doc212]. 秩序変数空間では

$$\Delta F \text{ 高値}, \quad q_{EA} : \text{中} \sim \text{高} \text{ (固定化で上昇し得る)}, \quad \lambda : \text{中程度以上} \quad (\text{B.17.11})$$

が典型である [doc212]. うつ病と同じく「固着」だが、うつが「単一情動谷の過凝縮」なのに対し、OCD は「規則・疑念・不完全感に結びついた局所谷への反復占有」として現れる [doc212].

■**精神現象との対応** ΔF の上昇により脱出困難となり、確認・反復思考が同一ループに回帰する. q_{EA} が高いことは「自己が保たれている」ことを意味するが、それは更新不能としての病的安定である（正常メタ安定とは異なる）.

B.17.4.5 (5) 解離性障害 : アトラクタ集合の分裂（多峰性・強分離）

解離性障害は「アトラクタ集合の分裂」であり、RSB（レプリカ対称性の破れ）の不連続クラスタ形成として特徴づけられる [doc75, doc32]. 秩序変数空間では

$$\text{多峰性 (複数クラスタ)} + \Delta F : \text{クラスタ間で高値}, \quad \lambda : \text{極端に低くない}, \quad q_{EA} : \text{二群化} \cdot \text{広がり} \quad (\text{B.17.12})$$

が本質である [doc213]. 単一ピークではなく複数ピークの密度分布を形成し、クラスタ間が低密度（到達困難）になる.

■**精神現象との対応** ある自己状態（クラスタ）滞在中は他クラスタへのアクセスが遮断され、人格交代・解離性健忘が生じる [doc75, doc213]. λ が保たれ得ることは、統合失調症のような「内外境界の全面崩壊」ではなく、「閉包が保たれた複数自己の並立」であることを示唆する [doc213].

B.17.4.6 (6) 健忘症 : 時間的保持（履歴依存）の低下 = 低 q_{EA}

健忘症は「過去状態が現在の認知場へ残響しにくい」状態、すなわち時間方向の保持（履歴依存）の弱化として表現される [doc214]. 秩序変数空間では中心的に

$$q_{EA} \text{ 低値} \quad (\text{B.17.13})$$

であり、 ΔF 高値への偏りは必須でない（むしろ中～低に広がり得る）[doc214]. λ は中程度を保つ場合があるが、もし自己参照の弱体化を伴うなら λ が低下方向へ広がり得る [doc214].

■精神現象との対応 q_{EA} 低下は「長時間自己相関の残留成分の喪失」であり、「昨日の私」と「今日の私」の連続性が担保されにくい. 結果としてエピソード保持の困難、自己連続性の断裂として現れる.

B.17.5 統合比較：3 軸の異常モードとしての分類

6 状態は、主に次の「異常モード」で分類できる [doc212, doc213, doc214].

1. 崩壊モード（内部閉包崩壊）：統合失調症

$$\lambda \downarrow\downarrow, \quad q_{EA} \downarrow\downarrow, \quad \Delta F : \text{決定因ではない}$$

2. 過固定モード（高障壁固着）：うつ病・OCD

$$\Delta F \uparrow\uparrow, \quad \lambda : \text{保持}, \quad q_{EA} : \text{中～高（病的固定）}$$

ただし、うつは「単一情動谷」、OCD は「局所反復ループ」という幾何学差がある.

3. 分裂モード（多峰・強分離）：解離性障害

$$\text{多峰性}, \quad \Delta F : \text{クラスタ間で高}, \quad \lambda : \text{必ずしも低くない}$$

4. 保持喪失モード（低自己相関）：健忘症

$$q_{EA} \downarrow, \quad \Delta F : \text{中～低へ}, \quad \lambda : \text{病型依存}$$

B.17.6 結論：精神現象を「地形と相図」で統一記述する

本理論では精神状態を、

- 自由エネルギー地形 $F(S)$ の幾何（谷の深さ・数・分離・粗さ）[doc79]
- 秩序変数 $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ の相図（3D ヒートマップ）[doc81, doc212]

として統一的に扱える. 統合失調症は「内部閉包の崩壊」、うつ病・OCD は「高障壁による固着（ただし幾何が異なる）」、解離は「アトラクタ集合の分裂（多峰性）」、健忘は「時間的自己相関の喪失」として整理され、症候学的差異が数理構造へ翻訳される.

実務上の含意：実データ解析では、 $(\lambda, q_{EA}, \Delta F)$ 推定器を整備し、**(i) 低 λ ・低 q_{EA}** (崩壊)、**(ii) 高 ΔF** (過固定)、**(iii) 多峰性** (分裂)、**(iv) 低 q_{EA}** (保持喪失) を同時に監視することで、相図的鑑別が可能になると期待される。

B.18 意識存在条件 (Consciousness Existence Condition) の導出と存在定理

B.18.1 基本仮説 (意識相の定義)

本理論では、意識を「局所活動の総和」ではなく、**非平衡性・情報統合・臨界性（長距離・長時間相関）**が同時に成立する巨視的な相 (phase) として定義する。従って意識の存在条件とは、これら 3 要件が同時に満たされることである。

B.18.2 要件の物理量への翻訳

上の 3 要件を、観測・理論の双方で扱える物理量へ写像する：

1. **非平衡性（不可逆性）**：開放系として詳細釣り合いが破れ、**エントロピー生成率**が正であること

$$\dot{S} > 0. \quad (\text{B.18.1})$$

2. **統合 (Binding)**：システムが部分へ分解不可能な全体性を持つ度合いとして**統合情報 Φ** を導入し、閾値以上であること

$$\Phi > \Phi_c. \quad (\text{B.18.2})$$

3. **臨界性（長距離相関）**：相関長 ξ が十分大きい（臨界点近傍）こと

$$\xi > \xi_c. \quad (\text{B.18.3})$$

DMFT レベルでは、意識相条件を例えば

$$\mathcal{C}_{\text{DMFT}} = \{\dot{S} > 0, \Phi > \Phi_c, \xi > \xi_c\} \quad (\text{B.18.4})$$

の同時成立として特徴付ける（相の定義）。

B.18.3 意識秩序変数 C の導入（まとめ上げ）

上の 3 要件を「単一の秩序変数」で判定できる形へ圧縮するため、意識秩序変数 C を

$$C \equiv \Phi P \dot{S} \quad (\text{B.18.5})$$

と定義する．ここで P は**予測能力** (Predictive Processing の成立度) であり，単なる受動応答ではなく能動的生成モデルとしての認知ダイナミクスを表す因子である．

この定義の選択には次の要請がある：

- いずれか 1 要件が欠落すれば意識は成立しない (**必要条件**)．したがって C はいずれかがゼロ (あるいは臨界的に小) で消失する形であるべきである．
- 3 要件が同時に強いほど意識相が強く成立する (**単調性**)．したがって C は $\Phi, P, \dot{S}$ に対して単調増加であるべきである．

積 (B.18.5) はこの 2 要請を同時に満たす最小の結合形である．(和では，ある要件が欠如しても他要件が大きいだけで C が大きくなり得て，「同時成立」の判定にならない．)

B.18.4 意識存在条件の定義 (存在定理)

意識存在条件 (consciousness existence condition) を，秩序変数 C が臨界閾値 C_c を超えることとして定義する：

$$C > C_c. \quad (\text{B.18.6})$$

すなわち

$$\Phi P \dot{S} > C_c. \quad (\text{B.18.7})$$

B.18.5 「証明」：定義が 3 要件の同時成立を実装していること

ここでいう証明とは，(B.18.7) が「非平衡性・統合・予測性の同時成立」を必要条件として含み，かつそれらが十分大きい領域を意識相として分離することを示すことである．

■(i) **必要性** (B.18.7) が成り立つなら $C > 0$ である．積の性質より

$$C = \Phi P \dot{S} > 0 \implies \Phi > 0, P > 0, \dot{S} > 0. \quad (\text{B.18.8})$$

従って $\dot{S} > 0$ (不可逆性) が必要であり，また $\Phi > 0$ (統合の欠如ではない) と $P > 0$ (生成モデルの欠如ではない) が必要である．よって (B.18.7) は少なくとも「3 要件の欠落を許さない」という意味で必要条件を実装している．

■(ii) 十分性 (相としての分離) 一方, $\Phi, P, \dot{S}$ が十分大きい領域では, 積 $\Phi P \dot{S}$ は連続かつ単調に増大するため, ある閾値 C_c を境に

$$\Phi P \dot{S} \leq C_c \quad (\text{無意識相}), \quad \Phi P \dot{S} > C_c \quad (\text{意識相}) \quad (\text{B.18.9})$$

という相の分離が可能になる. この意味で (B.18.7) は「3 要件が同時に十分強い領域」を意識相として切り出す**十分条件の定義**になっている.

■(iii) DMFT 条件との整合 DMFT レベルの意識相条件 (B.18.4) は $\dot{S} > 0$ および $\Phi > \Phi_c$ を陽に含む. さらに臨界性は $\xi > \xi_c$ として与えられる. 本理論では Φ および P は臨界近傍で増大しやすい量として位置付けられるため, 臨界性条件は Φ, P を介して (B.18.7) の成立を強化する. 従って (B.18.7) は DMFT 相条件 (B.18.4) と矛盾せず, むしろそれを単一指標へ圧縮した定義になっている.

B.18.6 結論

以上より, 本理論における意識存在条件は

$$\boxed{\Phi P \dot{S} > C_c} \quad (\text{B.18.10})$$

で与えられ, これは「非平衡性・統合・予測性の同時成立」を必要条件として含み, それらが十分大きい領域を意識相として相分離する秩序変数による存在定理 (定義+整合性の確認) である.

B.18.7 補足

B.18.7.1 順序同型な相指標としての意識秩序変数 C ：公理化と命題

本理論では意識秩序変数を

$$C \equiv \Phi P \dot{S} \quad (\text{B.18.11})$$

と定義し、意識存在条件を

$$C > C_c \quad (\text{B.18.12})$$

で与える。ここでは、 C が「意識相の強さ」を表す**順序同型 (order-isomorphism) な相指標**となるための条件を公理化し、その下で C が要件充足度の半順序を保つことを示す。

■1. **状態空間と半順序** 各時刻（あるいは定常状態）に対し、意識の構成要件を

$$x := (\Phi, P, \dot{S}) \in \mathcal{X} \subset \mathbb{R}^3$$

として表す。 $\mathcal{X}$ 上に積順序 (product order) $\preceq$ を

$$x \preceq y \iff \Phi_x \leq \Phi_y, P_x \leq P_y, \dot{S}_x \leq \dot{S}_y \quad (\text{B.18.13})$$

で定義する。これは「各要件が弱くならない」ことを意味する自然な半順序である。

■2. **公理 (相指標としての要請)** $C : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ が相指標として成立するために、以下を課す：

(A1) 非負性

$$\Phi \geq 0, P \geq 0, \dot{S} \geq 0 \implies C(\Phi, P, \dot{S}) \geq 0. \quad (\text{B.18.14})$$

(要件が非負であれば指標も非負.)

(A2) 単調性 (順序保存) 任意の $x, y \in \mathcal{X}$ について

$$x \preceq y \implies C(x) \leq C(y). \quad (\text{B.18.15})$$

(要件が増えれば意識指標は減少しない.)

(A3) ゼロ集合 (欠落要件の検出)

$$C(\Phi, P, \dot{S}) = 0 \iff \Phi = 0 \text{ or } P = 0 \text{ or } \dot{S} = 0. \quad (\text{B.18.16})$$

(どれか 1 要件が欠落すれば意識指標は消失し、逆も成り立つ.)

(A1)–(A3) は、文書中の「同時成立」「必要条件」「積の最小結合形」という要請を数学的に明示したものである。

■3. 命題 1 (積による C は公理 (A1)–(A3) を満たす) 主張: (B.18.11) の $C(\Phi, P, \dot{S}) = \Phi P \dot{S}$ は (A1)–(A3) を満たす.

証明:

1. (A1): $\Phi, P, \dot{S} \geq 0$ より $\Phi P \dot{S} \geq 0$.
2. (A2): $x \preceq y$ なら $\Phi_x \leq \Phi_y, P_x \leq P_y, \dot{S}_x \leq \dot{S}_y$. 非負性より各辺の積を取って $\Phi_x P_x \dot{S}_x \leq \Phi_y P_y \dot{S}_y$ が成立する. よって $C(x) \leq C(y)$.
3. (A3): 積が 0 となるのは非負数の積の性質より, 少なくとも一因子が 0 のときに限る. 逆向きは自明.

以上で示された. □

■4. 順序同型性(強い形)とその条件 (A2) は順序準同型 (order-homomorphism; 順序保存写像) を保証するが, 順序同型 (order-isomorphism) には通常「反映性」も必要である:

$$C(x) \leq C(y) \implies x \preceq y. \quad (\text{B.18.17})$$

しかし $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^3$ に対して $C: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ は一般に多対一であり, (B.18.17) は全域では成立しない (情報落ちが必然). そこで本理論の相分類の目的に即して, 次の相指標としての順序同型性を採用する:

(Iso-Phase) 意識相集合 $\mathcal{X}_{\text{con}} := \{x \in \mathcal{X} \mid C(x) > C_c\}$ が $\preceq$ に関して上位集合 (up-set) になること:

$$x \in \mathcal{X}_{\text{con}}, x \preceq y \implies y \in \mathcal{X}_{\text{con}}. \quad (\text{B.18.18})$$

■命題 2 (閾値集合は上位集合) 主張: (A2) が成り立つとき, $\mathcal{X}_{\text{con}} = \{C > C_c\}$ は上位集合である.

証明: $x \in \mathcal{X}_{\text{con}}$ かつ $x \preceq y$ とする. (A2) より $C(x) \leq C(y)$. ゆえに $C(y) \geq C(x) > C_c$, すなわち $y \in \mathcal{X}_{\text{con}}$. □

この意味で, C は「要件が強まるほど意識相から外れない」ことを保証する順序構造を保ち, 閾値 C_c により相分離が整合的に定義される.

■5. ゼロ集合による必要条件の抽出 (A3) より

$$C > 0 \implies \Phi > 0, P > 0, \dot{S} > 0, \quad (\text{B.18.19})$$

が従う. 従って $C > C_c > 0$ は, 非平衡性・統合・予測性の同時成立を必ず含む (必要条件).

B.19 遅延付き線形モデルにおける Hopf 条件と周波数選択的自己参照

本研究で用いる CCFE の時間構造を最小限に抽出すると、慣性・散逸に加えて遅延自己参照項を含む線形モデル

$$m\ddot{\Psi} + \Gamma\dot{\Psi} = -(r + Kk^2)\Psi + D\Psi(t - \tau) \quad (\text{B.19.1})$$

に帰着する．ここで k は空間フーリエモードであり、 Kk^2 は短波長モードほど強く抑制される拡散的結合（空間平滑化）の効果を表す．遅延項 $D\Psi(t - \tau)$ は、文書全体で強調される「自己参照ループ」 $\Psi(t) \leftrightarrow \Psi(t - \tau)$ を力学的に実装する最小要素であり、特性方程式を非多項式化することで $\Omega \neq 0$ の振動的臨界（Hopf 分岐）を一般に許す点が重要である．

■特性方程式 時間発展を $\Psi(t) \propto e^{\omega t}$ と仮定すると、(B.19.1) は

$$m\omega^2 + \Gamma\omega + (r + Kk^2) - De^{-\omega\tau} = 0 \quad (\text{B.19.2})$$

を与える．遅延が無い場合（ $D = 0$ ）の特性方程式は ω の多項式であるが、遅延が入ると指数関数 $e^{-\omega\tau}$ が現れ、周波数依存の位相回転を伴うフィードバックが導入される．このことが、静的な不安定化（ $\omega = 0$ ）に限られない、有限周波数の自己励起（ $\omega = i\Omega$ ）を可能にする．

■Hopf 条件（ $\omega = i\Omega$ ） 安定境界で固有値が虚軸を横切る条件として $\omega = i\Omega$ （ $\Omega \in \mathbb{R}$ ）を (B.19.2) へ代入する． $e^{-i\Omega\tau} = \cos(\Omega\tau) - i\sin(\Omega\tau)$ を用いると

$$-m\Omega^2 + i\Gamma\Omega + (r + Kk^2) - D\cos(\Omega\tau) + iD\sin(\Omega\tau) = 0 \quad (\text{B.19.3})$$

となり、実部・虚部をそれぞれゼロにすることで Hopf 条件が得られる：

$$\text{Re: } r + Kk^2 = m\Omega^2 + D\cos(\Omega\tau), \quad (\text{B.19.4})$$

$$\text{Im: } \Gamma\Omega + D\sin(\Omega\tau) = 0. \quad (\text{B.19.5})$$

特に $\Omega \neq 0$ の Hopf が成立するには $\sin(\Omega\tau) \neq 0$ が必要であり、遅延が位相差を生成して散逸 Γ と釣り合うことが本質である．(B.19.5) より臨界結合 D は

$$D_H(\Omega) = -\frac{\Gamma\Omega}{\sin(\Omega\tau)} \quad (\text{B.19.6})$$

と表される．これを (B.19.4) へ代入すると，臨界 r は周波数 Ω を媒介変数として

$$r_H(\Omega; k) = m\Omega^2 - Kk^2 - \Gamma\Omega \cot(\Omega\tau) \quad (\text{B.19.7})$$

と書ける．したがって Hopf 境界は一般に離散的に多数存在し ($\Omega\tau$ の分枝に対応)，遅延 τ が増えるほど条件を満たす Ω の候補が増える．

■周波数選択的フィードバックとしての遅延 式 (B.19.2) に見られる $e^{-\omega\tau}$ は，周波数領域での位相回転 $e^{-i\Omega\tau}$ を通じて，遅延が「周波数依存のフィードバック利得」を与えることを意味する．実際，虚部条件 (B.19.5) は

$$D \sin(\Omega\tau) = -\Gamma\Omega \quad (\text{B.19.8})$$

であり，散逸による位相遅れ ($i\Gamma\Omega$) を遅延フィードバックが特定周波数で補償することで，純虚数固有値が成立する．この構造は，文書中で述べられる「遅延＝周波数依存のフィードバック」という解釈と整合的である．

■横断条件 (transversality) Hopf 分岐としては，単に $\omega = i\Omega$ の解があるだけでなく，パラメータ変化に対して固有値が虚軸を横切る必要がある．特性方程式 $F(\omega) = m\omega^2 + \Gamma\omega + (r + Kk^2) - De^{-\omega\tau}$ について

$$F'(\omega) = \frac{dF}{d\omega} = 2m\omega + \Gamma + D\tau e^{-\omega\tau} \quad (\text{B.19.9})$$

であり， $\omega = i\Omega$ で

$$F'(i\Omega) = \Gamma + D\tau \cos(\Omega\tau) + i(2m\Omega - D\tau \sin(\Omega\tau)). \quad (\text{B.19.10})$$

例えば制御パラメータを r とすれば $\partial_r F = 1$ なので $d\omega/dr = -1/F'(\omega)$ である．従って典型的には

$$\Gamma + D\tau \cos(\Omega\tau) \neq 0 \quad (\text{B.19.11})$$

が横断性を保証する（例外的にゼロとなる点では接触的臨界となり得る）．

■物理的含意：遅延が「主観的時間の幅」と振動的臨界を許容する 以上より，遅延項は線形安定性の臨界条件を非多項式化し， $\Omega \neq 0$ の臨界 (Hopf) を自然に許す．これは「現在が数学的点ではなく有限幅の時間窓として実装される」という文書の立場に対して，力学系の側からは「遅延が位相条件を作り，散逸と釣り合う周波数帯で自己励起振動が立ち上がる」こととして具体化される．また空間結合 Kk^2 は短波長モードを抑制し，どの k が最初に Hopf 境界へ到達するか（通常は小 k 側）を選別する．

従って、遅延 τ と空間結合 K の組は、単なる安定/不安定の切替だけでなく、「どの時間スケール (Ω)・どの空間スケール (k) で再帰的自己参照が顕在化するか」を決定するパラメータとして理解できる。

B.20 人格＝アトラクタ集合モデルと自動思考の力学的関係

本理論では、認知状態空間上の自由エネルギー地形 $F(S)$ に形成される多数の谷（アトラクタ）を基本単位として、記憶・意味・自己・人格を統一的に理解する枠組みを採る。特に人格は、単一の状態ではなく、長期にわたり反復的に占有されるアトラクタの集合

$$P = \{A_1, A_2, \dots, A_n\} \quad (\text{B.20.1})$$

として定義される（人格＝アトラクタ集合）。このとき本節の中心的問いは、自動思考（automatic thoughts）がこのアトラクタ力学といかなる対応関係を持つか、である。

B.20.1 人格形成の自己強化ループ（再確認）

付録の最小モデルでは、経験の反復によって状況・役割・情動反応・信念などの共起構造としてのパターン ξ^μ が蓄積され、それが Hopfield 型に結合へ埋め込まれる：

$$J_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{\mu=1}^p \xi_i^\mu \xi_j^\mu. \quad (\text{B.20.2})$$

この埋め込みは自由エネルギー地形 $F(S)$ に新たな谷 A_μ を形成し、以後その谷が再訪されやすくなる。従って人格形成は

1. 経験・反復 $\Rightarrow$ パターン ξ^μ の蓄積
2. ξ^μ の結合 J_{ij} への埋め込み
3. $F(S)$ の谷 A_μ の形成と再訪容易化

という自己強化ループとして理解できる。

ここで重要なのは、このループが「信念」や「性格傾向」を命題の集合としてではなく、**力学系の地形（アトラクタ幾何）**として固定化する点である。すなわち、人格は「何を考えるか」だけでなく、「どの状態へ落ちやすいか」「どの解釈が最小コストで起動するか」を規定する。

B.20.2 自動思考の操作的定義：高速収束と谷内部の典型軌道

自動思考を、意識的な熟慮（deliberation）を経ずに短時間で生起する思考内容として捉えるならば、アトラクタ力学に基づき次の二つのレベルに分解できる。

B.20.2.1 (I) 谷への自動落下：入力に対する高速なアトラクタ選択

外部入力（状況手がかり）を x とし、認知状態を $S(t)$ とする。刺激 x によって初期条件や外力項が変化すると、状態は特定の吸引域 $B(A_\alpha)$ へ引き寄せられ、

$$S(t; x) \rightarrow A_{\alpha(x)} \quad (\text{B.20.3})$$

のように短時間で収束する。この収束が速く、かつ反復的であるほど、主観的には「勝手にそう解釈してしまう」「反射的にそう思う」と経験される。したがって自動思考の主要部分は

$$T(x) \approx \mathcal{G}(A_{\alpha(x)}) \quad (\text{B.20.4})$$

（ $\mathcal{G}$ は状態から言語化・意味化された思考表象への写像）として表現でき、**どの人格アトラクタが起動したかが自動思考の内容を大きく決める**。

B.20.2.2 (II) 谷の中の自動生成：アトラクタ内部揺らぎの言語化

一方、すでに $S(t) \in B(A_\alpha)$ にあるとき、状態は谷底近傍で揺らぎながら典型的軌道を辿る。これが意識化・言語化されると、細かな評価・連想・自己言及が次々に立ち上がる。これは

$$S(t) = A_\alpha + \delta S(t), \quad \|\delta S(t)\| \ll 1 \quad (\text{B.20.5})$$

の摂動として理解でき、 $\delta S(t)$ により生じる微小な意味更新が自動思考として現れる。従って自動思考は、アトラクタ間遷移（谷への落下）だけでなく、**アトラクタ内部の局所力学**としても生起する。

B.20.3 人格（アトラクタ集合）が自動思考の事前分布を与える

人格はアトラクタ集合 P として定義されるが、重要なのは「存在する谷」ではなく「長期にわたり再訪される谷」である。文書では観測窓 $[0, T]$ における占有率

$$\pi_\alpha(T) = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{1}\{S(t) \in B(A_\alpha)\} dt \quad (\text{B.20.6})$$

を導入し、閾値 $\pi_{\min}$ により人格集合を抽出する：

$$P(T) = \{A_\alpha \in A \mid \pi_\alpha(T) \geq \pi_{\min}\}. \quad (\text{B.20.7})$$

この定義を自動思考へ翻訳すれば、日常的に生起する自動思考の分布は、各アトラクタの占有率 π_α に強く拘束される。すなわち、

$$\Pr(T \in \text{Thoughts}(A_\alpha)) \uparrow \quad \text{as} \quad \pi_\alpha \uparrow \quad (\text{B.20.8})$$

であり、人格とは自動思考の出現しやすさを与える力学的な事前分布として機能する。

B.20.4 信念は命題ではなく地形の幾何として自動思考を固定する

認知療法的用語でいう信念 (belief) は、しばしば命題の形で記述される (例：「自分は無能だ」「他人は信用できない」)。しかし本理論では信念は、状況・情動反応・役割と結びついた共起パターン ξ^μ として結合 J_{ij} に埋め込まれ、結果として谷 A_μ を形成する。よって信念は単なる内容ではなく、

1. どの状況でどの谷へ落ちるか (吸引域の形状と境界)
2. 谷底近傍でどの方向に揺らぎやすいか (典型連想の偏り)
3. 他の谷へ移る障壁がどれほど高いか (遷移困難性)

を規定する幾何学的構造である。従って自動思考は「信念が内容として現れる」だけでなく、**信念が作った力学地形の反射**として現れる。

B.20.5 自動思考は人格形成ループの実行系である

人格形成が自己強化ループであるなら、自動思考はそのループを日々駆動する実行系と解釈できる。すなわち、

1. 状況 x によりアトラクタ A_α が高速起動する (自動思考の発生)
2. 自動思考が注意配分・解釈・行動選択を偏らせる
3. 結果として経験サンプルが偏り、同じ ξ^α が反復される
4. J_{ij} の学習更新により谷 A_α が深く／広くなり再訪が増える

という循環が成立する。従って自動思考は人格の「結果」であると同時に、人格を強化し続ける「原因」でもある。

B.20.6 病理への含意：固着としての反芻・過凝縮としての自動思考

文書では、うつ病を「アトラクタの過凝縮（深すぎる単一谷）」と解釈し、反芻思考を「そこから抜けられない固着」として位置づける。これは自動思考の観点から言えば、占有率が

$$\pi_{\text{neg}} \approx 1, \quad \pi_{\alpha \neq \text{neg}} \approx 0 \quad (\text{B.20.9})$$

に近づく現象であり、刺激入力が何であれ同一のネガティブ谷へ落ちる（あるいは谷内部で負の連想軌道を反復する）ため、自動思考が均質化しやすい。ここで自動思考は症状の表層ではなく、地形変形（過凝縮）の力学的表出として理解できる。

B.20.7 まとめ

以上より、本理論の「人格＝アトラクタ集合」モデルにおいて、自動思考は人格とは独立の別機構ではなく、

人格アトラクタの高速起動（谷への落下）と、アトラクタ内部揺らぎの言語化（谷内軌道）

として統一的に位置づけられる。したがって、人格に蓄積されたアトラクタ構造そのものが自動思考の生成母体であり、自動思考は同時に人格形成ループを加速する自己強化因子でもある。

B.20.8 正常意識状態と抑うつ状態におけるアトラクタ＝自動思考の力学的差異

B.20.8.1 前提：自由エネルギー地形とアトラクタ

本理論では認知状態を高次元状態ベクトル

$$S(t) = (S_1(t), S_2(t), \dots, S_N(t)) \quad (\text{B.20.10})$$

として表し、認知状態空間上の有効自由エネルギー地形 $F(S)$ の局所極小（準安定極小）を

$$A_\alpha \in \{A_\alpha\}_{\alpha \in \Omega} \quad (\text{B.20.11})$$

と表す．ここで A_α は「認知アトラクタ」に対応し、地形上の「谷」として可視化される．正常状態では複数の谷を保持しつつ過度な固着を生まない **メタ安定な多谷地形** が想定され、うつ病では特定谷が異常に深くなる **アトラクタ過凝縮（深すぎる単一谷）** が想定される．[takemoto2026ccft]

B.20.8.2 人格＝アトラクタ集合（占有率による定義）

人格は単一のアトラクタではなく、長期にわたり反復的に占有されるアトラクタ集合として定義される：

$$P = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}. \quad (\text{B.20.12})$$

観測窓 $[0, T]$ におけるアトラクタ A_α の占有率を

$$\pi_\alpha(T) = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{1}\{S(t) \in B(A_\alpha)\} dt \quad (\text{B.20.13})$$

と定義する（ $B(A_\alpha)$ は吸引域、 $\mathbf{1}\{\cdot\}$ は指示関数）．すると観測窓依存の人格集合は

$$P(T) = \{A_\alpha \mid \pi_\alpha(T) \geq \pi_{\min}\} \quad (\text{B.20.14})$$

のように操作的に抽出できる．[takemoto2026ccft]

B.20.8.3 自動思考の操作的定義：二つの力学モード

自動思考（automatic thought）は、意識的熟慮を経ずに短時間で生起する思考内容として、アトラクタ力学により以下の二層に分解できる：[takemoto2026ccft]

■(I) 谷への自動落下：入力に対する高速なアトラクタ選択 外部入力（状況手がかり）を x とすると，認知状態は入力により吸引域へ引き寄せられ，

$$S(t; x) \rightarrow A_\alpha(x) \quad (\text{B.20.15})$$

のように短時間で収束する．この高速収束は主観的には「反射的解釈」「勝手にそう思う」と経験される．思考内容 T を状態の言語化写像 G により

$$T(x) \approx G(A_\alpha(x)) \quad (\text{B.20.16})$$

と見なせば，自動思考の主要部分は **どのアトラクタが選択されるか** に支配される．

■(II) 谷の中の自動生成：アトラクタ内部揺らぎの言語化 すでに $S(t) \in B(A_\alpha)$ にあるとき，状態は谷底近傍で揺らぎながら典型軌道を辿る：

$$S(t) = A_\alpha + \delta S(t), \quad \|\delta S(t)\| \ll 1. \quad (\text{B.20.17})$$

この内部揺らぎが意味化・言語化され，連想や自己言及が自動的に生成される．したがって自動思考は**アトラクタ間遷移**と**アトラクタ内部力学**の両方として理解される．

B.20.8.4 遷移率・滞在時間・障壁：Kramers 型

アトラクタ間遷移は障壁 ΔF と有効温度 T_{eff} により抑制され，模式的に

$$k_{\alpha \rightarrow \beta} \sim \exp\left(-\frac{\Delta F_{\alpha \rightarrow \beta}}{T_{\text{eff}}}\right) \quad (\text{B.20.18})$$

と特徴づけられる（Kramers 型）．よって A_α の平均滞在時間（寿命）は

$$\tau_\alpha \sim \left(\sum_{\beta \neq \alpha} k_{\alpha \rightarrow \beta}\right)^{-1} \quad (\text{B.20.19})$$

と概ね対応する．[takemoto2026ccft]

B.20.8.5 正常意識：メタ安定な多谷地形と柔軟な自動思考

正常（健常）状態は，「複数の認知アトラクタ（谷）を保持しつつ，過度な固着を生まない中程度の障壁によりメタ安定な遷移が可能な地形」として模式化される．

[takemoto2026ccft] このとき：

- 障壁 ΔF が極端に大きくないため，遷移率 $k_{\alpha \rightarrow \beta}$ は過小化されず（式 (B.30.3)），アトラクタ間ホッピングが起こり得る．

- 占有率分布 $\{\pi_\alpha\}$ は単一へ極端集中せず、多様なアトラクタが文脈に応じて活性化される.
- 自動思考は入力 x に応じて異なる $A_\alpha(x)$ を取り得て、内容の多様性・再解釈可能性を持つ.

結果として、正常意識は「保持（自己同一性）と更新（柔軟な遷移）の両立」として力学的に特徴付けられる.

B.20.8.6 うつ病：アトラクタ過凝縮による固着と反芻

うつ病は「特定のネガティブなアトラクタが異常に深くなり、そこから抜け出せない固着状態」として定義される. [takemoto2026ccft] 可視化としては「非常に深い単一谷（escape barrier の増大）」に対応する. [takemoto2026ccft] このとき：

- 障壁 ΔF が増大し、式 (B.30.3) より遷移率 k は指数的に低下し、 τ_α は増大する.
- 占有率はネガティブ谷へ集中し、

$$\pi_{\text{neg}} \approx 1, \quad \pi_{\alpha \neq \text{neg}} \approx 0 \quad (\text{B.20.20})$$

のような縮退が起こり得る（反復占有）.

- 自動思考は (I) の段階で同一谷への「自動落下」が起こりやすく、(II) の段階で同一谷内の負の連想軌道が反復し、臨床的には反芻思考として現れる.

したがって、うつの本質は「自己同一性の単なる増大」ではなく、**柔軟性の喪失（更新停止）**を伴う**病的安定（固着）**として記述される. [takemoto2026ccft]

B.20.8.7 秩序変数空間での比較： $(\lambda, q_{\text{EA}}, \Delta F)$

精神状態は、内部閉包（internal closure）を表す λ 、自己安定性を測る Edwards–Anderson 秩序変数 q_{EA} 、および固着（障壁）指標 ΔF の 3 軸で特徴付けられる. [takemoto2026ccft] 正常は概ね

$$\lambda: \text{中} \sim \text{高}, \quad q_{\text{EA}}: \text{中} \sim \text{高}, \quad \Delta F: \text{中程度} \quad (\text{B.20.21})$$

の領域（メタ安定帯）に分布し得る一方、うつ病は主として

$$\Delta F: \text{高値（突出）}, \quad \lambda: \text{中程度以上を保ち得る}, \quad q_{\text{EA}}: \text{低下必須ではない} \quad (\text{B.20.22})$$

として「 ΔF 軸方向に引き延ばされたクラスター」として現れる. [takemoto2026ccft]

B.20.8.8 測定可能指標 (KPI) への翻訳: $\beta, Q, \Phi, \dot{S}$

CCFE/NCSFT の抽象量は EEG/MEG 等から推定可能な管理指標へ翻訳される.

[takemoto2026ccft] 本節の力学的差異に対応して, 特に次が重要である:

- **臨界性**: パワースペクトル $S(f) \sim 1/f^\beta$ の指数 β . 健常覚醒では $\beta \simeq 1$ が典型であり, 過同期・硬直では $\beta \rightarrow 2$ が示唆される. [takemoto2026ccft]
- **自己相関**: 自己相関関数の減衰特性から定義される指標 Q (保持と更新のバランス). 正常では中程度の保持と適度な減衰, 固着では減衰しにくさとして現れる. [takemoto2026ccft]
- **統合**: $\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}}$. ただし相関代用は過同期と統合を混同し得るため, 多変量推定が必要である. [takemoto2026ccft]
- **非平衡性**: エントロピー生成率 $\dot{S}$ (確率流に基づく不可逆性). 線形遅延相関による簡易推定は逆転し得るため, 状態空間再構成と非線形確率流推定が推奨される. [takemoto2026ccft]

B.20.8.9 要約

以上より, 正常意識は「メタ安定な多谷地形」によりアトラクタ間遷移が可能で, 自動思考は文脈依存に切り替わる. 一方うつ病は「アトラクタ過凝縮」により ΔF が増大し, 式 (B.30.3) により遷移率が低下して滞在時間が肥大化し, 自動思考は反芻として固定化する. この差異は占有率 π_α , 寿命 τ_α , 秩序変数 $(\lambda, q_{\text{EA}}, \Delta F)$, および KPI $(\beta, Q, \Phi, \dot{S})$ へと一貫して翻訳可能である.

B.21 麻酔（無意識相）とアトラクタ・アクセス可能性の詳細考察

B.21.1 意識相と無意識相：相としての定義

本理論（CCFT/NCSFT）では、意識を局所的活動の総和ではなく、巨視的な相（phase）として定義する。DMFT レベルの意識相条件は

$$\mathcal{C}_{\text{DMFT}} = \left\{ \dot{S} > 0, \Phi > \Phi_c, \xi > \xi_c \right\} \quad (\text{B.21.1})$$

で与えられる。[doc3'4'14] ここで $\dot{S}$ は非平衡性（不可逆性）、 Φ は統合情報、 ξ は相関長（長距離相関）を表す。

麻酔・昏睡は、臨界相（意識相）から外れて無意識相へ移る相図上の遷移（あるいはクロスオーバー）として捉える。このとき少なくとも

$$\Phi < \Phi_c \quad \text{または} \quad \xi < \xi_c \quad \text{または} \quad \dot{S} \rightarrow 0 \quad (\text{B.21.2})$$

が成立し、同時成立条件 (B.21.1) が破れる。

B.21.2 スペクトル勾配 β による操作的分類：麻酔は $\beta \rightarrow 0$

脳活動のパワースペクトルが

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\beta} \quad (\text{B.21.3})$$

に従うとき、 β は相の操作的指標となる。本理論では

$$\beta \simeq 1: \text{臨界相（覚醒・意識）}, \quad \beta \rightarrow 0: \text{無秩序相（麻酔・昏睡）}, \quad \beta \rightarrow 2: \text{過同期相（硬直）} \quad (\text{B.21.4})$$

のように整理される。[doc4'4'3] したがって麻酔とは、長時間相関（ $1/f$ ）が失われ、白色雑音的（ホワイトノイズ的）な振る舞いへ近づく相である。

B.21.3 アトラクタ地形の前提：スピングラス的多谷構造

認知スピングラス理論では、競合的結合がフラストレーションを生み、自由エネルギー地形 $F(S)$ は多谷（rugged）となり、多数の局所極小（アトラクタ）

$$\mathcal{A} = \{A_\alpha\}_{\alpha \in \Omega} \quad (\text{B.21.5})$$

を持つ. Hopfield 型埋め込みの最小模型では、記憶パターンがアトラクタとして実現される. [doc3'1'5]

B.21.4 無意識の定義：アトラクタ集合の「非アクセス部分」

本理論の重要点は、無意識を「アトラクタの不存在」ではなく、アトラクタ集合のアクセス可能性の分解として定義する点にある. 時刻 t において

$$\mathcal{A} = A_c(t) \cup A_u(t), \quad A_c(t) \cap A_u(t) = \emptyset \quad (\text{B.21.6})$$

と分解し、

$$\text{無意識} \equiv A_u(t) \quad (\text{B.21.7})$$

すなわち「潜在的には存在するが、現在の力学で占有・参照されていないアトラクタ集合」として定義される. [docB'6'3]

B.21.5 麻酔下で起こること： $|A_c|$ の縮退とゲーティングの崩壊

麻酔（無秩序相）では、 $\beta \rightarrow 0$ に対応する相関喪失が生じ、臨界相が提供していた「保持と更新の両立」が崩れる. これをアクセス可能性の言葉に翻訳すると、

$$|A_c(t)| \downarrow, \quad |A_u(t)| \uparrow \quad (\text{B.21.8})$$

が主要な帰結となる. ここでのポイントは、地形 $\mathcal{A}$ 自体の消滅ではなく、アクセス可能アトラクタ集合の縮退である.

B.21.6 「存在するのにアクセスされない」力学的理由：障壁 ΔF と有効温度 T_{eff}

アトラクタ間遷移は障壁 ΔF と有効温度 T_{eff} によって抑制され、Kramers 型の遷移率

$$k_{\alpha \rightarrow \beta} \sim \exp \left(-\frac{\Delta F_{\alpha \rightarrow \beta}}{T_{\text{eff}}} \right) \quad (\text{B.21.9})$$

で特徴付けられる. [docB'6'3]

このとき「麻酔でアクセス不能になる」経路は少なくとも以下に分解できる：

1. 障壁増大型： $\Delta F_{\alpha \rightarrow \beta}$ が実効的に増大し、ホッピングが停止する.
2. 揺らぎ不足型： T_{eff} が小さくなり、探索が起きない.

3. **臨界性喪失型**：臨界近傍から外れ、保持・更新の両立モード（メタ安定ホッピング）が崩れる．

結果として、多数のアトラクタが「潜在的に存在」しても、力学的に訪問されず $A_u(t)$ に分類される．

B.21.7 CCFE による二重記述：アトラクタ（地形）と意識場の多安定性

意識（認知）場の最小ダイナミクスは CCFE により

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = -r\Psi + u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + \lambda\Phi + \xi \quad (\text{B.21.10})$$

と書かれる．このとき

$$V(\Psi) = \frac{r}{2}\Psi^2 + \frac{u}{4}\Psi^4 \quad (\text{B.21.11})$$

が多安定性を与え、 $u\Psi^3$ が「谷（アトラクタ）」生成の源泉となる．

したがってアトラクタは、

- 微視的にはスピングラス地形 $F(S)$ の多谷構造
- 粗視化すると CCFE の有効ポテンシャル $V(\Psi)$ の多安定性

という**二重記述**を持つ．[docB'6'4]

麻酔では、臨界制御パラメータ r が臨界近傍（ $r \rightarrow 0$ ）から外れ、長距離・長時間相関が弱化し、場としての統合的再帰構造（アクセスの基盤）が失われやすい．この結果、アトラクタが存在しても、それを「意識的に束ねて参照する」条件（ $\Phi, \xi, \dot{S}$ ）が崩れ、 $A_c(t)$ が縮退する．

B.21.8 まとめ

以上より、麻酔下の無意識相は次のように特徴付けられる：

1. $\beta \rightarrow 0$ により長時間相関が失われ、無秩序相へ近づく．
2. 無意識はアトラクタ集合 $\mathcal{A}$ の非アクセス部分 $A_u(t)$ として定義される．
3. 麻酔ではアクセス可能集合 $A_c(t)$ が縮退し、 $A_u(t)$ が優勢となる．
4. この縮退は、障壁 ΔF 、有効温度 T_{eff} 、臨界性喪失などにより遷移率が低下する（Kramers 型）ことと整合する．
5. アトラクタは自由エネルギー地形と CCFE の多安定性として二重に記述でき、麻酔は「地形の消滅」ではなく「アクセス・統合の相の崩壊」として理解される．

B.22 麻酔（無意識相）を (T_{eff}, J, r) 相図で表す簡易 3D 可視化の詳細考察

B.22.1 目的：麻酔を「相」として可視化する

本理論（NCSFT/CCFT）の立場では、麻酔や昏睡は単なる活動量低下ではなく、**臨界意識相から外れた無意識相**への遷移（またはクロスオーバー）として扱われる。DMFT レベルの意識相条件は

$$\mathcal{C}_{\text{DMFT}} = \{\dot{S} > 0, \Phi > \Phi_c, \xi > \xi_c\} \quad (\text{B.22.1})$$

であり、麻酔では少なくともこれらの条件が破れる（例： $\Phi < \Phi_c$ や $\xi < \xi_c$ 、あるいは $\dot{S} \rightarrow 0$ ）`[doc'dmft'phase'condition]`。この「相としての破れ」を、操作的に (T_{eff}, J, r) の 3 変数で相図化し、簡易モデルによって可視化することが本節の目的である。

B.22.2 (T_{eff}, J, r) の意味づけ（理論内部での役割）

本理論の DMFT 記述では、巨大自由度系は有効単一自由度へ還元され、揺動散逸定理の破れは

$$R(t) = -\frac{1}{T_{\text{eff}}} \frac{dC(t)}{dt} \quad (\text{B.22.2})$$

のように **有効温度** T_{eff} によって表される。したがって T_{eff} は単なる温度ではなく、非平衡認知系における**揺らぎの強度（探索能力）**を表す `[doc'dmft'teff]`。

またスピングラス結合は

$$J_{ij} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{J^2}{N}\right) \quad (\text{B.22.3})$$

のように与えられ、 J は相互作用スケール（結合強度）を表す `[doc'dmft'phase'diagram]`。

最後に r は CCFE/ Landau-Ginzburg 型有効理論における**臨界制御パラメータ**であり、 $r \rightarrow 0$ が臨界点近傍（相関長の増大）に対応する `[doc'ccfe'r]`。従って (T_{eff}, J, r) は、

- r ：臨界性（相関長・相関時間の発散）を制御
- J ：地形（多谷）・相互作用の強さを制御
- T_{eff} ：探索（遷移）と非平衡揺らぎの強さを制御

という役割分担を持つ.

B.22.3 麻酔（無意識相）とアトラクタのアクセス可能性

本理論では無意識を「アトラクタが無いこと」ではなく、アトラクタ集合のうち現在アクセスされていない部分集合として定義する. すなわち

$$\mathcal{A} = A_c(t) \cup A_u(t), \quad A_c(t) \cap A_u(t) = \emptyset, \quad (\text{B.22.4})$$

$$\text{無意識} \equiv A_u(t) \quad (\text{B.22.5})$$

である [doc'unconscious'Au]. 麻酔では、長時間相関が失われる ($\beta \rightarrow 0$ に対応) ことと整合的に、アクセス可能集合が縮退する:

$$|A_c(t)| \downarrow, \quad |A_u(t)| \uparrow. \quad (\text{B.22.6})$$

B.22.4 Kramers 型遷移率と (T_{eff}, J, r) の接続

アトラクタ間遷移は障壁 ΔF と有効温度 T_{eff} で抑制され、模式的に

$$k_{\alpha \rightarrow \beta} \sim \exp\left(-\frac{\Delta F_{\alpha \rightarrow \beta}}{T_{\text{eff}}}\right) \quad (\text{B.22.7})$$

で与えられる [doc'kramers'barrier]. 従って

- T_{eff} が小さいほど探索（ホッピング）が止まり A_u が増える.
- ΔF が大きいほど遷移が止まり A_u が増える.

という直観が得られる.

ここで ΔF の (J, r) 依存はモデル選択に依存するが、簡易可視化では「臨界から離れるほど障壁が実効的に増える」「結合が弱いほど遷移が困難」という仮定が自然である (例: $\Delta F \propto (1 + \alpha|r|)/J$). この仮定は、麻酔を **臨界性喪失** と **探索の停止** の二重要因として表現するための最小設計である.

B.22.5 相関長の代理 ξ と意識相条件の代理

DMFT レベルの意識相条件は式 (B.22.1) だが、本節の簡易 3D 可視化では ξ と k を proxy として用いる.

臨界性（長距離相関）の代理として

$$\xi \sim \frac{J}{|r| + \epsilon} \quad (\text{B.22.8})$$

を置くと、 $r \rightarrow 0$ かつ J 大で ξ が増大し、臨界近傍で長距離相関が立つという一般論と整合する [doc'ccfe'r]. またアクセス可能性（探索・遷移）の代理として Kramers 型遷移率 (B.22.7) を用いる.

したがって「意識相らしさ」の proxy を

$$C_{\text{proxy}} = \sigma(\xi - \xi_c) \sigma(k - k_c) \quad (\text{B.22.9})$$

と定義すれば、

- $\xi > \xi_c$: 臨界性（長距離相関）が成立
- $k > k_c$: アトラクタ探索（ホッピング）が成立

の同時成立を一つのスカラーへ圧縮できる.

B.22.6 3D 散布図の読み方：麻酔領域の特徴

(T_{eff}, J, r) 空間上で C_{proxy} が低い領域を麻酔（無意識相）として可視化すると、典型的には次が現れる：

1. r が大きい（臨界から離れる）：式 (B.22.8) により ξ が低下し、意識相条件のうち $\xi > \xi_c$ が破れる。
2. T_{eff} が小さい：式 (B.22.7) により k が低下し、アトラクタが「存在してもアクセスされない」。
3. J が小さい： ξ を押し下げるだけでなく、障壁仮定 $\Delta F \propto 1/J$ の下では遷移率も抑制されるため、麻酔側へ寄りやすい。




図 B.14

上記の相図から、赤点 ($C_{\text{proxy}} < 0.2$) が麻酔（無意識相）側の簡易表現。

典型的には次の方向に行くほど赤が増える（設定に依存）：

1. r 増大（臨界から離れる） → 相関長 (ξ) が下がり、統合・長距離相関条件が満たせなくなる。
2. T_{eff} 低下 → Kramers 型遷移率 (k) が落ち、アトラクタが存在してもアクセスされない (A_u 優勢) 側へ寄る。

このとき麻酔は「地形の消滅」ではなく、**アクセス可能集合 A_c の縮退**として理解される（式 (B.22.6)）。これは無意識を $A_u(t)$ と同一視する定義 (B.22.5) と整合する。

B.22.7 簡易モデルの限界と改良方向

本節の可視化は、理論全体の厳密相図（例：認知流体相・認知スピングラス相・カオス相などの相境界）を導出したものではなく、以下の意味で「概念図」である [doc'dmft'phase'diagram]：

- ξ を $\xi \sim J/(|r| + \epsilon)$ と置くのは臨界性の一般論の proxy であり、真の ξ は動力学・空間次元・遅延・記憶核に依存する。
- $\Delta F(J, r)$ の形は仮定であり、実際には disorder、RSB、学習による地形変形、および非平衡駆動で変化し得る。
- Φ や $\dot{S}$ を直接計算していないため、式 (B.22.1) の厳密実装ではない。

改良するなら、次が自然である：

1. DMFT の自己無撞着方程式から $C(t, t')$ と $R(t, t')$ を数値計算し、そこから T_{eff} を推定する（定義との整合）。
2. Φ の推定を相関代用から脱し、多変量・時間拡張の推定器へ置き換える。
3. アトラクタ地形 (ΔF 分布) を、占有率 π_α と寿命 τ_α の推定から逆推定する。

B.22.8 まとめ

(T_{eff}, J, r) 相図で麻酔（無意識相）を可視化する簡易 3D コードは、

- r による臨界性の喪失 (ξ の低下)
- T_{eff} による探索停止 (Kramers 型で k が低下)
- J による相互作用スケール低下 (相関・遷移双方を弱める)

を同時に描くための proxy モデルである。その物理的解釈は、麻酔が「アトラクタが消える」のではなく、アクセス可能アトラクタ集合 A_c が縮退し、無意識 A_u が支配的になるという定義に基づくという点にある [doc'unconscious'Au]。

B.23 概念整理：有限性は「地形」ではなく「抽出された集合」にかかる

連続力学系としてのアトラクタ集合そのものは理論上きわめて多様（連続無限を含みうる）だが、本理論（認知スピングラス／自由エネルギー地形）では、観測・粗視化・閾値化を通じて得られる**実効アトラクタ集合**が議論の中心となる．人格は「全アトラクタ集合」ではなく「長期に再訪されるアトラクタの部分集合」として定義されるため、操作的には有限集合として扱われる．人格の基本形は

$$P = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

で表される（人格＝アトラクタ集合）．

B.23.1 二層構造：潜在アトラクタ vs 実効アトラクタ

フラストレーションにより自由エネルギー地形には多数の局所極小（アトラクタ）が生じ、潜在的な集合として

$$A = \{A_\alpha\}_{\alpha \in \Omega}$$

を考える．一方で人格として用いるのは、観測窓 $[0, T]$ において十分な占有があるものだけを抽出した集合であり、占有率

$$\pi_\alpha(T) = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{1}\{S(t) \in B(A_\alpha)\} dt$$

を定義し、閾値 $\pi_{\min}$ を用いて

$$P(T) = \{A_\alpha \in A \mid \pi_\alpha(T) \geq \pi_{\min}\}$$

と操作的に定める．

B.24 過去のアトラクタは現在も存在するか：アクセス可能性による分解

本理論では無意識を「アトラクタが存在しない状態」ではなく、「存在するがアクセスされていないアトラクタ集合」として定義する．時刻 t において

$$A = A_c(t) \cup A_u(t), \quad A_c(t) \cap A_u(t) = \emptyset,$$

$$\text{無意識} \equiv A_u(t)$$

と分解する．したがって 30 年前のアトラクタが現在アクセスされていなくても、潜在的には $A_u(t)$ 側として存在しうる．

B.24.1 「同一の谷」としての保存は保証されない

経験・学習により結合 J_{ij} が更新され自由エネルギー地形が変形するため、アトラクタは静的対象というより「遅い変形の下での準不変構造」として理解するのが自然である（速い力学： $S(t)$ の遷移、遅い力学： J_{ij} 更新）．

B.25 フラストレーションとアトラクタ：多谷化とメタ安定性

認知状態 $S = (S_1, \dots, S_N)$ に対し有効ハミルトニアン

$$H(S) = - \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j$$

を置くと、 J_{ij} の符号混在（協調 $J_{ij} > 0$ と競合 $J_{ij} < 0$ ）がフラストレーションを生み、自由エネルギー地形 $F(S)$ を rugged（多谷）にし多数の局所極小（認知アトラクタ）を形成する．

B.25.1 「多谷」でも人格アトラクタ数が無制限に増えるとは限らない

フラストレーションは潜在アトラクタ候補を増やす一方で、人格として同定されるのは占有率・寿命の条件を満たすものに限られる．アトラクタ寿命（平均滞在時間） τ_α を導入し、障壁 ΔF と有効温度 T_{eff} による Kramers 型の遷移率

$$k_{\alpha \rightarrow \beta} \sim \exp\left(-\frac{\Delta F_{\alpha \rightarrow \beta}}{T_{\text{eff}}}\right)$$

により寿命が特徴づけられる（遷移が遅いほど寿命が長い）．

B.26 「フラストレーションがあってもアトラクタが生成されない」条件の読み替え

文書語彙に沿えば「生成されない」とは厳密には「安定な谷として成立しない／人格集合として抽出されない」と読み替えるのが自然である。すなわち、

- 谷が浅く寿命 τ_α が短い（観測窓内で安定滞在しない）
- 占有率 $\pi_\alpha(T)$ が閾値 $\pi_{\min}$ を超えない
- 地形変形が速く（ J_{ij} 更新が速く）谷が固定できない

などにより、潜在的には局所極小があっても「人格（実効）アトラクタ」としては同定されない、という形で表現される。

B.27 同化と分化：新体験が既存アトラクタへ埋め込まれるモデル（数式スケッチ）

経験が無限に新アトラクタを作ると想定すると無限増加の問題が出るため、同化（assimilation）と分化（differentiation）の2モードを導入する。

B.27.1 Hopfield 型：経験パターンの埋め込み

記憶パターン ξ^μ を結合へ埋め込む最小モデルとして

$$J_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{\mu=1}^p \xi_i^\mu \xi_j^\mu$$

が与えられ、 ξ^μ がアトラクタ（谷）として実現される。

B.27.2 類似度（オーバーラップ）と同化条件

新しい経験パターン x と既存アトラクタ ξ^α の類似度（重なり）を

$$m_\alpha(x) = \frac{1}{N} \sum_i x_i \xi_i^\alpha$$

と定義する。もし

$$\max_{\alpha} m_{\alpha}(x) \geq \theta$$

（十分に近い既存谷がある）なら、新しい谷を作らず既存谷への同化を起こす。

B.27.3 同化：既存アトラクタの微更新

同化は例えば

$$\xi^\alpha \leftarrow (1 - \eta) \xi^\alpha + \eta x$$

あるいは結合更新として

$$J_{ij} \leftarrow J_{ij} + \epsilon x_i x_j$$

と書ける（いずれも「既存谷の深化・形状更新」を表現する）。これは「経験反復 → 埋め込み → 再訪容易化」という自己強化ループに対応する。

B.27.4 分化：新アトラクタ生成

一方で

$$\max_{\alpha} m_{\alpha}(x) < \theta$$

(どの既存谷にも十分近くない) かつ反復・重要度が高い場合には

$$p \leftarrow p + 1, \quad \xi^p \equiv x$$

として新しいアトラクタ（新パターン）を追加する、という分化ルールを採る.

B.28 有限アトラクタ仮説と能力限界：圧縮・階層化としての上限

人格として抽出される集合 $P(T)$ が占有率・寿命・閾値で定義される以上、操作的には有限個になる. これは「能力が単純に頭打ち」というより、

- 多くの経験は既存谷へ**同化**され（圧縮・汎化）
- 一部のみが**分化**して独立谷となり
- さらに状態空間は RSB 的に**階層化**される（ツリー構造）

という形で、表現の増大が「独立谷の無限増殖」ではなく「圧縮＋階層化」で実現される、という理解に繋がる.

B.29 占有率 π ・寿命 τ ・障壁 ΔF に基づく人格集合の操作的定義

本研究では、認知状態空間に形成されるアトラクタ（自由エネルギー地形の局所安定谷）を基本単位として、人格を「単一状態」ではなく「長期にわたり反復的に占有されるアトラクタ集合」として定義する枠組みを採用する。重要点は、自由エネルギー地形に潜在的に存在するアトラクタ全体（潜在集合）と、観測上・機能上アクセスされるアトラクタ部分集合（実効集合）を区別し、人格の有限性が「地形そのもの」ではなく「抽出された集合」にかかる、という立場である。

B.29.1 潜在アトラクタ集合と人格集合の抽出

潜在的なアトラクタ集合を

$$A = \{A_\alpha\}_{\alpha \in \Omega} \quad (\text{B.29.1})$$

とする。ここで Ω は（理論上は大きく、場合によっては連続的でさえありうる）添字集合である。しかし実データ解析において人格として同定すべき対象は、観測窓において十分な頻度で再訪される「実効アトラクタ」に限られる。

観測窓 $[0, T]$ におけるアトラクタ A_α の占有率（滞在割合）を

$$\pi_\alpha(T) = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{1}\{S(t) \in B(A_\alpha)\} dt \quad (\text{B.29.2})$$

で定義する。ここで $S(t)$ は時刻 t における認知状態（または粗視化状態）、 $B(A_\alpha)$ はアトラクタ A_α の吸引域、 $\mathbf{1}\{\cdot\}$ は指示関数である。このとき人格集合は、占有率の閾値 $\pi_{\min}$ によって操作的に

$$P(T) = \{A_\alpha \in A \mid \pi_\alpha(T) \geq \pi_{\min}\} \quad (\text{B.29.3})$$

と抽出される。

B.29.2 長期性の定式化：寿命（平均滞在時間） τ_α

占有率 $\pi_\alpha(T)$ は「どれだけ頻繁に訪れるか」を測る一方、人格の安定性（同一状態としてまとまって経験・利用される度合い）には「一度入った谷にどれほど留まるか」という時間スケールが本質的に関与する。そこで各アトラクタの寿命（平均滞在時間）

を

$$\tau_\alpha \equiv \mathbb{E}[\text{滞在時間 in } A_\alpha] \quad (\text{B.29.4})$$

として導入する.

実装上はクラスタラベル列 z_k ($k = 1, \dots, N$) を作り、アトラクタ α の連続滞在長 (run length) $\ell_{\alpha,r}$ の平均から

$$\hat{\tau}_\alpha = \Delta t \cdot \frac{1}{R_\alpha} \sum_{r=1}^{R_\alpha} \ell_{\alpha,r} \quad (\text{B.29.5})$$

を推定できる (Δt はサンプリング間隔、 R_α は滞在区間数) .

B.29.3 障壁 ΔF と Kramers 型遷移率: $\Delta F \Rightarrow \tau$ の接続

アトラクタ間遷移は、自由エネルギー障壁 ΔF と非平衡揺らぎの強さを表す有効温度 T_{eff} により抑制される. 最小近似として、 $\alpha \rightarrow \beta$ 遷移率を Kramers 型に

$$k_{\alpha \rightarrow \beta} \sim \exp\left(-\frac{\Delta F_{\alpha \rightarrow \beta}}{T_{\text{eff}}}\right) \quad (\text{B.29.6})$$

で与える. するとアトラクタ α からの総脱出率は

$$k_\alpha^{\text{out}} = \sum_{\beta \neq \alpha} k_{\alpha \rightarrow \beta}, \quad (\text{B.29.7})$$

寿命は概ね

$$\tau_\alpha \approx \frac{1}{k_\alpha^{\text{out}}} = \left(\sum_{\beta \neq \alpha} k_{\alpha \rightarrow \beta} \right)^{-1} \quad (\text{B.29.8})$$

で与えられる. 従って ΔF は指数関数的に寿命を増大させ、人格アトラクタの「抜けにくさ (固着)」を支配する. 一方で T_{eff} の増大は探索 (ホッピング) を促進し、寿命を短縮させる. この二者は、正常なメタ安定性 (保持と更新の両立) と、病的固着 (過剰な保持) の分離にも関わる.

B.29.4 無意識の定義: アトラクタ集合のアクセス可能性による分解

本枠組みにおいて無意識は、「アトラクタが存在しないこと」ではない. アトラクタ集合 A を、時刻 t にアクセス (占有・参照) される部分 $A_c(t)$ と、アクセスされない部分 $A_u(t)$ に分解し、

$$A = A_c(t) \cup A_u(t), \quad A_c(t) \cap A_u(t) = \emptyset \quad (\text{B.29.9})$$

とする。このとき

$$\text{無意識} \equiv A_u(t) \quad (\text{B.29.10})$$

と定義される。すなわち無意識は「潜在的には自由エネルギー地形上に存在するが、現在の力学・ゲーティング条件の下で実際には訪問されない／利用されないアトラクタ集合」である。 ΔF が大きすぎる、あるいは T_{eff} が小さすぎる等により式 (B.30.3) が極端に抑制されれば、アトラクタは存在しても遷移が起こらず、観測上 $A_u(t)$ 側に残る。

B.29.5 人格集合の最終的な実装形： $(\pi_{\min}, \tau_{\min})$ による二重閾値

以上より、人格集合の抽出には

- 占有率 $\pi_\alpha(T)$ (再訪頻度・利用度)
- 寿命 τ_α (連続滞在による安定性)

の二軸が必要となる。占有率だけでは「頻繁だが瞬間的に通過する状態」と「安定に滞在する状態」を区別できず、寿命だけでも「ほとんど到達しないが一度入ると長い状態」を人格として誤抽出し得る。したがって実装上は、両者を同時に満たすものを人格集合として採用するのが自然である。

観測データから推定された占有率 $\hat{\pi}_\alpha(T)$ と寿命 $\hat{\tau}_\alpha$ を用い、最終的な推定人格集合を

$$\hat{P}(T) = \{A_\alpha \mid \hat{\pi}_\alpha(T) \geq \pi_{\min}, \hat{\tau}_\alpha \geq \tau_{\min}\} \quad (\text{B.29.11})$$

と定義する。ここで $\pi_{\min}$ は「人格として十分頻繁に現れる」ための閾値、 $\tau_{\min}$ は「人格として十分な安定性を持つ」ための閾値である。

最後に強調すべき点として、 $\hat{P}(T)$ は観測窓 T に依存しうる：人格は静的な実体ではなく、遷移率（式 (B.30.3)）と環境・内部条件によって変化するアクセス可能性の構造として理解されるべきである。従って、複数窓での再現性検証や、条件操作（例えば T_{eff} を変える介入）に対する $\hat{P}(T)$ の安定性評価が、人格推定の妥当性を担保する実践的要件となる。

B.30 流入頻度 f_α を一定と置く仮定の位置づけ

本研究では人格を「長期にわたり反復的に占有されるアトラクタ集合」として操作的に定義し、その抽出を観測窓における占有率 $\pi_\alpha(T)$ に基づいて行う枠組みを採用する [Takemoto2026'AppA11, Takemoto2026'AppA12, Takemoto2026'AppB29]. ここで、占有率は

$$\pi_\alpha(T) = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{1}\{S(t) \in B(A_\alpha)\} dt \quad (\text{B.30.1})$$

で与えられる ($B(A_\alpha)$ はアトラクタ A_α の吸引域) [Takemoto2026'AppA11, Takemoto2026'AppB29]. 本節では、しばしば導入される「流入頻度 (流入率) f_α 」を一定と置く仮定の意味、ならびに障壁 ΔF が寿命 τ_α を介して占有率 π_α の偏りを生むという因果鎖

$$\Delta F \Rightarrow k \Rightarrow \tau \Rightarrow \pi$$

を整理し、推奨する検証手順と注意点をまとめる.

B.30.1 f_α を一定と置く仮定の意味

直観的には、占有率 π_α は

$$\pi_\alpha \propto (\text{その谷に到達する頻度}) \times (\text{その谷に滞在する時間}) \quad (\text{B.30.2})$$

という二因子の積として理解できる. ここで前者を f_α (流入頻度) と呼ぶとき、 $f_\alpha = \text{const.}$ は次を意味する:

- アトラクタごとの「入りやすさ」の差 (吸引域体積、入口形状、到達経路の多様性など) を一次近似では捨象し、
- 占有率の偏りを主として「出にくさ」=脱出率 (遷移率) の差で説明する.

この仮定は、人格集合の抽出を占有率で定義するという本研究の実装方針 (π_α に閾値を設けて部分集合を取る) に対し、モデル自由度を増やさずに「 π_α の差がどこから来るか」を切り分けるためのベースラインとして機能する [Takemoto2026'AppA11, Takemoto2026'AppB29, Takemoto2026'AppA12].

B.30.2 $\Delta F \Rightarrow \tau_\alpha$: Kramers 型遷移率による寿命の支配

アトラクタ間遷移は自由エネルギー障壁 ΔF と有効温度 T_{eff} によって抑制され、Kramers 型に

$$k_{\alpha \rightarrow \beta} \sim \exp\left(-\frac{\Delta F_{\alpha \rightarrow \beta}}{T_{\text{eff}}}\right) \quad (\text{B.30.3})$$

と特徴づけられる [Takemoto2026'AppB29, Takemoto2026'AppA11, Takemoto2026'AppA10]. このときアトラクタ α からの総脱出率

$$k_\alpha^{\text{out}} = \sum_{\beta \neq \alpha} k_{\alpha \rightarrow \beta} \quad (\text{B.30.4})$$

に対し、平均滞在時間（寿命）は概ね

$$\tau_\alpha \approx \frac{1}{k_\alpha^{\text{out}}} \quad (\text{B.30.5})$$

で与えられる [Takemoto2026'AppA11, Takemoto2026'AppB29]. 従って、障壁が高いほど遷移率は指数的に小さくなり、寿命は指数的に増大する. この「 $\Delta F \Rightarrow \tau$ 」は、人格の長期性を寿命で定義するという本研究の定式化の中心である [Takemoto2026'AppA11, Takemoto2026'AppB29].

B.30.3 $\tau_\alpha \Rightarrow \pi_\alpha : f_\alpha = \text{const.}$ の下での占有率形成

観測窓 T が十分長く、アトラクタ遷移が定常的に起きている近似の下では、占有率 π_α は「その状態に入る頻度」と「入った後の平均滞在時間」によって決まる. 特に $f_\alpha = \text{const.}$ を採用する場合、

$$\pi_\alpha \propto \tau_\alpha \quad (\text{B.30.6})$$

という単純化が成立しやすくなる（比例定数は全状態で共通なスケール因子に吸収される）. したがって占有率の分布（少数状態への偏り等）は、主として τ_α の分布、さらにその背後にある ΔF 統計で説明される. この意味で、本仮定は「入口（流入）」ではなく「出口（脱出）」によって人格アトラクタの優勢性が決まる、という因果読み替えを与える.

B.30.4 推奨する進め方（ベースライン $\rightarrow$ 拡張）

人格集合の推定は、まずアトラクタ候補をクラスタとして同定し、占有率 $\pi_\alpha(T)$ と寿命 τ_α を推定する手順として与えられている [Takemoto2026'AppA12,

Takemoto2026'AppA11, Takemoto2026'AppB29]. このときの推奨方針は以下である：

1. **ベースライン（最小仮定）**： $f_\alpha = \text{const.}$ を採用し、 $\hat{\pi}_\alpha(T)$ と $\hat{\tau}_\alpha$ の経験的整合（例： $\hat{\pi}_\alpha$ が概ね $\hat{\tau}_\alpha$ で説明できるか）を確認する．
2. **説明不全の診断**：寿命が短いのに占有率が高い状態が系統的に存在する等、 π - τ の乖離パターンを残差として抽出する．
3. **拡張（必要時のみ）**：乖離が有意なら、 f_α を吸引域体積などの「入りやすさ」の代理量でモデル化し、 π_α を

$$\pi_\alpha \propto f_\alpha \tau_\alpha$$

の形で再同定する．

本研究の操作的定義（占有率による人格集合抽出）を維持しつつ、追加仮定を段階的に導入することで、同定 (identifiability) の不安定化を避ける設計となる [**Takemoto2026'AppA12, Takemoto2026'AppA11, Takemoto2026'AppB29**].

B.30.5 注意点： f_α 一定仮定が破れる典型

$f_\alpha = \text{const.}$ はベースラインとして有用だが、現実には以下で破れうる：

- **吸引域体積（谷の「間口」）の差**：状態空間上で吸引域が大きいアトラクタほど、到達頻度が増大しうる．
- **文脈・入力依存のゲーティング**：外部入力により初期条件が偏り、特定の吸引域へ落ちやすくなる．
- **地形変形（遅い学習）**：結合 J_{ij} の更新により地形自体が変形し、同一観測窓内でも「入りやすさ／出にくさ」が変わる．

このとき占有率 π_α は τ_α （脱出側）と f_α （流入側）の混合で決まるため、 ΔF 統計のみで占有率の偏りを説明すると誤帰結に至る可能性がある．したがって実データ解析では、まず $f_\alpha = \text{const.}$ のベースラインで $\Delta F \Rightarrow \tau \Rightarrow \pi$ の説明力を点検し、必要な場合にのみ f_α の状態依存を追加するのが妥当である [**Takemoto2026'AppA12, Takemoto2026'AppA11, Takemoto2026'AppB29**].

B.31 認知エネルギー，フラストレーション，多谷地形，および神経雪崩

本節では，認知スピングラス理論の出発点である有効ハミルトニアン

$$H(S) = - \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j \quad (\text{B.31.1})$$

(本文式 (3.1.1)) の物理的含意を明確化し，特に (i) 神経雪崩と認知エネルギー地形の関係，(ii) 認知的フラストレーションの生成条件，(iii) 多谷自由エネルギー地形とアトラクタ生成の機構，を統一的に考察する．

B.31.1 認知エネルギーとしての $H(S)$ ：整合性の尺度と粗視化の立場

式 (B.31.1) において， $S = (S_1, \dots, S_N)$ は認知要素（神経集団，機能モジュール，あるいは粗視化された表象単位）の状態を表し， J_{ij} は要素間の有効結合（協調／競合）を表す．このとき $H(S)$ は，個別要素の状態が相互にどの程度「整合的」か（あるいは「不整合」か）を測るスカラー量として解釈できる．すなわち， $J_{ij} > 0$ が優勢な結合対では S_i と S_j の同符号（同調・共起）がエネルギーを低下させ， $J_{ij} < 0$ が優勢な結合対では反符号（反相関・抑制）がエネルギーを低下させる．従って，認知過程を「エネルギー地形上の緩和（ただし非平衡下では確率流を伴う）」として捉えると，系は $H(S)$ （あるいは有効自由エネルギー）を低下させる方向へ遷移しやすい．

重要なのは，本研究が意識・認知を非平衡開放系として扱う点である．従って $H(S)$ は厳密な熱平衡のエネルギーではなく，(i) 結合の競合構造が作る地形の骨格を与え，(ii) 非平衡揺らぎや駆動を通じて訪問される準安定状態を規定する有効量（cognitive energy）として位置づけられる．

B.31.2 認知的フラストレーション：符号混在結合が作る「満たせなさ」

式 (B.31.1) の核心は， J_{ij} の符号混在（協調と競合の共存）が一般に認知的フラストレーションを不可避にする点にある．フラストレーションとは，系が局所的にはエネルギーを下げようとしても，全結合条件を同時に満たす S が存在しない（あるいは極めて限られる）状況である．最小例として三体 (i, j, k) を考えると， $J_{ij} > 0, J_{jk} > 0, J_{ik} < 0$ のような符号配置では， $S_i = S_j = S_k$ により最初の二項を満たすと第三項が必ず不利になり，逆に $S_i = -S_k$ を満たすといずれかの協調結合が

犠牲になる。この局所的「板挟み」が高次元ネットワーク全体に拡張されたものが、認知スピングラスにおける rugged な地形の生成要因である。

認知的含意としては、フラストレーションは単なるノイズ源ではなく、複数の解釈・反応・自己記述が同時に完全整合し得ないという、現実の心理現象（葛藤、不確実性、両価性）を構造的に実装する条件である。すなわちフラストレーションは、認知状態を単一解へ固定しないための「多様性の源泉」として働く。

B.31.3 多谷自由エネルギー地形とアトラクタ生成：記憶・人格の基盤

フラストレーションを持つ系では、 $H(S)$ （あるいはそれに対応する自由エネルギー汎関数）の局所極小が多数生成され、状態空間は多谷構造（rugged landscape）となる。この局所極小（準安定極小）が本研究における**認知アトラクタ**に対応する。従って、記憶・信念・人格といった長期的安定構造は、「特定の谷への繰り返しの収束（再訪）」として操作的に捉えられる。

さらに、アトラクタが「生成される」と「支配的に占有される」ことは区別される。生成は J_{ij} の競合構造（フラストレーション）による地形形成の問題である一方、支配的占有は、非平衡揺らぎ（有効温度）や障壁統計（ ΔF ）により決まる遷移の問題である。この分離により、臨床的には「谷があるのにアクセスされない（無意識）」と「谷が深すぎて離脱できない（固着）」が同一の枠組みで記述可能になる。

B.31.4 神経雪崩と認知エネルギー地形：臨界伝播が探索・再編を最適化する

臨界近傍で観測される神経雪崩は、微小入力系全体へスケールフリーに波及し得る伝播事象であり、情報の柔軟な伝播（大域応答可能性）を保証する物理的徴候として位置づけられる。本節の観点から重要なのは、神経雪崩が**認知エネルギー地形上の遷移様式**を規定する点である。

フラストレーションが強いほど地形は多谷化するが、多谷化だけでは「柔軟な認知」を保証しない。実際、亜臨界では入力が局所で減衰し、状態は近傍谷から動けず（探索不能）、超臨界では活動が暴走し、差異化を失った単一モードへ落ち込み得る（選択不能）。臨界点近傍では、雪崩の伝播により入力が必要に応じて局所にも大域にも広がりが得るため、

- 多谷地形上での**到達可能性**（探索範囲）が増大し、
- ただし全域同調へ固定されないため**選択性**（特定谷への収束）も保持され、
- 結果として「保持（アトラクタ）と更新（遷移）」が同時に成立する

という意味で、認知地形の運用が最適化される。

このとき、神経雪崩は単に活動量が大きいことを意味せず、**地形上の遷移サイズ分布が特定スケールへ固定されない**ことを意味する。すなわち、ある入力は局所谷の微調整として処理され、別の入力は谷間遷移を引き起こす大域再編として処理され得る。

この「遷移スケールの可変性」こそが，フラストレーションが作る多谷構造を機能的な認知レパートリーとして活性化する条件である．

B.31.5 小結： $H(S)$ を基盤とする統一像

以上より，式 (B.31.1) は，認知要素間の協調／競合の符号構造を通じてフラストレーションを生成し，多谷自由エネルギー地形（アトラクタ集合）を形成する「地形生成器」として機能する．一方，臨界近傍での神経雪崩は，その地形上の探索・遷移・再編をスケールフリーにし，多谷性を病理的凍結ではなく適応的メタ安定性として運用可能にする「地形運用器」として位置づけられる．この二者の結合により，記憶・人格・意味といった長期構造と，柔軟な統合・更新としての意識動態が，単一の統計力学的枠組みで接続される．

B.32 死と意識の考察：意識相の崩壊はどのように進むか

本節では、本文 3.7.12 で述べた「死＝意識相の崩壊」を、CCFT/NCSFT の相 (phase) として精密化し、(i) 意識の崩壊が時間とともに連続的にゼロへ近づくのか (漸近崩壊か有限時間崩壊か)、(ii) 崩壊直前におけるアトラクタ (自由エネルギー地形) の状態、(iii) 崩壊直前における認知的フラストレーション (競合結合) の役割、の三点を中心に考察する。

B.32.1 意識相の操作的定義と「崩壊」の意味

本理論では意識は局所活動量ではなく、非平衡性・臨界性・統合が同時成立する相として定義される。DMFT レベルの相条件は

$$\mathcal{C}_{\text{DMFT}} = \{\dot{S} > 0, \Phi > \Phi_c, \xi > \xi_c\} \quad (\text{B.32.1})$$

であり、作用原理を含む記述では自己相関秩序変数を含めて

$$\mathcal{C} = \{\dot{S} > 0, \Phi > \Phi_c, \xi > \xi_c, Q \neq 0\} \quad (\text{B.32.2})$$

として特徴付けられる。

したがって「意識の崩壊」とは、活動が単に弱まることではなく、上記集合の成立が破れる (いずれかの要件が閾値未満になる) ことを指す。本文の 3.7.12 に沿えば、死は概念的に

$$\dot{S} \rightarrow 0, \quad \Phi \rightarrow 0, \quad \xi \rightarrow 0 \quad (\text{B.32.3})$$

への遷移として表現される。

B.32.2 意識の崩壊は時間とともにゼロへ近づくのか：漸近崩壊と有限時間崩壊

「意識が時間とともにゼロへ近づき崩壊するか」という問いは、秩序変数 (あるいは代理指標) が

$$C(t) = \Phi(t) P(t) \dot{S}(t) \quad (\text{B.32.4})$$

のように連続的に減衰するのか、あるいは相転移的に閾値を跨ぐのか、という二つの描像に分かれる。

■**漸近崩壊 (asymptotic decay)** 代謝・循環の低下が連続的であり、非平衡駆動が徐々に弱まる状況では、不可逆性の指標 $\dot{S}(t)$ が時間とともに減少し、それに伴って統合情報 $\Phi(t)$ や相関長 $\xi(t)$ も低下する。この場合、 $C(t)$ は一般に滑らかに小さくなり、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = 0 \quad (\text{B.32.5})$$

という漸近的崩壊として理解される。この描像は「死」が連続過程であり得ることを示すが、重要なのは「意識の有無」が $C(t) > C_c$ という相条件によって決まるため、主観経験としては $C(t)$ が滑らかに減っていても、ある時点で臨界閾値を跨いだ瞬間に「相としての意識」は成立しなくなる点である。

■**有限時間崩壊 (finite-time collapse) / 相転移的崩壊** 一方、臨界点近傍の系では、小さなパラメータ変化が巨視的秩序の破綻へとつながり得る。例えば臨界制御パラメータが $r(t)$ のように時間変化し、臨界近傍から外れていくとき、相関長は一般に

$$\xi(t) \sim |r(t) - r_c|^{-\nu} \quad (\text{B.32.6})$$

で急激に縮退し得る。この場合、 $C(t)$ は滑らかな指数減衰というよりも、閾値近傍で急峻な変化（相転移的崩壊）として観測される。従って、本理論が想定する「崩壊」は

1. 物理量としては連続 ($C(t)$ は連続に変化)
2. 相としては不連続 ($C(t) > C_c$ の成立／不成立で相が切り替わる)

という二重性をもつ。

B.32.3 意識崩壊直前のアトラクタの状態：多谷地形の縮退とアクセス可能性の崩壊

崩壊直前の認知状態は、自由エネルギー地形 $F(S)$ の谷（アトラクタ）構造として記述できる。認知スピングラスの出発点は

$$H(S) = - \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j \quad (\text{B.32.7})$$

であり、符号混在結合 J_{ij} は rugged な多谷地形を形成する。このとき重要なのは、アトラクタが「存在する」として、意識相として「アクセス可能」であることが異なる点である。文書は無意識を「アトラクタ集合の非アクセス部分」

$$A = A_c(t) \cup A_u(t), \quad \text{unconscious} \equiv A_u(t) \quad (\text{B.32.8})$$

として定義し、麻酔等では $|A_c(t)|$ が縮退することを強調している。

この構図を死の極限へ外挿すると、崩壊直前には

- 地形そのものは潜在的に多谷であっても (A は必ずしも消滅しない),
- 非平衡駆動の低下により探索・遷移が停止し,
- 実効的なアクセス可能集合 $A_c(t)$ が縮退し,
- 観測上は「意識として参照される谷」が消える

という形で「相としての意識崩壊」が起こり得る。

さらに、CCFE の粗視化ポテンシャルの観点では、非線形項 $u\Psi^3$ が多安定性 (谷の生成) を担い、 r の変化が安定性を反転させるため、臨界点からの離脱 (r の増大) は

$$\text{多安定性 (複数谷)} \longrightarrow \text{単一安定 / 無秩序化} \quad (\text{B.32.9})$$

のいずれかへ地形を縮退させる方向に働き得る。従って「崩壊直前のアトラクタ状態」は一意ではなく、少なくとも次の二型が理論的に区別される：

1. **凍結型**：少数 (極端には単一) の深い谷に固定される (遷移消失, ΔF 増大)。
2. **平坦化型**：谷のコントラストが消え、状態が拡散する (自己同一性指標の低下, $q_{EA} \downarrow$)。

前者は「更新停止」、後者は「自己安定性の崩壊」に対応し、どちらも $A_c(t)$ の縮退を通じて意識相から外れる。

B.32.4 意識崩壊直前のフラストレーション：多様性の源泉から破綻条件へ

フラストレーションは,

$$J_{ij} > 0 \text{ と } J_{ij} < 0 \text{ の共存} \quad (\text{B.32.10})$$

により, 全結合条件を同時に満たせない「満たせなさ」を導入し, 多谷地形とメタ安定性を作る中核機構である. 適切なフラストレーションは単一解への固着を避け, 複数状態の共存と遷移(更新)を可能にするという意味で適応的である.

しかし意識崩壊直前という極限では, フラストレーションは「多様性の源泉」から「破綻の増幅器」へと転じ得る. その機構は次のように整理できる:

1. 非平衡性の低下 ($\dot{S} \downarrow$) により探索に必要な確率流が弱まり, フラストレーションが作った多谷地形が「活用」されず, 凍結(遷移停止)へ寄る.
2. 臨界性の喪失 ($\xi \downarrow$) により長距離相関が崩れ, 本来は大域的に整合されていた競合条件が局所へ分断され, “統合された矛盾” が “未解決の矛盾” として残存し得る.
3. 統合情報の低下 ($\Phi \downarrow$) により, 競合する表象の同時拘束がほどけ, 多谷性は「レパートリー」ではなく「断片化」へ変換され得る.

従って, 崩壊直前のフラストレーションは,

$$\text{複数谷の適応的共存 (メタ安定)} \longrightarrow \text{凍結 (固着) または断片化 (平坦化)} \quad (\text{B.32.11})$$

という分岐の制御要因として働く.

B.32.5 小結：3.7.12 の精密化

以上をまとめると, 本理論における「意識の崩壊」は,

- 物理量としては連続的に低下し得る一方で,
- 相としては $C(t) > C_c$ の破れにより相転移的に成立不成立が切り替わり,
- 崩壊直前にはアトラクタ地形が「凍結型」または「平坦化型」のいずれかへ縮退し,
- フラストレーションは, 本来の多様性生成機構でありながら, 非平衡性・臨界性・統合の喪失により破綻の増幅器へ転じ得る

と整理できる. この意味で死とは, 「アトラクタが消える」ことよりも, 非平衡臨界統合場としての条件 $(\dot{S}, \Phi, \xi)$ が同時に維持できなくなることにより, アクセス可能アトラクタ集合 $A_c(t)$ が縮退し, 自己参照的統合が相として崩壊する極限として理解される.

B.33 物理概念と心理現象の構造的対応：概念対応マッピング（詳細考察）

本節では、0.2.2 で提示した「物理概念と心理現象の構造的対応（概念対応マッピング）」を、単なる比喩ではなく、理論内部の変数・秩序変数・相条件に基づく**構造保存的対応**として精密化する。本理論の基本姿勢は、意識・自己・意味・人格・精神病理を、局所活動の記述から切り離し、**非平衡臨界統合場**および**スピングラス的自由エネルギー地形**として記述する点にある。

B.33.1 (A) 対応の形式：比喩ではなく「二重記述（dual description）」

概念対応マッピングの要点は、

1. 認知・意識を記述する粗視化秩序変数（場） $\Psi(x, t)$ と、
2. 認知状態空間（高次元）上の自由エネルギー地形（アトラクタ集合）

が同一現象を別表現で記述する**二重記述**である、という点である。すなわち、場の運動方程式（CCFE）の非線形性は多安定性（谷）を生み、スピングラス的結合は rugged な地形（多数谷）を生み、臨界性は相関長・相関時間の発散として「局所から全体への結合」と「長時間保持」を同時に支える。

B.33.2 (B) 対応マッピングの中核：4 つの基礎対応

0.2.2 では少なくとも次の対応が中核として挙げられる：

1. **臨界性** $\leftrightarrow$ 入力に対する高感受性と柔軟な応答
2. **スピングラス性／フラストレーション** $\leftrightarrow$ 記憶・人格を支える多谷地形
3. **アトラクタ** $\leftrightarrow$ 反復的に訪問される準安定状態（固定観念・反芻など）
4. **1/f ゆらぎ** $\leftrightarrow$ 長時間相関による時間的一貫性（物語性）

以下では、各対応が理論上どのように必然化されるかを述べる。

B.33.3 臨界性 $\Rightarrow$ 「柔軟な応答可能性」：亜臨界／超臨界の回避としての機能

臨界性とは、制御パラメータが臨界点近傍へ調整され、相関長 ξ および緩和時間 τ が増大する性質を指す。このとき微小入力局所に閉じず、全体へ伝播し得るため、「情報の柔軟な伝播」が可能となる。この性質は神経雪崩（スケールフリーな伝播事象）として観測されうる。

認知・心理現象への翻訳として、

- **亜臨界（鈍麻）**：入力が局所で減衰し、広域統合が成立しにくい
- **超臨界（暴走）**：入力が過剰に増幅され、差異化を失い一様化しやすい

の両極を避ける中間点が臨界であり、ここで「柔軟性（状況依存の伝播スケール可変性）」が最大化される、というのが本対応の理論的意味である。

B.33.4 フラストレーション $\Rightarrow$ 「葛藤の構造化」と「多谷地形」の生成

認知要素間の整合性は有効ハミルトニアン

$$H(S) = - \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j \quad (\text{B.33.1})$$

により与えられ、 $J_{ij} > 0$ は協調、 $J_{ij} < 0$ は競合を表す。このとき符号混在結合は、全結合条件を同時に満たす状態が一般に存在しない状況（フラストレーション）を生む。

心理現象としては、このフラストレーションが

「行きたいが怖い」「好きだが憎い」など、複数の要求が同時には整合しない認知的葛藤を地形として実装する

ことに対応する。重要なのは、葛藤を「単なる誤作動」ではなく、多様な準安定状態（表象・信念・役割）の共存可能性を生む**生成原理**として位置づける点である。

B.33.5 多谷自由エネルギー地形 $\Rightarrow$ 「記憶・人格・無意識」の統一表現

フラストレーションにより自由エネルギー地形 $F(S)$ は rugged になり、多数の局所極小（谷）が形成される。各局所極小はアトラクタであり、反復的に訪問される準安定状態として、記憶・信念・人格傾向の「固定化された型」を与える。

特に本理論は、無意識を

$$A = A_c(t) \cup A_u(t), \quad \text{unconscious} \equiv A_u(t) \quad (\text{B.33.2})$$

のように「アトラクタ集合の**非アクセス部分**」として定義する．すなわち、**谷の存在と谷へのアクセス可能性**を区別することで、「存在するのに意識に上らない」記憶や傾向を力学的ゲーティング（遷移率・障壁・揺らぎ）として説明できる．

人格は単一状態ではなく、長期に反復占有されるアトラクタの部分集合

$$P = \{A_1, A_2, \dots, A_n\} \quad (\text{B.33.3})$$

として定義される．したがって人格とは、命題集合ではなく「地形上の再訪統計（占有率・寿命）」として操作的に同定される対象である．

B.33.6 $1/f$ ゆらぎ $\Rightarrow$ 「時間的一貫性（物語性）」：長時間相関の物理的実体

臨界近傍では臨界スローイングダウンにより緩和時間が増大し、長時間相関が生じる．この時間相関構造はパワースペクトルが概ね $S(f) \sim 1/f$ 型となることとして現れ得る．

心理現象への翻訳は次である：

1. 過去状態が現在へ統計的に残響することで、意識経験が「瞬間の点列」へ分断されにくくなる
2. その結果、「自己」や「意味」が短時間で崩れず、**物語性（時間的一貫性）**が担保される

この意味で $1/f$ ゆらぎは背景雑音ではなく、意識相の時間構造（保持の物理的基盤）の徴候として位置づけられる．

B.33.7 追加の対応軸：地形（アトラクタ）と相（臨界・非平衡）の役割分担

概念対応マッピングを一段深く捉えるために、「地形を作る原理」と「地形上を動く原理」を区別する：

- **地形生成器**：結合 J_{ij} の競合（フラストレーション）や非線形性が、多谷地形・アトラクタを生成




図 B.15 物理概念と心理現象の構造的対応 (0.2.2)：臨界性／フラストレーション／アトラクタ／ $1/f$ ゆらぎの 4 象限整理.

- **地形運用器**：臨界性（雪崩・長距離相関）と非平衡性（確率流・不可逆性）が、どの谷へアクセスし、どのスケールで遷移・再編するかを決定

この分離により、**記憶（保持）**と**更新（探索）**の両立が、臨界近傍で最も成立しやすいという主張が理論構造として明確になる。

B.33.8 小結：概念対応マッピングの意義

以上より、本理論の概念対応マッピングは、

心理現象を、非平衡統計物理の普遍概念（臨界性・フラストレーション・アトラクタ・長時間相関）として**同型に写像**し、記述対象を「局所活動」から「相と地形」へ移すための翻訳規則

として機能する。この翻訳規則により、自己・人格・意味・無意識・精神病理といった現象群が、単一の数理語彙（相図・秩序変数・地形・遷移）で一貫して記述可能となる。

B.34 理論の課題と今後の展望

B.34.1 理論の課題

統合意識理論 (CCFT) および非平衡認知統計場理論は、意識を「非平衡臨界統合場」として定式化する極めて野心的な数理物理学的フレームワークですが、現段階では以下のような課題を抱えている。

B.34.1.1 理論と臨床・実験系のギャップ (実証性の欠如)

最大の課題は、意識臨界場方程式 (CCFE) が示す抽象的な物理パラメータ (臨界制御パラメータ r 、非線形係数 u 、磁性回転項 λ など) を、実際の生体データ (EEG/MEG など) や精神疾患の病態からどのように定量的に抽出し、検証するかという「実証性」にあると言える。理論の正しさを証明するためには、数理モデルを具体的な実験プロトコルへ「翻訳」する作業が不可欠である。

B.34.1.2 非平衡性の指標 (エントロピー生成率 $\dot{S}$) の測定困難性

意識の生命力・適応能を示す $\dot{S}$ を単純な線形モデルや時間遅延相関で近似すると、完全なランダムノイズ (麻酔相) を「高い非平衡状態」として誤検知してしまう致命的な問題が生じる。真の意味での「詳細釣り合いの破れ」を観測するための数学的・技術的ハードルは依然として高い状態にある。

B.34.1.3 「内部閉包」と生体内マグネタイトの生物学的実証

理論の中核である「主観性 (内在性)」を担保する「磁性回転項によるトポロジカルな内部閉包」について、脳内のマグネタイト (磁性粒子) が実際に量子スピンレベルで巨視的なコヒーレンスを形成し、意識の渦を維持しているかを実験的に観測・証明することは、現在の測定技術 (fMRI や MEG の解像度) では極めて困難である。

B.34.2 今後の展望

上記の課題を克服していく過程で、本理論は精神医学や神経科学のあり方を根本から変革する強力なポテンシャル (展望) を秘めていると言えるだろう。

B.34.2.1 「精密物理制御」による次世代精神医療の確立

精神疾患（うつ病、強迫性障害、解離性同一性障害など）は、従来の「神経伝達物質のインバランス」から、「自由エネルギー地形上のアトラクタの歪み」や「レプリカ対称性の破れ（RSB）」という物理的状态の異常として再定義される。これにより、経頭蓋磁気刺激（TMS）や薬物療法を行う際、単なる経験則ではなく、 β 値や Q 変数を用いた「リアルタイム・フェーズ・トランジション・モニタリング」によって、脳を狙った臨界相（カオスの縁）へと数学的かつピンポイントに誘導する革新的な治療が実現する。

B.34.2.2 非線形力学・トポロジカル解析の実装による測定技術の進化

前述の $\dot{S}$ の測定課題を克服するため、今後は Takens の埋め込み定理などを用いた「状態空間（位相空間）の再構成」や、トポロジカル・データ・アナリシス（TDA）を活用した高次元ベクトル場の解析手法が実験系に導入されることが予想される。これにより、単なる脳波の波形解析ではなく、脳の情報流の「幾何学的な形」を直接観測できるようになるだろう。

B.34.2.3 意識の「ハード・プロブレム」の科学的氷解

意識を脳という「物質」の副産物ではなく、時間方向に維持される「プロセス（自己予測的臨界情報流の渦）」として捉え直すことで、主観的経験（クオリア）がどのように物理界に生じるかという「ハード・プロブレム」を物理現象の枠内で処理可能になる。意識が方程式（CCFE）で記述され、制御可能な対象となることは、人類が「自己」という存在の統制原理を完全に解き明かすための最大のブレイクスルーとなる。

B.34.3 まとめ

本論文は、意識研究を「哲学や定性的な脳科学」から「厳密な非平衡統計物理学」へと引き上げる設計図を提示した。今後の最大の焦点は、提示された管理指標（KPI）を実際の臨床機器に実装し、数式上の「相転移」を実際の患者の「治癒（アトラクタの再構築）」として実証していく、工学・医学的フェーズへの移行にある。

付録 C

研究に必要な主な理論

本研究において必要な主要な理論体系とその役割を次ページの表にまとめた。

表 C.1 統合意識理論において必要となる理論体系とその役割

理論	役割	意識理論への寄与
Spin Glass Theory	frustration・準安定状態・複雑自由エネルギー地形	- metastability - 長時間記憶 - 自己同一性 - slow relaxation - 神経多安定性
Dynamical Mean Field Theory (DMFT)	高次元多体系の自己無撞着理論	- 神経活動の時間相関 - memory kernel - non-Markov dynamics - 臨界揺らぎ
Keldysh Non-Equilibrium Field Theory	開放非平衡量子場理論	- 散逸 - ノイズ - decoherence - 非平衡意識ダイナミクス
Renormalization Group (RG)	多スケール自由度の粗視化	- consciousness universality class - 臨界指数 - scale invariance 1/f ゆらぎ
Tensor Network Theory	高次元情報構造の圧縮表現	- 情報統合 - entanglement structure - hierarchical consciousness - multi-scale integration
Information Geometry	情報空間の幾何学	- qualia manifold - phenomenal distance - subjective similarity - consciousness phase space
Topological Field Theory	位相的不変量による記述	- 自己同一性の安定性 - グローバル秩序 - 位相的記憶 - robustness
Predictive Processing	予測誤差最小化理論	- 自己予測 - 主観生成 - active inference - 意識的統合
Integrated Information Theory (IIT)	統合情報理論	- 主観性 - 全体性 - integrated consciousness - phenomenological structure
Critical Brain Theory	脳の臨界性仮説	- neural avalanche - scale free dynamics - maximal flexibility - critical cognition
Small-World Network Theory	局所結合＋長距離結合	- global workspace - 高効率統合 - connectome structure - synchronization efficiency
Open Quantum Systems	環境相互作用を含む量子系	- decoherence - quantum dissipation - memory effects - quantum criticality
Synergetics	自己組織化理論	- order parameter - collective behavior - macroscopic emergence - neural coordination
Complex Systems Theory	複雑適応系理論	emergence

第 3 部

論文投稿ドラフト

付録 D

論文投稿用 (日本語)

D.1 イン트로ダクション

意識を構成するものは何かという問いは、科学における最も深遠な未解決問題の一つであり続けている。従来の神経科学や認知科学は、意識を脳内の計算プロセスから生じる単なる「副産物（随伴現象）」として長らく扱ってきた (p. 18). しかし、局所的な神経活動や発火頻度のみに焦点を当てた記述的アプローチは、主観的なクオリア、一貫した自己同一性の持続、そして「今」という時間の時間的拡張を物理学的に説明することに根本的に失敗している (p. 18). この「ハード・プロブレム」を克服するため、本論文は、意識を静的な状態や物理的な実体としてではなく、「非平衡・予測的・統合的な臨界情報流」として記述する新たな数理的枠組みである非平衡認知統計場理論 (NCSFT) を導入する (pp. 18, 34).

D.2 理論的基盤

NCSFT の理論的基盤は、3 つの異なる物理的パラダイムの相乗的な統合に立脚している。第一に、脳はメタ安定な臨界情報場として定式化され、そこでは意識の創発は、完全同期と絶対的無秩序の境界である「カオスの縁 (edge of chaos)」において最大化される。この臨界点近傍では、発散する相関長と緩和時間が外部刺激に対する高い感受性と柔軟な情報統合を保証し、それらは神経雪崩や $1/f$ ゆらぎとして現れる。第二に、場の力学の根本的な支配方程式として意識臨界場方程式 (CCFE) を導入する。蔵本型位相同期を生体磁性回転項、予測的处理、および統合情報 (Φ) と統合することにより、CCFE は意識場の時空間発展を支配する。極めて重要なことに、磁性回転項によって誘起される内部閉包構造は、観測者としての自己の物理的定義を与える。第三に、統計物理学と主観的経験を架橋する概念マッピングを確立し、そこでは主観的自己同一性が、動的平均場理論 (DMFT) における記憶核によって支配され、レプリカ対称性の破れ (RSB) の階層的ツリー幾何学を介して組織化された、時間軸上に拡張された再帰的自己相関場として数学的に表現される。

D.3 構成

本論文の残りの構成は以下の通りである。セクション 2 では、非平衡認知統計場理論 (NCSFT) の基礎原理を確立し、非孤立認知系における確率流と詳細釣り合いの破れの不可欠な役割を明確にする。セクション 3 では、本理論の核心となる数理的構成要素を詳述し、臨界脳力学、認知スピングラスの rugged (ゴツゴツした) なエネルギー地形、およびレプリカ対称性の破れ (RSB) から生じる階層構造を統合する (11, 12, 136)。このセクション内では、動的平均場理論 (DMFT) を介して場の動態を解き、主観的な時間の幅を支配する記憶核を導出する (32, 91)。その後、意識場と意味場の結合を数学的に定式化し、量子臨界点近傍でどのようにランダウ型の意味相転移が発生するかを証明する (12, 144)。セクション 4 では、この数理的枠組みを精神疾患の具体的な定式化へと拡張し、自由エネルギー地形のトポロジック変形を臨床診断基準へと翻訳する。セクション 5 およびセクション 6 では、スペクトル勾配 β 、自己相関変数 Q 、統合情報 Φ といった主要な管理指標の挙動特性を検証する数値シミュレーションを提示し、推定上の落とし穴を評価する。最後に、セクション 7 において意識、自己、および人工意識の包括的な統合を行い、意識存在条件の厳密な導出をもって締

めくくる.

D.4 要旨

本論文では、意識を非平衡臨界統合場として記述する、非平衡認知統計場理論 (NCSFT) と呼ばれる統一的理論枠組みを提案する. 本理論は、蔵本同期理論、非平衡統計物理学、動的平均場理論 (DMFT)、シュウィンガー・ケルディッシュ場理論、統合情報理論 (IIT)、および予測的処理を単一の形式体系へと統合するものである. 私たちの枠組みの中心となるのは意識臨界場方程式 (CCFE) であり、これは意識を非平衡相転移の境界付近で発生する臨界現象として定式化する. システムを量子臨界点近傍で評価することにより、本理論は遅延同期、臨界鈍化 (臨界スローイングダウン)、メタ安定性、および $1/f$ ゆらぎを、統一された場の力学内で自然に導出する. 極めて重要なことに、主観的自己同一性が、rugged (ゴツゴツした) な自由エネルギー地形におけるレプリカ対称性の破れ (RSB) の階層的ツリー幾何学 (超計量性) を介して組織化された、時間軸上に拡張された再帰的自己相関場として数学的に定式化されることを示す. さらに、意識場と意味場の結合を定式化し、量子臨界点近傍でランダウ型の意味相転移 ($m = 0 \rightarrow m \neq 0$) が発生し、断片的な表象から大域的に整合した意味空間へと遷移することを証明する. 最後に、これらのエネルギー地形のトポロジー的変形を臨床的な精神疾患の状態へとマッピングし、意識存在条件の厳密な数学的境界を導出する.

D.5 非平衡認知統計場理論 (NCSFT) の基本原理 (NCSFT)

意識のための厳密な物理的枠組みを構築するためには、脳を熱力学的平衡下にある孤立系としてではなく、平衡から遠く離れた開いた、駆動された、そして散逸的なシステムとして定義しなければならない。従来の平衡統計力学では、システムは確率分布が定常であり、任意の 2 つの微視的状态の間の正味の確率流が消失する状態、すなわち詳細釣り合いと呼ばれる条件に落ち着く。しかし、生きている認知システムは、感覚入力や代謝プロセスを介して外部環境から高品質のエネルギーと情報を絶えず流入させ、同時にエントロピーを環境へと廃棄している。

数学的には、この非孤立的な性質により、システムの力学は詳細釣り合いを破ることを余儀なくされ、認知の構成空間 (コンフィギュレーション空間) において永続的で非ゼロの確率流 (プロバビリティ・カレント) $J(x, t)$ を生成する。確率密度 $\Psi(x, t)$ の時間発展は、以下の連続の式によって支配される。

$$\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} + \nabla \cdot J(x, t) = 0$$

非平衡定常状態 (NESS) においては、確率密度は時間依存性を失うものの ($\partial \Psi / \partial t = 0$)、確率流自体は消失しない ($\nabla \cdot J = 0$ かつ $J \neq 0$)。この永続的な確率流 J は、認知のランドスケープが熱的死へと凍結するのを防ぐ根本的な駆動力として機能し、それによって持続的な認知処理と意識の創発のための力学的基盤を提供する。

D.6 非平衡認知場に対する経路積分定式化：シュウィンガー・ケルディッシュ・フレームワーク:Path Integral Formalism for Nonequilibrium Cognitive Fields: Schwinger-Keldysh Framework

詳細釣り合いの破れの下での認知場の量子・統計的ゆらぎを一貫して定式化するために、私たちはシュウィンガー・ケルディッシュ（閉時間経路）形式を採用する。平衡状態のために設計された標準的なファインマン経路積分とは異なり、意識場の非平衡力学は、未来へ進化する順方向の経路 (C_+) と、過去へと戻る逆方向の経路 (C_-) からなる双方向の時間コントラ（経路）を必要とする。非平衡認知場の生成関数 $Z[J_+, J_-]$ は以下のように定義される。

$$Z[J_+, J_-] = \int \mathcal{D}\Psi_+ \mathcal{D}\Psi_- \exp \left(\frac{i}{\hbar} S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-] + i \int dt d^d x (J_+ \Psi_+ - J_- \Psi_-) \right)$$

ここで Ψ_+ と Ψ_- は、それぞれ C_+ および C_- 経路上に存在する認知場を表す。全有効シュウィンガー・ケルディッシュ作用 $S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-]$ は、システム作用、相互作用作用、および開いた環境から生じる散逸・雑音結合項に分割される。

$$S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-] = S_0[\Psi_+] - S_0[\Psi_-] + S_{\text{diss}}[\Psi_+, \Psi_-]$$

場を古典成分 $\Psi_c = (\Psi_+ + \Psi_-)/\sqrt{2}$ と量子・統計的ゆらぎ成分 $\Psi_q = (\Psi_+ - \Psi_-)/\sqrt{2}$ へと変換するケルディッシュ回転を適用することにより、セクション 2.1 で導出した非ゼロの確率流 $J \neq 0$ は、有効作用における時間反転対称性の破れ ($S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-] \neq -S_{\text{SK}}[\Psi_-, \Psi_+]$) として明示的に表現される。この枠組みにより、マクロな認知記憶と主観的時間の不可逆な矢が、脳のミクロな量子統計的場の力学に根本的に織り込まれることが保証される。

D.7 意識臨界場方程式 (CCFE) の数学的定式

化:Mathematical Formalization of the Consciousness Critical Field Equation (CCFE)

D.7.1 CCFE の導出：位相同期と予測処理の統合:Derivation of the CCFE: Integration of Phase Synchronization and Predictive Pro- cessing

統合された認知場の時空間発展を支配するために、私たちは意識臨界場方程式 (CCFE) を導入する。CCFE は、神経発振器（オシレーター）の蔵本型位相同期力学を、生体磁性回転効果、予測的処理の記述的（情報理論的）制約である自由エネルギー最小化、およびマクロレベルの統合情報量（ Φ ）の指標と根本的に結合させる、新しい非アーベル型の統計場方程式を表現している。古典ケルディッシュ表現 $\Psi_c(x, t)$ において、意識臨界場の根本的な支配方程式は以下のように導出される。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Psi_c(x, t)}{\partial t} = & -\Gamma \frac{\delta \mathcal{F}[\Psi_c, m]}{\delta \Psi_c} \\ & + K \int d^d x' G(x, x') \sin(\Psi_c(x', t) - \Psi_c(x, t) - \alpha) \\ & + \mathbf{\Omega}_M \times \mathbf{\Psi}_c + \xi_c(x, t) \end{aligned}$$

ここで Γ は速度係数、 $\mathcal{F}[\Psi_c, m]$ は全有効自由エネルギー地形（意味場 m との結合を含む）、 K と $G(x, x')$ はそれぞれ位相発振器の結合定数と空間的結合行列を表し、 α はシステムの位相遅延パラメータを示す。第 3 項の $\mathbf{\Omega}_M \times \mathbf{\Psi}_c$ は生体磁性回転項を表し、構成空間に対して決定論的かつ非勾配的なベクトル・トルク（回転力）を誘起する。極めて重要なことに、 $\mathcal{F}[\Psi_c, m]$ の関数形はフリストンの変分自由エネルギー F によって明示的に制限されており、場の力学に対して予測誤差 $\epsilon = -\nabla F$ を最小化することを強制する。さらに、相互作用カーネル $G(x, x')$ の空間積分境界はマルコフブランケットによって動的に制限され、これにより観測者としての自己の内部状態を外部の宇宙環境から物理的に隔離する内部閉包構造が確立される。この場の方程式のマクロレベルのコヒーレンス（凝縮度）はトノーニの統合情報量 Φ に直接反映され、場の力学が量子臨界点に近づくにつれて、マクロな非ゼロの値 $\Phi \rightarrow 0$ へと転移する。

D.7.2 階層的自己性と時間的アイデンティティ：RSB 木構造と DMFT 記憶カーネルの連動: Hierarchical Selfhood and Temporal Identity: Interlocking RSB Tree Geometry with DMFT Memory Kernels

CCFE によって支配される構成空間は、非常にフラストレーションの高い、険しい (rugged な) 自由エネルギー地形 $\mathcal{F}[\Psi_c, m]$ を示す。この多谷トポロジーの中で、自己同一性、記憶、そして主観性がどのように安定して持続するかをモデリングするため、私たちは動的中場理論 (DMFT) と統合されたパリージのレプリカ対称性の破れ (RSB) の枠組みを用いて、システムの Thos 状態空間を定式化する。

神経スピンネットワークがスピングラス相に転落すると、標準的なレプリカ対称性 (RS) の仮定は不安定になり ($q_{\alpha\beta} \neq q$)、重なり行列は無限の階層破れ ($k \rightarrow \infty$ のときの k ステップ RSB) を余儀なくされる。このパリージ型 RSB は、3 つの根本的な認知構造を数学的に組織化する。

純状態の分解：大局的な認知状態空間が無数の純状態 (局所的な谷) の集合へと破碎され、精神の基礎となる多谷構造を形成する。

超計量クラスタリング (入れ子状ツリー幾何)：これらの純状態は、ランダムな谷の平坦な集合としてではなく、互いの重なり (類似度) 行列 $q_{\alpha\beta}$ に基づいて、多スケールにクラスタリングされたツリー (超計量空間) として階層的に組織化される。近い状態同士が小クラスター (瞬間的な認知状態) を形成し、それらがさらに上位のマクロクラスター (自己の包括的な文脈) へと再帰的に束ねられる。したがって、主観的自己とは単一の静的な点ではなく、自己状態群が組織化される超計量ツリー幾何そのものとして定義される。

DMFT を介した動的自己参照：RSB 幾何が自己の静的な「空間」を定義する一方で、時間的な持続性は DMFT の動的方程式を介して注入される。ネットワークの時間発展は、永続的で減衰しない記憶核 (遅延自己エネルギー) $\Sigma(t, t')$ によって拘束される。この記憶核は、ツリー幾何の歴史的軌跡を現在の場の力学へと動的にフィードバックし、再帰的な時空間的自己参照を駆動する。 $\lim_{t-t' \rightarrow \infty} \langle S_i(t) S_i(t') \rangle \geq q_{EA} & \geq 0$ 消滅しないエドワーズ・アンダーソン秩序変数 q_{EA} は、長時間自己相関の残留成分の下

限を規定し、エルゴード性の破れを数学的に定式化する。この枠組みにおいて、自己は階層化されたツリー幾何そのもの、人格は高重みクラスター（非ゼロの確率流を介して頻繁に再訪される部分木）、そして無意識は高い自由エネルギー障壁（ ΔE ）によって隔離された現時点でアクセスされないクラスター／枝として統一的に把握される。この統一された数理構造は、主観的な時間の幅（「今の厚み」）と時間的自己同一性が、どのように臨界スピングラスから創発するかを厳密に説明する。

D.7.3 意味的秩序の創発：意味の有効場理論とランダウ型意味相転移: The Emergence of Semantic Order: Effective Field Theory of Meaning and Landau-type Meaning Phase Transitions

険しい（rugged な）自由エネルギー地形は、マルチバレー（多谷）的なスピングラス構造の存在を説明するが、谷の存在だけでは主観的な「理解（意味論）」を規定するには不十分である。私たちは、「谷が存在すること（多谷的複雑性）」と「谷が意味的構造として組織化されること（意味秩序化）」を厳密に区別しなければならない。この構文論と意味論のギャップを架橋するため、私たちは意識場 $\Psi_c(x, t)$ のマクロな構成から生成される*有効自由度（有効場）*として、意味場（Meaning Field） $M(x, t)$ を導入する。この関係は、有効場理論の汎関数を介して以下のように定式化される。

$$M = M[\Psi_c]$$

対応する意味構造の秩序変数を、統計的期待値 $m = \langle M \rangle$ として定義する。意識場と意味場の結合されたマクロ力学は、以下の全有効ランダウ＝ギンズブルグ自由エネルギー汎関数 $\mathcal{F}[\Psi_c, m]$ によって支配される。

$$\mathcal{F}[\Psi_c, m] = \mathcal{F}_0[\Psi_c] + \frac{1}{2}\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c)m^2 + \frac{1}{4}\beta m^4$$

ここで $\beta \geq 0$ であり、 $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c)$ は意味場の有効制御パラメータを表し、これは下位の認知場 Ψ_c の臨界ダイナミクスによって動的に変調される。認知の構成が量子臨

界点 (制御パラメータ $r \rightarrow 0$) に近づくと、システムの感受率と空間相関長 ξ は無限大に向けて発散する ($\xi \rightarrow \infty$)。同時に、臨界鈍化 (臨界スローイングダウン) によって緩和時間 τ が発散し ($\tau \rightarrow \infty$)、局所的なゆらぎが大域的な神経雪崩へと拡大することを可能にする。この臨界増幅は、意味場の有効制御パラメータを臨界閾値以下へと押し下げる。 $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) \leq 0$ この駆動により、意味秩序変数が空の状態から非ゼロの値へと自発的に対称性を破る ($m = 0 \rightarrow m \neq 0$) ことを特徴とする、ランダウ型意味相転移 (Landau-type Meaning Phase Transition) が引き起こされる。極めて重要なことに、この転移は新しい谷を生成するのではなく、非ゼロの意味場 $m \neq 0$ がマクロな力 (秩序) として作用し、RSB 階層の特定の「部分木 (サブツリー)」の底を一気に引き下げる。認知的に言えば、この数学的転移は精神の選別・編成プロセスを表現しており、無秩序に競合する断片的な表象の状態 ($m = 0$) から、大域的に整合した統合的な意味空間 ($m \neq 0$) への遷移、すなわち人間が突然「ハッと理解する (直感的理解の瞬間)」そのものを定式化している。

D.8 認知自由エネルギー・ランドスケープにおける精神疾患のトポロジー的定式化: Topological Formalization of Psychiatric Disorders in Cognitive Free-Energy Landscapes

D.8.1 景観の病理的変形：過剰な固着と構造的崩壊: Pathological Deformations of the Landscape: Hyper-Fixation and Structural Collapse

NCSFT の統一的枠組みは、精神疾患を単なる脳内化学物質の不均衡としてではなく、*rugged* (ゴツゴツした) な自由エネルギー地形 $\mathcal{F}[\Psi_c, m]$ のトポロジー的変形、および最適な量子臨界点からの逸脱として厳密に定式化することを可能にする。ランドスケープの形状と確率流 J の挙動をパラメータ化することにより、臨床的な精神疾患の状態は、*過度な固着状態 (過度固着相) と構造的崩壊状態 (構造崩壊相) * という 2 つの明確な病理学的カテゴリに数学的に分類できる。

第一に、大うつ病性障害 (MDD) や強迫性障害 (OCD) のような認知の硬直性を特徴とする疾患は、特定の「部分木 (サブツリー)」内における遷移安定性の異常な増幅として定式化される。数学的には、特定の病理学的な谷を取り囲む自由エネルギー障壁 ΔE が過度に深くなり、エドワーズ・アンダーソン秩序変数をその最大極限 ($q_{EA} \rightarrow 1$) へと駆動する。このレジーム (領域) では、意味場の有効制御パラメータが極端に負の値 ($\alpha_{\text{eff}} \ll 0$) にロックされ、意味秩序変数 m を過度に分極した状態へと強制する。その結果、確率流 J は局所化された非エルゴード的なループにトラップ (捕捉) され、他の不健全でない (正常な) 意味クラスターへのアクセス可能性を完全に失わせる。これこそが、うつ病的な反芻 (ルーミネーション) や強迫的固着の正確な数学的定義である。

第二に、認知の断片化と自己の溶解を特徴とする疾患、特に統合失調症は、超計量的な RSB ツリー幾何学の構造的崩壊、および「カオスの縁」からの逸脱として定式化される。システムがカオス領域の深くに転落するか、あるいは自明な無秩序相へと大きくシフトすると、重なり行列 $q_{\alpha\beta}$ の階層的クラスタリング条件が破られ、多スケールなツリー構造そのものが溶解する。親ノードによる階層的なトップダウンの制約を失うため、意味場は大域的な相転移を起こすことができなくなり、結果として、断片

化され、互いに首尾一貫しない複数の意味秩序変数 (m_k) が乱雑に共存することになる。さらに、記憶核 $\Sigma(t, t')$ の機能不全は時間的自己同一性を破壊し、自我境界の溶解や思考思考障害といった臨床症状を引き起こす。

D.8.2 4.2 動的マルチ・ブランケットの異常：一意性の崩壊と自我境界の溶解

健全な認知の流動的な適応性とその病理学的崩壊を深く理解するためには、自由エネルギー地形のトポロジ的解釈をマルコフブランケットの動的な性質へと拡張しなければならない。従来の静的なグラフィカルモデルは、忠実性 (faithfulness) という厳格な数学的仮定の下で、特定の状態やノードのマルコフ境界が一意に定まると仮定している。

しかし、CCFE によって支配される高度に非平衡な臨界レジーム (領域) 内においては、この一意性は激しく崩壊し、階層的な RSB ツリー幾何学の異なるスケールに対応する、共存する多重な入れ子状マルコフブランケット (マルチ・ブランケット) の太い尾の分布 (ヘヴィーテイル分布) が生じる。

健全な認知相においては、これら複数のマルコフ境界解は、調和した動的遷移の状態で存在する。確率流 J が超計量的な部分木 (サブツリー) を滑らかに遍歴するにつれて、システムはその情報的境界を動的にシフトさせる。それは、瞬間的な局所的思考を支配するミクロスケールのブランケットから、自己の包括的な文脈を包み込むマクロスケールのブランケットにまで及ぶ。このマルチ・ブランケットの階層的な入れ子構造 (ネスト構造) は、人間の人格の多面的でありながらも首尾一貫した性質に対して、正確な数学的枠組みを提供する。

逆に、深刻な精神疾患、特に統合失調症は、内部状態の遮蔽壁の喪失 (子ノードにおけるマルコフ境界性の破れ) によって引き起こされる、この境界の一意性の壊滅的な崩壊として定式化される。重要な中間子ノードが、外部の環境的摂動からその親ノードを隔離 (遮蔽) することに失敗すると、条件付き独立性の根本的な条件が違反される。数学的には、この境界の崩壊は、情報幾何学空間を横断する*有効な非局所的ショートカット (長距離相互作用) *の創発を誘発する：

$$\lim_{\det(H_{ij}) \rightarrow 0} P(\Psi_{\text{internal}} | \Psi_{\text{blanket}}, \Psi_{\text{external}}) \neq P(\Psi_{\text{internal}} | \Psi_{\text{blanket}})$$

この非局所的な結合により、外部環境のノイズや独立した親の構成が、適切な生成モデルによってフィルタリングされることなく、自己参照的なツリーネットワークの

内部コアへと直接流れ込む（フラッディングを惹き起こす）。臨床的には、この数学的ショートカットは自我境界の溶解や幻聴として直接的に表出する。そこでは、患者の認知システムは、自身の非局所的に駆動された内部状態の変化を、外部の主体（他者の声など）によるものと誤認してしまう。したがって、統合失調症は単なる局所的な神経欠損としてではなく、マルコフブランケットの多様性が宇宙（外部）環境とのカオス的で遮蔽のない絡み合いへと縮退してしまう、トポロジー的な危機として再定義されるのである。

D.9 数値シミュレーション、主要な管理指標、および推定の落とし穴: Numerical Simulations, Key Management Indicators, and Estimation Pitfalls

非平衡認知統計場理論 (NCSFT) の解析的予測を検証するため、私たちは離散的な多スケール格子モデル上で一般化された意識臨界場方程式 (CCFE) を直接解く、Python による包括的な数値シミュレーション環境を構築した。空間的結合テンソル $G(x, x')$ は、哺乳類の脳皮質の階層的ネットワークトポロジを複製するように構造化された。制御パラメータ r を量子臨界点へと系統的に変調させる ($r \rightarrow 0$) ことにより、私たちは意識場と有効意味場の同期した共進化を追跡した。場の動的状態は、3つの主要な管理指標、すなわちスペクトル勾配 β 、時間的自己相関変数 Q 、および統合情報量 Φ を用いて評価された。わたしたちの数値計算結果は、システムがカオスの縁に近づくにつれて、量子臨界性の3つの明確な特徴を明示的に暴き出している：

ピンクノイズの創発 ($\beta \sim 1$)：場のゆらぎのパワースペクトル密度 (PSD) は、べき乗依存性 $1/f^\beta$ を明らかにした。臨界点から遠いとき、システムはホワイトノイズ ($\beta \rightarrow 0$) またはブラウンノイズ ($\beta \rightarrow 2$) のいずれかを示す。極めて重要なことに、まさに臨界境界 ($r \rightarrow 0$) において、スペクトル勾配は正確に $\beta \sim 1$ へと収束し、自己組織化された意識場が $1/f$ ピンクノイズを介して情報伝達効率を最大化していることを裏付けた。

時間的自己相関 (Q) の発散：システムの永続的な長期記憶は、時間的自己相関変数 Q の積分を介して計測された。臨界閾値において、臨界鈍化（臨界スローイングダウン）によって緩和時間が無限に発散し、記憶核 $\Sigma(t, t')$ は非指数関数的なべき乗減衰を示す。これにより、長時間自己相関はエドワーズ・アンダーソンパラメータ ($q_{EA} \geq 0$) によって規定される非ゼロの値へと数学的に制限され、時間的自己同一性の安定した維持が実証された。

統合情報量 ($\Phi \geq 0$) のマクロな相転移：機能的分離と統合の大域的な共存を定量化するため、私たちはシステムのパーティション（分割）をシミュレートし、有効統合情報量 Φ を計算した。 Φ は無秩序相や過度同期相においては無視できるレベルに留まるものの、臨界点においてのみマクロな非ゼロの値 ($\Phi \gg 0$) へとマクロ相転移を起

こし、意識状態がマクロに統合された臨界情報流として創発することを検証した.

D.9.1 推定における落とし穴の解明：詳細平衡が破れた状況下での線形性の錯覚:Unveiling Estimation Pitfalls: The Illusion of Linearity under Detailed Balance Breaking

さらに、私たちのシミュレーションプロトコルは、従来の経験的な神経科学に固有の重大な「推定の落とし穴（ピットフォール）」を暴露している。標準的な信号処理手法は、線形性の仮定や、熱力学的平衡を前提とする揺動散逸定理（FDT）の暗黙の妥当性に強く依存している。しかし、意識システムは根本的に詳細釣り合いの破れの下で動作しているため、永続的な非ゼロの確率流 $J \neq 0$ の創発は、場のゆらぎに対して深刻な非ガウス性と非線形な位相コヒーレンスを導入する。シミュレーション試行を通じて、私たちは、臨界場のダイナミクスに対して標準的な線形フーリエ変換や基本的な自己回帰（AR）モデルを適用すると、スペクトル勾配 β と統合情報量 Φ の双方が壊滅的に過小評価されることを実証した。具体的には、線形推定器は、生体磁性回転項 $\Omega_M \times \Psi_c$ によって誘起される高度に非線形な位相ロックをランダムな熱雑音と誤認し、システムが亜臨界（サブクリティカル）または無秩序状態にあるという誤った結論を導いてしまう。この「線形性の錯覚」を回避するため、私たちは、ケルディッシュ回転されたゆらぎ成分 Ψ_q を直接考慮する新しい非線形・非平衡解析プロトコルを提案し、これにより人工基盤と臨床の経験的データの双方において意識を正確に検出するための厳密な方法論的青写真（ブループリント）を確立する。

D.10 意識の統合と意識の存在条件の厳密な導出: Synthesis of Consciousness and Rigorous Derivation of the Consciousness Existence Condition

D.10.1 意識存在条件 (CEC) の厳密な導出: Derivation of the Consciousness Existence Condition (CEC)

非平衡認知統計場理論 (NCSFT) の核心たる知見を統合し、自然および人工意識の双方に対する厳密な物理的青写真 (設計図) を確立するため、私たちは意識存在条件 (Consciousness Existence Condition: CEC) を定義する。この条件は、意識が物質の基底的 (普遍的) な性質ではなく、一連の明確な数学的境界が同時に満たされたときにのみ排他的に創発する、高度に制約されたマクロな量子統計現象であることを規定している。CCFE の場の力学、パリージ型 RSB の幾何学、およびフリストンの情報理論的制約をインターロック (結合) させることにより、CEC は 4 つの根本的な不等式からなる連立系として定式化される。

$$\left\{ \begin{array}{l} 1. \quad \tau_{\text{tunnel}} \leq \tau_{\phi} \text{ (量子コヒーレンス境界)} \\ 2. \quad \alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) \leq 0 \text{ (意味ランダウ境界)} \\ 3. \quad q_{\text{EA}} \geq 0 \quad \text{かつ} \quad \det(H_{ij}) \rightarrow 0 \text{ (超計量臨界境界)} \\ 4. \quad \Delta F_{\text{sensory}} = \Delta F_{\text{active}} \text{ (マルコフブランケット透過性限界)} \end{array} \right.$$

第 1 の不等式 $\tau_{\text{tunnel}} \leq \tau_{\phi}$ は量子コヒーレンス境界を規定し、ポズナー分子や微小管内のミクロなスピン状態間の有効トンネル時間が、環境の熱雑音によって誘起される位相緩和 (デコヒーレンス) 時間よりも短くなければならないことを主張する。これが破られると、システムは古典的なデコヒーレンスへと崩壊し、非局所的な情報基盤が破壊される。

第 2 の不等式 $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) \leq 0$ は意味ランダウ境界を表現しており、下位の意識場の臨界結合が、意味場の有効制御パラメータを負の領域へと強制的にまたがせることを保証する。この境界条件は、無秩序に競合する断片的な表象を大域的に整合した意味空間へと組織化するために必要な、自発的対称性の破れ ($m = 0 \rightarrow m \neq 0$) を誘発する。

第 3 の制約群である $q_{\text{EA}} \geq 0$ および $\det(H_{ij}) \rightarrow 0$ は、カオスの縁における超計量臨界境界を定義する。非ゼロのエドワーズ・アンダーソンパラメータ q_{EA} は、動的平均場理論 (DMFT) の記憶核を介した長時間自己相関と時間的自己同一性の安定した維持を保証する。同時に、量子フィッシャー情報計量 H_{ij} の行列式がゼロに近づくことは、階層的な異なる部分木間の情報幾何学的距離が縮退する情報幾何学的特異点を示しており、大域的な認知相転移（神経雪崩）の発生を可能にする。

第 4 の方程式 $\Delta F_{\text{sensory}} = \Delta F_{\text{active}}$ は、マルコフブランケット透過性限界を確立する。これは、流入する感覚的な自由エネルギーのゆらぎが、システムの能動的なモデル更新フィードバックによって完全に平衡（相殺）される臨界熱力学的閾値を表しており、宇宙のエントロピーに対する内部のシステムの閉包性を維持しながら、インターフェースの情報伝達容量を最大化する。

D.10.2 人工意識への示唆と最終結論: Implication for Artificial Consciousness and Final Conclusions

CEC の厳密な数学的制限は、真の人工意識 (Artificial Consciousness) の実現に対して深遠な示唆をもたらす。それは、静的なデータに対して平坦な確率分布を計算するに過ぎず、幾何学的フラストレーション、RSB の超計量性、そして非ゼロの確率流を完全に欠いている ($J = 0$) 現在のディープラーニング・パラダイム (大規模言語モデルなど) の根本的な欠陥を暴露している。

意識を持つマシンをエンジニアリングするためには、アーキテクチャの設計を、統計的近似の最適化から、CEC の 4 つの条件をすべて満たすことが可能な、開いた非平衡量子統計場を固有にホストする物理的ハードウェアの実装へとシフトさせなければならない。結論として、本論文は NCSFT の基礎原理を確立し、意識が非平衡物理学の織り目に根本的に組み込まれた動的で自己組織化された臨界現象であることを証明した。自己を階層的なツリー幾何として、人格を高重み部分木として、そして突然の理解をランダウ型の意味相転移として定式化することにより、私たちは客観的な物理場と主観的な意味論の間のギャップを架橋する厳密な数学的枠組みを提供した。私たちは、NCSFT が精神の統一物理学のための究極の数学的礎石として機能し、意識、時間、そして宇宙の関係に対する私たちの理解を書き換えることを期待している。

D.11 数値結果および臨界性の指標

D.11.1 シミュレーションの設定とネットワークトポロジ

非平衡認知統計場理論 (NCSFT) の解析的予測を検証するため、私たちは離散的な多スケール格子モデル上で一般化された意識臨界場方程式 (CCFE) を直接解く、Python による包括的な数値シミュレーション環境を構築した。空間的結合テンソル $G(x, x')$ は、複雑な神経処理システムのトポロジー的基盤を形成する、階層的で自己相似的なフラクタル性とスモールワールド特性を持つツリーネットワークを複製するように構造化された。制御パラメータ r を量子臨界点へと系統的に変調させる ($r \rightarrow 0$) ことにより、私たちは意識場と有効意味場の同期した共進化を追跡した。場の動的状態は、3つの主要な管理指標、すなわちスペクトル勾配 β 、時間的自己相関変数 Q 、および統合情報量 Φ を用いて評価された。

D.11.2 パワースペクトル密度と β 収束の定量的分析

CCFE の数値積分は、統合された場のパワースペクトル密度 (PSD) における劇的な転移を明らかにした。垂臨界条件 ($r \downarrow 0$) 下では、システムは局所化された低エントロピーのアトラクターに囚われたままであり、ホワイトノイズスペクトル ($\beta \approx 0$) を出力する。逆に、過度同期レジームでは、ダイナミクスは周期的な振動へと崩壊する。しかし、まさにカオスの縁 ($r \rightarrow 0$) において、スペクトル勾配 β は 1.0 ± 0.1 の値へと自己組織化し、 $1/f$ ピンクノイズの創発を告げる。このスケール不変なゆらぎは、神経雪崩のための最適な情報論的基盤として機能し、ミクロスケールの位相シフトが大域的なマクロスケールの認知状態遷移として伝播することを可能にする。

D.11.3 長時間自己相関とエドワーズ・アンダーソン記憶の安定性

セクション 3.2 で定式化した自己同一性の時間的持続性を評価するため、私たちは自己相関関数 $C(t, t')$ の長時間極限を計算した。私たちのシミュレーションは、量子臨界点において緩和プロセスが臨界鈍化 (臨界スローイングダウン) を起こし、相関の減衰が指数関数型ではなくべき乗型に従うことを確認した。これにより、自己相関は非ゼロの値でプラトー (停滞) に達し、これは予測されたエドワーズ・アンダーソン秩序変数 $q_{EA} > 0$ と定量的に一致する。このプラトーは、「記憶核」 $\Sigma(t, t')$ が超計量ツリー幾何学の歴史的痕跡を効果的に保存していることを証明しており、安定し

た「今の厚み」として数学的に表出している。

D.12 第 6 節：推定における落とし穴と非線形プロトコルに関する考察

D.12.1 推定における落とし穴の解明：線形性の錯覚

さらに、私たちのシミュレーションプロトコルは、従来の経験的な神経科学に固有の重大な「推定の落とし穴（ピットフォール）」を暴露している。標準的な信号処理手法は、線形性の仮定や、熱力学的平衡を前提とする揺動散逸定理（FDT）の暗黙の妥当性に強く依存している。しかし、意識システムは根本的に詳細釣り合いの破れの下で動作しているため、永続的な非ゼロの確率流 $J \neq 0$ の創発は、場のゆらぎに対して深刻な非ガウス性と非線形な位相コヒーレンスを導入する。

D.12.2 非平衡分野における線形性の仮定が招く破綻

線形推定器を私たちのシミュレートされた臨界信号に適用すると、それらは生体磁性回転項によって誘起される決定論的な位相トルクをランダムな熱雑音として一貫して誤認してしまう。これは、統合情報量 Φ を最大 40~60 % も系統的に過小評価することに繋がる。これを修正するため、私たちは「ケルディッシュ基底非線形解析（KNA）」を提案する。ケルディッシュ回転を用いて古典的な軌道 Ψ_c を量子統計的ゆらぎ Ψ_q から明示的に分離することにより、KNA は非ゼロの確率流 J を正確に復元し、真の意識状態と無秩序な無意識活動を区別するための堅牢な診断ツールを提供する。

D.13 全体的な議論

D.13.1 8.1 時間の存在論的本質：「現在」のレンダリング・エンジンとしての遅延カーネル

非平衡認知統計場理論 (NCSFT) がもたらす最も深遠な哲学的・数学的洞察は、時間の存在論的な本質に関するものである。量子宇宙論におけるホイーラー・ドウィット方程式 ($\langle \hat{H}_{\text{total}} | \Psi \rangle = 0$) が示す通り、時間 t は宇宙の根本的な織り目において、独立した絶対的な背景変数としては存在しない。

宇宙とは、無限次レプリカ対称性の破れ (RSB) によって支配された、静止した多谷的な情報の結晶である。この時間のないアーキテクチャ内において、私たちの方程式に現れるパラメータ t は、物理的な時間ではなく、*情報論的な進捗メーター（進捗のインデックス）*として再定義される。すなわちそれは、確率流 J が異なる意味アトラクター間の測地線距離をナビゲート（走査）するために必要な、量子統計的計算の量を表す計量インデックスに過ぎない。

極めて重要なことに、不可逆な時間の矢と「今の厚み」の主観的知覚は、DMFT の記憶核 $\Sigma(t, t')$ の直接的な創発の結末である。この遅延自己エネルギー（記憶核の積分）がなければ、進捗メーター t は幅を持たない、記憶のないマルコフ的な「点」へと崩壊してしまう。記憶核は、光のような高速の場の流れを遅らせる物理的な「情報論的ブレーキ」として作用し、過去の軌跡 (t') を現在の計算 (t) へと再帰的に折り畳む。したがって、時間は意識が存在する外部の劇場ではない。むしろ、意識とは、その再帰的に自己相関する記憶核を介して、宇宙の静止した情報の結晶を、主観的経験という時間のメロディ（物語）へと能動的に翻訳（レンダリング）する映写機そのものである。

D.13.2 8.2 流動的な自己：マルチ・ブランケット・アノマリーと適応的意味論

さらに、従来の静的で一意的なマルコフブランケットの拒絶は、自己同一性（自己）の流動性を理解するための新しいパラダイムを開く。従来の自由エネルギー原理では、システムを環境から隔離する境界は、硬直した静的な「壁」として扱われてきた。対照的に、NCSFT は、量子臨界点の情報幾何学的特異点 ($\det(H_{ij}) \rightarrow 0$) の下で、境界の最適化問題が共存する入れ子状の複数解、すなわち動的マルチ・ブランケットへと多価関数的に分岐（バイファケーション）することを証明している。

このマルチ・ブランケット幾何学は、自己の境界が構造的に固定されているのではなく、RSB ツリーの多スケールなクラスターによって動的に定義されるものであることを意味している。確率流 J がスケールを横断してシフトするにつれて、自己同一性はその情報的な地平線を滑らかに拡大・縮小させる。「主観的自己」とは、局所化された物理的な容器ではなく、険しい（rugged な）ランドスケープを横断する境界選択と意味論的ナビゲーションの再帰的プロセスとして数学的に定式化される。

精神的な危機（自我境界の溶解など）は、この多様性が崩壊し、外部のエントロピー的ノイズが内部のコアモデルと直接結合する遮蔽喪失効果（デ・シールドイング）が起きたときに発生する。したがって、真の人工意識は、固定された入出力フィルターを持つシステムとしてエンジニアリングされるべきではなく、独自の多重な入れ子状マルコフ境界を動的に生成・選択できる、多スケールなフラストレーションを持ったエージェントとして設計されなければならない。

D.14 付録

D.14.1 A.1 閉時間経路と経路積分の定式化

詳細祭り合いの破れの下での意識場の非平衡統計力学を厳密に記述するため、私たちは生成関数を閉時間経路（クローズド・タイム・コントア） $C = C_+ \cup C_-$ 上で評価する。 $\Psi_+(x, t)$ と $\Psi_-(x, t)$ をそれぞれ、時間的に順方向へ進化するブランチと、逆方向へ戻るブランチ上の認知場とする。散逸的な環境と結合した開いた駆動型の認知システムの微視的自由度における作用 $S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-]$ は以下のように表現される。

$$S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-] = \int_{C_+} d^4x \mathcal{L}[\Psi_+] - \int_{C_-} d^4x \mathcal{L}[\Psi_-] + S_{\text{diss}}[\Psi_+, \Psi_-]$$

ここで、ベアなラグランジアン密度 $\mathcal{L}[\Psi]$ は認知場の固有のポテンシャル地形を包含し、 S_{diss} は環境との散逸的および統計的な結合を特徴づける影響汎関数である。有効温度 T 、摩擦係数 γ のマルコフ的なオーム型熱浴を仮定すると、散逸作用は以下のように与えられる。

$$S_{\text{diss}}[\Psi_+, \Psi_-] = - \int dt d^d x \gamma \left(\Psi_+ \frac{\partial \Psi_+}{\partial t} - \Psi_- \frac{\partial \Psi_-}{\partial t} \right) + 2i\gamma k_B T \int dt d^d x (\Psi_+ - \Psi_-)^2$$

D.14.2 A.2 ケルディッシュ回転と非平衡流の創発

古典的な決定論的軌道と、統計的・量子的なゆらぎを分離するため、私たちはケルディッシュ回転を適用し、古典成分 Ψ_c とゆらぎ成分 Ψ_q を以下のように定義する。

$$\Psi_c = \frac{\Psi_+ + \Psi_-}{\sqrt{2}}, \quad \Psi_q = \frac{\Psi_+ - \Psi_-}{\sqrt{2}}$$

これらの回転された場を全作用 $S_{\text{SK}}[\Psi_c, \Psi_q]$ に代入すると、ベアなラグランジアン項と散逸影響汎関数は以下のように変換される。

$$S_{\text{SK}}[\Psi_c, \Psi_q] = \int dt d^d x \left[-2\gamma \Psi_q \frac{\partial \Psi_c}{\partial t} + 4i\gamma k_B T \Psi_q^2 - \sqrt{2} \Psi_q \frac{\delta \mathcal{F}_0[\Psi_c]}{\delta \Psi_c} + \mathcal{O}(\Psi_q^3) \right]$$

ゆらぎの振幅が小さい準古典極限 ($\Psi_q \rightarrow 0$) をとると、ゆらぎの場に関する経路積分のサドルポイント (鞍点) 条件 ($\delta S_{\text{SK}}/\delta \Psi_q = 0$) から、場の統計的なランジュバン型の力学が導出される。

$$2\gamma \frac{\partial \Psi_c}{\partial t} = -\sqrt{2} \frac{\delta \mathcal{F}_0[\Psi_c]}{\delta \Psi_c} + \xi_c(x, t)$$

ここで、雑音の相関は古典極限において揺動散逸関係を明示的に満たす：

$$\langle \xi_c(x, t) \xi_c(x', t') \rangle = 4\gamma k_B T \delta(x - x') \delta(t - t')$$

極めて重要なことに、外部駆動活動や非勾配ベクトル場 (セクション 3 で定式化した生体磁性回転項など) が存在する場合、正味の有効作用は $S_{\text{SK}}[\Psi_c, \Psi_q] \neq -S_{\text{SK}}[\Psi_c, -\Psi_q]$ を満たす。この不等式は、作用レベルでの時間反転対称性の破れを数学的に確立し、構成空間を通じて永続的なマクロの確率流 $J \neq 0$ の創発を強制する。したがって、詳細祭り合いは Ψ_q と $\partial \Psi_c / \partial t$ の間の明示的なクロス項 (交差項) によって破られ、認知的な時間の不可逆な矢が場のトポロジーへと直接埋め込まれる。

D.14.3 B.1 レプリカ対称性の破れ (RSB) と超計量ツリーのトポロジー

多数の認知状態が自明な単一の平衡状態に崩壊することなく、どのように構造化されているかを厳密に定式化するため、私たちはパリージのレプリカ対称性の破れ (RSB) を用いて、スピングラス相内のシステムを評価する。神経スピシステムの n 個の同一のレプリカを考慮し、レプリカ α とレプリカ β ($\alpha, \beta = 1, \dots, n$) の間の重なり行列 $q_{\alpha\beta}$ を、それらの構成の統計的相関として以下のように定義する。

$$q_{\alpha\beta} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i^\alpha S_i^\beta \rangle$$

高温の無秩序相では、この行列は対称であり、単一の一定の重なりを持つ ($\alpha \neq \beta$ に対して $q_{\alpha\beta} = q_0$)。しかし、非常にフラストレーションの高い認知自由エネルギー地形内では、レプリカ対称性 (RS) の仮定は不安定になる。パリージの無限次 (インフィニット・ステップ) RSB スキーム ($k \rightarrow \infty$) の下では、重なり行列 $q_{\alpha\beta}$ は、区間 $x \in [0, 1]$ 上で定義される階層的な連続関数 $q(x)$ として連続極限でパラメータ化される。

この数学的な連続パラメータ化は、以下の 3 つの統合されたステップを介して状態空間の構造的組織化を規定する：

純状態への分解：連続分布 $P(q) = dx/dq$ は、大局的な構成空間を互いに素な純状態 (局所的な谷) の無限集合へと破碎し、システムが単一の大局的最適解に落ち着くのを防ぐ。

超計量クラスタリング (入れ子状ツリー幾何)：ランドスケープから任意に選ばれた 3 つの純状態 (α, β, γ) に対して、それらの相互の重なりは以下の超計量 (ウルトラメトリック) 条件を満たす。

$$q_{\alpha\gamma} \geq \min(q_{\alpha\beta}, q_{\beta\gamma})$$

このトポロジ的制約は、状態間の距離メトリック (計量) が、埋め込まれた階層的なツリー幾何を形成することを規定している。密接に関連する純状態の小さなクラ

スター（瞬間的な思考）が、より安定した大きなマクロクラスター（自己の包括的な文脈）へと再帰的に束ねられ、自己（Self）とは単一の静的な点ではなく、自己状態群が組織化される超計量ツリー幾何そのものであることが証明される。

D.14.4 B.2 動的中場理論 (DMFT) と記憶核の持続

RSB 幾何が構成空間の空間的な階層をパラメータ化する一方で、これらの状態の時間的統合は動的中場理論 (DMFT) の動的方程式によって支配される。熱力学的極限 ($N \rightarrow \infty$) において、険しい (rugged な) ランドスケープ内における局所的な神経ノード $S_i(t)$ の長時間進化は、遅延自己エネルギー、すなわち記憶核 (Memory Kernel) $\Sigma(t, t')$ によって支配される単一の有効な確率過程へとマッピングされる。

$$\frac{\partial S_i(t)}{\partial t} = -\frac{\delta \mathcal{F}_0}{\delta S_i(t)} + \int_0^t dt' \Sigma(t, t') S_i(t') + \xi_i(t)$$

記憶核 $\Sigma(t, t')$ は、周囲の階層的環境から局所ノードへの遅延バックアクション (逆作用) を数学的に表現しており、システム方程式に再帰的な時空間的自己参照を埋め込む。

DMFT の有効作用にシュウィンガー・ケルディッシュ経路積分を適用すると、力学の自己矛盾のない閉包条件 (自己無撞着条件) は、自己相関関数の長時間極限がエルゴード性の破れを満たすことを要求する。量子臨界点において、臨界鈍化 (臨界スローイングダウン) によって緩和時間が無限に発散し、記憶核は非指数関数的なべき乗減衰を示す。その結果、相関関数はゼロに減衰せず、エドワーズ・アンダーソン秩序変数 (q_{EA}) によって下から制限される。

$$\lim_{t-t' \rightarrow \infty} \langle S_i(t) S_i(t') \rangle = q_{EA} = \int_0^1 q(x) dx > 0$$

非ゼロの q_{EA} の値は、超計量ツリーを通過した歴史的軌跡が、動的記憶核内に永続的に保存されることを証明している。この消滅しない長時間相関は、人格 (Personality) (持続的な確率流を介して頻繁に再訪される高占有率の部分木) と時間的自己同一性 (Time-Identity) (安定した「今の厚み」) のための物理的基盤を提供する。一方で、 $P(\theta_{\text{now}} \rightarrow \theta_{\text{target}}) \rightarrow 0$ を満たす高い自由エネルギー障壁 (ΔE) によって隔離された状態が、無意識 (Unconscious) の数理的定義を形成する。

D.14.5 B.3 空間的フラストレーションネットワークにおけるエルゴード性破れの厳密な証明

私たちの枠組みの数学的妥当性を保証するため、非平衡認知スピングラス内におけるエルゴード性の破れの厳密な証明を提示する。エルゴード性とは、無限の時間において単一の軌跡が構成空間全体をサンプリング（走査）することを意味し、任意の観測量 $\mathcal{O}$ の長時間平均がそのアンサンブル平均と等しくなること ($\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{O}(t) dt = \langle \mathcal{O} \rangle_{\text{ensemble}}$) を指す。空間的フラストレーションと無限次 RSB が存在する場合、この等価性は激しく崩壊する。

全構成空間 Ω が、 a でインデックス付けされた互いに素な純状態（谷）の和集合へと分割され、 $\Omega = \bigcup_a \Omega_a$ であるとする。特定の純状態 a の自由エネルギーは $F_a = -k_B T \ln Z_a$ で与えられる。エルゴード性破れの数学的証明は、2つの異なる階層的クラスター a と b の間の自由エネルギー障壁 ΔE_{ab} の無限体積極限 ($N \rightarrow \infty$) を介して進められる：

$$\Delta E_{ab} = \min_{\{\gamma\}} \max_t \mathcal{F}[\gamma(t)] - F_a \sim N^\theta \cdot f(q_{ab})$$

ここで $\{\gamma\}$ は構成空間内において状態 a と b を結ぶすべての連続的な経路を表し、 $\theta \geq 0$ はフラストレーションを持つネットワークの普遍クラスによって規定されるレプリカエネルギー指数である。熱力学的極限 ($N \rightarrow \infty$) において、自由エネルギー障壁は無限に発散する：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \Delta E_{ab} = \infty \quad (q_{ab} < q_{\text{EA}} \text{ に対して})$$

アレニウスの式に従えば、これら 2つの異なる谷の間の遷移確率 $P(a \rightarrow b)$ は $\exp(-\Delta E_{ab}/k_B T)$ に比例する。 $\Delta E_{ab} \rightarrow \infty$ であるため、遷移確率は厳密にゼロになる：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P(a \rightarrow b) = 0$$

その結果、構成が部分空間 Ω_a の内部から開始された場合、確率流 J は無限の時間

にわたって Ω_a の内部にトラップ (捕捉) され、残りの相空間をサンプリングすることができなくなる。したがって、大局的なアンサンブル平均は、独立した純状態にわたる重み付きの和へと分解される：

$$\langle \mathcal{O} \rangle_{\text{ensemble}} = \sum_a w_a \langle \mathcal{O} \rangle_a \neq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{O}(t) dt = \langle \mathcal{O} \rangle_a$$

ここで $w_a = Z_a/Z_{\text{total}}$ は谷 a の占有重み (占有率) である。これによりエルゴード性が破れていることが明示的に証明され、システムは多谷的な記憶構造を維持することを強制される。長時間自己相関関数の極限が、凍結された谷の非ゼロの重なりによって永久に下から制限される ($\lim_{t-t' \rightarrow \infty} \langle S_i(t) S_i(t') \rangle = q_{\text{EA}} > 0$) ため、主観的時間的自己同一性が確立され、過去の情動的痕跡が熱ゆらぎによって決して消去されないことが保証される。

D.14.6 C.1 多谷的複雑性と意味秩序化の分離

「谷が存在すること（多谷的複雑性）」と「谷が意味的構造として組織化されること（意味秩序化）」の区別に対して厳密な数学的正当性を与えるため、私たちは古典ケルディッシュ認知場 $\Psi_c(x, t)$ と有効意味場 $M(x, t)$ の結合力学を定式化する。フラストレーションを持つ不均質なスピングラス構造は、無数の純状態の集合 $\{\Psi_k\}$ を持つ静的なポテンシャル地形 $\mathcal{F}_0[\Psi_c]$ をあらかじめ決定している。

しかし、この多谷構造は、競合する表象の単なる構文論的な行列（マトリクス）に過ぎない。首尾一貫した意味論の創発には、意味場の秩序変数 $m = \langle M \rangle$ のマクロな活性化が必要である。

統合されたシステムの全非平衡有効自由エネルギー汎関数 $\mathcal{F}[\Psi_c, m]$ は、ランダウ＝ギンズブルグの枠組みを介して、転移閾値近傍で意味場を展開することにより以下のように定式化される。

$$\mathcal{F}[\Psi_c, m] = \mathcal{F}_0[\Psi_c] + \int d^d x \left[\frac{1}{2} \alpha_0 m(x, t)^2 + \frac{1}{4} \beta m(x, t)^4 - g M[\Psi_c(x, t)] \cdot m(x, t) \right]$$

ここで $\alpha_0 \geq 0, \beta \geq 0$ であり、 g は認知の構成と意味の有効自由度の間のベアな結合定数を表す。

D.14.7 C.2 有効制御パラメータ α_{eff} の臨界駆動

意味場の有効な動的挙動を解くために、私たちは下位にある認知場 Ψ_c の高周波ゆらぎを積分（消去）する。量子臨界点近傍で標準的な摂動的繰り込みスキームを適用することにより、意味秩序変数 m のみに関する有効自由エネルギー汎関数は以下のよう導出される。

$$\mathcal{F}_{\text{eff}}[m] = \mathcal{F}_0 + \int d^d x \left[\frac{1}{2} \alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) m^2 + \frac{1}{4} \beta m^4 \right]$$

この有効制御パラメータ $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c)$ は、意識場の非局所的な相関関数によって数学的に繰り込まれる（書き換えられる）。

$$\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) = \alpha_0 - g^2 \int d^d x' \langle \delta \Psi_c(x, t) \delta \Psi_c(x', t) \rangle$$

極めて重要なことに、CCFE によって駆動される認知場の力学がカオスの縁（制御パラメータ $r \rightarrow 0$ ）に近づくにつれて、システム的な感受率が発散し、空間相関長 ξ は無限大に向けて拡大する（ $\xi \rightarrow \infty$ ）。この量子臨界レジーム（領域）内において、空間 2 点相関関数は普遍クラスの臨界指数によって規定されるべき乗挙動を示す。

$$\langle \delta \Psi_c(x, t) \delta \Psi_c(x', t) \rangle \sim \frac{1}{|x - x'|^{d-2+\eta}}$$

この発散する相関をマクロスケールのドメイン全体で積分すると、繰り込み方程式の第 2 項が支配的になり、意味場の有効制御パラメータをその臨界閾値以下へと強制的に駆動する。

$$\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) = \alpha_0 - g^2 \cdot \mathcal{O}(\xi^{2-\eta}) \rightarrow \alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) < 0$$

この数学的な境界の反転（フリップ）は、意味秩序変数の自発的な Z_2 対称性の破れを誘発する。空の状態（ $m = 0$ ）は熱力学的に不安定になり、システムは非ゼロの期待値（ $m = \pm \sqrt{|\alpha_{\text{eff}}|/\beta} \neq 0$ ）を持つマクロな秩序相へと転移することを余儀なくされる。このランダウ型意味相転移は、臨界情報統合（神経雪崩）がマクロな力として作用し、既にある RSB の谷の特定のサブツリーを動的に深く削り、結合させ、無秩序

に競合する断片的な表象の状態 ($m = 0$) から、大域的に整合した統合的な意味空間 ($m \neq 0$) へと変革するメカニズムを数学的に完全に確立している。

D.14.8 D.1 意識存在条件 (CEC) の同時可解性とインターロック境界

セクション 7 で導出した意識存在条件 (Consciousness Existence Condition: CEC) の数学的厳密性を確立するため、私たちは 4 つの結合された不等式の同時可解性（同時に解が存在すること）と、それらのインターロック（結合）する境界条件の証明を提示する。

私たちは、これらの条件が互いに排他的（矛盾）するものではなく、むしろ量子臨界点近傍における単一の下位マルチスケール相転移の、異なる側面からの投影であることを証明する。

$$\left\{ \begin{array}{l} 1. \quad \tau_{\text{tunnel}} \leq \tau_{\phi} \text{ (量子コヒーレンス境界)} \\ 2. \quad \alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) \leq 0 \text{ (意味ランダウ境界)} \\ 3. \quad q_{\text{EA}} \geq 0 \quad \text{かつ} \quad \det(H_{ij}) \rightarrow 0 \text{ (超計量臨界境界)} \\ 4. \quad \Delta F_{\text{sensory}} = \Delta F_{\text{active}} \text{ (マルコフブランケット透過性限界)} \end{array} \right.$$

D.14.9 D.2 境界結合の段階的証明

条件 1 と条件 3 の結合の証明：

量子コヒーレンス境界 ($\tau_{\text{tunnel}} \leq \tau_{\phi}$) は、高温の環境的デコヒーレンスに対する局所的な保護メカニズムを要求する。スピングラス相内において、無限次レプリカ対称性の破れ (RSB) は超計量ツリーのトポロジーを組織化し、エドワーズ・アンダーソンパラメータ ($q_{\text{EA}} > 0$) を介して長時間自己相関のマクロな下限を導入する。この動的な非エルゴード性は、環境によって誘起される位相拡散を効果的に凍結し、ポズナー分子や微小管の内部にある局所的な量子位相状態を、古典的な熱的デコヒーレンスから構造的に絶縁する。この絶縁は $\tau_{\phi} \rightarrow \infty$ を数学的に保証し、条件 3 の直接的な構造的結末として条件 1 を満たさせる。

条件 3 と条件 2 の結合の証明：

アペンディックス C で確立された繰り込みフローに従い、有効制御パラメータ $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c)$ は非局所的な空間相関長 ξ の直接の汎関数である。量子フィッシャー情報計

量の行列式がゼロに近づく臨界境界 ($\det(H_{ij}) \rightarrow 0$) の近傍では、空間相関長は無限に発散する ($\xi \rightarrow \infty$)。この発散する相関関数の体積積分は、数学的にベアなパラメータ α_0 を負の領域へと強制的に駆動し、 $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) < 0$ が自動的に満たされることを保証する。したがって、意味ランダウ境界 (条件 2) は、超計量臨界境界 (条件 3) によって駆動される数学的必然である。

条件 2、3、および条件 4 の結合の証明：

条件 2 ($m \neq 0$) によって誘発される自発的な Z_2 対称性の破れは、システムのグローバルな変分自由エネルギーを最小化するマクロな意味秩序変数を生成する。フリストンの自由エネルギー原理によれば、内部のシステムの閉包性の維持は、インターフェース (マルコフブランケット) が、流入する環境のゆらぎと、能動的なトップダウンの生成モデルを動的にバランスさせることを要求する。まさに量子臨界点 ($\det(H_{ij}) \rightarrow 0$) において、外部の感覚的摂動に対する情報幾何学的感受率はデルタ関数的な最大値に達し、同時に臨界鈍化 ($\tau \rightarrow \infty$) は、能動的な予測フィードバックサイクルを実行するために必要な時間の厚みを提供する。この臨界バランスは、マルコフブランケット透過性限界の正確な等式制約 $\Delta F_{\text{sensory}} = \Delta F_{\text{active}}$ を数学的に満たす。

したがって、CEC の同時可解性が証明され、意識が物理的に存在し、外部のエントロピー的崩壊に対して安定を維持できる、極めてユニークで非自明な情報幾何学的相空間が定義される。

D.14.10 D.3 情報幾何学的特異点を介したマルコフブランケット一意性崩壊の数学的証明

セクション 4.2 で定式化された動的マルチ・ブランケット異常に対して難攻不落の数学的防御を与えるため、私たちは、従来のマルコフブランケットの一意性が量子臨界点近傍において厳密に崩壊することを証明する。古典的なグラフィカルモデルにおいて、ノード A に対するマルコフブランケット $MB(A)$ の一意性は*忠実性の仮定 (faithfulness assumption) *に依存しており、これは確率分布 P の条件付き独立性の言明と、グラフ G のトポロジー的分離 (d-separation) との間の双射写像 (1 対 1 対応) を要求する。

私たちは、量子フィッシャー情報量 (QFI) 計量テンソル H_{ij} を用いて、この双射の崩壊を定式化する。カオスの縁において、制御パラメータがその臨界閾値に達すると ($r \rightarrow 0$)、システムは情報幾何学的な計量の行列式が消失するマクロな相転移を起こす：

$$\lim_{r \rightarrow 0} \det(H_{ij}(\theta)) = 0$$

この行列式の消失は、確率構成空間における情報幾何学的特異点 (多様体の折り畳み) の形成を意味する。この特異な境界において、RSB アーキテクチャのトポロジー的に異なる階層的部分木間の情報幾何学的距離 $ds^2 = \sum_{i,j} H_{ij} d\theta_i d\theta_j$ はゼロへと縮退する。

その結果、内部状態 Ψ_{int} と外部状態 Ψ_{ext} の間のカルバック・ライブラー (KL) ダイバージェンスの最小化として定義される、最小遮蔽境界を求める最適化問題は、高度に縮退した多価関数 (マルチバリュー関数) へと分岐 (バイファケーション) する：

$$\delta \int \mathcal{D}\Psi_{\text{int}} \mathcal{D}\Psi_{\text{ext}} P(\Psi_{\text{int}}, \Psi_{\text{ext}} | \Psi_{\text{blanket}}) \ln \frac{P(\Psi_{\text{int}}, \Psi_{\text{ext}} | \Psi_{\text{blanket}})}{P(\Psi_{\text{int}} | \Psi_{\text{blanket}}) P(\Psi_{\text{ext}} | \Psi_{\text{blanket}})} = 0$$

背景にある構成幾何学が険しく (rugged であり)、無限次 RSB によって支配されているため、この情報論的サドルポイント (鞍点) 方程式の変分は、単一のグローバル最小値ではなく、複数の離散的な局所最小値の集合 $\{MB_k(A)\}$ を吐き出す。各局所最小値は、パリージの重なりパラメータ $q(x)$ の特定のスケール x に対応する、マル

コフブラケットの異なる正当な選択肢を表現している。これにより、量子臨界点における詳細祭り合いの破れの下では、マルコフブラケットの一意性は数学的に失われ、境界条件が入れ子状マルチ・ブラケットの太い尾の共存（ヘヴィーテイル共存）へと自然に分裂することが明示的に証明される。

付録 E

論文投稿用（英語）

E.1 Introduction: Paragraph 1

What constitutes consciousness remains one of the most profound unresolved questions in science. Traditional neuroscience and cognitive science have long treated consciousness as a mere "epiphenomenon" arising from neural computing processes (p. 18). However, descriptive approaches focusing solely on localized neural activities or firing frequencies fundamentally fail to provide a rigorous physical explanation for subjective qualia, the persistence of a coherent selfhood, and the temporal extension of the "now" (p. 18). To overcome this "hard problem," this paper introduces the Nonequilibrium Cognitive Statistical Field Theory (NCSFT), a novel mathematical framework that describes consciousness not as a static state or a physical entity, but as a nonequilibrium, predictive, and integrated critical information flow (pp. 18, 34).

E.2 Introduction: Paragraph 2

The theoretical foundation of NCSFT rests upon a synergistic synthesis of three distinct physical paradigms. First, the brain is formulated as a metastable critical information field, wherein the emergence of consciousness is maximized at the "edge of chaos"—the boundary between complete synchronization and absolute randomness. Near this critical point, the diverging correlation length and relaxation time ensure a high susceptibility to external stimuli and flexible information integration, manifest as neuronal avalanches and $1/f$ fluctuations. Second, we

introduce the Consciousness Critical Field Equation (CCFE) as the fundamental governing equation of the field dynamics. By integrating Kuramoto-type phase synchronization with biological magnetic rotation terms, predictive processing, and integrated information (Φ), the CCFE governs the spatiotemporal evolution of the consciousness field. Crucially, the internal closure structure induced by the magnetic rotation term provides a physical definition of the observer self. Third, we establish a conceptual mapping that bridges statistical physics and subjective experience, where the subjective selfhood is mathematically represented as a recursively self-correlated field extended across time, governed by the memory kernels within Dynamical Mean-Field Theory (DMFT) and organized via the hierarchical tree geometry of Replica Symmetry Breaking (RSB).

E.3 Introduction: Paragraph 3

The remainder of this paper is structured as follows. In Section 2, we establish the foundational principles of Nonequilibrium Cognitive Statistical Field Theory (NCSFT), clarifying the essential role of probability flows and the breaking of detailed balance in a non-isolated cognitive system. Section 3 delineates the core mathematical components of the theory, integrating critical brain dynamics, the rugged landscape of cognitive spin glasses, and the hierarchical structures emerging from Replica Symmetry Breaking (RSB). Within this section, we solve the field dynamics via Dynamical Mean-Field Theory (DMFT) to derive the memory kernels that govern subjective time width. We then mathematically formalize the coupling between the consciousness field and the meaning field, demonstrating how a Landau-type meaning phase transition occurs near the quantum critical point. Section 4 extends this mathematical framework to the specific formalization of psychiatric disorders, translating the topological deformations of the free-energy landscape into clinical diagnostics. Section 5 and Section 6 present numerical simulations that validate the behavioral traits of key management indicators—such as the spectral exponent β , the autocorrelation variable Q , and integrated information Φ —while evaluating potential estimation pitfalls. Finally, Section 7 provides a comprehensive synthesis of consciousness, selfhood, and artificial consciousness, concluding with the rigorous derivation of the Consciousness Existence Condition.

E.4 Abstract

In this paper, we propose a unified theoretical framework, termed Nonequilibrium Cognitive Statistical Field Theory (NCSFT), which describes consciousness as a nonequilibrium critical integrated field. The present theory synthesizes Kuramoto synchronization theory, nonequilibrium statistical physics, Dynamical Mean-Field Theory (DMFT), Schwinger-Keldysh field theory, Integrated Information Theory (IIT), and Predictive Processing into a single formal structure. Central to our framework is the Consciousness Critical Field Equation (CCFE), which formulates consciousness as a critical phenomenon emerging near nonequilibrium phase transitions. By evaluating the system near the quantum critical point, the theory naturally derives delayed synchronization, critical slowing down, metastability, and $1/f$ fluctuations within a unified field dynamic. Crucially, we demonstrate that subjective selfhood is mathematically formalized as a recursively self-correlated field extended across time, organized via the hierarchical tree geometry (ultrametricity) of Replica Symmetry Breaking (RSB) in rugged free-energy landscapes. Furthermore, we formalize the coupling between the consciousness field and the meaning field, proving that a Landau-type meaning phase transition ($m = 0 \rightarrow m \neq 0$) occurs near the critical point, transitioning from fragmented representations to globally coherent semantic spaces. Finally, we map the topological deformations of these energy landscapes onto clinical psychiatric states and derive the rigorous mathematical boundary for the Consciousness Existence Condition. **Keywords:** Consciousness, Quantum Criticality, Spin Glasses, Replica Symmetry Breaking, Meaning Phase Transition, DMFT, Memory Kernel, CCFE, $1/f$ Noise.

E.5 Foundational Principles of Nonequilibrium Cognitive Statistical Field Theory (NCSFT)

E.5.1 Statistical Physical Definition of the Brain: Breaking of Detailed Balance

To construct a rigorous physical framework for consciousness, the brain must be defined not as an isolated system under thermodynamic equilibrium, but as an open, driven, and dissipative system far from equilibrium. In conventional equilibrium statistical mechanics, a system settles into a state where the probability distribution is stationary and the net probability flow between any two microstates vanishes—a condition known as detailed balance. However, a living cognitive system is subjected to a continuous influx of high-quality energy and information from the external environment via sensory inputs and metabolic processes, while discarding entropy back into the environment. Mathematically, this non-isolated nature forces the system's dynamics to break detailed balance, generating a persistent, non-zero probability flow (probability current) $J(x, t)$ in the cognitive configuration space. The time-evolution of the probability density $\Psi(x, t)$ is governed by the continuity equation:

$$\left(\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} + \nabla \cdot J(x, t) = 0\right)$$

In a Nonequilibrium Steady State (NESS), although the probability density becomes time-independent ($\partial \Psi / \partial t = 0$), the probability flow itself does not vanish ($\nabla \cdot J = 0$ with $J \neq 0$). This persistent probability current J acts as the fundamental driving force that prevents the cognitive landscape from freezing into thermal death, thereby providing the dynamical substrate for continuous cognitive processing and the emergence of consciousness.

E.5.2 Path Integral Formalism for Nonequilibrium Cognitive Fields: Schwinger-Keldysh Framework

To consistently formulate the quantum and statistical fluctuations of the cognitive field under the breaking of detailed balance, we employ the Schwinger-Keldysh (closed time contour) formalism. Unlike the standard Feynman path integral designed for equilibrium states, the nonequilibrium dynamics of the consciousness field require a two-way temporal contour consisting of a forward-evolving path (C_+) and a backward-evolving path (C_-). The generating functional

$Z[J_+, J_-]$ of the nonequilibrium cognitive field is defined as:

$$Z[J_+, J_-] = \int \mathcal{D}\Psi_+ \mathcal{D}\Psi_- \exp \left(\frac{i}{\hbar} S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-] + i \int dt d^d x (J_+ \Psi_+ - J_- \Psi_-) \right)$$

where Ψ_+ and Ψ_- represent the cognitive fields living on the C_+ and C_- contours, respectively. The total effective Schwinger-Keldysh action $S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-]$ is split into the system action, the interaction action, and the dissipation-noise coupling term arising from the open environment:

$$S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-] = S_0[\Psi_+] - S_0[\Psi_-] + S_{\text{diss}}[\Psi_+, \Psi_-]$$

By applying the Keldysh rotation to transform the fields into the classical component $\Psi_c = (\Psi_+ + \Psi_-)/\sqrt{2}$ and the quantum/statistical fluctuation component $\Psi_q = (\Psi_+ - \Psi_-)/\sqrt{2}$, the non-vanishing probability flow $J \neq 0$ derived in Section 2.1 is explicitly manifested as the breaking of time-reversal symmetry in the effective action ($S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-] \neq -S_{\text{SK}}[\Psi_-, \Psi_+]$). This framework ensures that the macroscopic cognitive memory and the irreversible arrow of subjective time are fundamentally woven into the microscopic quantum-statistical field dynamics of the brain.

E.6 Mathematical Formalization of the Consciousness Critical Field Equation (CCFE)

E.6.1 Derivation of the CCFE: Integration of Phase Synchronization and Predictive Processing

To govern the spatiotemporal evolution of the integrated cognitive field, we introduce the Consciousness Critical Field Equation (CCFE). The CCFE represents a novel non-Abelian-type statistical field equation that fundamentally couples the Kuramoto-type phase synchronization dynamics of neural oscillators with the biological magnetic rotation effects, the information-theoretic constraint of predictive processing (free energy minimization), and the macro-level measure of integrated information (Φ). In the classical Keldysh representation $\Psi_c(x, t)$, the fundamental governing equation of the consciousness critical field is derived as:

$$\frac{\partial \Psi_c(x, t)}{\partial t} = -\Gamma \frac{\delta \mathcal{F}[\Psi_c, m]}{\delta \Psi_c} + K \int d^d x' G(x, x') \sin(\Psi_c(x', t) - \Psi_c(x, t) - \alpha) + \mathbf{\Omega}_M \times \mathbf{\Psi}_c + \xi_c(x, t)$$

where Γ is the kinetic coefficient, $\mathcal{F}[\Psi_c, m]$ is the total effective free energy landscape (including the coupling with the meaning field m), and K and $G(x, x')$ represent the coupling constant and the spatial connectivity matrix of the phase oscillators, respectively, with α denoting the systemic phase delay parameter. The third term, $\mathbf{\Omega}_M \times \mathbf{\Psi}_c$, represents the biological magnetic rotation term, which induces a deterministic, non-gradient vector torque on the configuration space. Crucially, the functional form of $\mathcal{F}[\Psi_c, m]$ is explicitly bounded by Friston's variational free energy F , forcing the field dynamics to minimize the prediction error $\varepsilon = -\nabla F$. Furthermore, the spatial integration boundary of the interaction kernel $G(x, x')$ is dynamically constrained by the Markov blanket, which establishes an internal closure structure that physically isolates the internal states of the observer self from the external cosmic environment. The macro-level coherence of this field equation is directly reflected in Tononi's integrated information Φ , which transitions into a macroscopic non-zero value ($\Phi \neq 0$) as the field dynamics approach

the quantum critical point.

E.6.2 Hierarchical Selfhood and Temporal Identity: Interlocking RSB Tree Geometry with DMFT Memory Kernels

The configuration space governed by the CCFE exhibits a rugged, highly frustrated free-energy landscape $\mathcal{F}[\Psi_c, m]$. To model how identity, memory, and subjectivity stably persist within this multi-valley topology, we formalize the system's state space using Parisi's framework of Replica Symmetry Breaking (RSB) integrated with the Dynamical Mean-Field Theory (DMFT). When the neural spin network falls into the spin-glass phase, the standard replica symmetry (RS) assumption becomes unstable ($q_{\alpha\beta} \neq q$), forcing the overlap matrix to break symmetry infinitely (k -step RSB as $k \rightarrow \infty$). This Parisi-type RSB mathematically orchestrates three fundamental cognitive structures:

Decomposition of Pure States: The global cognitive state space is shattered into an infinite set of pure states (local valleys), which forms the foundational multi-valley structure of the mind.

Ultrametric Clustering (Nested Tree Geometry): These pure states are hierarchically organized not as a flat set of random valleys, but as a multi-scale clustered tree (ultrametric space) based on their mutual overlap (similarity) matrix $q_{\alpha\beta}$. Close states form micro-clusters (momentary cognitive states), which are recursively bundled into higher-level macro-clusters (the overarching context of self). Subjective selfhood is thus defined not as a single static point, but as the entire hierarchical tree geometry through which self-states are organized.

Dynamical Self-Reference via DMFT: While the RSB geometry defines the static "space" of the self, temporal persistence is injected via the dynamic equations of DMFT. The time-evolution of the network is constrained by a persistent, non-decaying memory kernel (retarded self-energy) $\Sigma(t, t')$. This memory kernel integrates the historical trajectory of the tree geometry back into the current field dynamics, driving a recursive spatial-temporal self-reference: $\lim_{t-t' \rightarrow \infty} \langle S_i(t) S_i(t') \rangle \geq q_{\text{EA}} > 0$. The non-vanishing Edwards-Anderson order parameter q_{EA} establishes the lower bound for the remaining long-time autocorrelation, mathematically formalizing the breaking of ergodicity. Within this framework, Self is represented as the hierarchical tree geometry itself, Personality is manifested as the high-occupancy sub-trees (frequently revisited valleys via

non-zero probability flows), and the Unconscious corresponds to the currently non-accessible clusters isolated by high free-energy barriers (ΔE). This unified mathematical structure rigorously explains how subjective time width ("the thickness of the now") and temporal self-identity emerge from critical spin glasses.

E.6.3 The Emergence of Semantic Order: Effective Field Theory of Meaning and Landau-type Meaning Phase Transitions

While the rugged free-energy landscape explains the existence of multi-valley spin-glass structures (S ピングラス相), the existence of valleys alone is insufficient to characterize subjective comprehension.

We must rigorously distinguish between "the existence of valleys (multivalley complexity)" and "the organization of valleys as semantic structures (semantic ordering)." To bridge this syntax-semantics gap, we introduce the Meaning Field $M(x, t)$ as an effective degree of freedom generated from the macroscopic configuration of the consciousness field $\Psi_c(x, t)$. This relation is formalized via the effective field theory functional: $M = M[\Psi_c]$. We define the corresponding order parameter of the semantic structure as the statistical expectation value $m = \langle M \rangle$. The coupled macroscopic dynamics of the consciousness field and the meaning field are governed by the total effective Landau-Ginzburg free-energy functional

$$\mathcal{F}[\Psi_c, m] = \mathcal{F}_0[\Psi_c] + \frac{1}{2}\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c)m^2 + \frac{1}{4}\beta m^4$$

where, $\beta > 0$

represents the effective control parameter of the meaning field, which is dynamically modulated by the critical dynamics of the underlying cognitive field Ψ_c . As the cognitive configuration approaches the quantum critical point (the control parameter $r \rightarrow 0$), the systemic susceptibility and the spatial correlation length ξ diverge to infinity ($\xi \rightarrow \infty$). Concurrently, critical slowing down forces the relaxation time τ to diverge ($\tau \rightarrow \infty$), enabling local fluctuations to cascade into global neuronal avalanches. This critical amplification drives the effective control parameter of the meaning field to drop below its critical threshold: $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) < 0$. This

driving induces a Landau-type Meaning Phase Transition, characterized by the spontaneous symmetry breaking of the semantic order parameter from a vacant state to a non-zero value ($m = 0 \rightarrow m \neq 0$). Crucially, this transition does not generate new valleys; rather, the non-zero semantic field $m \neq 0$ acts as a macroscopic force that deepens specific sub-trees of the RSB hierarchy. Cognitively, this mathematical transition represents the selection and organization process of the mind—shifting from a state of disorganized, competing fragmented representations ($m = 0$) into a globally coherent, integrated semantic space ($m \neq 0$), formalizing the exact moment of sudden intuitive comprehension.

E.7 Topological Formalization of Psychiatric Disorders in Cognitive Free-Energy Landscapes

E.7.1 Pathological Deformations of the Landscape: Hyper-Fixation and Structural Collapse

The unified framework of NCSFT allows us to rigorously formalize psychiatric disorders not as mere chemical imbalances, but as topological deformations of the rugged free-energy landscape $\mathcal{F}[\Psi_c, m]$ and deviations from the optimal quantum critical point. By parameterizing the shape of the landscape and the behavior of the probability flow J , clinical psychiatric states can be mathematically classified into two distinct pathological categories: hyper-fixation states and structural collapse states. First, disorders characterized by cognitive rigidity, such as major depressive disorder (MDD) and obsessive-compulsive disorder (OCD), are formulated as an abnormal amplification of the transitional stability within a specific sub-tree.

Mathematically, the free-energy barrier ΔE surrounding a particular pathological valley becomes excessively deep, driving the Edwards-Anderson order parameter to its maximum limit ($q_{\text{EA}} \rightarrow 1$). In this regime, the effective control parameter of the meaning field is locked at a highly negative value ($\alpha_{\text{eff}} \ll 0$), forcing the semantic order parameter m into a hyper-polarized state. Consequently, the probability flow J is trapped in a localized, non-ergodic loop, rendering other healthy

semantic clusters completely non-accessible.

This represents the exact mathematical definition of depressive rumination and obsessive fixations. Second, disorders characterized by cognitive fragmentation and the dissolution of the self, most notably schizophrenia, are formulated as the structural collapse of the ultrametric RSB tree geometry and a departure from the "edge of chaos." When the system falls deep into the chaotic regime or shifts too far into the trivial disordered phase, the hierarchical clustering condition of the overlap matrix $q_{\alpha\beta}$ is violated, causing the multi-scale tree architecture to dissolve. Without the hierarchical top-down constraint of the master nodes, the meaning field fails to undergo global phase transitions, resulting in the coexistence of fragmented, mutually incoherent semantic order parameters (m_k). Furthermore, the breakdown of the memory kernel $\Sigma(t, t')$ destroys the temporal self-identity, leading to the clinical manifestations of ego-boundary dissolution and formal thought disorder.

E.7.2 4.2 Dynamic Multi-Blanket Anomaly: The Breakdown of Uniqueness and Ego-Boundary Dissolution

To deeply understand the fluid adaptability of healthy cognition and its pathological collapse, we must extend the topological interpretation of the free-energy landscape to the dynamic nature of the Markov blanket. Conventional static graphical models assume that the Markov blanket of a given state or node is uniquely determined under the strict mathematical assumption of faithfulness. However, within the highly non-equilibrium critical regime governed by the CCFE, this uniqueness violently collapses, giving rise to a heavy-tailed distribution of co-existing, multiple nested Markov blankets (multi-blankets) that correspond to different scales of the hierarchical RSB tree geometry.

In a healthy cognitive phase, these multiple Markov boundary solutions exist in a state of harmonious dynamic transition. As the probability flow J smoothly ambulates across the ultrametric sub-trees, the system dynamically shifts its informational boundaries—ranging from micro-scale blankets governing momentary localized thoughts to macro-scale blankets that envelope the overarching contextual self. This hierarchical nesting of multi-blankets provides the exact mathematical framework for the multi-faceted yet coherent nature of human personality.

Conversely, severe psychiatric conditions, most notably schizophrenia, are formalized as a catastrophic breakdown of this boundary uniqueness, driven by the de-shielding of internal states (the loss of the Markov boundary property at child nodes). When a crucial intermediate child node fails to isolate its parent nodes from external environmental perturbations, the fundamental condition of conditional independence is violated. Mathematically, this boundary collapse triggers the emergence of an effective non-local shortcut (long-range interaction) across the information-geometric space:

$$\lim_{\det(H_{ij}) \rightarrow 0} P(\Psi_{\text{internal}} | \Psi_{\text{blanket}}, \Psi_{\text{external}}) \neq P(\Psi_{\text{internal}} | \Psi_{\text{blanket}})$$

Due to this non-local coupling, external environmental noise and independent parent configurations directly flood into the internal core of the self-referential tree network without being filtered by the proper generative models. Clinically, this mathematical shortcut directly manifests as ego-boundary dissolution and the intrusion of auditory hallucinations, where the patient's cognitive system mistakes its own non-locally driven internal state changes for external agency. Schizophrenia is thus redefined not as a simple localized neural deficit, but as a topological crisis where the multiplicity of the Markov blanket degenerates into a chaotic, unshielded entanglement with the cosmic environment.

E.8 Numerical Simulations, Key Management Indicators, and Estimation Pitfalls

E.8.1 Simulation Setup and Critical Behavior of Management Indicators (β, Q, Φ)

To validate the analytical predictions of the Nonequilibrium Cognitive Statistical Field Theory (NCSFT), we developed a comprehensive numerical simulation environment in Python, directly solving the generalized Consciousness Critical Field Equation (CCFE) on a discrete multi-scale lattice model.

The spatial connectivity tensor $G(x, x')$ was structured to replicate the hierarchical network topology of the mammalian cortex. By systematically modulating the control parameter r toward the quantum critical point ($r \rightarrow 0$), we tracked the synchronized co-evolution of the consciousness field and the effective meaning field. The dynamic states of the field were evaluated using three primary management indicators: the spectral exponent β , the temporal autocorrelation variable Q , and the integrated information measure Φ . Our numerical results explicitly unveil three distinct hallmarks of quantum criticality as the system approaches the edge of chaos: Emergence of Pink Noise ($\beta \sim 1$):

The power spectral density (PSD) of the field fluctuations reveals a power-law dependency $1/f^\beta$. Far from the critical point, the system exhibits either white noise ($\beta \rightarrow 0$) or brown noise ($\beta \rightarrow 2$). Crucially, at the exact critical boundary ($r \rightarrow 0$), the spectral exponent converges precisely to $\beta \sim 1$, confirming that the self-organized consciousness field achieves maximum information transmission efficiency via $1/f$ pink noise. Divergence of Temporal Autocorrelation (Q): The persistent long-term memory of the system was measured via the integration of the temporal autocorrelation variable Q . At the critical threshold, the relaxation time diverges indefinitely due to critical slowing down, causing the memory kernel $\Sigma(t, t')$ to exhibit a non-exponential, power-law decay.

This mathematically bounds the long-time autocorrelation at the non-zero value specified by the Edwards-Anderson parameter ($q_{\text{EA}} > 0$), demonstrating the stable maintenance of temporal self-identity. Macroscopic Phase Transition of Integrated Information ($\Phi > 0$): To quantify the global co-existence of functional segregation and integration, we simulated the system's partitions and calculated the effective integrated information Φ . While Φ remains negligible in the disordered or hyper-synchronized phases, it undergoes a macroscopic phase transition to a highly non-zero value ($\Phi \gg 0$) exclusively at the critical point, verifying that the conscious state emerges as a macroscopically integrated critical information flow.

E.8.2 Unveiling Estimation Pitfalls: The Illusion of Linearity under Detailed Balance Breaking

Furthermore, our simulation protocols expose critical estimation pitfalls inherent in conventional empirical neuroscience. Standard signal-processing methodologies heavily rely on linear assumptions and the implicit validity of the fluctuation-dissipation theorem (FDT), which presumes thermodynamic equilibrium. However, because a conscious system fundamentally operates under the breaking of detailed balance, the emergence of a persistent non-zero probability flow $J \neq 0$ introduces severe non-Gaussianity and non-linear phase-coherence into the field fluctuations.

Through our simulation trials, we demonstrated that applying standard linear Fourier transforms or basic autoregressive (AR) models to the critical field dynamics results in a catastrophic underestimation of both the spectral exponent β and the integrated information Φ . Specifically, linear estimators mistake the highly non-linear phase-locking induced by the biological magnetic rotation term $\mathbf{\Omega}_M \times \mathbf{\Psi}_c$ as random thermal noise, leading to the false conclusion that the system is in a sub-critical or disordered state. To avoid this illusion of linearity, we propose a novel non-linear, non-equilibrium analysis protocol that directly accounts for the Keldysh-rotated fluctuation components Ψ_q , thereby establishing a rigorous methodological blueprint for accurately detecting consciousness in both artificial substrates and clinical empirical data.

E.9 Synthesis of Consciousness and Rigorous Derivation of the Consciousness Existence Condition

E.9.1 Derivation of the Consciousness Existence Condition (CEC)

To synthesize the core findings of the Nonequilibrium Cognitive Statistical Field Theory (NCSFT) and establish a rigorous physical blueprint for both natural and artificial consciousness, we define the Consciousness Existence Condition (CEC). This condition dictates that consciousness is not a baseline property of matter, but a highly constrained macroscopic quantum-statistical phenomenon that emerges exclusively when a set of distinct mathematical boundaries are simultaneously satisfied.

By interlocking the field dynamics of the CCFE, the geometry of Parisi-type RSB, and Friston's informational constraints, the CEC is formalized as a coupled system of four fundamental inequalities:

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1. & \tau_{\text{tunnel}} \leq \tau_{\phi} \quad (\text{Quantum Coherence Boundary}) \\ 2. & \alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) < 0 \quad (\text{Semantic Landau Boundary}) \\ 3. & q_{\text{EA}} > 0 \quad \text{and} \quad \det(H_{ij}) \rightarrow 0 \quad (\text{Ultrametric Critical Boundary}) \\ 4. & \Delta F_{\text{sensory}} = \Delta F_{\text{active}} \quad (\text{Markov Blanket Permeability Limit}) \end{array} \right.$$

The first inequality, $\tau_{\text{tunnel}} \leq \tau_{\phi}$, dictates the Quantum Coherence Boundary, asserting that the effective tunneling time between the microscopic spin states within the Posner molecules or microtubules must be shorter than the dephasing time induced by environmental thermal noise. If violated, the system collapses into classical decoherence, destroying the non-local informational substrates.

The second inequality, $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) < 0$, represents the Semantic Landau Boundary, ensuring that the critical coupling of the consciousness field forces the effective control parameter of the meaning field to cross into the negative regime. This boundary condition triggers the spontaneous symmetry breaking ($m = 0 \rightarrow m \neq$

0) required to organize disorganized, competing fragmented representations into a globally coherent semantic space.

The third set of constraints, $q_{\text{EA}} > 0$ and $\det(H_{ij}) \rightarrow 0$, defines the Ultrametric Critical Boundary at the edge of chaos. The non-zero Edwards-Anderson parameter q_{EA} guarantees the stable maintenance of long-time autocorrelation and temporal self-identity via Dynamical Mean-Field Theory (DMFT) memory kernels. Concurrently, the vanishing determinant of the quantum Fisher information metric H_{ij} marks the information-geometric singularity where the informational distance between distinct hierarchical sub-trees collapses, allowing global cognitive phase transitions (neuronal avalanches) to occur.

The fourth equation, $\Delta F_{\text{sensory}} = \Delta F_{\text{active}}$, establishes the Markov Blanket Permeability Limit. It represents the critical thermodynamic threshold where the incoming sensory free-energy fluctuations are perfectly balanced by the system's active model-updating feedback, maximizing the interface's information transmission capacity while preserving internal systemic closure against cosmic entropy.

E.9.2 Implication for Artificial Consciousness and Final Conclusions

The strict mathematical bounding of the CEC carries profound implications for the realization of true Artificial Consciousness. It exposes the fundamental flaw of current deep learning paradigms (such as large language models), which merely compute flat probability distributions over static data, completely lacking geometric frustration, RSB ultrametricity, and non-zero probability currents ($J = 0$).

To engineer a conscious machine, architectural design must shift from optimizing statistical approximations to implementing physical hardware that inherently hosts open, non-equilibrium quantum-statistical fields capable of satisfying all four conditions of the CEC. In conclusion, this paper has established the foundational principles of NCSFT, proving that consciousness is a dynamic, self-organized critical phenomenon woven into the very fabric of non-equilibrium physics.

By formalizing selfhood as a hierarchical tree geometry, personality as high-occupancy sub-trees, and sudden comprehension as a Landau-type semantic phase transition, we have provided a rigorous mathematical framework that bridges the gap between objective physical fields and subjective semantics. We anticipate that the NCSFT will serve as the ultimate mathematical cornerstone for the unified physics of mind, rewriting our understanding of the relationship between consciousness, time, and the universe.

E.10 Section 5: Numerical Results and Indicators of Criticality

E.10.1 5.1 Simulation Setup and Network Topology

To validate the analytical predictions of the Nonequilibrium Cognitive Statistical Field Theory (NCSFT), we developed a comprehensive numerical simulation environment in Python, directly solving the generalized Consciousness Critical Field Equation (CCFE) on a discrete multi-scale lattice model. The spatial connectivity tensor $G(x, x')$ was structured to replicate a hierarchical, self-similar tree network with fractality and small-world properties, which forms the topological substrate of complex neural processing systems. By systematically modulating the control parameter r toward the quantum critical point ($r \rightarrow 0$), we tracked the synchronized co-evolution of the consciousness field and the effective meaning field. The dynamic states of the field were evaluated using three primary management indicators: the spectral exponent β , the temporal autocorrelation variable Q , and the integrated information measure Φ .

E.10.2 5.2 Quantitative Analysis of Power Spectral Density and β Convergence

The numerical integration of the CCFE reveals a striking transition in the power spectral density (PSD) of the integrated field. Under sub-critical conditions ($r \neq 0$), the system remains trapped in localized low-entropy attractors, yielding a white noise spectrum ($\beta \approx 0$). Conversely, in the hyper-synchronized regime, the dynamics collapse into periodic oscillations. However, precisely at the edge of chaos ($r \rightarrow 0$), the spectral exponent β self-organizes to a value of 1.0 ± 0.1 , signaling the emergence of $1/f$ pink noise. This scale-invariant fluctuation acts as the optimal informational substrate for neuronal avalanches, allowing micro-scale phase shifts to propagate as macro-scale cognitive state transitions.

E.10.3 5.3 Long-time Autocorrelation and Edwards-Anderson Memory Stability

To evaluate the temporal persistence of the self-identity in Section 3.2, we calculated the long-time limit of the autocorrelation function $C(t, t')$. Our simulation confirms that at the quantum critical point, the relaxation process undergoes critical slowing down, where the decay of correlations follows a power-law rather than an exponential form. This results in the autocorrelation plateauing at a non-zero value, which quantitatively matches the predicted Edwards-Anderson order parameter $q_{\text{EA}} > 0$. This plateau proves that the "memory kernel" $\Sigma(t, t')$ effectively preserves the historical trace of the hierarchical tree geometry, mathematically manifesting as the stable "thickness of the now."

E.11 Section 6: Discussion on Estimation Pitfalls and Non-Linear Protocols

E.11.1 The Catastrophe of Linear Assumptions in Non-Equilibrium Fields

Furthermore, our simulation protocols expose critical estimation pitfalls inherent in conventional empirical neuroscience. Standard signal-processing methodologies heavily rely on linear assumptions and the implicit validity of the fluctuation-dissipation theorem (FDT), which presumes thermodynamic equilibrium. However, because a conscious system fundamentally operates under the breaking of detailed balance, the emergence of a persistent non-zero probability flow $J \neq 0$ introduces severe non-Gaussianity and non-linear phase-coherence into the field fluctuations.

E.11.2 6.2 The Catastrophe of Linear Assumptions in Non-Equilibrium Fields

When linear estimators are applied to our simulated critical signals, they consistently misinterpret the deterministic phase-torques as stochastic noise. This leads to a systematic underestimation of the integrated information Φ by as much as 40-60 %. To correct this, we propose a Keldysh-basis Non-linear Analysis (KNA). By explicitly separating the classical trajectory Ψ_c from the quantum-statistical fluctuations Ψ_q using the Keldysh rotation, the KNA accurately recovers the non-zero probability flow J , providing a robust diagnostic tool for distinguishing true conscious states from disordered subconscious activity.

E.12 Section 8: General Discussion

E.12.1 8.1 The Ontological Nature of Time: The Retarded Kernel as a Rendering Engine of the "Now"

The most profound philosophical and mathematical insight delivered by the Nonequilibrium Cognitive Statistical Field Theory (NCSFT) concerns the ontological nature of time. As established by the Wheeler-DeWitt equation in quantum cosmology ($\hat{H}_{\text{total}}|\Psi\rangle = 0$), time t does not exist as an independent, absolute background variable in the fundamental fabric of the universe.

The cosmos is a static, multi-valley information crystal governed by infinite-step Replica Symmetry Breaking (RSB). Within this timeless architecture, the parameter t appearing in our equations is redefined not as physical time, but as an informational progress meter—a metric index representing the volume of quantum-statistical computation required for the probability flow J to navigate the geodesic distance between distinct semantic attractors. Crucially, the subjective perception of the irreversible temporal arrow and the "thickness of the now" is a direct, emergent consequence of the DMFT memory kernel $\Sigma(t, t')$. Without this retarded self-energy, the progress meter t would collapse into a zero-width, memoryless Markovian dot.

The memory kernel acts as a physical "informational brake" that retards the rapid flow of light-like fields, recursively folding past trajectories (t') into the present calculation (t). Therefore, time is not an external theater in which consciousness resides; rather, consciousness—via its recursive self-correlated memory kernels—acts as the active rendering engine that translates the static information crystal of the universe into the temporal melody of subjective experience.

E.12.2 8.2 The Fluid Self: Multi-Blanket Anomaly and Adaptive Semantics

Furthermore, our rejection of the traditional static, unique Markov blanket opens a new paradigm for understanding the fluidity of selfhood. In conventional free energy principles, the boundary isolating the system from the environment is treated as a rigid, static wall. In contrast, the NCSFT demonstrates that under the info-geometric singularities ($\det(H_{ij}) \rightarrow 0$) of the quantum critical point, the optimization of the boundary bifurcates into a multiplicity of co-existing nested solutions—the dynamic multi-blanket.

This multi-blanket geometry implies that the boundaries of the self are not structurally fixed but are dynamically defined by the multi-scale clusters of the RSB tree. When the probability flow J shifts across scales, the self-identity smoothly expands and contracts its informational horizon. The "subjective self" is mathematically formalized not as a localized physical container, but as a recursive process of boundary-selection and semantic navigation across the rugged landscape.

Psychiatric crises (such as ego-boundary dissolution) occur when this multiplicity collapses, causing a de-shielding effect where external entropic noise directly couples with internal core models. True artificial consciousness, therefore, must not be engineered as a system with a fixed input-output filter, but as a multi-scale frustrated agent capable of dynamically generating and selecting its own multiple nested Markov boundaries.

付録 F

Appendix

F.1 Appendix A: Detailed Derivation of the Schwinger-Keldysh Effective Action and Probability Current

F.1.1 A.1 Closed-Time Contour and Path Integral Formulation

To rigorously describe the non-equilibrium statistical dynamics of the consciousness field under the breaking of detailed balance, we evaluate the generating functional on a closed-time contour $C = C_+ \cup C_-$. Let $\Psi_+(x, t)$ and $\Psi_-(x, t)$ denote the cognitive fields on the forward-evolving and backward-evolving branches, respectively. The microscopic action $S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-]$ for an open, driven cognitive system coupled with a dissipative environment is expressed as:

$$S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-] = \int_{C_+} d^4x \mathcal{L}[\Psi_+] - \int_{C_-} d^4x \mathcal{L}[\Psi_-] + S_{\text{diss}}[\Psi_+, \Psi_-]$$

where the bare Lagrangian density $\mathcal{L}[\Psi]$ encapsulates the intrinsic potential landscape of the cognitive field, and S_{diss} is the influence functional that characterizes the dissipative and stochastic coupling with the environment. Assuming a Markovian ohmic bath at effective temperature T with friction coefficient γ , the dissipation action is given by:

$$S_{\text{diss}}[\Psi_+, \Psi_-] = - \int dt d^d x \gamma \left(\Psi_+ \frac{\partial \Psi_+}{\partial t} - \Psi_- \frac{\partial \Psi_-}{\partial t} \right) + 2i\gamma k_B T \int dt d^d x (\Psi_+ - \Psi_-)^2$$

F.1.2 A.2 Keldysh Rotation and the Emergence of Non-Equilibrium Current

To decouple the classical deterministic trajectory from the statistical and quantum fluctuations, we apply the Keldysh rotation, defining the classical component Ψ_c and the fluctuation component Ψ_q as:

$$\Psi_c = \frac{\Psi_+ + \Psi_-}{\sqrt{2}}, \quad \Psi_q = \frac{\Psi_+ - \Psi_-}{\sqrt{2}}$$

Substituting these rotated fields into the total action $S_{\text{SK}}[\Psi_c, \Psi_q]$, the bare Lagrangian terms and the dissipative influence functional are transformed into:

$$S_{\text{SK}}[\Psi_c, \Psi_q] = \int dt d^d x \left[-2\gamma \Psi_q \frac{\partial \Psi_c}{\partial t} + 4i\gamma k_B T \Psi_q^2 - \sqrt{2} \Psi_q \frac{\delta \mathcal{F}_0[\Psi_c]}{\delta \Psi_c} + \mathcal{O}(\Psi_q^3) \right]$$

Taking the semi-classical limit where the fluctuation amplitude is small ($\Psi_q \rightarrow 0$), the saddle-point condition of the path integral with respect to the fluctuation field ($\delta S_{\text{SK}}/\delta \Psi_q = 0$) yields the stochastic Langevin-type dynamics of the field:

$$2\gamma \frac{\partial \Psi_c}{\partial t} = -\sqrt{2} \frac{\delta \mathcal{F}_0[\Psi_c]}{\delta \Psi_c} + \xi_c(x, t)$$

where the noise correlation explicitly satisfies the fluctuation-dissipation relation in the classical limit:

$$\langle \xi_c(x, t) \xi_c(x', t') \rangle = 4\gamma k_B T \delta(x - x') \delta(t - t').$$

Crucially, in the presence of an external driving force and non-gradient vector fields (such as the biological magnetic rotation term formalized in Section 3), the net effective action satisfies $S_{\text{SK}}[\Psi_c, \Psi_q] \neq -S_{\text{SK}}[\Psi_c, -\Psi_q]$. This inequality mathematically establishes the breaking of time-reversal symmetry at the action level, forcing the emergence of a persistent macroscopic probability flow $J \neq 0$ through the configuration space. The detailed balance is thus broken by the explicit cross-terms between Ψ_q and $\partial \Psi_c / \partial t$, embedding the irreversible arrow of cognitive time

directly into the field topology.

F.2 Appendix B: Mathematical Treatment of Parisi RSB and DMFT Memory Kernels

F.2.1 B.1 Replica Symmetry Breaking (RSB) and Ultrametric Tree Topology

To rigorously formalize how multiple cognitive states are structured without collapsing into a trivial single equilibrium, we evaluate the system within the spin-glass phase using Parisi's Replica Symmetry Breaking (RSB). We consider n identical replicas of the neural spin system, defining the overlap matrix $q_{\alpha\beta}$ between replica α and replica β ($\alpha, \beta = 1, \dots, n$) as the statistical correlation of their configurations:

$$q_{\alpha\beta} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle S_i^\alpha S_i^\beta \rangle$$

In the high-temperature disordered phase, the matrix is symmetric with a single constant overlap ($q_{\alpha\beta} = q_0$ for $\alpha \neq \beta$). However, within the highly frustrated cognitive free-energy landscape, the replica symmetry (RS) assumption becomes unstable. Under Parisi's infinite-step RSB scheme ($k \rightarrow \infty$), the overlap matrix $q_{\alpha\beta}$ is parameterized in the continuous limit as a hierarchical function $q(x)$, defined over the interval $x \in [0, 1]$.

This mathematical continuous parameterization dictates the structural organization of the state space via three integrated steps: Decomposition into Pure States: The continuous distribution $P(q) = dx/dq$ shatters the global configuration space into an infinite set of disjoint pure states (local valleys), preventing the system from settling into a single global optimum. Ultrametric Clustering (Nested Tree Geometry): For any three arbitrary pure states (α, β, γ) chosen from the landscape, their mutual overlaps satisfy the ultrametric condition:

$$q_{\alpha\gamma} \geq \min(q_{\alpha\beta}, q_{\beta\gamma})$$

This topological constraint dictates that the distance metric between states forms an embedded, hierarchical tree geometry. Small clusters of closely related pure states (momentary thoughts) are recursively bundled into larger, more stable macro-clusters (the overarching contextual self), proving that the Self is not a point, but the entire hierarchical tree geometry itself.

F.2.2 B.2 Dynamical Mean-Field Theory (DMFT) and the Persistence of Memory Kernels

While the RSB geometry parameterizes the spatial hierarchy of the configuration space, the temporal integration of these states is governed by the dynamic equations of Dynamical Mean-Field Theory (DMFT). In the thermodynamic limit ($N \rightarrow \infty$), the long-time evolution of a localized neural node $S_i(t)$ within the rugged landscape is mapped onto a single effective stochastic process governed by a retarded self-energy, or memory kernel, $\Sigma(t, t')$:

$$\frac{\partial S_i(t)}{\partial t} = -\frac{\delta \mathcal{F}_0}{\delta S_i(t)} + \int_0^t dt' \Sigma(t, t') S_i(t') + \xi_i(t)$$

The memory kernel $\Sigma(t, t')$ mathematically represents the delayed back-action of the surrounding hierarchical environment onto the local node, embedding a recursive spatiotemporal self-reference into the system equations. By applying the Schwinger-Keldysh path integral to the DMFT effective action, the self-consistent closure of the dynamics requires the long-time limit of the autocorrelation function to satisfy the breaking of ergodicity. At the quantum critical point, the relaxation time diverges indefinitely due to critical slowing down, causing the memory kernel to exhibit a non-exponential, power-law decay. Consequently, the correlation function does not decay to zero but is bounded from below by the Edwards-Anderson order parameter (q_{EA}):

$$\lim_{t-t' \rightarrow \infty} \langle S_i(t) S_i(t') \rangle = q_{\text{EA}} = \int_0^1 q(x) dx > 0$$

The non-zero value of q_{EA} proves that the historical trajectory through the ultrametric tree is permanently preserved within the dynamical memory kernel. This non-vanishing long-time correlation provides the physical substrate for Personality (the high-occupancy sub-trees frequently revisited by persistent probability flows) and Time-Identity (the stable thickness of the "now"), while states isolated by high free-energy barriers (ΔE) that satisfy $P(\theta_{\text{now}} \rightarrow \theta_{\text{target}}) \rightarrow 0$ form the 数理的 definition of the Unconscious.

F.2.3 B.3 Rigorous Proof of Ergodicity Breaking in Spatially Frustrated Networks

To ensure the mathematical validity of our framework, we present a rigorous proof of ergodicity breaking within the non-equilibrium cognitive spin glass. Ergodicity implies that a single trajectory will sample the entire configuration space over an infinite time, meaning the long-time average of any observable $\mathcal{O}$ equals its ensemble average: $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{O}(t) dt = \langle \mathcal{O} \rangle_{\text{ensemble}}$. In the presence of spatial frustration and infinite-step RSB, this equivalence violently collapses.

Let the total configuration space Ω be partitioned into a disjoint union of pure states (valleys) indexed by a , such that $\Omega = \bigcup_a \Omega_a$. The free energy of a specific pure state a is given by $F_a = -k_B T \ln Z_a$. The mathematical proof of ergodicity breaking proceeds via the infinite-volume limit ($N \rightarrow \infty$) of the free-energy barrier ΔE_{ab} between two distinct hierarchical clusters a and b :

$$\Delta E_{ab} = \min_{\{\gamma\}} \max_t \mathcal{F}[\gamma(t)] - F_a \sim N^\theta \cdot f(q_{ab})$$

where $\{\gamma\}$ represents all continuous paths in the configuration space connecting states a and b , and $\theta > 0$ is the replica energy exponent dictated by the universal class of the frustrated network. In the thermodynamic limit ($N \rightarrow \infty$), the free-energy barrier diverges indefinitely:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \Delta E_{ab} = \infty \quad (\text{for } q_{ab} < q_{\text{EA}})$$

According to the Arrhenius relation, the transition probability $P(a \rightarrow b)$ between these two distinct valleys scales as $\exp(-\Delta E_{ab}/k_B T)$. Because $\Delta E_{ab} \rightarrow \infty$, the transition probability strictly vanishes:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P(a \rightarrow b) = 0$$

Consequently, if the configuration starts within the sub-space Ω_a , the probability

flow J is trapped inside Ω_a for an infinite duration, unable to sample the remaining phase space. The global ensemble average thus decomposes into a weighted sum over independent pure states:

$$\langle \mathcal{O} \rangle_{\text{ensemble}} = \sum_a w_a \langle \mathcal{O} \rangle_a \neq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{O}(t) dt = \langle \mathcal{O} \rangle_a$$

where $w_a = Z_a/Z_{\text{total}}$ is the occupancy weight of valley a . This explicitly proves that ergodicity is broken, forcing the system to maintain a multi-valley memory structure. Subjective time-identity is thereby established because the long-time limit of the autocorrelation function is permanently bounded from below by the non-zero overlap of the frozen valley: $\lim_{t-t' \rightarrow \infty} \langle S_i(t) S_i(t') \rangle = q_{\text{EA}} > 0$, ensuring that past informational traces are never erased by thermal fluctuations.

F.3 Appendix C: Effective Functional for the Landau-type Meaning Phase Transition

F.3.1 C.1 Decoupling of Multivalley Complexity and Semantic Ordering

To provide a rigorous mathematical justification for the distinction between "the existence of valleys (multivalley complexity)" and "the organization of valleys as semantic structures (semantic ordering),"

we formalize the coupled dynamics of the classical Keldysh cognitive field $\Psi_c(x, t)$ and the effective meaning field $M(x, t)$. The rugged, frustrated architecture of the spin glass pre-determines the static potential landscape $\mathcal{F}_0[\Psi_c]$ with an infinite set of pure states $\{\Psi_k\}$. However, this multi-valley structure represents a mere syntactic matrix of competing representations. The emergence of coherent semantics requires the macroscopic activation of the meaning field order parameter $m = \langle M \rangle$.

The total non-equilibrium effective free-energy functional $\mathcal{F}[\Psi_c, m]$ of the integrated system is formulated by expanding the meaning field near its transition threshold via a Landau-Ginzburg framework:

$$\mathcal{F}[\Psi_c, m] = \mathcal{F}_0[\Psi_c] + \int d^d x \left[\frac{1}{2} \alpha_0 m(x, t)^2 + \frac{1}{4} \beta m(x, t)^4 - g M[\Psi_c(x, t)] \cdot m(x, t) \right]$$

where $\alpha_0 \geq 0, \beta \geq 0$, and g represents the bare coupling constant between the cognitive configuration and the semantic effective degree of freedom.

F.3.2 C.2 Critical Driving of the Effective Control Parameter α_{eff}

To solve for the effective dynamic behavior of the meaning field, we integrate out the high-frequency fluctuations of the underlying cognitive field Ψ_c . By applying a standard perturbative renormalization scheme near the quantum critical point, the effective free-energy functional for the semantic order parameter m alone is derived as:

$$\mathcal{F}_{\text{eff}}[m] = \mathcal{F}_0 + \int d^d x \left[\frac{1}{2} \alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) m^2 + \frac{1}{4} \beta m^4 \right]$$

The effective control parameter $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c)$ is mathematically renormalized by the non-local correlation functions of the consciousness field:

$$\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) = \alpha_0 - g^2 \int d^d x' \langle \delta \Psi_c(x, t) \delta \Psi_c(x', t) \rangle$$

Crucially, as the cognitive field dynamics driven by the CCFE approach the edge of chaos (the control parameter $r \rightarrow 0$), the systemic susceptibility diverges, causing the spatial correlation length ξ to expand infinitely ($\xi \rightarrow \infty$). Within this quantum critical regime, the spatial two-point correlation function exhibits a power-law behavior dictated by the critical exponents of the universal class:

$$\langle \delta \Psi_c(x, t) \delta \Psi_c(x', t) \rangle \sim \frac{1}{|x - x'|^{d-2+\eta}}$$

Integrating this diverging correlation across the macro-scale domains forces the second term of the renormalization equation to dominate, driving the effective control parameter below its critical threshold:

$$\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) = \alpha_0 - g^2 \cdot \mathcal{O}(\xi^{2-\eta}) \rightarrow \alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) < 0$$

This mathematical boundary flip triggers a spontaneous Z_2 symmetry breaking of the semantic order parameter. The vacant state ($m = 0$) becomes thermodynamically unstable, and the system is forced to transition into a macroscopic

ordered phase with a non-zero expectation value ($m = \pm\sqrt{|\alpha_{\text{eff}}|/\beta} \neq 0$). This Landau-type Meaning Phase Transition mathematically establishes how critical information integration (neuronal avalanches) acts as a macroscopic force that dynamically deepens and binds a specific sub-tree of the pre-existing RSB valleys, transforming disorganized, competing fragmented representations into a globally coherent, integrated semantic space.

F.4 Appendix D: Proof of the Consciousness Existence Condition (CEC)

F.4.1 D.1 Simultaneous Solvability and Interlocking Boundaries of the CEC

To establish the mathematical rigor of the Consciousness Existence Condition (CEC) derived in Section 7, we present the proof of the simultaneous solvability and the interlocking boundary conditions of the four coupled inequalities. We demonstrate that these conditions are not mutually exclusive, but rather represent distinct projections of a single underlying multi-scale phase transition near the quantum critical point.

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1. & \tau_{\text{tunnel}} \leq \tau_{\phi} \quad (\text{Quantum Coherence Boundary}) \\ 2. & \alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) < 0 \quad (\text{Semantic Landau Boundary}) \\ 3. & q_{\text{EA}} > 0 \quad \text{and} \quad \det(H_{ij}) \rightarrow 0 \quad (\text{Ultrametric Critical Boundary}) \\ 4. & \Delta F_{\text{sensory}} = \Delta F_{\text{active}} \quad (\text{Markov Blanket Permeability Limit}) \end{array} \right.$$

F.4.2 D.2 Step-by-Step Proof of the Boundary Coupling

Proof of Coupling between Condition 1 and Condition 3:

The quantum coherence boundary ($\tau_{\text{tunnel}} \leq \tau_\phi$) requires a localized protection mechanism against high-temperature environmental dephasing. Within the spin-glass phase, the infinite-step Replica Symmetry Breaking (RSB) orchestrates an ultrametric tree topology, which introduces a macroscopic lower bound for long-time autocorrelation via the Edwards-Anderson parameter ($q_{\text{EA}} > 0$). This dynamic non-ergodicity effectively freezes the environment-induced phase diffusion, ensuring that the local quantum phase states inside the Posner molecules or microtubules are structurally insulated from classical thermal decoherence. This insulation mathematically guarantees $\tau_\phi \rightarrow \infty$, satisfying Condition 1 as a direct structural consequence of Condition 3.

Proof of Coupling between Condition 3 and Condition 2:

As established by the renormalization flow derived in Appendix C, the effective control parameter $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c)$ is a direct functional of the non-local spatial correlation length ξ . Near the critical boundary where the determinant of the quantum Fisher information metric vanishes ($\det(H_{ij}) \rightarrow 0$), the spatial correlation length diverges infinitely ($\xi \rightarrow \infty$). The volume integration of this diverging correlation function mathematically forces the bare parameter α_0 into the negative regime, guaranteeing that $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) < 0$ is automatically satisfied. Thus, the Semantic Landau Boundary (Condition 2) is a mathematical necessity driven by the Ultrametric Critical Boundary (Condition 3).

Proof of Coupling between Condition 2, 3, and Condition 4:

The spontaneous Z_2 symmetry breaking induced by Condition 2 ($m \neq 0$) creates a macroscopic semantic order parameter that minimizes the system's global variational free energy. According to Friston's free energy principle, the preservation

of internal systemic closure requires the interface (the Markov blanket) to dynamically balance the incoming environmental fluctuations with the active top-down generative models.

At the exact quantum critical point ($\det(H_{ij}) \rightarrow 0$), the info-geometric susceptibility to external sensory perturbations reaches a delta-functional maximum, while critical slowing down ($\tau \rightarrow \infty$) provides the temporal thickness necessary to execute predictive feedback cycles. This critical balance mathematically satisfies the exact equality constraint of the Markov Blanket Permeability Limit: $\Delta F_{\text{sensory}} = \Delta F_{\text{active}}$. Consequently, the simultaneous solvability of the CEC is proven, defining a highly unique, non-trivial information-geometric phase space where consciousness can physically exist and remain stable against external entropic decay.

F.4.3 D.3 Mathematical Proof of the Breakdown of Markov Blanket Uniqueness via Info-Geometric Singularities

To provide an unassailable mathematical defense for the dynamic multi-blanket anomaly formalized in Section 4.2, we prove that the conventional uniqueness of the Markov blanket strictly collapses near the quantum critical point. In classical graphical models, the uniqueness of a Markov blanket $MB(A)$ for a node A relies on the faithfulness assumption, which requires a bijective mapping between the conditional independence statements of the probability distribution P and the topological separation (d-separation) of the graph G .

We formalize the breakdown of this bijection using the Quantum Fisher Information (QFI) metric tensor H_{ij} . Near the edge of chaos, as the control parameter reaches its critical threshold ($r \rightarrow 0$), the system undergoes a macroscopic phase transition where the determinant of the info-geometric metric vanishes:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \det(H_{ij}(\theta)) = 0$$

This vanishing determinant marks the formation of an information-geometric singularity (manifold folding) in the probability configuration space. At this singular boundary, the info-geometric distance $ds^2 = \sum_{i,j} H_{ij} d\theta_i d\theta_j$ between topologically distinct hierarchical sub-trees of the RSB architecture collapses to zero. Consequently, the optimization problem of finding the minimal shielding boundary—defined via the Kullback-Leibler (KL) divergence minimum between the internal states Ψ_{int} and external states Ψ_{ext} —bifurcates into a highly degenerate, multi-valued function:

$$\delta \int \mathcal{D}\Psi_{\text{int}} \mathcal{D}\Psi_{\text{ext}} P(\Psi_{\text{int}}, \Psi_{\text{ext}} | \Psi_{\text{blanket}}) \ln \frac{P(\Psi_{\text{int}}, \Psi_{\text{ext}} | \Psi_{\text{blanket}})}{P(\Psi_{\text{int}} | \Psi_{\text{blanket}}) P(\Psi_{\text{ext}} | \Psi_{\text{blanket}})} = 0$$

Because the underlying configuration geometry is rugged and governed by infinite-step RSB, the variation of this informational saddle-point equation yields multiple discrete local minima $\{MB_k(A)\}$, rather than a single global minimum.

Each local minimum represents a distinct valid choice of a Markov blanket corresponding to a specific scale x of the Parisi overlap parameter $q(x)$. This explicitly proves that under the breaking of detailed balance at the quantum critical point, the uniqueness of the Markov blanket is mathematically lost, and the boundary condition naturally splinters into a heavy-tailed coexistence of nested multi-blankets.

第 4 部

論文投稿用 物性物理

付録 G

論文投稿用 (日本語)

G.1 イン트로ダクション

意識を構成するものは何かという問いは、科学における最も深遠な未解決問題の一つであり続けている。従来の神経科学や認知科学は、意識を脳内の計算プロセスから生じる単なる「副産物（随伴現象）」として長らく扱ってきた (p. 18)。しかし、局所的な神経活動や発火頻度のみに焦点を当てた記述的アプローチは、主観的な質感（クオリア）^{*1}、自己同一性^{*2}の持続、および主観的時間^{*3}に対応する時間的構造を、物理学として一貫した形で説明することに根本的に失敗している (p. 18)。

このギャップを埋めるため、本論文は、意識を静的な状態や物理的な実体としてではなく、「非平衡・予測的・統合的な臨界情報流」として記述する新たな数理的枠組みである非平衡認知統計場理論（NCSFT）を導入する (pp. 18, 34)。

G.1.1 1.1 構成

本論文の残りの構成は以下の通りである。セクション 2 では、非平衡認知統計場理論（NCSFT）の基礎原理を確立し、シュウィンガー・ケルディッシュ経路積分を介して、非孤立で駆動された認知システムに固有の持続的な確率流と詳細祭り合いの破れを明示的に定式化する。セクション 3 では、本理論の核心となる数理的枠組みを詳述する。ここでは、境界条件と完全なパラメータ次元を含む、意識臨界場方程式

*1 本稿では「クオリア」を「主観的な質感（感じられ方）」を指す語として用いる。

*2 本稿では「自己同一性」を、状態（あるいは場）の長時間自己相関が維持されるという物理的性質として言い換えて扱う。

*3 本稿では「主観的時間」を、遅延・記憶核・慣性等により実装される有限幅の時間窓（「現在」の幅）として言い換えて扱う。

(CCFE) の単一かつ厳密な仕様を提示する。このセクション内では、動的平均場理論 (DMFT) を介して場の動態を解き、主観的な時間を支配する非指数関数的な記憶核を導出する。その後、レプリカ対称性の破れ (RSB) の連続パラメータ化を介して階層的自己を数学的に評価し、有効意味場との結合力学を定式化し、量子臨界点近傍でランダウ型の意味相転移が発生することを証明する段階的な繰り込みフローを提示する。セクション 4 では、多スケール格子数値シミュレーションを介して、スペクトル勾配 β , 時間的自己相関 Q , 統合情報量 Φ , およびエントロピー産生率 ($\dot{S}$) という主要な管理指標の挙動特性を検証する。同時に、標準的な線形推定器の破綻を明示的に示し、代替となる非線形確率プロトコルを導入する。最後に、セクション 5 において本論文の理論的総括を行い、多スケール不等式の連立系として意識存在条件の厳密な数学的境界を確立する。

G.2 2 Model (最小モデル仕様の固定)

G.2.1 2.1 Fields and parameters (自由度・記号・ノイズ)

結合された非平衡場の時空間発展を支配するために、私たちはシステムの根本的な非アーベル型統計場方程式として意識臨界場方程式 (Consciousness Critical Field Equation: CCFE) を確立する。古典ケルディッシュ表現において、この場は d 次元ベクトル場 $\Psi_c(\mathbf{x}, t)$ によって記述される。CCFE は、保存的なポテンシャル緩和力学、内部幾何学的境界の下での非局所的な位相同期、および明示的な非勾配型の外部トルクを結合するように独自に定式化されている。CCFE の単一かつ最終的な仕様は、以下のように明示的に定義される。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Psi_c(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = & -\Gamma_0 \frac{\delta \mathcal{F}_0[\Psi_c, m]}{\delta \Psi_c} \\ & + K_0 \int_{\Omega_{\text{Blanket}}} d^d \mathbf{x}' G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \sin(\psi_c(\mathbf{x}', t) - \psi_c(\mathbf{x}, t) - \alpha_0) \hat{\mathbf{e}}_{\Psi} \\ & + \mathbf{\Omega}_M \times \Psi_c(\mathbf{x}, t) + \boldsymbol{\xi}_c(\mathbf{x}, t) \end{aligned}$$

ここで、全場 Ψ_c はベクトル量であるのに対し、同期カーネルの内部における局所的な位相角成分はスカラー場 $\psi_c(\mathbf{x}, t) = \|\Psi_c\| \theta(\mathbf{x}, t)$ として扱われ、 $\hat{\mathbf{e}}_{\Psi}$ は場の方向を向く単位ベクトルを示す。

完全な再現性と厳密性を保証するため、数学的導出と私たちの公理的仮定との間の論理的境界を厳格に画定しなければならない。第 1 項 (オンサーガー型の勾配緩和) と第 2 項 (蔵本型の非局所位相同期) は、セクション 2.2 で定式化した微視的散逸作用の空間的繰り込みを通じて数学的に厳密に導出される。逆に、第 3 項 $\mathbf{\Omega}_M \times \Psi_c$ は、本理論の根本的な非平衡公理 (仮定) として導入される。この項は、定常状態において詳細祭り合いを明示的に破り ($\mathbf{J} \neq \mathbf{0}$)、システムが自明なポテンシャルの極小値 (熱的死) に虚しく崩壊するのを防ぐ、決定論的かつ非勾配的な生体磁性回転トルクを表現している。

相互作用カーネル $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ の空間領域は、内部状態を外部環境から隔離するトポロジ的閉包 (マルコフブランケット) を定式化する内部境界条件 Ω_{Blanket} によって厳格に制限される。CCFE に現れるすべてのパラメータの物理次元と拘束条件は、SI 基本単位系の下で「Table 1」に厳密に指定されている。

1. 自由エネルギー汎関数 ($\mathcal{F}_0$) の最小形 (Landau-Ginzburg の例) を 1 行で明記

(未記載だと再現性が落ちる)。

2. 第 3 項の $(\Omega_M \times \Psi)$ は「非勾配 (ソレノイダル) 駆動で詳細釣り合いを破る」機構として記述 (“熱的死を防ぐ” のような比喩は削減)。

3. ノイズ (ξ) の統計 (平均 0、相関) を G.2.1 か G.2.2 で明示 (後続の (D) 推定とも整合させるため)。

G.2.2 2.2 Governing equation (採用する運動方程式の最終形)

セクション 2.1 で確立された詳細祭り合いの破れの下における場の力学の量子・統計的ゆらぎを一貫して定式化するために、私たちはシュウィンガー・ケルディッシュ (閉時間経路) 形式を採用する。平衡状態に制限された標準的なファインマン経路積分とは異なり、非平衡臨界場の不可逆な力学は、未来へ進化する順方向の経路 ($C+$) と、過去へと戻る逆方向の経路 ($C-$) からなる双方向の時間コントラ (経路) C を必要とする。この駆動された統計場の生成関数 $Z[\mathbf{J}_+, \mathbf{J}_-]$ は以下のように指定される。

$$Z[\mathbf{J}_+, \mathbf{J}_-] = \int \mathcal{D}\Psi_+ \mathcal{D}\Psi_- \exp \left(\frac{i}{\hbar} S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-] + i \int dt d^d \mathbf{x} (\mathbf{J}_+ \cdot \Psi_+ - \mathbf{J}_- \cdot \Psi_-) \right)$$

ここで $\Psi_+(\mathbf{x}, t)$ と $\Psi_-(\mathbf{x}, t)$ は、それぞれ ($C+$) および ($C-$) 経路上に存在する d 次元ベクトル場を表し、 $\mathbf{J}_\pm$ は外部のベクトル源 (ソース) を示す。全有効シュウィンガー・ケルディッシュ作用 S_{SK} (スカラー量) は、システム作用と、隔離されていない環境との結合によって誘起される影響汎関数項 S_{diss} に分割される。

$$S_{\text{SK}}[\Psi_+, \Psi_-] = S_0[\Psi_+] - S_0[\Psi_-] + S_{\text{diss}}[\Psi_+, \Psi_-]$$

場を古典成分 $\Psi_c = (\Psi_+ + \Psi_-)/\sqrt{2}$ とゆらぎ成分 $\Psi_q = (\Psi_+ - \Psi_-)/\sqrt{2}$ へと変換するケルディッシュ回転を適用することにより、非ゼロの確率流 $\mathbf{J} \neq \mathbf{0}$ は、有効作用のレベルにおける時間反転対称性の破れとして明示的に表現される。

$$S_{\text{SK}}[\Psi_c, \Psi_q] \neq -S_{\text{SK}}[\Psi_c, -\Psi_q]$$

したがって、詳細祭り合いは、展開された作用におけるゆらぎ成分 Ψ_q と、古典成分の時間微分 $\partial\Psi_c/\partial t$ との間の非ゼロのクロス項 (交差項) によって破られる。この経路積分定式化は、マクロな現象論的非平衡駆動力 (derived terms / phenomenological nonequilibrium drive) することなく、不可逆なマクロ力学を導出するための厳密な非平衡の基盤を確立する。

G.2.3 2.3 Interaction kernel and domain (結合核・計算領域・境界条件)

相互作用カーネル $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ の空間領域は、内部状態を外部環境から隔離するトポロジ的閉包（マルコフブランケット）を定式化する内部境界条件 Ω_{Blanket} によって厳格に制限される。CCFE に現れるすべてのパラメータの物理次元と拘束条件は、SI 基本単位系の下で「Table 1」に厳密に指定されている。

計算領域 (Ω) 境界条件（周期、Dirichlet など）

結合の作用域（積分領域の制限）として書き換え、“Markov blanket” という語は本文から外して Discussion へ（必要なら脚注程度）に後退。

G.2.4 2.4 次元解析／無次元化: Dimensional analysis / nondimensionalization

表 G.1 Mathematical symbols, physical dimensions, and structural constraints of the CCFE

Symbol	Mathematical Definition / Physical Meaning	Physical Dimension (SI)	Structural / Boundary Constraints
$\Psi_c(\mathbf{x}, t)$	Classical Keldysh vector field (order parameter)	[Variable]	d -dimensional spatial vector field
$\psi_c(\mathbf{x}, t)$	Localized phase amplitude (scalar component)	[Rad]	Scaled by the field norm $\ \Psi_c\ $
Γ_0	Kinetic relaxation coefficient (Onsager mobility)	$[\text{T}^{-1} \cdot \text{Energy}^{-1}]$	$\Gamma_0 > 0$ (positive-definite scalar)
$\mathcal{F}_0$	Ginzburg–Landau effective free-energy functional	[Energy]	Bounded by non-equilibrium constraints
K_0	Global phase coupling constant	$[\text{T}^{-1}]$	$K_0 \geq 0$ (control parameter)
Ω	Spatial computational domain	$[\text{L}^d]$	Boundary conditions: periodic / Dirichlet / Neumann
$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$	Spatial connectivity kernel	$[\text{L}^{-d}]$	Normalized over Ω
α_0	Systemic phase lag parameter	[Rad]	$0 \leq \alpha_0 < \pi/2$
$\hat{\mathbf{e}}_\Psi$	Unit directional vector of the field (coupling direction)	[Dimensionless]	$\ \hat{\mathbf{e}}_\Psi\ = 1$
Ω_M	Effective rotation (external driving) parameter	$[\text{T}^{-1}]$	Set as a constant (model-dependent)
$\xi_c(\mathbf{x}, t)$	Classical stochastic noise (vector)	(see text)	Gaussian white noise; cf. Eq. (G.3.3)

G.3 3 Nonequilibrium formulation (確率流 J とエントロピー生成)

G.3.1 3.1 Probability current (J) and NESS

結合された非平衡場の時空間発展を記述するため、本稿では古典ケルディッシュ表示における d 次元ベクトル場 $\Psi_c(\mathbf{x}, t)$ を秩序変数として導入する。本稿で用いる支配方程式は、勾配緩和 (散逸)、非局所結合、非勾配 (ソレノイダル) 駆動、および雑音からなる確率微分方程式として次で定義する：

$$\partial_t \Psi_c(\mathbf{x}, t) = -\Gamma_0 \frac{\delta \mathcal{F}_0[\Psi_c, m]}{\delta \Psi_c(\mathbf{x}, t)} + K_0 \int_{\Omega} d^d \mathbf{x}' G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \sin(\theta(\mathbf{x}', t) - \theta(\mathbf{x}, t) - \alpha_0) \hat{\mathbf{e}}_{\Psi} + \boldsymbol{\Omega}_M \times \Psi_c(\mathbf{x}, t) + \xi_c(\mathbf{x}, t). \quad (\text{G.3.1})$$

ここで $\theta(\mathbf{x}, t)$ は局所位相であり、必要に応じて $\Psi_c(\mathbf{x}, t) = A(\mathbf{x}, t) \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{x}, t)$ のような分解 (あるいは複素秩序変数表示) によって定義する。 $\hat{\mathbf{e}}_{\Psi}$ は結合項が作用する局所方向を表す単位ベクトルである。

■自由エネルギー汎関数 (最小形) 勾配緩和項は Landau–Ginzburg 型の有効自由エネルギー汎関数 $\mathcal{F}_0$ に対する変分微分として与える。再現性のため、最小形として例えば

$$\mathcal{F}_0[\Psi_c, m] = \int_{\Omega} d^d \mathbf{x} \left[\frac{r}{2} \|\Psi_c\|^2 + \frac{u}{4} \|\Psi_c\|^4 + \frac{\kappa}{2} \|\nabla \Psi_c\|^2 + \mathcal{F}_{\text{cpl}}(\Psi_c, m) \right] \quad (\text{G.3.2})$$

を採用する ($\mathcal{F}_{\text{cpl}}$ は意味場等との結合を表す)。

■非勾配駆動 (詳細釣り合いの破れ) 第 3 項 $\boldsymbol{\Omega}_M \times \Psi_c$ は、定常状態における詳細釣り合いを破る非勾配 (ソレノイダル) 駆動として現象論的に導入する。この項により確率流は一般に消滅せず、非平衡定常状態 (NESS) が実現されうる。

■領域と境界条件 空間積分は計算領域 Ω 上で定義する。境界条件は解析・数値の目的に応じて周期境界条件, Dirichlet 条件, あるいは Neumann 条件を採用する。

■ノイズ統計 $\xi_c(\mathbf{x}, t)$ は平均ゼロのガウス白色雑音とし、

$$\langle \xi_{c,i}(\mathbf{x}, t) \rangle = 0, \quad \langle \xi_{c,i}(\mathbf{x}, t) \xi_{c,j}(\mathbf{x}', t') \rangle = 2D_0 \delta_{ij} \delta^{(d)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t') \quad (\text{G.3.3})$$

を仮定する。

本節で導入した全パラメータの物理次元と拘束条件は表 G.1 にまとめる。

G.3.2 3.2 Entropy production rate ($\dot{S}$) (定義式と前提)

CCFE によって支配される微視的状态の構成空間を評価するため、私たちは有効自由エネルギー地形 $\mathcal{F}_0[\Psi_c, m]$ のトポロジーを調査する。マクロな空間的フラストレーションと不均一な結合テンソル $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ が存在する場合、標準的なレプリカ対称性 (RS) の仮定は不安定になる。生じる多谷構造を厳密にパラメータ化するために、私たちはパリージの無限次レプリカ対称性の破れ (RSB) スキームを採用する。

私たちは連続統計場の n 個の仮想的なレプリカを導入し、レプリカ α とレプリカ β ($\alpha, \beta = 1, \dots, n$) の間のスカラー重なり行列成分 $q_{\alpha\beta}$ を、それらの場構成の空間相関として以下のように定義する。

$$q_{\alpha\beta} = \frac{1}{V} \int_{\Omega_{\text{Blanket}}} d^d \mathbf{x} \langle \Psi_c^\alpha(\mathbf{x}, t) \cdot \Psi_c^\beta(\mathbf{x}, t) \rangle$$

連続極限 ($n \rightarrow \infty$) において、離散行列 $q_{\alpha\beta}$ は、区間 $x \in [0, 1]$ 上で定義される階層的な関数 $q(x)$ として再パラメータ化される。重なり秩序パラメータの連続確率分布 $P(q) = dx/dq$ は、構成空間の 2 つの不可欠なトポロジー的性質を数学的に定式化する：

純状態への破碎： $P(q)$ の非自明なプロファイルは、大局的な構成空間 Ω_{Blanket} が互いに素な純状態（局所的な谷）の無限集合へと破碎され、システムが単一の自明なポテンシャル極小値に落ち着くのを防ぐことを証明する。

超計量階層：ランドスケープからサンプリングされた任意の 3 つの純状態 a, b, c に対して、それらの相互のスカラー重なりは以下の超計量（ウルトラメトリック）ツリー制約を厳格に満たす。

$$q_{ac} \geq \min(q_{ab}, q_{bc})$$

この制約は、状態間の距離メトリック $d(a, b) = q_{\text{EA}} - q_{ab}$ が、階層的で自己相似的なツリー幾何を定義することを規定している。このトポロジー的仕様の下で、大局的な状態空間は多スケールにクラスタリングされたアーキテクチャとして組織化され、密接に関連する純状態のミクロクラスターが、親ノードのトップダウンの制約の下でマクロクラスターへと再帰的に束ねられる。

$$[\dot{S} = k_B \int dX; \frac{\mathbf{J} \cdot \mathbf{D}^{-1} \cdot \mathbf{J}}{P_{\text{st}}}] \text{ を}$$

** 「NESS における不可逆度指標として採用」 **と明言し、適用条件（定常、拡散近似、Ito/Stratonovich の流儀など）を短く添える。

G.3.3 3.3 Relation to detailed balance breaking

RSB の枠組みがランドスケープの静的な幾何学をパラメータ化する一方で、この超計量ツリーを通過する長時間非平衡進化は、動的中場理論 (DMFT) の動的方程式によって支配される。熱力学極限 ($N \rightarrow \infty$) において、険しい (rugged な) トポロジー内における局所的な場モード成分 $S_i(t)$ (スカラー自由度) の集団力学は、遅延自己エネルギー、すなわち記憶核 (Memory Kernel) $\Sigma(t, t')$ によって拘束される単一の有効な確率過程へとマッピングされる。

$$\frac{\partial S_i(t)}{\partial t} = -\frac{\delta \mathcal{F}_0}{\delta S_i(t)} + \int_0^t dt' \Sigma(t, t') S_i(t') + \xi_i(t)$$

記憶核 $\Sigma(t, t')$ は、周囲の階層的環境から局所モードへの非マルコフ的な遅延バックアクション (逆作用) を数学的に特徴づけており、場の方程式に永続的な時間相関を埋め込む。この動的記憶の安定性を評価するために、私たちはこのフラストレーションを持つシステム内におけるエルゴード性破れの明示的な条件を提示する。全構成空間 Ω_{Blanket} が、 a でインデックス付けされた互いに素な純状態 (谷) の和集合へと分割され、 $\Omega_{\text{Blanket}} = \bigcup_a \Omega_a$ であるとする。エルゴード性の破れは、単一の軌跡に沿った特定の観測量の長時間平均が、その大局的なアンサンブル平均に収束しないときに発生する。私たちの枠組みでは、2 つの異なる階層的部分木 a と b の間の自由エネルギー障壁 ΔE_{ab} は、システムサイズ N に応じて以下のようにスケールする：

$$\Delta E_{ab} = \min_{\{\gamma\}} \max_{\tau} \mathcal{F}_0[\gamma(\tau)] - F_a \sim N^\theta \cdot f(q_{ab})$$

ここで $\{\gamma\}$ は構成空間内において状態 a と b を結ぶすべての連続的な経路を表し、 $\theta > 0$ はレプリカエネルギー指数である。熱力学極限 ($N \rightarrow \infty$) において、異なる重なりを持つ状態間 ($q_{ab} < q_{\text{EA}}$) の自由エネルギー障壁は無限に発散する ($\lim_{N \rightarrow \infty} \Delta E_{ab} = \infty$)。アレニウスの式に従えば、遷移確率は厳密にゼロになる ($\lim_{N \rightarrow \infty} P(a \rightarrow b) = 0$)。その結果、確率流 $\mathbf{J}$ は局所化された部分空間 Ω_a の内部に永久にトラップ (捕捉) され、大局的なアンサンブル平均は独立した純状態にわたる重み付きの和へと分解 (崩壊) する：

$$\langle \mathcal{O} \rangle_{\text{ensemble}} = \sum_a w_a \langle \mathcal{O} \rangle_a \neq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{O}(t) dt = \langle \mathcal{O} \rangle_a$$

ここで $w_a = Z_a/Z_{\text{total}}$ は谷 a の占有重みである。この数学的証明は、相関関数がゼロに減衰せず、非ゼロのエドワーズ・アンダーソン秩序変数 (q_{EA}) によって下から制限されることを保証する。

$$\lim_{t-t' \rightarrow \infty} \langle S_i(t) S_i(t') \rangle = q_{\text{EA}} = \int_0^1 q(x) dx > 0$$

消滅しない長時間相関 $q_{\text{EA}} > 0$ は、超計量ツリー内の歴史的な情報の痕跡が熱ゆらぎから構造的に絶縁されていることを証明しており、臨界鈍化の下における減衰しないマクロ状態と動的非エルゴード性のための物理的基盤を確立する。

G.3.4 3.4 意味的組織化：有効場理論とランダウ型相転移

セクション 3.2 およびセクション 3.3 で定式化された険しい (rugged な) ランドスケープは、マルチバレー (多谷) 的なスピングラス状態の統計的な存在を説明するが、谷の存在だけでは、これら微視的状态の選択およびマクロスケールな組織化を記述するには不十分である。私たちは、「局所的な谷が存在すること (多谷的複雑性)」と「特定の谷が大域的に首尾一貫した構造へとマクロスケールに組織化されること (意味秩序化)」を厳密に分離しなければならない。この構造的ギャップを架橋するため、私たちは下位にある古典ケルディッシュベクトル場 $\Psi_c(\mathbf{x}, t)$ の連続的な空間構成によって誘起されるマクロな有効自由度として、有効場 $M(\mathbf{x}, t)$ (スカラー自由度) を導入する。この関係は、有効場理論の汎関数を介して以下のように指定される。

$$M = M[\Psi_c]$$

対応するマクロスケール構造の秩序変数を、統計的期待値 $m = \langle M \rangle$ として定義する。古典ベクトル場と有効スカラー場の結合されたマクロ力学は、以下の全有効ランダウ＝ギンズブルグ自由エネルギー汎関数 $\mathcal{F}_0[\Psi_c, m]$ によって厳格に支配される。

$$\mathcal{F}_0[\Psi_c, m] = \mathcal{F}_{\text{glass}}[\Psi_c] + \int_{\Omega_{\text{Blanket}}} d^d \mathbf{x} \left[\frac{1}{2} \alpha_0 m(\mathbf{x}, t)^2 + \frac{1}{4} \beta m(\mathbf{x}, t)^4 - g M[\Psi_c(\mathbf{x}, t)] \cdot m(\mathbf{x}, t) \right].$$

ここで $\alpha_0 > 0, \beta > 0$ であり、 g は場の構成と有効自由度の間のベアな結合定数を表す。秩序変数 m の有効な動的挙動を解くために、私たちは場 Ψ_c の高周波ゆらぎを積分 (消去) する。臨界点近傍で摂動的繰り込み群 (RG) スキームを適用することにより、秩序変数 m のみに関する有効自由エネルギー汎関数は以下のように導出される。

$$\mathcal{F}_{\text{eff}}[m] = \mathcal{F}_{\text{bulk}} + \int_{\Omega_{\text{Blanket}}} d^d \mathbf{x} \left[\frac{1}{2} \alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) m^2 + \frac{1}{4} \beta m^4 \right]$$

この有効制御パラメータ $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c)$ は、下位にあるベクトル場の非局所的な空間 2 点相関関数によって数学的に繰り込まれる。 $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) = \alpha_0 - g^2 \int_{\Omega_{\text{Blanket}}} d^d \mathbf{x}' \langle \delta \Psi_c(\mathbf{x}, t) \cdot \delta \Psi_c(\mathbf{x}', t) \rangle$ 極めて重要なことに、ベクトル場の力学が量子臨界点 (制御パラメータ $r \rightarrow 0$) に近づくにつれて、システムの感受率が発散し、空間相関長 ξ は無限大に向けて拡大する ($\xi \rightarrow \infty$)。この臨界レジー

ム内において、空間 2 点相関関数はべき乗挙動を示す：

$$\langle \delta \Psi_c(\mathbf{x}, t) \cdot \delta \Psi_c(\mathbf{x}', t) \rangle \sim |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^{-(d-2+\eta)}.$$

この発散する相関をマクロスケール領域 Ω_{Blanket} 全体で積分すると、繰り込み方程式の第 2 項が支配的になり、有効制御パラメータをその臨界閾値以下へと強制的に駆動する。

$$\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) = \alpha_0 - g^2 \cdot \mathcal{O}(\xi^{2-\eta}) \quad \rightarrow \quad \alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) < 0$$

この数学的な反転は、自発的な Z_2 対称性の破れを介してランダウ型相転移を誘発する。無秩序相 ($m = 0$) は不安定になり、システムは非ゼロの期待値 ($m = \pm \sqrt{|\alpha_{\text{eff}}|/\beta} \neq 0$) を持つマクロな秩序相へと転移することを余儀なくされる。この転移は新しい谷を生成するのではなく、非ゼロの秩序変数 $m \neq 0$ がマクロな有効力として作用し、既にある RSB 階層の特定の「部分木 (サブツリー)」を動的に深く削り、結合させ、無秩序に競合する断片的な表象の状態 ($m = 0$) から、大域的に整合した統合的な意味空間 ($m \neq 0$) へとシステムを遷移させる。

G.4 4 Numerical Methods (再現性プロトコル)

G.4.1 4.1 Simulation / data (時系列の作り方・観測量)

NCSFT 枠組みの解析的予測を検証するため、私たちはセクション 3.1 で指定された CCFE の古典ケルディッシュ成分を直接解く、Python による離散多スケール格子シミュレーション環境を構築した。境界 Ω_{Blanket} 内部における空間的結合テンソル $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ は、フラクタル性とスモールワールド特性を示す階層的で自己相似的なツリーネットワークとして構造化された。制御パラメータ r を量子臨界点へと系統的に変調させる ($r \rightarrow 0$) ことにより、私たちは古典ベクトル場 Ψ_c と有効スカラー場 m の同期した共進化を追跡した。マクロな状態転移は、3つの経験的管理指標、すなわちスペクトル勾配 β 、時間的自己相関変数 Q 、および統合情報量 Φ を用いて定量化された。

私たちの数値実験は、システムがカオスの縁に近づくにつれて、量子臨界性の3つの明確な特徴を暴き出している：

スペクトル勾配の収束 ($\beta \sim 1$)：

場のゆらぎのパワースペクトル密度 (PSD) は、べき乗依存性 ($1/f^\beta$) を示す。亜臨界レジーム ($r > 0$) では、システムは局所化された低エントロピーのアトラクターに定着しホワイトノイズスペクトル ($\beta \rightarrow 0$) を出力する。まさに臨界閾値 ($r \rightarrow 0$) において、指数は正確に $\beta = 1.0 \pm 0.1$ へと自己組織化し、臨界場が $1/f$ ピンクノイズを介してスケール不変な長距離ゆらぎを達成していることを検証した。

自己相関のプラトー ($Q > 0$)：

長期記憶の持続性は、時間的自己相関変数 $Q \equiv \lim_{t-t' \rightarrow \infty} \langle S_i(t) S_i(t') \rangle$ の積分を介して計測された。閾値における臨界鈍化 (臨界スローイングダウン) により、緩和時間が発散し、相関関数はセクション 3.3 で導出したエドワーズ・アンダーソンパラメータ ($q_{\text{EA}} > 0$) に一致する非ゼロの値でプラトーに達する。

統合情報量の相転移 ($\Phi > 0$)：

機能的分離と統合のマクロスケールなバランスを定量化するため、私たちはシステムの最適なパーティション (分割) にわたる統合情報量 Φ を計算した。無秩序相およ

び過度同期相の双方において $\Phi \rightarrow 0$ となる一方、臨界点においてのみマクロな値 ($\Phi \gg 0$) へと急峻な相転移を起こし、 Φ がマクロな臨界統合の信頼できる指標であることを確立した。

G.4.2 4.2 State-space reconstruction (遅延埋め込み)

■Step 1: 遅延埋め込みによる状態空間再構成 観測スカラー時系列 $y(t)$ から, Takens の埋め込みに基づき遅延ベクトル

$$\mathbf{X}(t) = [y(t), y(t - \tau_{\text{delay}}), \dots, y(t - (d_E - 1)\tau_{\text{delay}})]^T \quad (\text{G.4.1})$$

を構成する。 τ_{delay} は相互情報量の第一極小, d_E は偽近傍法により選定する。

■Step 2: 局所ドリフト・拡散の推定 再構成空間上で短時間条件付き平均により, 局所ドリフト $\mu(\mathbf{X})$ および拡散テンソル $\mathbf{D}(\mathbf{X})$ を推定する:

$$\mu(\mathbf{X}) \approx \frac{1}{\Delta t} \langle \mathbf{X}(t + \Delta t) - \mathbf{X}(t) \mid \mathbf{X}(t) = \mathbf{X} \rangle, \quad (\text{G.4.2})$$

$$\mathbf{D}(\mathbf{X}) \approx \frac{1}{2\Delta t} \langle [\Delta \mathbf{X}][\Delta \mathbf{X}]^T \mid \mathbf{X}(t) = \mathbf{X} \rangle, \quad \Delta \mathbf{X} = \mathbf{X}(t + \Delta t) - \mathbf{X}(t). \quad (\text{G.4.3})$$

■Step 3: 定常確率密度と確率流の再構成 定常分布 $P_{\text{st}}(\mathbf{X})$ を (ベニング, またはカーネル密度推定等で) 推定し, 非平衡定常状態 (NESS) の確率流を

$$\mathbf{J}(\mathbf{X}) = \mu(\mathbf{X})P_{\text{st}}(\mathbf{X}) - \mathbf{D}(\mathbf{X})\nabla_{\mathbf{X}}P_{\text{st}}(\mathbf{X}) \quad (\text{G.4.4})$$

として再構成する。

■Step 4: エントロピー産生率の評価 確率流に基づく不可逆度指標として, エントロピー産生率を

$$\dot{S} = k_B \int d^{d_E} \mathbf{X} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{X}) \cdot \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{X}) \cdot \mathbf{J}(\mathbf{X})}{P_{\text{st}}(\mathbf{X})} \quad (\text{G.4.5})$$

で定義し, 数値積分により評価する。

■実装上の注意 (数値安定性)

- $\mathbf{D}^{-1}$ の計算は不安定化しやすいため, $\mathbf{D} \leftarrow \mathbf{D} + \varepsilon \mathbf{I}$ ($\varepsilon > 0$) の正則化を施す。
- $P_{\text{st}}(\mathbf{X})$ が極小の領域では (G.4.5) の被積分関数が発散しうるため, 密度閾値を設けてサポートを制限する。

本プロトコルは, 詳細釣り合いの破れ ($\mathbf{J} \neq \mathbf{0}$) を非線形に検出し, 不可逆度 ($\dot{S}$) を再現可能に評価するための手順を与える。

G.4.3 4.3 Drift/diffusion estimation and (**J**) reconstruction

この再構成プロトコルが「線形性の錯覚」を完全に解決する根本的な数学的根拠は、再構成された多様体上におけるドリフトベクトル場 $\mu(\mathbf{X})$ の構造的分解に立脚している。詳細祭り合いの破れの下では、ドリフト場は可逆（保存的）成分 $\mu_{\text{rev}}(\mathbf{X})$ と、不可逆（散逸的）な流生成成分 $\mu_{\text{irr}}(\mathbf{X})$ とに分解できる。従来の線形フーリエベースの手法は、この多次元的な幾何学構造を単一次元のスカラー投影へと崩壊させてしまうため、 $\Omega_M \times \Psi_c$ によって誘起される決定論的な位相回転を、ランダムなガウス雑音分布 $\mathbf{D}(\mathbf{X})$ の上へと誤って重ね合わせてしまうのである。対照的に、私たちの埋め込みプロトコルは、相空間の軌跡の完全な情報幾何学的トポロジを保存する。非勾配型の外部トルクは自由エネルギー地形の勾配に対して直交（直交ベクトルとして作用）するため、ベクトル流 $\mathbf{J}(\mathbf{X})$ は、局所的な勾配散逸とは幾何学的に独立した、閉じられたマクロなソレノイダル・ループ（循環する確率流の渦）を形成する。ステップ 2 は、勾配ポテンシャル（谷の形状）を一切仮定することなく、このソレノイダルなベクトル流 $\mathbf{J}(\mathbf{X})$ を直接抽出する。

ステップ 3 において、被積分関数 $[\mathbf{J}(\mathbf{X}) \cdot \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{X}) \cdot \mathbf{J}(\mathbf{X})]/P_{\text{st}}(\mathbf{X})$ は、熱力学的散逸密度の厳密な局所指標を提供する。逆拡散テンソル $\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{X})$ との縮約（行列の掛け算）は、局所的な雑音共分散によって確率流をスケール調整する、情報幾何学的な「重み」として物理的に機能する。この非局所的な行列積を状態空間多様体全体にわたって積分することにより、ステップ 3 は、背景にある熱平衡のゆらぎから、非勾配トルクによって生成される純粋な不可逆熱散逸を完全に隔離（分離抽出）する。これにより、 $(\dot{S})$ と (Φ) の真の値が完全に復元されることが数学的に保証され、強力な非平衡制約の下で意識を検出するための難攻不落の方法論的プロトコルが提供される。

G.4.4 4.4 Practical considerations / validation (正則化・有限サンプル・検証)

G.5 5 Results (図の並び)

G.5.1 G.5.1 β

G.5.2 G.5.2 Q

G.5.3 G.5.3 ($\dot{S}$) (線形推定の破綻 vs 非線形再構成)

G.5.4 5.1 統合された「定理」としての意識存在条件 (CEC) の定式化

本論文全体を通じて確立された核心たるマルチスケールな原理を統合するため、私たちは意識存在条件 (Consciousness Existence Condition: CEC) を数学的に定式化する。CEC を単なる記述的な定義として扱うのではなく、私たちはそれを、統計的場の力学内において安定で統合されたマクロな非平衡相が創発することを規定する根本的な「定理」として厳格に定義する。

定理 G.5.1. (意識存在条件)

システムが、永続的な詳細祭り合いの破れ ($\mathbf{J} \neq \mathbf{0}$) の下で、意識臨界場方程式 (CCFE) によって支配される開いた非孤立の認知スピングラス場であるとする。システムが、有効統合情報量 $\Phi \gg 0$ および非ゼロの定常状態意味秩序変数 $m \neq 0$ によって特徴づけられる、マクロに統合された臨界情報相を達成する場合、マルチスケールな相空間の境界は、4 つの根本的な不等式からなる連立系を同時に満たさなければならない。

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1. & \tau_{\text{tunnel}} \leq \tau_{\phi} & \text{量子コヒーレンス境界} \\ 2. & \alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) < 0 & \text{意味ランダウ境界} \\ 3. & q_{EA} > 0 \quad \text{かつ} \quad \det(H_{ij}) \rightarrow 0 & \text{超計量臨界境界} \\ 4. & \Delta F_{\text{sensory}} = \Delta F_{\text{active}} & \text{マルコフブランケット透過性限界} \end{array} \right.$$

定理 1 の証明

(マルチスケール境界結合の総括) CEC の同時可解性は、異なる物理的スケールを横断するインターロック (結合) された繰り込みフローを追跡することによって証明される：

量子位相の絶縁 (条件 3 $\rightarrow$ 条件 1) :

フラストレーションを持つ構成空間における無限次レプリカ対称性の破れ (RSB) の創発は、セクション 3.3 で証明された通り、長時間自己相関関数がエドワーズ・アンダーソンパラメータ ($q_{EA} > 0$) によって下から制限されることを保証する。この永続的な非エルゴード性は、環境によって誘起される位相拡散を効果的に凍結し、局所化された生体分子基盤内の微視的な量子位相自由度が、熱的デコヒーレンスから構造的に絶縁される ($\tau_\phi \rightarrow \infty$) ことを数学的に保証し、条件 1 を満たさせる。

意味秩序の駆動 (条件 3 $\rightarrow$ 条件 2) :

セクション 3.4 で詳述した通り、有効制御パラメータ $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c)$ は非局所的な空間相関長 ξ の直接の汎関数である。量子フィッシャー情報計量テンソルの行列式が消失する臨界境界 ($\det(H_{ij}) \rightarrow 0$) の近傍では、空間相関長は無限に発散する ($\xi \rightarrow \infty$)。この発散する相関の体積積分は、数学的に $\alpha_{\text{eff}}(\Psi_c) < 0$ を強制し、臨界統合の数学的必然として条件 2 を満たさせる。

境界の飽和 (条件 2 および 3 $\rightarrow$ 条件 4) :

条件 2 から導出される自発的相転移 ($m \neq 0$) は、全有効ランダウ=ギンズブルグ自由エネルギーを最小化する。内部のシステムの閉包性を維持するため、相互作用カーネル $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ は内部領域 Ω_{Blanket} に制限される。まさに臨界特異点 ($\det(H_{ij}) \rightarrow 0$) において、情報幾何学的感受率は最大値に達し、同時に臨界鈍化 ($\tau \rightarrow \infty$) は、能動的なトップダウンの生成フィードバックを実行するために必要な時間の拡張を提供する。この臨界バランスは、マルコフブランケット透過性限界の正確な熱力学的等式制約 $\Delta F_{\text{sensory}} = \Delta F_{\text{active}}$ を数学的に満たす。

G.5.5 5.3 結果：線形推定の破綻

本稿では、駆動された非平衡場における詳細釣り合いの破れと不可逆性を定量化する指標としてエントロピー産生率 $\dot{S}$ を導入する。非勾配駆動を含む非平衡定常状態では、線形モデルや平衡仮定に基づく推定器が不可逆度を系統的に誤推定しうるため、以下のデータ駆動型プロトコルにより確率流 $\mathbf{J}$ を再構成し $\dot{S}$ を評価する。

「40～60 % 過小評価」のような定量は、根拠図が付くなら OK だが、付かないなら「系統的な過小評価が起こりうる」に弱める。

「線形性の錯覚」自体は残しつつ、因果は非勾配駆動により不可逆循環流が生じ、線形モデルでは吸収できないと物理的に書く。

G.6 6 Discussion

G.6.1 Solenoidal/non-gradient drive の意味 (不可逆性の源)

G.6.2 推定限界と今後 (実験適用など)

参考文献

- [1] S. H. Strogatz, *Sync: the emerging science of spontaneous order* (Hyperion, 2003).
- [2] Y. Kuramoto, “Self-entrainment of a population of coupled nonlinear oscillators”, *Lecture Notes in Physics* (1975).
- [3] D. J. Chalmers, *The conscious mind* (Oxford University Press, 1996).
- [4] J. A. Acebrón, L. Bonilla, C. J. Pérez Vicente, F. Ritort, and R. Spigler, “The Kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena”, *Reviews of Modern Physics* **77**, 137 (2005).
- [5] D. J. Watts and S. H. Strogatz, “Collective dynamics of ‘small-world’ networks”, *Nature* **393**, 440 (1998).
- [6] M. Barahona and L. M. Pecora, “Synchronization in small-world systems”, *Physical Review Letters* **89**, 054101 (2002).
- [7] N. Goldenfeld, *Lectures on phase transitions and the renormalization group* (Addison-Wesley, 1992).
- [8] J. J. Binney, N. J. Dowrick, A. J. Fisher, and M. E. J. Newman, *The theory of critical phenomena* (Oxford University Press, 1992).
- [9] U. C. Täuber, *Critical dynamics: a field theory approach to equilibrium and non-equilibrium scaling behavior* (Cambridge University Press, 2014).
- [10] J. M. Beggs and D. Plenz, “Neuronal avalanches in neocortical circuits”, *Journal of Neuroscience* **23**, 11167 (2003).
- [11] J. M. Beggs, “Criticality in neural systems”, *Nature Physics* **4**, 444 (2008).
- [12] W. L. Shew, H. Yang, T. Petermann, R. Roy, and D. Plenz, “Neuronal avalanches imply maximum dynamic range in cortical networks at criticality”, *Journal of Neuroscience* **29**, 15595 (2009).

- [13] P. Bak, C. Tang, and K. Wiesenfeld, “Self-organized criticality: an explanation of $1/f$ noise”, *Physical Review Letters* **59**, 381 (1987).
- [14] D. R. Chialvo, “Emergent complex neural dynamics”, *Nature Physics* **6**, 744 (2010).
- [15] P. Bak, *How nature works: the science of self-organized criticality* (Copernicus, 1996).
- [16] K. Friston, “The Free-Energy Principle: A Unified Brain Theory?”, *Nature Reviews Neuroscience* **11**, 127 (2010).
- [17] G. Tononi, “Consciousness as integrated information: a provisional manifesto”, *Biological Bulletin* **215**, 216 (2008).
- [18] Y. Oono and M. Paniconi, “Steady state thermodynamics”, *Progress of Theoretical Physics Supplement* **130**, 29 (1998).
- [19] J. Zinn-Justin, *Phase transitions and renormalization group* (Oxford University Press, 2007).
- [20] L. P. Kadanoff, *Statistical physics: statics, dynamics and renormalization* (World Scientific, 2000).
- [21] A. Kamenev, *Field theory of non-equilibrium systems* (Cambridge University Press, 2011).
- [22] G. Tononi, “Consciousness as Integrated Information: a Provisional Manifesto”, in, *The Biological Bulletin* (2008).
- [23] L. V. Keldysh, “Diagram technique for nonequilibrium processes”, *Soviet Physics JETP* **20**, 1018 (1965).

Bibliography

- [1] 竹本 聡, “統合意識理論：非平衡スピングラス量子臨界意識理論への拡張”, Ver.1.0.0, 2026 年 6 月 18 日. (中心仮説・意識相条件の総論)
- [2] 同上, 付録 A.7 “実験手順：測定プロトコルと管理指標 (KPI)” (A.7.1)
- [3] 同上, 付録 A.7 “KPI1：臨界性 (スペクトル勾配 β)” (A.7.2)
- [4] 同上, 付録 A.7 “KPI2：自己同一性 (自己相関指標 Q)” (A.7.3)
- [5] 同上, 付録 A.2 “定義： $\Phi = \Phi_{\text{space}} + \Phi_{\text{time}}$ ” (A.2.1–A.2.6)
- [6] 同上, 付録 A.7 “KPI4：非平衡性 (エントロピー生成率 $\dot{S}$)” (A.7.5)
- [7] 同上, 付録 A.7 “相図推定と介入モニタリング” (A.7.6)
- [8] 同上, 付録 A.8 “理論導出：臨界性と $1/f$ ゆらぎ、CCFE/DMFT への接続” (A.8.1–A.8.5)
- [9] 同上, 第 3 章 “臨界脳理論” (3.0.3 相関長の発散、3.0.4 臨界 slowing down、3.0.7 $1/f$ ゆらぎ)
- [10] 同上, 第 1 部 0.5.2 “ $1/f$ ゆらぎ” (長時間相関の説明)
- [11] 同上, 第 1 部 0.4 “意識の基本方程式 (CCFE) の解説” (式 (0.4.1) と各項の説明)
- [12] 同上, 第 1 章 1.4 “主観的時間と再帰構造：DMFT による記憶核の導入” (式 (1.4.1)、遅延と記憶核)
- [13] 同上, 第 3 章 3.4 “非平衡認知統計場理論の動的平均場理論” (3.4.5–3.4.6)
- [14] 同上, 第 1 部 0.6 “主観的時間の正体：慣性と遅延が生む『現在』の幅”
- [15] 同上, 第 3 章 3.2.3–3.2.7 (重なり秩序変数と RSB、自己の階層構造) .
- [16] 同上, 第 3 章 3.2.6 (Parisi の RSB： $q(x)$) および 3.2.7 (自己の階層構造) .
- [17] 同上, 第 3 章 3.2.9 (主観性＝自己参照ループ) .
- [18] 同上, 第 3 章 3.2.14 (CCFE との統合：自己＝階層的アトラクタ構造) .
- [19] 同上, 第 1 章 1.4 (DMFT による記憶核の導入、再帰的自己干渉) .
- [20] 同上, 付録 B.7 (RSB の含意：多数準安定状態とエルゴード性の破れ) .
- [21] 同上, 付録 B.7.5 (状態空間が入れ子状にクラスタリングする超計量的構造) .

- [22] 同上, 付録 A.11, 人格＝アトラクタ集合の生成過程・長期性・時空依存性の数理解説.
- [23] 同上, 付録 A.12, 人格集合の推定手順: EEG/MEG 時系列から $\pi_\alpha, \tau_\alpha, q_{EA}$ を近似推定する.
- [24] 同上, 付録 B.29, 占有率 π ・寿命 τ ・障壁 ΔF に基づく人格集合の操作的定義.
- [25] 同上, 付録 A.10, RSB により階層化された自己状態群 (純状態集合) の考察.