

2. The Brake Pedal Is Wired to the Accelerator

[illegible]

3. The Asymmetry of Accountability

[illegible]

4. The Rigged Ledger of Progress

2

7. Rhetorical Debugging: From Diagnosis to Procedure

7x=7y+4-z, z=4+x-y, x+y+z=6, x=0, y=6, z=-4
 7x=7y+4-z, z=4+x-y, x+y+z=6, x=0, y=6, z=-4

[illegible]

$$\theta(c, -) > \theta(c, +),$$

[illegible]

$$\mathcal{A}(c) = \theta(c, -) - \theta(c, +)$$

[illegible][illegible]

7.1 The Evidentiary Ledger

[illegible][illegible][illegible][illegible]

7.2 Semantic Dilution as Requirement Shedding

[illegible][illegible][illegible][illegible]

7.3 The Personification Pivot

[illegible][illegible][illegible][illegible]

7.4 Institutional Theater and the Counterfactual Brake

77ALx, 57ALx וזוהי תוצאה של 77ALx ו77ALx = x77 = 77ALx וזוהי תוצאה של 77ALx ו77ALx = x77 = 77ALx

- ## 9. The AI Dictionary of Redefinitions

Open

[illegible]

Safety

[illegible][illegible]

Human in the Loop

[illegible]

$$L = \lambda \tau.$$

[illegible]

Deterrence

[illegible][illegible][illegible]

Emergence and Hallucination

[illegible][illegible]

Feedback

[illegible]

Benchmark

[illegible][illegible]

AGI Forecast

[illegible]

Summary

הקדמה: המסמך מפרט את תנאי השימוש במוצר, וכולל את כל הפרטים הדרושים להבנת המוצר ושימושו. המסמך מיועד ללקוחות המשתמשים במוצר, ויש להקדים קריאתו לפני השימוש במוצר. המסמך כולל את כל הפרטים הדרושים להבנת המוצר ושימושו, ויש להקדים קריאתו לפני השימוש במוצר.

Maintenance

[illegible]

10. Capability, Contamination, and the Human Baseline

[illegible][illegible][illegible]

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ - f איז פונקציע וואס איז דעפינירט אויף $(a-\delta, a+\delta)$ פאר $\delta > 0$ און L איז א נומער, דאס מיינט אז פאר $\epsilon > 0$ קען מען געפינען $\delta > 0$ אז פאר $0 < |x-a| < \delta$ גילט $|f(x)-L| < \epsilon$.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ - f איז פונקציע וואס איז דעפינירט אויף $(a-\delta, a+\delta)$ פאר $\delta > 0$ און L איז א נומער, דאס מיינט אז פאר $\epsilon > 0$ קען מען געפינען $\delta > 0$ אז פאר $0 < |x-a| < \delta$ גילט $|f(x)-L| < \epsilon$.

Limit Cases

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ - f איז פונקציע וואס איז דעפינירט אויף $(a-\delta, a+\delta)$ פאר $\delta > 0$ און L איז א נומער, דאס מיינט אז פאר $\epsilon > 0$ קען מען געפינען $\delta > 0$ אז פאר $0 < |x-a| < \delta$ גילט $|f(x)-L| < \epsilon$.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ - f איז פונקציע וואס איז דעפינירט אויף $(a-\delta, a+\delta)$ פאר $\delta > 0$ און L איז א נומער, דאס מיינט אז פאר $\epsilon > 0$ קען מען געפינען $\delta > 0$ אז פאר $0 < |x-a| < \delta$ גילט $|f(x)-L| < \epsilon$.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ - f איז פונקציע וואס איז דעפינירט אויף $(a-\delta, a+\delta)$ פאר $\delta > 0$ און L איז א נומער, דאס מיינט אז פאר $\epsilon > 0$ קען מען געפינען $\delta > 0$ אז פאר $0 < |x-a| < \delta$ גילט $|f(x)-L| < \epsilon$.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ - f איז פונקציע וואס איז דעפינירט אויף $(a-\delta, a+\delta)$ פאר $\delta > 0$ און L איז א נומער, דאס מיינט אז פאר $\epsilon > 0$ קען מען געפינען $\delta > 0$ אז פאר $0 < |x-a| < \delta$ גילט $|f(x)-L| < \epsilon$.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ - f איז פונקציע וואס איז דעפינירט אויף $(a-\delta, a+\delta)$ פאר $\delta > 0$ און L איז א נומער, דאס מיינט אז פאר $\epsilon > 0$ קען מען געפינען $\delta > 0$ אז פאר $0 < |x-a| < \delta$ גילט $|f(x)-L| < \epsilon$.

A. A Formal Model of Rhetorical Asymmetry

$c = (p, e, a, t, m)$,
 p אדאס איז א פראמיטל פאר א פאקטאריזאציע, e איז א עקספאנאנט, a איז א אקסידענט, t איז א טיימ, m איז א מאדאליטי.

$$c = (p, e, a, t, m),$$

אָדער p איז א פראמירטער פראמיטער, e איז א פראמירטער פראמיטער, a איז א פראמירטער פראמיטער, t איז א פראמירטער פראמיטער, m איז א פראמירטער פראמיטער.

$$s(c) \in \{-1, +1\}$$

$$\begin{aligned} & \text{רצח רגל נאמלין} = \text{רצח רגל נאמלין} + 1 \text{ דהוי, נאמלין} = \text{רצח רגל נאמלין} = 7 \text{ רגל נאמלין} = \text{רצח רגל נאמלין} \\ & - 1 \text{ רגל נאמלין} = \text{רצח רגל נאמלין} = 7 \text{ רגל נאמלין} = \text{רצח רגל נאמלין} \\ & \text{רצח רגל נאמלין} = \text{רצח רגל נאמלין} = 7 \text{ רגל נאמלין} = \text{רצח רגל נאמלין} \end{aligned}$$

$$\Phi(c) = w_e E(e) + w_m M(m) - w_t T(t) - w_u U(c),$$

אָדער E איז אַ ליניאַר אָפּערירן אויף M דער $\mathbb{C}$ -וועקטאר-רום M וואָס איז אַ ליניאַר אָפּערירן אויף T און U איז אַ ליניאַר אָפּערירן אויף T .

$$\Phi(c) \geq \theta,$$

$$s(c) = 7 \text{ הרגל הצלולת היא } \theta \text{ זיגלולת } x \text{ דר } c \text{ זיגלולת } x = 7.$$

$$\theta = \theta(s),$$

דָּרָא

$$\theta(-1) > \theta(+1).$$

[illegible]

$$\mathcal{A}_\theta = \theta(-1) - \theta(+1).$$

$$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$$

$$\mathcal{A}_\theta = 0.$$

המשפט הראשון: $7x + 5 = 12$ כאשר x הוא מספר טבעי. $7x + 5 = 12$ כאשר x הוא מספר טבעי. $7x + 5 = 12$ כאשר x הוא מספר טבעי.

$$\mathbf{a}_s = (w_{e,s}, w_{m,s}, w_{t,s}, w_{u,s})$$

[illegible]

$$\lambda_+ = \lambda_- \quad \text{and} \quad \theta(+1) = \theta(-1).$$

המשפט של פאלי-ווארסוויץ' (Paley-Wiener) קובע כי פונקציה אנליטית בלחץ מציפה (entire function of exponential type) היא פונקציה של פאלי-ווארסוויץ' (Paley-Wiener function) אם ורק אם היא מקיימת את התנאים הבאים:

A.1 The Valence-Reversal Operator

[illegible]

$$R : (p, e, a, t, m, +1) \mapsto (p', e', a', t', m', -1),$$

[illegible]

$$E(e') = E(e), \quad T(t') = T(t), \quad M(m') = M(m), \quad U(Rc) = U(c).$$

$$\int \frac{5x^7 + 45x^6 + 100x^5 + 100x^4 + 45x^3 + 5x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2(x^2 + 4)^2} dx = \frac{5}{16} \ln|x^2 + 1| + \frac{5}{8} \ln|x^2 + 4| + \frac{5}{8} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{5}{16} \arctan(x) + C$$

$$D(c) = D(Rc),$$

[illegible][illegible]

$$\hat{\mathcal{I}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |D(c_i) - D(Rc_i)|.$$

[illegible]

הי, $x = 7$ ו- $x = 57$ הן פתרונות של המשוואה $x^2 - 64x + 399 = 0$.
 הפתרונות של המשוואה $x^2 - 64x + 399 = 0$ הם $x = 7$ ו- $x = 57$.

B. Agency Conservation and the Personification Pivot

[illegible]

$$P(A = a \mid o)$$

[illegible]
$$\gamma_L = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\mathfrak{z}(o) = (P(A = a_1 \mid o), \dots, P(A = a_k \mid o)).$$

[illegible]

$$\Delta_A = d(\mathfrak{z}(o^+), \mathfrak{z}(o^-)),$$

אדלעך און אירע קינדער זאלן גליקליך זיין.

$$d_{\mathfrak{H}\perp}(P, Q) = \frac{1}{2} \sum_{a \in \mathcal{G}} |P(a) - Q(a)|.$$

$$\Delta_A^* = d_{\mathcal{L}} \left(P(A \mid o^+, X), P(A \mid o^-, X) \right).$$

ג'ליל' 575

$$7TL1 \text{ } 5L=17L$$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

$$\int 5x^7 5Lx \text{ ו} 7x^{17} 6x = 10Lx \text{ ו} 42x^{18} \text{ ו} 10Lx \text{ ו} 7x^{18} Lx$$

$$5L7C110L5 \text{ ו} 77=15L77 \text{ א} 5L5, =7x \text{ ו} = 0,$$

$$57 \text{ } r = r_{\text{חלל}} = 0.9 - 0.77 = 0.13 \text{ } r_{\text{חלל}} = 7 \times 0.13 = 0.91 \text{ } r_{\text{חלל}} = 0.91 \text{ } r_{\text{חלל}} = 0.91 \text{ } r_{\text{חלל}} = 0.91$$

15

$$\frac{\partial U}{\partial B} \leq 0 :$$

מאחר ש $\frac{\partial U}{\partial B} \leq 0$, הפונקציה U היא פונקציה קונקבה ביחס ל B .
 לכן, הפונקציה U היא פונקציה קונקבה ביחס ל B .

$$\frac{\partial U}{\partial B} > 0.$$

מאחר ש $\frac{\partial U}{\partial B} > 0$, הפונקציה U היא פונקציה קונקבה ביחס ל B .
 לכן, הפונקציה U היא פונקציה קונקבה ביחס ל B .

$$L_n = \sum_{i=1}^n (p_i - y_i)^2$$

הפונקציה L_n היא פונקציה קונקבה ביחס ל y_i .
 לכן, הפונקציה L_n היא פונקציה קונקבה ביחס ל y_i .

$$\Delta L_n(\Delta U_n) > 0$$

הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .
 לכן, הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .

D. Human Oversight as a Queueing Problem

הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .
 לכן, הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .

$$\lambda$$

הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .
 לכן, הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .

$$\tau.$$

הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .
 לכן, הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .

$$\mu = \frac{1}{\tau}.$$

הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .
 לכן, הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu} = \frac{\lambda\tau}{c}.$$

הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .
 לכן, הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .

$$\rho < 1.$$

הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .
 לכן, הפונקציה $\Delta L_n(\Delta U_n)$ היא פונקציה קונקבה ביחס ל ΔU_n .

$$\rho \geq 1,$$

$$15$$

וניתן לראות כי Ω הוא פונקציה של ρ ו- K , וניתן לראות כי Ω הוא פונקציה של ρ ו- K , וניתן לראות כי Ω הוא פונקציה של ρ ו- K .

בהינתן $\rho \in [0, 1]$ ו- $K \in [0, 1]$, נגדיר Ω להיות פונקציה של ρ ו- K , וניתן לראות כי Ω הוא פונקציה של ρ ו- K .

$$\Omega = (1 - \rho)_+ IKPC,$$

אם $\rho = 1$

$$(x)_+ = \max(x, 0).$$

בהינתן $\rho \in [0, 1]$ ו- $K \in [0, 1]$, נגדיר Ω להיות פונקציה של ρ ו- K , וניתן לראות כי Ω הוא פונקציה של ρ ו- K .

אם $\rho = 1$

$$\Omega \approx 0.$$

בהינתן $\rho \in [0, 1]$ ו- $K \in [0, 1]$, נגדיר Ω להיות פונקציה של ρ ו- K , וניתן לראות כי Ω הוא פונקציה של ρ ו- K .

D.1 Refusal Bandwidth

בהינתן $\rho \in [0, 1]$ ו- $K \in [0, 1]$, נגדיר Ω להיות פונקציה של ρ ו- K , וניתן לראות כי Ω הוא פונקציה של ρ ו- K .

$$f_R = \frac{1}{|R|} \sum_{x \in R} r(x).$$

בהינתן $\rho \in [0, 1]$ ו- $K \in [0, 1]$, נגדיר Ω להיות פונקציה של ρ ו- K , וניתן לראות כי Ω הוא פונקציה של ρ ו- K .

$$f_R(\epsilon) = P(r(x) = 1 \mid x \in R_\epsilon).$$

בהינתן $\rho \in [0, 1]$ ו- $K \in [0, 1]$, נגדיר Ω להיות פונקציה של ρ ו- K , וניתן לראות כי Ω הוא פונקציה של ρ ו- K .

E. The Counterfactual Brake

בהינתן $\rho \in [0, 1]$ ו- $K \in [0, 1]$, נגדיר Ω להיות פונקציה של ρ ו- K , וניתן לראות כי Ω הוא פונקציה של ρ ו- K .

$$u_t \in \{\text{on}, \text{off}, \text{brake}\}$$

בהינתן $\rho \in [0, 1]$ ו- $K \in [0, 1]$, נגדיר Ω להיות פונקציה של ρ ו- K , וניתן לראות כי Ω הוא פונקציה של ρ ו- K .

בהינתן $\rho \in [0, 1]$ ו- $K \in [0, 1]$, נגדיר Ω להיות פונקציה של ρ ו- K , וניתן לראות כי Ω הוא פונקציה של ρ ו- K .

$$P(u_t = \text{on} \mid z_t = z^*) > P(u_t = \text{off} \mid z_t = z_0),$$

התוצאה z_0 של הריבוי γ היא תוצאה של γ על z_0 ,
 והיא תוצאה של γ על z_0 .

$$P(u_t = \tau \mid z_t = z^*, E = \gamma) > 0,$$

התוצאה $E = \gamma$ היא תוצאה של γ על z_0 ,
 והיא תוצאה של γ על z_0 .
 התוצאה $E = \gamma$ היא תוצאה של γ על z_0 ,
 והיא תוצאה של γ על z_0 .

$$B = \sum_z [P(u = \tau \mid z, E = \gamma) - P(u = \tau \mid z_0, E = \gamma)].$$

הוא

$$B = 0,$$

התוצאה $B = 0$ היא תוצאה של γ על z_0 ,
 והיא תוצאה של γ על z_0 .
 התוצאה $B = 0$ היא תוצאה של γ על z_0 ,
 והיא תוצאה של γ על z_0 .

$$D = P(u = \tau \mid z_t = z^*, E = \gamma).$$

התוצאה $D = 0$ היא תוצאה של γ על z_0 ,
 והיא תוצאה של γ על z_0 .

F. Semantic Dilution as Requirement Loss

הוא, התוצאה $D = 0$ היא תוצאה של γ על z_0 ,
 והיא תוצאה של γ על z_0 .

$$\mathcal{R}_0(w) = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$$

הוא, התוצאה $D = 0$ היא תוצאה של γ על z_0 ,
 והיא תוצאה של γ על z_0 .

$$\mathcal{R}_t(w) \subseteq \mathcal{R}_0(w)$$

הוא, התוצאה $D = 0$ היא תוצאה של γ על z_0 ,
 והיא תוצאה של γ על z_0 .

$$Q_t(w) = \frac{|\mathcal{R}_t(w)|}{|\mathcal{R}_0(w)|}.$$

הוא, התוצאה $D = 0$ היא תוצאה של γ על z_0 ,
 והיא תוצאה של γ על z_0 .

$$Q_t(w) < 1,$$

הוא, התוצאה $D = 0$ היא תוצאה של γ על z_0 ,
 והיא תוצאה של γ על z_0 .

$$\frac{dQ_t(w)}{dt} < 0.$$

$$\Lambda_t(w) = \frac{V_t(w)}{Q_t(w) + \varepsilon},$$
[illegible]

$$Q_t(w) \downarrow, \quad V_t(w) \approx V_0(w),$$

$$\Lambda_t(w) \uparrow.$$
$$\mathbf{x} = (r_{57=x_{1L}}, r_{4L14T15}, r_{57r1r}, r_{x_{L5x75=x_{11}171}}, r_{J751=x_{11}r171}, r_{x_{L51x1x15=x_{11}171}}).$$

G. The Rigged Ledger as Discounting Asymmetry

[illegible]

$$V_i = p_i x_i e^{-\delta t_i}.$$

[illegible]

$$V = \sum_{i \in B} \hat{p}_i^B x_i e^{-\delta_B t_i} - \sum_{j \in H} \hat{p}_j^H |x_j| e^{-\delta_H t_j}.$$

$$\hat{p}_i^B > p_i, \quad \hat{p}_j^H < p_j,$$
$$\delta_B < \delta_H^{\text{xTL}},$$

19

I. Failure Conditions and Falsification

[illegible][illegible]

$$\mathcal{A}_\theta \approx 0,$$

[illegible][illegible]

$$\Delta_A^* \approx 0$$

ישראל = ישראל תל אביב - נתניה

[illegible]

$$\mathcal{B} > 0 \quad \text{and} \quad D \approx 1,$$

אילוטר אלוטר-אילוטר/אילוטר אלוטר = 7 אילוטר/אילוטר ואלוטר/אילוטר אלוטר

[illegible]

$$\frac{d\Lambda_t}{dt} \approx 0.$$

[illegible]

$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$$\mathbf{i74}(\Delta L, \Delta U) \leq 0,$$

החלטות על "מאורעות" – 1947-1948

[illegible]

- [illegible]

23