

NOTA POSTANESTÉSICA
Descripción de técnica anestésica/Transanestésico

Premedicación:																																																		
Signos vitales Basal: FC: _____ lpm, FR: _____ /min, TA: _____ mmHg, PAM: _____ mmHg, SpO ₂ _____ %, PVC: _____ cmH ₂ O																																																		
Técnica anestésica ☐ AGIB ☐ AGEV ☐ BEPD ☐ BESA ☐ BEMIX ☐ Epidural Caudal ☐ Local administrada: ☐ Bloqueo de Plexo ☐ Bloqueo Troncular ☐ Bloqueo Paravertebral ☐ Sedación ☐ Otro																																																		
Anestesia General	Inducción Anestésica: ☐ Inhalatoria ☐ Endovenosa ☐ Preoxigenación ☐ Guedel # _____ ☐ Propofol _____ mg ☐ Etomidato _____ mg ☐ Fentanilo _____ mcg ☐ Tiopental _____ mg ☐ Mascarilla facial # _____ ☐ Vecuronio _____ mg ☐ Rocuronio _____ mg ☐ CisAtracurio _____ mg ☐ Otro _____ ☐ Ventilación Fácil ☐ Ventilación Difícil ☐ Sevoflurano ☐ Desflurano ☐ Isoflurano ☐ N ₂ O ☐ Apoyo Inotrópico: _____ mg																																																	
	Aseguramiento Vía Aérea: IET: ☐ Oral ☐ Nasal ☐ LMA: _____ # _____ Otro: _____ # _____ Laringoscopia directa Cormack-Lehane: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV Pala tipo: ☐ Mac ☐ Mill ☐ Otra No. o Tipo _____ No. de Intentos: _____ TET tipo: _____ Calibre: _____ mmDI ☐ Guía alámbrica, Manguillo _____ ml ☐ Empaquetamiento Distancia de TET: _____ cm a ☐ Dientes ☐ Comisura labial Verificación de posición de TED por: ☐ Auscultación ☐ Movimientos Torácicos ☐ Capnografía																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 15%;">Ventilación</th><th style="width: 15%;">Ciclado</th><th style="width: 35%;">Parámetros ventilatorios</th><th style="width: 35%;">Mantenimiento anestésico</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ Controlada</td><td>☐ Volumen</td><td>Vt: _____ ml FiO₂: _____ % FGF _____ L/min</td><td>☐ Sevoflurano ☐ Rocuronio ☐ Fentanilo ☐ N₂O</td></tr><tr><td>☐ Asistida</td><td>☐ Presión</td><td>PVA: _____ Ppic: _____ Pmax: _____ cmH₂O</td><td>☐ Desflurano ☐ Vecuronio ☐ Propofol ☐ Aire</td></tr><tr><td>☐ Espontanea</td><td>☐ SIMV</td><td>FR: _____ /min PEEP: _____ cmH₂O I:E: _____</td><td>☐ Isoflurano ☐ CisAtracurio ☐ Etomidato ☐ Otro: _____</td></tr></tbody></table>	Ventilación	Ciclado	Parámetros ventilatorios	Mantenimiento anestésico	☐ Controlada	☐ Volumen	Vt: _____ ml FiO ₂ : _____ % FGF _____ L/min	☐ Sevoflurano ☐ Rocuronio ☐ Fentanilo ☐ N ₂ O	☐ Asistida	☐ Presión	PVA: _____ Ppic: _____ Pmax: _____ cmH ₂ O	☐ Desflurano ☐ Vecuronio ☐ Propofol ☐ Aire	☐ Espontanea	☐ SIMV	FR: _____ /min PEEP: _____ cmH ₂ O I:E: _____	☐ Isoflurano ☐ CisAtracurio ☐ Etomidato ☐ Otro: _____																																	
	Ventilación	Ciclado	Parámetros ventilatorios	Mantenimiento anestésico																																														
	☐ Controlada	☐ Volumen	Vt: _____ ml FiO ₂ : _____ % FGF _____ L/min	☐ Sevoflurano ☐ Rocuronio ☐ Fentanilo ☐ N ₂ O																																														
	☐ Asistida	☐ Presión	PVA: _____ Ppic: _____ Pmax: _____ cmH ₂ O	☐ Desflurano ☐ Vecuronio ☐ Propofol ☐ Aire																																														
	☐ Espontanea	☐ SIMV	FR: _____ /min PEEP: _____ cmH ₂ O I:E: _____	☐ Isoflurano ☐ CisAtracurio ☐ Etomidato ☐ Otro: _____																																														
	Incidentes en vía aérea:																																																	
	Emersión: ☐ Por Lisis ☐ Reversión Farmacológica: ☐ Opioide ☐ RNM ☐ Benzodiacepina Fármaco: _____																																																	
	Extubación: ☐ Sin Incidentes ☐ Con incidentes: _____																																																	
Anestesia Regional Neuroaxial	Posición: ☐ Decúbito supino ☐ Decúbito Prono ☐ Decúbito lateral Izquierdo ☐ Decúbito lateral derecho ☐ Sentado Asepsia/antisepsia región: ☐ Cervical ☐ Dorsal ☐ Lumbar ☐ Sacro/Coxigea ☐ Otra _____ ☐ Jabón ☐ Isodine ☐ Alcohol ☐ Merthiolate ☐ Otra _____ Protección de área con: ☐ Campo hendido ☐ Campo textil ☐ Otra _____ Infiltración de tejido blando: Lidocaina ☐ 1% ☐ 2% Aguja Hipodérmica _____ Gauge Abordaje Epidural: ☐ Medio ☐ Paramedio ☐ Otro: _____ Intentos: _____, Sitio: _____ Aguja: ☐ Tuohy ☐ Otra: _____ Calibre: _____ G, Espacio Epidural encontrado a: _____ cm Pérdida de resistencia: ☐ Aire ☐ Solución Avance: ☐ Dogliotti ☐ Pitkin ☐ Pagèz ☐ Gota colgante Abordaje Subaracnoideo: ☐ Medio ☐ Paramedio ☐ A través de Tuohy ☐ Otro: _____ Intentos: _____, Sitio: _____ Aguja: ☐ Quincke ☐ Sprotte ☐ Whitacre Calibre: _____ G ☐ Aguja Hipodérmica guía Calibre _____ G Parestesia: ☐ Si ☐ No Endónde? _____ LCR: ☐ Si ☐ No: ☐ Limpio ☐ Claro ☐ Hemático ☐ Turbio ☐ Otro: _____ Prueba de Rizo: ☐ Si ☐ No Dosis de prueba: ☐ Fármaco: _____ Dosis: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%;">Anestésico inicial: ☐ Lidocaina _____ % Dosis: ☐ C/Epinefrina ☐ Simple</td><td style="width: 33%;">☐ Ropivacaina _____ % ☐ Bupivacaina _____ % ☐ Isobárica ☐ Hiperbárica</td><td style="width: 33%;"></td></tr></table> Fármaco adyuvante: ☐ Fentanilo _____ mcg ☐ Morfina _____ mcg ☐ Buprenorfina _____ mcg ☐ NaHCO ₃ _____ mEq Catéter epidural: Calibre _____ G, Dirección ☐ Cefálica ☐ Caudal, Hasta _____ cm a piel ☐ Permeable ☐ Inerte ☐ Activo Latencia: _____ min, Nivel de difusión: _____ Dosis adicional por catéter: _____ Al término: ☐ Dosis analgésica epidural: _____ ☐ Se retira catéter: ☐ Íntegro ☐ Roto ☐ Elongado ☐ Limpio ☐ Hemático ☐ Se deja cateter con: ☐ Dosis horaria _____ Vol. total _____ ml, a _____ ml c/ _____ hrs ☐ Bomba de infusión con _____ Vol. total _____ ml, a _____ ml/hr	Anestésico inicial: ☐ Lidocaina _____ % Dosis: ☐ C/Epinefrina ☐ Simple	☐ Ropivacaina _____ % ☐ Bupivacaina _____ % ☐ Isobárica ☐ Hiperbárica																																															
	Anestésico inicial: ☐ Lidocaina _____ % Dosis: ☐ C/Epinefrina ☐ Simple	☐ Ropivacaina _____ % ☐ Bupivacaina _____ % ☐ Isobárica ☐ Hiperbárica																																																
	Bloqueo Periférico	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="width: 5%;">I</th><th style="width: 5%;">D</th><th style="width: 35%;">Abordaje</th><th style="width: 20%;">Aguja</th><th style="width: 35%;">Anestésico Local y Dosis</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plexo Cervical Superficial</td><td>☐</td><td>☐</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>Plexo Cervical Profundo</td><td>☐</td><td>☐</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>Plexo Braquial</td><td>☐</td><td>☐</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>Paravertebral Torácico/Lumbar</td><td>☐</td><td>☐</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>Plexo Lumbo-Sacro</td><td>☐</td><td>☐</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>Clático</td><td>☐</td><td>☐</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>Otro</td><td>☐</td><td>☐</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr></tbody></table>		I	D	Abordaje	Aguja	Anestésico Local y Dosis	Plexo Cervical Superficial	☐	☐	_____	_____	_____	Plexo Cervical Profundo	☐	☐	_____	_____	_____	Plexo Braquial	☐	☐	_____	_____	_____	Paravertebral Torácico/Lumbar	☐	☐	_____	_____	_____	Plexo Lumbo-Sacro	☐	☐	_____	_____	_____	Clático	☐	☐	_____	_____	_____	Otro	☐	☐	_____	_____	_____
			I	D	Abordaje	Aguja	Anestésico Local y Dosis																																											
		Plexo Cervical Superficial	☐	☐	_____	_____	_____																																											
		Plexo Cervical Profundo	☐	☐	_____	_____	_____																																											
		Plexo Braquial	☐	☐	_____	_____	_____																																											
		Paravertebral Torácico/Lumbar	☐	☐	_____	_____	_____																																											
		Plexo Lumbo-Sacro	☐	☐	_____	_____	_____																																											
	Clático	☐	☐	_____	_____	_____																																												
Otro	☐	☐	_____	_____	_____																																													
Observaciones/incidentes:																																																		
Pneumoperitoneo: Tiempo total: _____ min Presión: _____ ☐ H ₂ O ☐ mmHg Hemocomponentes: ☐ Concentrado globular _____ ml ☐ Concentrado plaquetario _____ ml ☐ Plasma fresco congelado _____ ml ☐ Aféresis plaquetaria _____ ml Fármacos utilizados: _____																																																		
Termina procedimiento: ☐ Sin ☐ Con Incidentes: _____ _____ hrs Pasa a: ☐ URPA ☐ UCI ☐ Habitación ☐ Cubículo de observación ☐ Otro: _____ ☐ Intubado ☐ Extubado <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60%;">Aldrete: _____, Ramsay: _____, Bromage: _____, ENA: _____</td><td style="width: 40%;">Ventilación: ☐ Espontánea ☐ Asistida ☐ Controlada</td></tr></table> FC: _____ lpm, FR: _____ /min, TA: _____ mmHg, PAM: _____ mmHg, SpO ₂ _____ %, PVC: _____ cmH ₂ O						Aldrete: _____, Ramsay: _____, Bromage: _____, ENA: _____	Ventilación: ☐ Espontánea ☐ Asistida ☐ Controlada																																											
Aldrete: _____, Ramsay: _____, Bromage: _____, ENA: _____	Ventilación: ☐ Espontánea ☐ Asistida ☐ Controlada																																																	
Anestesiólogo: _____																																																		