

MÉXICO

ENCUESTA NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y MUJERES 2015



©UNICEF México/Peter Szabo

RESULTADOS PRINCIPALES



Instituto Nacional
de Salud Pública




unicef 

JULIO 2016

TABLA DE CONTENIDOS

LA ENIM 2015 A PRIMERA VISTA	7
NUTRICIÓN	8
SALUD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS.....	11
AGUA Y SANEAMIENTO	14
SALUD REPRODUCTIVA	15
DESARROLLO INFANTIL	18
ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN	20
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA	21
VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO SEXUAL	23
ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN	25
BIENESTAR SUBJETIVO Y SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA	25
FUNCIONAMIENTO Y DISCAPACIDAD	26
NOTAS	27



Las encuestas MICS miden los principales indicadores que permiten que los países generen datos para su uso en políticas y programas y monitorean el progreso de compromisos acordados internacionalmente, como por ejemplo algunos indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), llamada en México "Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres" (ENIM) fue llevada a cabo en 2015 por el Instituto Nacional de Salud Pública, como parte del programa global de MICS. La Representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) brindó apoyo técnico y financiero.

UNICEF desarrolló el programa global de MICS en el decenio de 1990, como un programa internacional de encuestas de hogares para recopilar datos comparables internacionalmente de un amplio rango de indicadores sobre la situación de los niños, las niñas y las mujeres. A nivel global, las encuestas MICS se han implementado en más de 100 países permitiendo el monitoreo integral de un conjunto de indicadores que los países pueden usar en políticas públicas y programas y el monitoreo de avances de compromisos acordados internacionalmente, como por ejemplo algunos indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, recientemente acordados.

La ENIM 2015 representa el primer esfuerzo de implementación de la encuesta MICS en nuestro país permitiendo la incorporación de México a un reconocido programa global de monitoreo de la situación de niños, niñas y mujeres, enmarcado en los siguientes objetivos específicos:

- Mejorar la evidencia disponible acerca de la situación de los niños, niñas y mujeres, resolviendo algunos vacíos de información de indicadores relacionados con el bienestar,

desarrollo infantil temprano, disciplina infantil, funcionamiento, discapacidad, y algunos aspectos de la salud materno-infantil y salud reproductiva.

- Proporcionar datos de medio término entre la ENSANUT 2012 y la ENSANUT 2018 de varios indicadores de salud materno-infantil y salud reproductiva.

- Mejorar la disponibilidad de información basal para el Sistema Nacional de Información exigido por la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

- Generar una línea basal para algunos de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con datos actualizados y que permiten ciertas desagregaciones.

El objetivo del presente informe de resultados principales consiste en facilitar la difusión oportuna y el uso de los resultados de la ENIM 2015 antes de que se dé a conocer el contenido completo de los cuadros y el informe final, que contendrá información detallada sobre todos los hallazgos de la encuesta según características demográficas, sociales, económicas y culturales. Se espera que el informe final de la encuesta se publique en septiembre de 2016.

No se esperan cambios en los resultados presentados en este informe, por lo que se consideran definitivos. Para obtener más información sobre los indicadores y el análisis realizado en el informe final completo, puede visitar las páginas: mics.unicef.org, unicef.org.mx o insp.mx.



La ENIM 2015 A PRIMERA VISTA

Implementación de la encuesta

Marco muestral	Censo de Población y Vivienda 2010 Agosto – Octubre 2015	Cuestionarios	Hogar Mujeres (15-49 años de edad) Niños/as y adolescentes (5-17 años de edad) Niños/as menores de cinco años
Capacitación de los entrevistadores	Agosto 2015	Trabajo de campo	Septiembre–Diciembre 2015
Marco de la muestra			
Hogares		Niños/as menores de cinco años	
▲ Muestreados	11,825	▲ Elegibles	8,216
▲ Ocupados	11,486	▲ Madres/ cuidadoras/es entrevistadas	8,066
▲ Entrevistados	10,760	▲ Tasa de respuesta (porcentaje)	98.2
▲ Tasa de respuesta (porcentaje)	93.7		
Mujeres		Niños/as y adolescentes de 5 a 17 años	
▲ Elegibles para las entrevistas	12,937	▲ Elegibles para las entrevistas	11,812
▲ Entrevistadas	12,110	▲ Entrevistados/as	11,607
▲ Tasa de respuesta (porcentaje)	93.6	▲ Tasa de respuesta (porcentaje)	98.3

Población de la encuesta

Tamaño promedio del hogar	3.8	Porcentaje de población que vive en:	
Porcentaje de población menor de:		▲ Áreas urbanas	76.8
▲ 5 años de edad	9.9	▲ Áreas rurales	23.2
▲ 18 años de edad	34.8		
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron al menos un nacido vivo en los últimos 2 años	14.3	▲ Noroeste	20.0
		▲ Noreste	21.7
		▲ Centro	15.4
		▲ CDMX-Edo México	21.9
		▲ Sur	21.0

Características de los hogares

Porcentaje de hogares con:	
▲ Electricidad	99.0
▲ Piso con acabados	96.8
▲ Techo con acabados	80.3
▲ Paredes con acabados	96.0

Número promedio de personas por habitación utilizada para dormir:	2.2
--	-----

Bienes personales o del hogar

Porcentaje de hogares que tienen:	
▲ Una televisión	95.6
▲ Un refrigerador	87.5
▲ Tierra de uso agrícola	9.2
▲ Animales de granja/ganado	13.3

Porcentaje de hogares donde al menos un integrante tiene o posee:

▲ Teléfono celular	86.7
▲ Auto o camión	38.8




NUTRICIÓN

Estado nutricionalⁱ de niños y niñas

Indicador MICS	Indicador ODS Relacionado	Indicador	Descripción	Valor
2.1a 2.1b	2.2.2	Prevalencia de desnutrición (a) moderada y severa (b) severa	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están (a) por debajo de dos desviaciones estándar (moderada y severa) (b) por debajo de tres desviaciones estándar (severa) con respecto al peso medio por la edad del estándar de la OMS.	3.9 1.0
2.2a 2.2b	2.2.1	Prevalencia de desnutrición crónica (a) moderada y severa (b) severa	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están (a) por debajo de dos desviaciones estándar (moderada y severa) (b) por debajo de tres desviaciones estándar (severa) con respecto a la altura media por la edad estándar de la OMS.	12.4 2.7
2.3a 2.3b	2.2.2	Prevalencia de emaciación (a) moderada y severa (b) severa	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están (a) por debajo de dos desviaciones estándar (moderada y severa) (b) por debajo de tres desviaciones estándar (severa) con respecto al peso medio por la altura estándar de la OMS.	1.0 0.4
2.4	2.2.2	Obesidad	Número de niños/as menores de 5 años que están por encima de dos desviaciones estándar con respecto al peso mediano por la altura estándar de la OMS.	5.2
2.S1 ⁱⁱ		Prevalencia de cualquier tipo de anemia	Porcentaje de niños/as de 12 a 59 meses clasificados con anemia.	14.1

Figura 1:

Desnutrición, desnutrición crónica, emaciación y obesidad en niños y niñas menores de cinco años, ENIM 2015.




Lactancia y alimentación de niños y niñas

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
2.5	Niños/as que alguna vez fueron lactados	Porcentaje de mujeres con un nacido vivo en los 2 últimos años que lactaron en cualquier momento a su último hijo/a nacido vivo.	94.9
2.6	Iniciación temprana de la alimentación con leche materna	Porcentaje de mujeres que tuvieron un nacido vivo dentro de los 2 últimos años y que lactaron al recién nacido dentro de la hora de haber nacido.	51.0
2.7	Lactancia exclusiva antes de los 6 meses	Porcentaje de niños/as menores de 6 meses que lactan exclusivamente. ⁱⁱⁱ	30.8
2.8	Lactancia predominante en niños/as menores de 6 meses	Porcentaje de niños/as menores de 6 meses que lactan como fuente predominante de alimentación durante el día anterior. ^{iv}	38.6
2.9	Lactancia continua hasta el 1er año de edad	Porcentaje de niños/as entre 12 y 15 meses alimentados con leche materna el día anterior.	45.8
2.10	Lactancia continua hasta los 2 años de edad	Porcentaje de niños/as entre 20 y 23 meses alimentados con leche materna el día anterior.	24.4
2.11	Duración de la lactancia (mediana)	La edad en meses en que el 50 por ciento de los niños/as entre 0 y 35 meses no recibieron leche materna durante el día anterior.	10.9
2.12	Lactancia materna apropiada para la edad	Porcentaje de niños/as entre 0 y 23 meses que fueron alimentados apropiadamente durante el día anterior. ^v	39.0
2.13	Introducción de alimentos sólidos, semisólidos o blandos	Porcentaje de niños/as entre 6 y 8 meses que recibieron alimentos sólidos, semisólidos o blandos durante el día anterior.	82.3
2.14	Frecuencia de alimentación con leche en niños/as que no reciben leche materna	Porcentaje de niños/as entre 6 y 23 meses que no reciben lactancia materna y que recibieron al menos 2 tomas de leche durante el día anterior.	91.4
2.15	Frecuencia mínima de comidas	Porcentaje de niños/as entre 6 y 23 meses que reciben alimentos sólidos, semisólidos y blandos (y niños/as no lactados que además son alimentados con leche) la cantidad mínima de veces o más ^{vi} durante el día anterior.	79.9
2.16	Diversidad alimentaria mínima	Porcentaje de niños/as entre 6 y 23 meses que recibieron alimentos de 4 o más grupos de alimentos durante el día anterior. ^{vii}	75.4
2.17 a 2.17 b	Alimentación mínima aceptable	(a) Porcentaje de niños/as amamantados entre 6 y 23 meses de edad que recibieron al menos la diversidad alimentaria mínima y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior. (b) Porcentaje de niños/as no lactados entre 6 y 23 meses de edad que recibieron al menos 2 tomas de leche no materna y que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima sin incluir alimentos lácteos y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior.	46.4 59.0
2.18	Alimentación con biberón	Porcentaje de niños/as entre 0 y 23 meses que fueron alimentados con biberón durante el día anterior.	66.4
2.S2 ⁱⁱ	Conocimiento de los beneficios de la lactancia materna	Porcentaje de mujeres madres de niños/as entre 0 y 23 meses que conocen al menos un beneficio de la lactancia materna para la madre o para el niño/a. ^{viii}	84.6
2.S3 ⁱⁱ	Exposición a publicidad de fórmulas lácteas	Porcentaje de mujeres madres de niños/as entre 0 y 23 meses expuestas a publicidad de fórmulas lácteas.	76.1
2.S4 ⁱⁱ	Consejería pre o postnatal sobre lactancia	Porcentaje de mujeres madres de niños/as entre 0 y 23 meses que recibieron algún tipo de consejería sobre lactancia en el periodo prenatal o en la primera semana después del parto.	88.6
2.S5 ⁱⁱ	Consumo de bebidas azucaradas	Porcentaje de niños/as entre 0 y 23 meses que consumieron bebidas azucaradas durante el día anterior.	48.3

Figura 2:

Patrones de alimentación infantil por edad, ENIM 2015.



Bajo peso al nacer

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
2.20	Niños/as con bajo peso al nacer	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que pesaron menos de 2,500 gramos al nacer.	10.5
2.21	Niños/as pesados al nacer	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que fueron pesados al nacer.	98.7



SALUD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS


Vacunas

Indicador MIICS	Indicador ODS Relacionado	Indicador	Descripción	Valor
3.1		Cobertura de vacunación contra la tuberculosis	Porcentaje de niños/as entre 12 y 23 meses que recibieron la vacuna BCG antes de cumplir el primer año.	92.6
3.2		Cobertura de vacunación con vacuna Pentavalente acelular [difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones por haemophilus influenzae tipo B (Hib)]	Porcentaje de niños/as entre 24 y 35 meses que recibieron la cuarta dosis de la vacuna pentavalente acelular antes de cumplir dos años.	54.8
3.3				
3.6		Cobertura de vacunación con SRP	Porcentaje de niños/as entre 24 y 35 meses que recibieron la vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis antes de cumplir 2 años.	81.9
3.4		Cobertura de vacunación con antihepatitis B (HepB2)	Porcentaje de niños/as entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB2) antes de cumplir el primer año.	76.9
3.S1 ⁱⁱ		Cobertura de inmunización contra rotavirus ^{xix}	Porcentaje de niños/as entre 12 y 23 meses que recibieron al menos dos dosis de la vacuna contra rotavirus antes de cumplir el primer año.	82.0
3.S2 ⁱⁱ		Cobertura de inmunización contra neumococo	Porcentaje de niños/as entre 24 y 35 meses que recibieron la tercera dosis (refuerzo) de la vacuna contra el neumococo antes de cumplir el primer año.	70.6
3.S3 ⁱⁱ		Cobertura de inmunización contra influenza ^x	Porcentaje de niños/as entre 12 y 23 meses que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la influenza antes de cumplir el primer año.	46.3
3.8	3.8.1 ^{xiii}	Cobertura de inmunización completa	Porcentaje de niños/as entre 24 y 35 meses que recibieron todas ^{xi} las vacunas recomendadas en el plan nacional de vacunación oportunamente (BCG, tercera dosis de HepB, segunda dosis de rotavirus antes de cumplir el primer año, y SRP, cuarta dosis de pentavalente y tercera dosis de vacuna contra el neumococo antes de cumplir 2 años).	34.3



Figura 3:

Vacunas a los 12 meses, ENIM 2015.



Nota: Los indicadores de MICS se muestran en negro.

(+) No aplica.

Tétanos toxoide

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
3.9	Protección contra el tétanos neonatal	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los últimos 2 años que recibieron al menos dos dosis de la vacuna Td o Tdpa dentro del intervalo apropiado antes del parto más reciente.	67.9

Diarrea

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
--	Niños/as con diarrea	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio de diarrea en las últimas 2 semanas.	7.6
3.10	Búsqueda de atención por diarrea	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio de diarrea en las últimas 2 semanas para el que se buscó consulta o tratamiento en una unidad de salud o con un profesional de la salud.	46.8
3.S5 ⁱⁱ		Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio de diarrea en las últimas 2 semanas para el que se buscó consulta o tratamiento en una unidad de salud, con un profesional de la salud o en una farmacia.*	56.1
3.S6 ⁱⁱ	Tratamiento de la diarrea con sales de rehidratación oral (SRO)	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio de diarrea en las últimas 2 semanas a quienes se les dio cualquier tipo de SRO como tratamiento para la diarrea	61.4
3.11	Tratamiento contra la diarrea con sales de rehidratación oral (SRO) y zinc	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con diarrea en las últimas 2 semanas que recibieron sales de rehidratación oral (SRO) y zinc.	8.8
3.12	Tratamiento de la diarrea con terapia de rehidratación oral (TRO) y alimentación continuada	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con diarrea en las 2 últimas semanas que recibieron TRO (paquete de SRO, SRO en líquido pre-envasado, líquidos recomendados elaborados en casa o líquidos incrementados) y alimentación continuada durante el episodio de diarrea.	79.9

* En México, muchas farmacias cuentan con un consultorio médico anexo. En los últimos años, se ha incrementado el número de personas que busca atención médica en los consultorios anexos a las farmacias.

Síntomas de infecciones respiratorias agudas (presunta neumonía)

Indicador MIICS	Indicador	Descripción	Valor
--	Niños/as con síntomas de Infecciones Respiratorias Agudas (presunta neumonía)	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas de IRA en las últimas 2 semanas.	3.0
3.13	Búsqueda de atención para niños/as con síntomas de Infecciones Respiratorias Agudas (presunta neumonía)	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas de IRA en las últimas 2 semanas para cuyos casos se buscó consejo o tratamiento en una unidad de salud o por parte de un proveedor de salud.	73.1
3.S8 ⁱⁱ		Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas de IRA en las últimas 2 semanas para cuyos casos se buscó consejo o tratamiento en una unidad de salud, por parte de un proveedor de salud o en una farmacia.*	83.7
3.14	Tratamiento con antibióticos para niños/as con síntomas de Infecciones Respiratorias Agudas (presunta neumonía)	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas de IRA en las últimas 2 semanas que recibieron antibióticos.	73.9
3.S9 ⁱⁱ	Reconocimiento de al menos una de las dos señales de neumonía	Porcentaje de madres o cuidadoras que reconocen al menos una de las dos señales de neumonía (respiración agitada y/o difícil).	28.4

Uso de combustibles sólidos

Indicador MIICS	Indicador	Descripción	Valor
3.15	Uso de combustibles sólidos para cocinar	Porcentaje de miembros del hogar en hogares que utilizan combustibles sólidos como fuente primaria de energía doméstica para cocinar.	14.4

Fiebre

Indicador MIICS	Indicador	Descripción	Valor
--	Niños/as con fiebre	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con fiebre en las últimas 2 semanas.	10.3
3.20	Búsqueda de atención por fiebre	Porcentaje de niños/as menores de 5 años con fiebre en las 2 semanas anteriores y para los que se solicitó orientación o tratamiento de una unidad de salud o de un profesional.	75.1

* En México, muchas farmacias cuentan con un consultorio médico anexo. En los últimos años, se ha incrementado el número de personas que busca atención médica en los consultorios anexos a las farmacias.


AGUA Y SANEAMIENTO

Agua y saneamiento

Indicador MICS	Indicador ODS Relacionado	Indicador	Descripción	Valor
4.1	6.1.1	Uso de fuentes de agua mejoradas para beber ^{xii}	Porcentaje de integrantes del hogar que usan fuentes mejoradas de agua para beber.	98.1
4.2		Tratamiento de agua	Porcentaje de integrantes del hogar que usan fuentes no mejoradas de agua para beber y que usan un método de tratamiento apropiado.	47.9
4.3	6.2.1 ^{xiii}	Uso de saneamiento mejorado ^{xiv}	Porcentaje de integrantes del hogar que usan instalaciones de saneamiento mejoradas que no son compartidas.	93.4
4.4		Eliminación segura de las heces de los niños/as	Porcentaje de niños/as entre 0 y 2 años cuya última deposición se eliminó de manera segura.	14.0
4.5	6.2.1 ^{xiii}	Lugar para el lavado de manos	Número de hogares con un lugar específico para el lavado de manos donde hay agua, jabón u otro agente para la limpieza.	90.3
4.6		Disponibilidad de jabón u otro agente para la limpieza	Porcentaje de hogares que tienen jabón u otro agente para la limpieza.	92.4

Figura 4:

Uso de agua y saneamiento mejorados en áreas urbanas y rurales, ENIM 2015.





SALUD REPRODUCTIVA^{xv}

Anticoncepción y necesidad no satisfecha de métodos anticonceptivos

Indicador MICS	Indicador ODS Relacionado	Indicador	Descripción	Valor
5.S1 ⁱⁱ		Maternidad adolescente	Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han tenido un nacido vivo.	17.2
5.2	3.7.2 ^{xiii}	Nacimientos en edad temprana	Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que tuvieron al menos un nacido vivo antes de los 18 años.	20.5
5.3		Prevalencia de anticonceptivos	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo (moderno o tradicional).	66.9
5.S2 ⁱⁱ		Prevalencia de anticoncepción moderna en adolescentes	Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas que están usando (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo moderno.	39.6
5.4		Necesidad no satisfecha de métodos anticonceptivos	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que actualmente están casadas o en unión, en edad fértil y que desean espaciar los nacimientos o limitar la cantidad de niños/as que tengan y que actualmente no usan anticonceptivos.	13.0
5.S3 ⁱⁱ	3.7.1	Necesidad satisfecha de métodos anticonceptivos	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que actualmente están casadas o en unión, en edad fértil y que desean espaciar los nacimientos o limitar la cantidad de niños/as que tengan y que actualmente usan anticonceptivos.	66.9

Figura 5:

Uso de métodos anticonceptivos, ENIM 2015.



Métodos modernos	
Esterilización femenina	32.9
Esterilización masculina	1.2
DIU	13.1
Inyectables	4.1
Implantes	4.2
Píldora	3.0
Condón masculino	5.9
Condón femenino	0.2
Diafragma / espuma / lubricante	0.1

Métodos tradicionales	
Abstinencia periódica	1.0
Retiro	0.5
Otro	0.3
Cualquier método	66.5
Sin método	33.1

Nota: El total no asciende al 100%, ya que el 0.4% de las respuestas contestó como "No sabe" o falta.

Salud materna y del recién nacido

Indicador MICS	Indicador ODS Relacionado	Indicador	Descripción	Valor
5.5a 5.5b 5.S4 ⁱⁱ 5.S5 ⁱⁱ		Cobertura de atención prenatal	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta que, durante su último embarazo tuvo como resultado un nacido vivo y que: (a) fueron atendidas al menos una vez por alguna persona de salud capacitada. (b) fueron atendidas al menos cuatro veces por alguna persona de salud capacitada. (S4) fueron atendidas al menos cinco veces por alguna persona de salud capacitada. (S5) tuvieron su primera consulta de cuidado prenatal en el primer trimestre.	98.5 94.3 87.3 82.5
5.6		Contenido de atención prenatal	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y a las cuales se les midió la presión arterial y se les tomó muestras de orina y sangre durante el último embarazo que tuvo como resultado un nacido vivo.	90.3
5.7	3.1.2	Asistencia en el parto por alguna persona capacitada	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y que fueron asistidas durante el parto por personal de salud capacitado.	97.7
5.8		Partos institucionales	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los últimos 2 años que dieron a luz a su nacido vivo más reciente en alguna unidad de salud.	96.9
5.9		Cesárea	Porcentaje de últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que nacieron por medio de una cesárea.	40.7
5.S6 ⁱⁱ		Consejería pre o post-natal sobre anticoncepción	Porcentaje de mujeres de 15-49 años que han tenido un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta que recibieron algún tipo de consejería sobre anticoncepción en el periodo prenatal o en la primera semana después del parto.	87.7




©UNICEF México/Rosendo Quintos

Controles de salud post-natales

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
5.10	Estancia post-parto en una unidad de salud	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que permanecieron en una unidad de salud por 12 horas o más después del parto de su último nacido vivo en los últimos 2 años.	90.0
5.11	Chequeos post-natales para el recién nacido	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que recibieron un chequeo mientras estuvieron en una unidad de salud o en casa después del parto, o un chequeo post-natal durante una consulta de revisión dentro de los 2 días posteriores al nacimiento.	95.4
5.12	Chequeos post-natales para la madre	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que recibieron un chequeo mientras estuvieron en una unidad de salud o en casa después del parto o un chequeo post-natal durante una consulta de revisión dentro de los 2 días posteriores al nacimiento de su último nacido vivo en los 2 últimos años.	95.2

Figura 6:

Lugar del parto y de los controles post-natales, ENIM 2015.





DESARROLLO INFANTIL

Desarrollo infantil


Indicador MICS	Indicador ODS Relacionado	Indicador	Descripción	Valor
6.1		Asistencia a programas de educación infantil temprana	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que asisten a un programa de educación infantil temprana.	60.0
6.2		Apoyo al aprendizaje	Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses con los cuales algún adulto ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover su aprendizaje y prepararlos para la escuela.	76.0
6.3		Apoyo paterno para el aprendizaje	Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses cuyo padre biológico ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos para la escuela.	14.4
6.4		Apoyo materno para el aprendizaje	Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses cuya madre biológica ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos para la escuela.	61.9
6.5		Disponibilidad de libros infantiles	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen tres o más libros infantiles.	34.9
6.6		Disponibilidad de juguetes	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen dos o más tipos de juguetes.	75.9
6.7		Cuidado inadecuado	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que fueron dejados solos o al cuidado de otro niño/a menor de 10 años durante más de una hora al menos una vez en la última semana.	5.1
6.8	4.2.1	Índice de desarrollo infantil temprano	Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses que presentan desarrollo adecuado en al menos 3 de los siguientes 4 ámbitos: alfabetismo-conocimientos numéricos, físico, socio-emocional y dominio del aprendizaje.	82.2




©UNICEF México/S Belaustegui

Figura 7:

Intervenciones a través del continuo de atención y del ciclo vital, ENIM 2015.


Figura 8:

Una mirada hacia los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ENIM 2015.






ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN

Alfabetización y educación^{xvi}

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
7.1	Tasa de alfabetización entre mujeres jóvenes	Porcentaje de mujeres jóvenes entre 15 y 24 años que pueden leer una oración simple y corta acerca de la vida diaria o que asistieron a la escuela secundaria o superior.	97.6
7.2	Preparación para la escuela	Porcentaje de niños/as en primer grado de la escuela primaria que asistieron a preescolar durante el año anterior.	88.6
7.3	Tasa neta de ingreso escolar en educación primaria	Porcentaje de niños/as en edad de ingreso escolar que asiste a primer grado de la escuela primaria.	92.2
7.4	Tasa de asistencia neta a la escuela primaria (ajustada)	Porcentaje de niños/as en edad de asistir a la escuela primaria que actualmente asisten a la escuela primaria o secundaria.	97.9
7.5	Tasa de asistencia neta a la escuela secundaria (ajustada)	Porcentaje de niños/as en edad de asistir a la escuela secundaria que actualmente asisten a la escuela secundaria o a educación superior.	79.6
7.6	Niños/as que alcanzan el último grado de la escuela primaria	Porcentaje de niños/as que ingresan al primer grado de la escuela primaria y que eventualmente alcanzan el último grado.	99.4
7.7	Tasa de terminación de primaria	Número de niños/as que asisten al último grado de la escuela primaria (excluyendo a los repetidores) dividido entre el número de niños/as en edad de completar la escuela primaria (edad apropiada al último grado de la escuela primaria).	107.9 ^{xvii}
7.8	Tasa de transición a la escuela secundaria	Número de niños/as que asistieron al último grado de la escuela primaria durante el año escolar anterior y que están en el primer año de escuela secundaria durante el año escolar actual dividido entre el número de niños/as que cursaron el último grado de la escuela primaria durante el año escolar anterior.	89.9
7.9	Índice de paridad de géneros (escuela primaria)	Tasa de asistencia neta (ajustada) de niñas dividida entre la tasa neta de asistencia a la escuela primaria de niños/as.	1.0
7.10	Índice de paridad de géneros (escuela secundaria)	Tasa de asistencia neta (ajustada) de niñas dividida entre la tasa neta de asistencia a la escuela secundaria de niños/as.	1.0

Figura 9:

Indicadores de educación por género, ENIM 2015.



Nota: Todos los valores de indicador constan en porcentajes

(a) Los porcentajes son mayores a 100 porque el numerador incluye niños/as con edades diferentes a la edad normativa para estudiar el último año de educación primaria.



PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

Registro de nacimiento

Indicador MICS	Indicador ODS Relacionado	Indicador	Descripción	Valor
8.1	16.9.1	Registro de nacimiento	Porcentaje de niños/as menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado.	95.0

Trabajo infantil


Indicador MICS	Indicador ODS Relacionado	Indicador	Descripción	Valor
8.2	8.7.1	Trabajo infantil	Porcentaje de niños/as entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil. ^{xviii}	12.4
8.S1 ⁱⁱ		Trabajo infantil de menores de 15 años	Porcentaje de niños/as entre 5 y 14 años que realizan trabajo infantil.	10.4

Disciplina del niño y la niña

Indicador MICS	Indicador ODS Relacionado	Indicador	Descripción	Valor
8.3	16.2.1 ^{xiii}	Disciplina violenta	Porcentaje de niños/as entre 1 y 14 años que experimentaron agresión psicológica o castigo físico durante el mes anterior a la encuesta.	63.1

Figura 10:

Método de disciplina infantil en edades comprendidas entre 1 y 14 años, ENIM 2015.



Matrimonio temprano

Indicador MICS	Indicador ODS Relacionado	Indicador	Descripción	Valor
8.4	5.3.1 ^{xiii}	Matrimonio antes de los 15 años	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 15 años.	4.0
8.5	5.3.1 ^{xiii}	Matrimonio antes de los 18 años	Porcentaje de mujeres entre 20 y 49 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 18 años.	23.6
8.6		Mujeres jóvenes entre 15 y 19 años que están actualmente casadas o en unión	Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años actualmente casadas o en unión.	15.4
8.8a 8.8b 8.8S2 ⁱⁱ		Diferencia de edad entre los esposos o las parejas unidas	Porcentaje de mujeres actualmente casadas o en unión cuyos esposos o parejas son mayores por 10 años o más cuando ellas tienen: (a) entre 15 y 19 años. (b) entre 20 y 24 años. (S2) entre 25 y 29 años.	7.6 9.2 15.3

Actitudes hacia la violencia doméstica

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.12	Actitudes hacia la violencia familiar	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que declaran que está justificado que el esposo/pareja golpee o pegue a la mujer en al menos una de las siguientes circunstancias: (1) sale sin avisarle, (2) descuida a los niños/as, (3) discute con él, (4) rehúsa mantener relaciones sexuales con él, (5) quema la comida.	5.0

Entorno familiar de los niños y las niñas

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.13	Entorno familiar de los niños/as	Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años que no vive con ninguno de los padres biológicos.	4.1
8.14	Prevalencia de niños/as con uno o ambos padres muertos	Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años con uno o ambos padres biológicos muertos.	4.9
8.15	Niños/as con al menos uno de los padres viviendo en el extranjero	Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años con al menos uno de los padres biológicos viviendo en el extranjero.	0.7



VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO SEXUAL

Conocimientos y actitudes sobre el VIH/SIDA

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
--	Ha oído hablar del SIDA	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han oido hablar del SIDA.	95.9
9.1	Conocimiento sobre la prevención del VIH entre las mujeres jóvenes	Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que identifican correctamente dos formas de prevenir la transmisión sexual del VIH ^{xix} y que rechazan las concepciones erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH. ^{xx}	31.3
9.2	Conocimiento sobre la transmisión del VIH de madre a hijo	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que identifican correctamente los tres medios de transmisión del VIH ^{xxi} de madre a hijo.	41.5
9.3	Actitudes de aceptación hacia las personas que viven con el VIH	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que expresan aceptar actitudes para las cuatro preguntas ^{xxii} sobre las personas que viven con el VIH.	40.5

Prueba del VIH

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
9.4	Mujeres que saben dónde hacerse la prueba del VIH	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han declarado tener conocimiento de un lugar para la prueba del VIH.	72.2
9.5	Mujeres que se hicieron la prueba del VIH y que conocen los resultados	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que se hicieron la prueba del VIH durante los 12 meses anteriores a la encuesta y que conocen el resultado.	10.1
9.6	Mujeres jóvenes sexualmente activas que se hicieron la prueba del VIH y que conocen los resultados	Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que tuvieron relaciones sexuales durante los 12 meses anteriores a la encuesta, que se hicieron la prueba del VIH durante los 12 meses anteriores a la encuesta y que conocen el resultado.	18.0
9.7	Consejería sobre el VIH durante la atención prenatal	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados prenatales y que informan haber recibido asesoramiento sobre el VIH durante dichos cuidados.	39.5
9.8	Prueba del HIV durante la atención prenatal	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados prenatales y que informan que se les ofreció y aceptaron hacerse una prueba del VIH durante la atención prenatal y que recibieron los resultados.	56.8

Comportamiento sexual

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
9.9 9.S2 ⁱⁱ	Mujeres jóvenes que nunca han mantenido relaciones sexuales	Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que nunca se han casado ni han mantenido relaciones sexuales. (S2) Porcentaje de mujeres entre 25 y 29 años que nunca se han casado ni han mantenido relaciones sexuales.	67.4 24.0
9.10	Relaciones sexuales antes de los 15 años en mujeres jóvenes	Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que mantuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años.	7.2
9.11	Mezcla de edades de las parejas sexuales	Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que mantuvieron relaciones sexuales en los 12 meses anteriores a la encuesta con una pareja que era al menos 10 años mayor.	9.0
9.12	Parejas sexuales múltiples	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que mantuvieron relaciones sexuales con más de una pareja sexual en los 12 meses anteriores a la encuesta.	1.9
9.13	Uso del preservativo durante la relación sexual con múltiples parejas sexuales	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que informan haber tenido más de una pareja sexual en los 12 meses anteriores a la encuesta y que también informan de haber usado un preservativo la última vez que mantuvieron relaciones sexuales.	33.0
9.14	Relaciones sexuales con parejas sexuales no cohabitantes	Porcentaje de mujeres sexualmente activas entre 15 y 24 años que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja que no es su esposo/a o pareja cohabitante en los 12 meses anteriores a la encuesta.	19.6
9.15	Uso del preservativo con parejas sexuales no cohabitantes	Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que informan haber usado un preservativo durante la relación sexual con su última pareja sexual que no era su esposo/a o pareja cohabitante, en los 12 meses anteriores a la encuesta.	63.2



©UNICEF México/Giacomo Pirozzi



ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN

Acceso a los medios de comunicación

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
10.1	Exposición a los medios de comunicación	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que, al menos una vez a la semana, leen un periódico o una revista, escuchan la radio y ven la televisión.	23.6

Uso de tecnologías de la información/comunicación

Indicador MICS	Indicador ODS Relacionado	Indicador	Descripción	Valor
10.2		Uso de computadoras	Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que usaron una computadora durante los últimos 12 meses.	72.2
10.3	17.8.1	Uso de internet	Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que usaron internet durante los últimos 12 meses.	77.0



BIENESTAR SUBJETIVO Y SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Bienestar subjetivo

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
11.1	Satisfacción con la vida	Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que están muy satisfechas o algo satisfechas con su vida en general.	95.5
11.2	Felicidad	Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que son muy felices o algo felices.	92.6
11.3	Percepciones de una vida mejor	Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años cuyas vidas mejoraron durante el último año, y que esperan que sus vidas mejoren más después de un año.	56.6

Sintomatología depresiva

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
11.S1 ⁱⁱ	Sintomatología depresiva	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años con indicación de depresión moderada o severa. ^{xxiii}	18.9



FUNCIONAMIENTO Y DISCAPACIDAD^{xxiv}

Dificultades severas de funcionamiento

Indicador MICS	Indicador	Descripción	Valor
13.S1 ⁱⁱ	Prevalencia de niños y niñas de 2 a 17 años con dificultades severas del funcionamiento en al menos un ámbito	Porcentaje de niños/as y adolescentes entre 2 y 17 años que tiene dificultades severas de funcionamiento en al menos un ámbito.	11.4
13.S2 ⁱⁱ	Prevalencia de niños y niñas de 2 a 4 años con dificultades severas del funcionamiento en al menos un ámbito	Porcentaje de niños/as entre 2 y 4 años que tiene dificultades severas de funcionamiento en al menos un ámbito. ^{xxv}	5.4
13.S3 ⁱⁱ	Prevalencia de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años con dificultades severas del funcionamiento en al menos un ámbito	Porcentaje de niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años que tiene dificultades severas de funcionamiento en al menos un ámbito. ^{xxvi}	14.1



©UNICEF México/Mauricio Ramos

NOTAS

- i** Las mediciones de peso y de estatura/talla se completaron con éxito para el 97.0 y el 96.9 por ciento de los niños/as menores de 5 años, respectivamente.
- ii** Indicadores específicos para México, que no hacen parte de los indicadores estándar MICS, se indican con una S.
- iii** Niños/as alimentados con leche materna y que no reciben ningún otro líquido o alimento, con excepción de solución oral rehidratante, vitaminas, suplementos minerales y medicamentos.
- iv** Niños/as que reciben leche materna y ciertos líquidos (agua y bebidas a base de agua, jugos de frutas, fluidos rituales, solución oral rehidratante, gotas, vitaminas, minerales y medicamentos), pero que no reciben nada más (en particular, leche de fórmula y fluidos a base de alimentos).
- v** Niños/as entre 0 y 5 meses que reciben exclusivamente leche materna, y niños/as entre 6 y 23 meses que reciben leche materna y que comieron alimentos sólidos, semi-sólidos y blandos.
- vi** Niños/as lactantes: alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos, dos veces para los infantes de 6-8 meses, y tres veces para los niños/as de 9-23 meses. Niños/as que no estén siendo lactados: alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos, o alimentación con leche, cuatro veces para niños/as de 6 a 23 meses.
- vii** El indicador se basa en el consumo de cualquier cantidad de alimentos de al menos 4 de los siguientes 7 grupos de alimentos: 1) granos, raíces y tubérculos, 2) legumbres y frutos secos, 3) productos lácteos (leche, yogur, queso), 4) alimentos de carne (carne, pescado, aves de corral e hígado/órganos de animales o vísceras), 5) huevos, 6) verduras y frutas ricas en vitamina A y 7) otras frutas y verduras.
- viii** Previene infecciones; mejora su salud/para que no se enferme; previene alergias; para que crezca (fuerte); fortalece los vínculos (relación) entre la madre y el niño; otro beneficio para para madre o para el bebé.
- ix** Debido a que en México existen dos presentaciones de la vacuna contra el rotavirus, una que se administra en dos dosis (2 y 4 meses) y otra que se administra en 3 dosis (2, 4 y 6 meses), para este indicador se consideran la cobertura de aplicación de al menos dos dosis de la vacuna contra el rotavirus.
- x** La vacuna contra la influenza se aplica, en general, en dos dosis separadas a los 6 y 7 meses, sin embargo en algunos casos las dos dosis se aplican en una sola ocasión, por lo que para este indicador se considera la cobertura de aplicación de al menos una dosis de la vacuna contra la influenza.
- xii** Según el esquema de vacunación en México, la vacunación completa incluye: BCG (en las primeras 24 horas después del parto), Pentavalente (2, 4 y 6 meses), Rotavirus (2 y 4 meses; ó 2, 4 y 6 meses dependiendo de la marca), Hepatitis B (al nacer, 2 y 6 meses), Neumococo (2, 4 y 12 meses) y la vacuna contra el Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP) a los 12 meses. Adicionalmente, a los 18 meses se administra la cuarta dosis de la Pentavalente.
- xiii** Se considera que los hogares usan fuentes mejoradas de agua potable si la fuente principal de agua para beber es agua de tubería, pozo con tubería, pozo cavado protegido, manantial protegido o si recogen agua de lluvia. Los hogares que utilizan agua embotellada como la principal fuente de agua para beber se clasifican en usuarios de agua para beber mejorada si la fuente de agua utilizada para otros propósitos como cocinar y lavarse las manos es una de las mencionadas anteriormente.
- xiv** El proceso para relacionar los indicadores MICS y los indicadores ODS no ha terminado, por lo que el indicador MICS puede diferir del indicador ODS. Para conocer los indicadores ODS visitar: <http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/metadata-compilation/>
- xv** Se consideran instalaciones de saneamiento mejoradas: excusado conectado a alcantarillado, excusado conectado a tanque séptico, letrina (pozo negro, hoyo), letrina de fosa mejorada con ventilación, letrina de fosa con losa, excusado de compostaje.

xv La ENIM 2015 no reporta indicadores de fecundidad una vez que existen en México cifras especializadas y actualizadas sobre este tema.

xvi Los indicadores de educación, siempre que sean aplicables, se basan en información sobre asistencia escolar reportada (en cualquier momento a lo largo del año escolar) como proxy de matriculación.

xvii El porcentaje es mayor a 100 porque el numerador incluye niños/as que asisten al último grado de la escuela primaria, y que no han repetido año, que tienen una edad diferente (menor o mayor) a la edad apropiada al último grado de la escuela primaria.

xviii A los niños/as involucrados en el trabajo infantil se les define como los niños/as que participan en actividades económicas en o por encima de los umbrales específicos de la edad, niños/as que participan en las tareas del hogar en o por encima de los umbrales específicos para la edad, y niños/as involucrados en trabajos peligrosos.

xix El uso de condones y mantener relaciones sexuales con una pareja fiel y no infectada.

xx Las dos ideas erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH se incluyen en el cálculo del indicador: i) las personas pueden contagiarse con el virus del SIDA a través de la picadura de un mosquito y ii) las personas pueden contagiarse del virus del SIDA al compartir comida con una persona infectada con el virus del SIDA.

xxi Transmisión durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia.

xxii Personas (1) que creen que a una maestra con el virus del SIDA se le debe permitir enseñar en una escuela, (2) que le comprarían verduras frescas al dueño de una tienda o a un vendedor que es VIH-positivo, (3) que no querían mantenerlo en secreto si un miembro de la familia es VIH-positivo, y (4) que estarían dispuestas a cuidar en su propia casa a un miembro de la familia con SIDA.

xxiii De acuerdo a puntajes iguales o mayores a 9 en la escala CES-D7, un instrumento para el tamizaje de la depresión.

xxiv El módulo de preguntas sobre funcionamiento y discapacidad fue desarrollado por UNICEF y el Grupo de Washington (sobre medición de la discapacidad (WG), para su utilización en censos y encuestas. Está diseñado para identificar a niños/as con dificultades en el funcionamiento los cuales, ante la ausencia de un entorno adaptado a sus necesidades, se encuentran en mayor riesgo de tener una participación limitada o restringida en la sociedad en comparación con aquellos niños/as en la población general. En México, el módulo sobre funcionamiento y discapacidad se aplicó a las madres de todos los niños, niñas y adolescentes entre 2 y 17 años en los hogares visitados por la Encuesta Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres 2015. Dependiendo del grupo de edad (2-4 años ó 5-17 años), el módulo incluye 17 ó 25 preguntas que evalúan dificultades de funcionamiento en las áreas de habla y lenguaje, audición, visión, aprendizaje, habilidades motoras y de movilidad, y emociones. En línea con el modelo biopsicosocial de discapacidad, el módulo se enfoca en la presencia y en el grado de severidad de las dificultades en el funcionamiento, más que en las causas de dichas dificultades. Por ejemplo, una limitación en la movilidad puede ser resultado de parálisis cerebral, una pérdida de extremidades, parálisis por poliomielitis, distrofia muscular o alguna lesión de la médula espinal. A su vez, los problemas en la conducta pueden resultar por autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o por algún trastorno de salud mental. Aunque hay niños/as que pueden compartir la causa de sus dificultades, el grado de sus limitaciones puede variar considerablemente. Tradicionalmente, algunas de estas dificultades se han considerado como "discapacidad", mientras que otras no. El módulo está diseñado para capturar este continuo de habilidades en el funcionamiento a través de varias áreas. Para generar los indicadores que se presentan en esta sección, se combinaron respuestas a preguntas individuales para desarrollar estimaciones del número de niños/as en riesgo de tener una participación muy limitada o restringida en la sociedad, de acuerdo a los ámbitos de interés. Ninguna respuesta por sí sola indica que el/la niño/a tenga discapacidad ya que el instrumento no fue diseñado con la intención de ser utilizado como herramienta diagnóstica.

xxv En niños de 2 a 4 años, se consideran los ámbitos siguientes: visión, audición, movilidad, coordinación motriz fina, comunicación (entender y hacerse entender), aprendizaje, juego y comportamiento.

xxvi En niños de 5 a 17 años, se consideran los ámbitos siguientes: visión, audición, movilidad (caminar y poder vestirse o alimentarse), comunicación (hacerse entender dentro y fuera del hogar), aprendizaje, memoria, aceptación de cambios en su rutina, socialización, comportamiento, concentración, ansiedad y depresión.

