ICS 65.020.20
CCS B 05

DB5308

普 洱 市 地 方 标 准

DB 5308/T xx —xxxx

景迈山古茶林保护管理技术规范

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

普洱市市场监督管理局　　发 布

目　　次

前　　言 II
引　　言 III
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
3.1 古茶林 1
3.2 古茶树 1
3.3 老茶树 1
3.4 回缩修剪 2
3.5 桥接 2
4 保护区类别 2
4.1 核心区 2
4.2 缓冲区 2
4.3 分隔防护林区 2
5 古茶林地管理 2
5.1 土壤检测 2
5.2 土壤改良 2
5.3 耕作 2
5.4 灌溉 3
5.5 施肥 3
5.6 除草 3
5.7 环境治理 3
6 茶树管理 3
6.1 修剪 3
6.2 刷白 3
6.3 采摘与留养 4
6.4 嫁接 4
6.5 移除茶树 4
7 植被管理 4
7.1 留养覆荫树 4
7.2 间伐树木 4
7.3 修枝 4
8 病虫害防治 5
8.1 病害防治 5
8.2 虫害防治 5
附　录　A 6
参考文献 8

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由澜沧拉祜族自治县人民政府提出。

本文件由普洱景迈山古茶林保护管理局归口。

本文件起草单位：普洱景迈山古茶林保护管理局、普洱市茶叶科学研究所、澜沧拉祜族自治县林业和草原局、澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业发展中心、普洱澜沧古茶股份有限公司（澜沧县茶叶协会）、澜沧景迈茶祖山农民专业合作社联合社。

本文件主要起草人员：陶仕科、张丕生、陈正华、刘波、罗亚昆、赵远艳、胡艳萍、郭建明、段自武、汤立新、车天海、刀云强、雷洋河、张军、杨剑波、张波、王娟、而波、南康、黄劲松、周子文、仙贡、苏爱华、钟春、玉苏。

引　言

根据普洱市人民代表大会常务委员会【第五届】第八号公告《普洱市景迈山古茶林文化景观保护条例》的规定，由普洱景迈山古茶林保护管理局牵头负责《景迈山古茶林保护管理技术规范》的编制工作。

景迈山古茶林是云茶画卷上的点睛之笔，茶树种植历史悠久，文化底蕴深厚，人地关系和谐，堪称传统茶树种植模式的典范。古茶林是本土天然林木与茶树共生的人工促成的生态群落，造就了“村寨围在茶林中，茶林隐在森林中”的空间格局和整体景观，林中有茶，园中有树，和谐共生，道法自然。其中的古茶树和古树名木经历了长期的自然选择，其生命力、抗逆性、适应性等特性超强，特有性、遗传稳定性和可利用性等十分稀有而珍贵。近十多年来，古茶树和古树名木因自然原因和人为因素导致损伤、致衰或损毁、死亡等情况时有发生，有效保护、科学管护和合理利用已经显得十分迫切而必要了。

为了使普洱市景迈山古茶林得到有效保护和科学合理地开发利用，必须以《云南省古茶树保护条例》、《普洱市古茶树资源保护条例》和《普洱市景迈山古茶林文化景观保护条例》为主要法律依据，制定和发布实施《景迈山古茶林保护管理技术规范》地方标准，规定古茶林的保护类别和范围，落实古茶树及古树名木拥有者、管理者或责任人的管护责任，并对古茶林的环境整治、林地管理和树体养护等进行技术规范。

虽然普洱市已经发布实施了《栽培型古茶树及古茶园管护技术规范》地方标准，但是，景迈山古茶林与其他地方的古茶树及古茶园相比，具有传统性、唯一性和独特性，它是传统农耕方式下的典型的林下种植模式，管养方法多为“自然农法”，《栽培型古茶树及古茶园管护技术规范》规定的某些管护方法和技术参数并不太适用景迈山古茶林的保护和管理，所以，结合景迈山古茶林实际，特制定《景迈山古茶林保护管理技术规范》。

景迈山古茶林保护管理技术规范

1 范围

本文件规定了普洱市景迈山古茶林保护管理的术语和定义、保护区类别、古茶林地管理、茶树管理、植被管理、病虫害防治等原则、方法、技术参数或要求。

本文件适用于普洱市澜沧拉祜族自治县景迈山古茶林核心区、缓冲区、分隔防护林区的保护和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 19630 有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求

NY 525 有机肥料

DB 5308/T 56-2020 普洱茶生态（Ⅰ类）建设及管理规范

DB 5308/T 57-2020 栽培型古茶树及古茶园管护规范

DB 5308/T 43-2021 野生型过渡型古茶树保护管理技术规范

3 术语和定义

DB 5308/T 57-2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了方便使用，以下重复列出了DB 5308/T 43-2021、DB 5308/T 57-2020 中的某些术语和定义。

3.1

古茶林 ancient tea forest

由山地、水体、天然植被和人工种植古茶树等物体共同组成的生态群落。

3.2

古茶树 ancient tea tree

植物学形态符合山茶属［Genus *Camellia* （L.）］茶组植物［Section *Thea* (L.) Dyer］的特征，树龄≥100a的栽培型茶树。地径≥20cm的未知树龄的大茶树也纳入古茶树保护管理范围。

［来源：DB 5308/T 43-2021 3.3，有修改］

3.3

老茶树 old tea tree

树龄≥30a、＜100a的栽培型茶树。

3.4

回缩修剪　heading back pruning

剪除树冠上多年生的徒长枝或过长的下垂状“藤条枝”，保留基部一段枝干的修剪方法。

［来源：DB 5308/T 57-2020 3.4］

3.5

桥接　bridge graft

用枝条或树干作为接穗，以搭桥方式连接伤口两端或树干与主根健壮部位的嫁接方法。

［来源：DB 5308/T 57-2020 3.5，有修改］

4　保护区类别

4.1 核心区

分布于澜沧拉祜族自治县惠民镇辖区芒埂-勐本古茶林、景迈大寨古茶林、糯岗古茶林、芒景上下寨-芒洪古茶林和翁洼古茶林的5片古茶林划定为核心区，面积共计1180hm^2。核心区应严格按照《普洱市景迈山古茶林文化景观保护条例》的规定进行保护，管养技术按照本规范实施。

4.2 缓冲区

分布于澜沧拉祜族自治县惠民镇辖区景迈村、芒景村、芒云村和糯福乡勐宋村辖区内除5片核心区以外的古茶林为缓冲区，面积共计11930hm^2。缓冲区应参照 DB 5308/T 56-2020 普洱茶生态（Ⅰ类）建设及管理规范进行保护管理。

4.3 分隔防护林区

分布于澜沧拉祜族自治县惠民镇辖区景迈-糯岗古茶林分隔林地、糯岗-芒景分隔林地、芒景-景迈分隔林地为古茶林分隔防护林区。分隔防护林区遵照《中华人民共和国森林法》的规定进行保护管理。

5　古茶林地管理

5.1 土壤检测

每 5a 进行一次古茶林地土壤检测，取样范围是核心区的五片古茶林地，每区取样 5 个点混合形成 1 个检测样本，检测结果作为土壤改良、配方施肥和风险管控的依据。指标参照 GB 15618 和 GB 19630 的规定执行。

5.2 土壤改良

土壤 pH 值低于 4.5 的古茶林地，可选用草木灰（3000kg/hm^2.a）、石灰（300kg/hm^2.a）、白云石粉（300kg/hm^2.a）等在冬耕时撒施，调节 pH 值至 5.0～5.5 时停止施用。

5.3　耕作

5.3.1 坡度＜25°的古茶林地，每年秋茶采摘结束后（10 月下旬～11 月下旬），应全园翻耕土壤 1 次，近茶树或覆荫树主根部位处浅耕 5 cm～10 cm，远处深耕 20 cm～30 cm。

5.3.2 坡度≥25°的古茶林地，不宜进行翻耕作业，才能进行浅铲除草。

5.4 灌溉

5.4.1 严重干旱发生时，可采用移动式滴灌、袋装水埋土渗灌等应急措施，抢救濒临死亡的古茶树（具体方法参见 DB 5308/T 57-2020）。

5.4.2 有水源保障的古茶林地，应安装滴灌等设施，在冬、春干旱季节进行灌溉。

5.4.3 灌溉水质应符合 GB 5084 的规定。

5.4.4 生活污水不允许排放到古茶林地中。

5.5 施肥

5.5.1 坡度＜25°的古茶林地，在每年冬耕开始前全园撒施基肥 1 次～2 次，肥料随翻耕作业埋入土中。

5.5.2 坡度≥25°的古茶林地，在树冠滴水线位置挖穴施基肥，穴深 15 cm～25 cm ,施肥后盖土复原。

5.5.3 肥料只允许施用有机茶园专用肥或自制的混合有机肥（混合有机肥制作方法见附录 A）。

5.5.4 有机茶园专用肥用量为 7.5t/hm^2.a～12t/hm^2.a，自制混合有机肥用量为 12t/hm^2.a～15t/hm^2.a。

5.5.5 肥料质量均应符合 NY 525 的规定。

5.6 除草

5.6.1 应以人工、机械、生物等方法解决古茶林地的杂草危害问题，不允许使用一切化学除草剂。

5.6.2 宜在杂草种子成熟之前，以铲、割、刨、挖、拔、砍等方法去除杂草、小杂木及竹子等，每 a≥3 次。

5.6.3 提倡使用新能源茶园机械和交通工具，逐渐替代目前普遍使用的燃油割草机和摩托车等。

5.6.4 古茶林地允许散养或围栏养殖除山羊以外的小型家禽、家畜，取食除草，间接施肥。

5.7 环境治理

5.7.1 道路两边应进行绿化美化，广泛种植本土树种的行道树如樱桃树、酸枣树、火焰木等。

5.7.2 清除杂物。除普洱景迈山古茶林保护管理局审批同意安装的保护标志、路标、杀虫灯、粘虫板、古茶树或古树名木编号牌等物品外，应清除所有的建材、塑料、玻璃、金属等废旧物品和生活垃圾，带出林外妥善处理。

6 茶树管理

6.1 修剪

6.1.1 每年冬季（11 月～12 月）宜采用回缩修剪等方法对古茶树、老茶树进行 1 次整形修剪，保持树冠呈自然开心形状态。

6.1.2 应剪除或锯掉古茶树、老茶树上的严重病虫枝、折伤枝、枯枝（桩）等，剪（锯）口在病、健部的交界处，较大锯口宜用塑料薄膜包扎或涂上封口蜡。

6.1.3 其它修剪方法可参照 DB 5308/T 57-2020 的规定进行。

6.2 刷白

6.2.1 严重患有膏药病、粗皮病、疮痂病等树皮病的古茶树、老茶树，应在冬季休眠期对树干进行刷白处理。

6.2.2 刷白药液配方: 硫磺粉:石灰粉:草木灰:清水=1:2:3:10 的混合水剂。

6.3 采茶与留养

6.3.1 宜采用“提手采”方法采摘茶叶，坚持留叶采茶，不应掰或摘带有鳞片的茶芽苞、马蹄茶或老叶片。

6.3.2 古茶树应遵循“春茶留鱼叶采、弱树夏茶留养、秋茶留 1 叶采”的留养原则，生长势弱的茶树“以养为主，适度采用”。

6.3.3 古树茶提倡采收 2 级、3 级的鲜叶原料，不宜采摘带雨或露水的鲜叶，古茶树、老茶树和小茶树应分别采收，单独加工。

6.3.4 应使用干净卫生、通风透气的器具盛装茶树鲜叶。

6.4 嫁接

6.4.1 茶树主干或骨干枝皮层严重受损的古茶树，宜采用桥接方法进行挽救。

6.4.2 对芽叶细小、过度开花结果、品质较差的老茶树，可在3级或4级分枝上进行嫁接改良，接穗应选用本地优质的单株品种。

6.4.3 茶树主干中空腐烂的，应清除腐烂木质、杂质、积水等，用1%～2%硫酸铜液喷洒消毒后塞入红心土合成的泥巴，皮层伤口处也可进行桥接处理。

6.5 移除茶树

6.5.1 古茶林应移除补植过密的老茶树或小茶树，保留茶树的密度在900株/hm^2～ 1500株/hm^2 为宜。

6.5.2 移除的大叶型茶树可在空地中补植。

7 植被管理

7.1 留养覆荫树

树木稀疏或无覆荫树的地块,应蓄养本土乔木型深根性的阔叶树木,密度以90株/hm^2～ 120株/hm^2 为宜，阳坡地多留，阴坡地少留。

7.2 间伐树木

在向普洱景迈山古茶林保护管理局审报获得许可后，可间伐生长过密的非古树名木，优先间伐竹子、针叶或细叶树种等，特别注意清除绞杀型树木及藤本植物，保持高层树木的郁闭度在0.3～0.5。

7.3 修枝

分布过密的古树名木，应适度进行修枝打叉，清除存在安全隐患的树枝，降低其郁闭度。

8 病虫害防治

8.1 病害防治

8.1.1 发生烟煤病、茶饼病、炭疽病等病害的茶树，应在冬季修剪结束后喷施 0.8° Be′（波美度）～1.2° Be′ 的石硫合剂或 0.5%石灰半量式波尔多液，喷药重点是叶片背面和枝叶密集的阴蔽处。

［石硫合剂熬制方法及波美度换算详见 DB 5308/T 56-2020 附录 B ］

8.1.2 发生根腐病的茶树，宜用波尔多液（配制比例为： 石灰：硫酸铜：清水=1：：2：200）或浓度为 0.8%～1%硫酸铜溶液，浇灌根部 1 次～3 次，间隔期 5d～10d。

8.1.3 宜在雨水集中时期，人工清除古茶树上的苔藓、地衣、菟丝子等寄生植物。

8.1.4 膏药病等树皮病防治见本文件6.3，其它病害的防治方法可参照 DB 5308/T 56-2020的规定执行。

8.2 虫害防治

8.2.1 宜采用捣毁蚁类巢穴、根茎部刷白、地面撒石灰粉后深翻等方法，防治蚁类危害。

8.2.2 钻蛀性类害虫，宜采用钢丝先疏通虫道口，再注入石硫合剂（10° Be′ ～15° Be′ ）等药液，封堵蛀口，熏杀幼虫。

8.2.3 茶小绿叶蝉、蓟马、茶蚜虫等主要叶部害虫的防治，应优先采用及时采摘、杀虫灯或色板诱杀、释放天敌昆虫等防控措施，必要时可选用有机生物药剂进行喷杀。

8.2.4 有机茶园允许使用的生物药济种类参照 GB 19630 和 DB 5308/T 56-2020 的规定。

附 录 A

（规范性）

混合有机肥制作方法

A.1 主料

在畜禽圈舍或人类厕所的下方，修造一个与养殖规模相匹配的混凝土结构的积肥坑或发酵池，收集容纳圈养畜、禽或人类产出的所有粪尿及垫圈材料，作为主料。

A.2 辅料

A.2.1 选择当地容易采购或采集到的（4～6）种含氮材料作为辅料。常用的含氮材料有：绿肥作物、幼嫩杂草、作物秸秆或残渣、种皮、种壳、动物下脚料、泥炭肥、草煤土、塘泥、腐殖质、菌包等。

A.2.2 较长或较大的植物性辅料应进行切细或粉碎，湿性泥炭类辅料应作晒干、粉碎处理。

A.3 配料

采购或制备适量的生物菌种（EM菌等）、石灰、草木灰、磷矿粉或钙镁磷、油枯等作为配料。

A.4 制作方法

A.4.1 配方及质量比例 菌种：石灰：磷矿粉：油枯：主料：辅料=2：30：100：300：1000：2000。

A.4.2 方法：将所用材料投入到积肥坑或发酵池中，翻拌混合均匀后做成堆，盖上塑料薄膜让其进行发酵，每隔30d～40d 翻拌一次，经过120d～150d 发酵后，于晴天起堆，薄摊10 cm～20 cm于晒场，经风干日晒至六成干（含水率≤40%）时，通过解块、粉碎并混入30%的草木灰即成。

A.5 成品

A.5.1 成品应进行定额包装，以25 kg/袋～40 kg/袋为宜。

A.5.2 每个配方制作出的混合有机肥，都要进行抽样检测，其养分、重金属、生物菌落等含量均应符合 NY 525 的规定。

［来源：DB5308/T 57-2020，有修改］

参考文献

[1] GB 5084 农田灌溉水质标准 [S] .

[2] GB/T 19630 有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求 [S] .

[3] GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染管控标准（试行）[S] .

[4] GB/T 22111 地理标志产品 普洱茶 [S] .

[5] NY 525 有机肥料 [S] .

[6] NY/T 1054 绿色食品 产地环境调查、检测与评价规范 [S]

[7] DB 5308/T 56-2020 普洱茶生态（Ⅰ类）建设及管理规范 [S] .

[8] DB 5308/T 57-2020 栽培型古茶树及古茶园管护规范 [S] .

[9] DB 5308/T 43-2021 野生型过渡型古茶树保护管理技术规范 [S] .

[10] 全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国森林法 [Z] .

[11] 国家林业和草原局. 中华人民共和国野生植物保护条例 [Z] .1997年1月1日施行.

[12] 云南省人民代表大会常务委员会. 云南省古茶树资源保护条例 [Z] .2023年3月1日施行.

[13] 普洱市人民代表大会常务委员会. 普洱市古茶树资源保护条例 [Z] .2018年7月1日施行.

[14] 普洱市人民代表大会常务委员会. 普洱市景迈山古茶林文化景观保护条例 [Z] . 2023年1月1日施行.

[15] 西双版纳傣族自治州人大委员会. 西双版纳州古茶树保护规程（试行）[Z] .2019年.

[16] 虞富莲等.走进茶树王国 [M] .云南科技出版社 ，2008年3月第1版.

[17] 虞富莲.中国古茶树 [M] . 云南科技出版社 ，2016年.

[18] 中国农业科学院茶叶研究所,中国茶叶学会.陈宗懋论文集 [M] .中国农业科学技术出版社,2004年10月.

[19] 白殿一，刘慎斋等.标准化文件的起草 [M] .中国标准出版社,2020年9月.

[20] LY/T 2970 古树名木生长和环境检测技术规程 [S] .

[21] LY/T 3073 古树名木管理技术规程 [S] .

[22] LY/T 3311-202 古茶树 [S] .