

数学分析 I

由于水平有限,加之对笔记的理解和挖掘在一定程度上不够充分,错误在所难免,敬请各位读者补充和斧正

Edited by Stellaria

数列极限

数列极限作为数学分析的开头起着至关重要的作用,极限是数学分析中的重要基石

Example1:

计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \dots + n!}{n!}$

◁

$$1 \leq \frac{1! + 2! + \dots + n!}{n!} < \frac{(n-2)(n-2)! + (n-1)! + n!}{n!} = \frac{n-2}{(n-1)n} + \frac{1}{n} + 1$$

根据夹逼定理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \dots + n!}{n!} = 1$

▷

Example2:

计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times (2n)}}$

◁

$$1 > \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times (2n)} > \frac{1}{2n} \quad \left(\frac{n}{n-1} > 1\right)$$

$$\sqrt[n]{\frac{1}{2n}} < \sqrt[n]{\frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times (2n)}} < 1$$

根据夹逼定理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times (2n)}} = 1$

▷

Example3:

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right) = \ln 2$

◁

我们知道: $\sum_{n=1}^n \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \alpha_n \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$

令该等式中 $n = 2n$ 可以得到: $\sum_{n=1}^{2n} \frac{1}{n} = \ln 2n + \gamma + \alpha_{2n}$

上述两个等式相减,可以得到: $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} = \ln 2 + \alpha_{2n} - \alpha_n$ 等式左右取极限即可

▷

Cauchy Theorem:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$$

◀

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 有 $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_1 \quad \forall n > N_1 : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\begin{aligned} & \left| \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} - a \right| = \left| \frac{a_1 - a + a_2 - a + \dots + a_n - a}{n} \right| \\ & < \left| \frac{a_1 - a + a_2 - a + \dots + a_{N_1} - a}{n} \right| + \left| \frac{a_{N_1+1} - a + \dots + a_n - a}{n} \right| \\ & < \left| \frac{a_1 - a + a_2 - a + \dots + a_{N_1} - a}{n} \right| + \frac{n - N_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \left| \frac{a_1 - a + a_2 - a + \dots + a_{N_1} - a}{n} \right| + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

又因为 $a_1 - a + a_2 - a + \dots + a_{N_1} - a$ 是一个确定的常数, 记作 C 我们知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C}{n} = 0$

故有 $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_1 \quad \forall n > N_2 : \left| \frac{a_1 - a + a_2 - a + \dots + a_{N_1} - a}{n} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$

最后我们取 $N = \max(N_1, N_2)$ 即可得 $\left| \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} - a \right| < \varepsilon$

▶

柯西定理的证明十分有意思,初学者需要理解掌握,是一种用定义来分段证明极限的方法

Example4:

计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n!}}$

◀

$$0 < \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} \leq \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{n} \quad \text{由柯西定理可只不等号右端的式子极限为0, 根据夹逼定理原极限为0}$$

▶

Example5:

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$

◀

由上题可以直接得证, 这里给出另一种方法:

$$e^n > 1 + n + \frac{1}{2!}n^2 + \dots + \frac{1}{n!}n^n > \frac{n^n}{n!} \Rightarrow n! > \frac{n^n}{e^n} \Rightarrow \sqrt[n]{n!} > \frac{n}{e} \rightarrow +\infty \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$

▶

Corollary:

设 $a_n > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$ 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$ 下面的引理即证明

Lemma:

设 $a_n > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$ 请读者自证

Example:

计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$

◀

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} \quad \text{根据上题的推论可以得到} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} = \frac{1}{e} \quad \text{故原极限为} \frac{1}{e}$$

▷

有用的放缩不等式:

$$a^n > \frac{(a-1)^2}{4} n^2 \quad (a \text{ 可以是任何大于1的数或式})$$

Example6:

$$\text{用 } \varepsilon - N \text{ 语言证明: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^k} = 1 \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

◁

$$\begin{aligned} |\sqrt[n]{n^k} - 1| &= \left| \sqrt[n]{\underbrace{\sqrt{n} \times \sqrt{n} \dots \times \sqrt{n}}_{2k \uparrow} \times \underbrace{1 \times 1 \dots \times 1}_{n-2k \uparrow}} - 1 \right| < \frac{2k\sqrt{n} + n - 2k}{n} - 1 = \frac{2k}{\sqrt{n}} - \frac{2k}{n} < \frac{2k}{\sqrt{n}} < \varepsilon \\ \Rightarrow n &> \frac{4k^2}{\varepsilon^2} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = \max(2k, [\frac{4k^2}{\varepsilon}]) \quad \forall n > N: |\sqrt[n]{n^k} - 1| < \varepsilon \end{aligned}$$

▷

Example7:

$$\text{设 } x_n \geq 0 \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \geq 0 \quad \text{证明: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{a}$$

◁

$$\begin{aligned} \text{法一: } |\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| &< \sqrt{|x_n - a|} \iff (\sqrt{x_n} - \sqrt{a})^2 < (\sqrt{x_n} - \sqrt{a})(\sqrt{x_n} + \sqrt{a}) < |x_n - a| \\ \text{法二: } |\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| &= \left| \frac{x_n - a}{\sqrt{x_n} + \sqrt{a}} \right| < \frac{1}{\sqrt{a}} |x_n - a| \end{aligned}$$

▷

Example8:

$$\text{计算: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

◁

$$0 < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \frac{(2n-1)!!}{\sqrt{1 \times 3 \times \sqrt{3 \times 5 \times \dots \times \sqrt{(2n-1) \times (2n+1)}}}} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

▷

Example9:

$$x_n = (1 + \frac{1}{n})^n \quad \text{证明 } x_{n+1} > x_n \quad \text{且 } x_n \text{ 上有界}$$

◁

$$\begin{aligned} x_n &= \overbrace{(1 + \frac{1}{n})(1 + \frac{1}{n}) \dots (1 + \frac{1}{n})}^{n \uparrow} \times 1 < (\frac{n(1 + \frac{1}{n}) + 1}{n+1})^{n+1} = (1 + \frac{1}{n+1})^{n+1} = x_{n+1} \\ x_n &< 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} < 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-2}} < 3 \end{aligned}$$

▷

Important Identity:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n!n} \quad \left(\frac{n}{n+1} < \theta_n < 1\right)$$

Example:

$$\text{计算: } \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n!e)$$

◁

$$\text{根据上述恒等式有: } n \sin\left(2\pi \frac{1}{n+1}\right) < n \sin(2\pi n!e) < n \sin\left(2\pi \frac{1}{n}\right)$$

▷

Example10:

$$\text{证明: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) = e^{\frac{1}{2}}$$

◁

$$\text{易知 } \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) = e^{\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)} \quad \frac{1}{n^2 + n} \times k < \frac{k}{n^2 + k} < \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) < \frac{k}{n^2}$$

$$\text{对第二个不等式求和可以得到: } \frac{1}{n^2 + n} \times \frac{n(n+1)}{2} < \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) < \frac{1}{n^2} \times \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{根据夹逼定理容易得到: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) = \frac{1}{2} \quad \text{取自然对数即可}$$

▷

Example11:

$$\text{计算: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1\right)$$

◁

$$\frac{\frac{k}{n^2}}{\sqrt{1 + \frac{n}{n^2}} + 1} < \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 = \frac{\frac{k}{n^2}}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1} < \frac{\frac{k}{n^2}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1}$$

$$\text{对不等式进行求和} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{n}{n^2}} + 1} \times \frac{n(n+1)}{2n^2} < \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1\right) < \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1} \times \frac{n(n+1)}{2n^2}$$

$$\text{根据夹逼定理容易得到: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1\right) = \frac{1}{4}$$

▷

数列极限到此为止,读者千万不能把重点放在求各种数列极限中,理解极限和定理才是这一章的关键,过分追求各种技巧对于数学分析的学习反而事倍功半

函数极限与连续

Important limit:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Proposition1:

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$ 且 $\alpha(x) \neq \beta(x)$ 那么有

1. $\sin(\alpha(x)) - \sin(\beta(x)) \sim \alpha(x) - \beta(x)$
2. $\tan(\alpha(x)) - \tan(\beta(x)) \sim \alpha(x) - \beta(x)$
3. $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)} \sim \alpha(x) - \beta(x)$



1. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin \alpha(x) - \sin \beta(x)}{\alpha(x) - \beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2 \cos \frac{\alpha(x) + \beta(x)}{2} \sin \frac{\alpha(x) - \beta(x)}{2}}{\alpha(x) - \beta(x)} = 1$
2. 由 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$ 容易证明
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}}{\alpha(x) - \beta(x)} = \frac{e^{\beta(x)}(e^{\alpha(x) - \beta(x)} - 1)}{\alpha(x) - \beta(x)} = 1$



Proposition2:

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 1$ $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 1$ 且 $\alpha(x) \neq \beta(x)$ 那么有

1. $\alpha^k(x) - \beta^k(x) \sim k \times [\alpha(x) - \beta(x)] \quad k \in \mathbb{N}^*$
2. $\alpha^{\frac{1}{k}}(x) - \beta^{\frac{1}{k}}(x) \sim \frac{1}{k} \times [\alpha(x) - \beta(x)] \quad k \in \mathbb{N}^*$
3. $\ln \alpha(x) - \ln \beta(x) \sim \alpha(x) - \beta(x)$

Example1:

计算: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x} - 1}{\ln \cos 3x}$



$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x} - 1}{\ln \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x})}{\ln \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{3} \cos 3x - 3}{\cos x - 1} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \times \frac{\cos 2x - 1}{\cos x - 1} + \frac{1}{3} \times \frac{\cos 3x - 1}{\cos x - 1} = 1 + \frac{1}{2} \times 4 + \frac{1}{3} \times 9 = 6 \end{aligned}$$

经过归纳我们可以得到: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \sqrt{\cos 2x} \dots \sqrt[n]{\cos nx} - 1}{\ln \cos x} = \frac{n(n+1)}{2} \quad n \in \mathbb{N}^*$



Example2:

计算: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1+3x^4} - \sqrt{1-2x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}}$



$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1+3x^4} - \sqrt{1-2x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[(1+3x^4)^2]^{\frac{1}{10}} - [(1-2x)^5]^{\frac{1}{10}}}{(1+x)^{\frac{1}{3}} [1 - (1+x)^{\frac{1}{6}}]} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{10} [(1+3x^4)^2 - (1-2x)^5]}{-\frac{1}{6}x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{10}(10x + o(x))}{-\frac{1}{6}x} = -6 \end{aligned}$$



Example3:

计算: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}} \quad (1^\infty)$



$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{1-\cos x} \ln \frac{\sin x}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{\frac{1}{2}x^3} = -\frac{1}{3} \quad \text{因此原极限} = e^{-\frac{1}{3}}$$



Example4:

计算： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[6]{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}{\sqrt[3]{\cos x} - \sqrt{\cos x}}$



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[6]{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}{\sqrt[3]{\cos x} - \sqrt{\cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[6]{1+x \sin x} - 1}{\sqrt[3]{\cos x} - \sqrt{\cos x}} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - 1}{\sqrt[3]{\cos x} - \sqrt{\cos x}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{1}{6}x \sin x}{-\frac{1}{6}(\cos x - 1)} - \frac{\frac{1}{2}(\cos x - 1)}{-\frac{1}{6}(\cos x - 1)} \right) = 5$$



Example5:

计算： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$



$$\frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x} = \frac{\tan(\tan x) - \tan(\sin x)}{\tan x - \sin x} + \frac{\tan(\sin x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \tan(\sin x)}{\tan x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \tan(\tan x) \tan(\sin x))(\tan(\tan x) - \sin x)}{\tan x - \sin x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\sin x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x} = 1 \quad \text{故原极限} = 2$$



Example1:

设 $f(x) = (\sin x)^2 + \sin^2 x \quad x \in \mathbb{R}$ 证明： $f(x)$ 不是周期函数



因为 $f(x)$ 在 \mathbb{R} 上连续, 但不一致连续, 根据引理的逆否命题就可证明
Lemma: 设 $f(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 连续的周期函数, 则 $f(x)$ 一致连续



Example2:

证明：设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 满足 *Lipschitz* 条件 即 $\exists M > 0 : |f(x_1) - f(x_2)| = M|x_1 - x_2|$
 则 $f(\sqrt{x})$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续



$$|f(\sqrt{x_1}) - f(\sqrt{x_2})| \leq M|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| \leq M\sqrt{|x_1 - x_2|}$$



Example3:

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 一致连续 $\phi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - \phi(x)] = 0$

证明: $\phi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 一致连续

◀

令 $F(x) = f(x) - \phi(x)$ $F(x)$ 在 $[a, +\infty]$ 连续 $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0$ 所以 $F(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续

所以 $\phi(x) = F(x) - f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 一致连续

▶

函数极限到此为止, 同上一章一样, 把重心放在理解定理和函数极限上

微分学

微分学是建立在极限基础上的数学分析 I 的另一大重点

导数

Example 1:

$f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导

◀

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \quad \text{左右极限不同, 故极限不存在, 所以不可导}$$

▶

Corollary:

设 $f(x) \in C(-1, 1)$ $f(0) = 0$ $f'(0)$ 存在. 则有: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{f'(0)}{2}$

进一步地, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k^{i-1}}{n^i}\right) = \frac{1}{i} f'(0) \quad i \in \mathbb{N}^*$

◀

这里只给出 $i = 2$ 的情况, 其余情况请读者自行归纳证明

设 $f'(0) = A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 根据极限的 $\varepsilon - \delta$ 定义: $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad |x| < \delta: \left| \frac{f(x)}{x} - A \right| < \varepsilon$

$\Rightarrow A - \varepsilon < \frac{f(x)}{x} < A + \varepsilon$ 取 $\frac{1}{N} < \delta$ ($N > \frac{1}{\delta}$) 当 $n > N$ 时: $0 < \frac{1}{n^2} < \frac{2}{n^2} < \frac{n}{n^2} < \frac{1}{N} < \delta$

即 $0 < \frac{k}{n^2} < \delta \Rightarrow (A - \varepsilon) \frac{k}{n^2} < f\left(\frac{k}{n^2}\right) < (A + \varepsilon) \frac{k}{n^2} \Rightarrow (A - \varepsilon) \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} < \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) < (A + \varepsilon) \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2}$

将不等式取极限可以得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{A}{2} = \frac{f'(0)}{2}$

▶

微分中值定理

Darboux Theorem:

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, $f'(a) \neq f'(b)$, μ 是介于 $f'(a), f'(b)$ 之间任意实数, 即 $f'(a) < \mu < f'(b)$

则存在 $\xi \in (a, b): f'(\xi) = \mu$

Rolle Theorem:

设 $f(x) \in \mathbb{C}[a, b]$, 且在 (a, b) 可导, $f(a) = f(x_1) = f(x_2) = \dots f(x_i) = f(b) \quad (x_i \in (a, b))$
 则存在 $\xi \in (a, b) : f^{(i+1)}(\xi) = 0$

Example1:

设 $f(x) \in \mathbb{C}[0, 4]$, 在 $[0, 4]$ 二阶可导, $f(0) = 0, f(1) = 1, f(4) = 2$ 证明: 存在 $\xi : f''(\xi) = -\frac{1}{3}$



考虑函数 $F(x) = f(x) - p(x) \quad p(x) = ax^2 + bx + c : p(0) = 0, p(1) = 1, p(4) = 2$
 容易得到多项式 $p(x)$ 的表达式, 又因为 $F(0) = F(1) = F(4)$ 根据 *Rolle* 定理即可证明



Lagrange Mean Theorem:

Example2:

$n > 1 \quad s > 0 \quad 1^s + 2^s + \dots + n^s = \phi(n)$ 则成立: $\frac{n^{s+1}}{s+1} < \phi(n) < \frac{(n+1)^{s+1}}{s+1}$



令 $f(x) = x^{s+1}$ 在 $[k, k+1]$ 由 *Lagrange* 中值定理可得: $(k+1)^{s+1} - k^{s+1} = (s+1)\xi^s \quad (\xi \in (k, k+1))$
 由上式可得: $(s+1) \times k^s < (k+1)^{s+1} - k^{s+1} < (s+1) \times (k+1)^s$
 对上述两个不等式进行求和即得到答案



Example3:

设 $f(x) \in \mathbb{C}[a, b]$ 在 (a, b) 可导 $a > 0$ 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b) : f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta)$



根据 *Lagrange* 中值定理可得: $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a) \quad \xi \in (a, b)$

根据 *Cauchy* 中值定理可得: $\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta} \quad \eta \in (a, b)$

两式相除即可



Example4:

设 $f(x) \in \mathbb{C}[a, b]$, 且在 (a, b) 二阶可导 证明: 存在 $\xi \in (a, b) : f(a) - 2f(\frac{a+b}{2}) + f(b) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi)$



法一: 令 $p(x) = \frac{(x - \frac{a+b}{2})(x-b)}{(a - \frac{a+b}{2})(a-b)} f(a) + \frac{(x-a)(x-b)}{(\frac{a+b}{2} - a)(\frac{a+b}{2} - b)} f(\frac{a+b}{2}) + \frac{(x - \frac{a+b}{2})(x-a)}{(b - \frac{a+b}{2})(b-a)} f(b)$
 $p(a) = f(a), p(b) = f(b), p(\frac{a+b}{2}) = f(\frac{a+b}{2})$

令 $F(x) = f(x) - p(x) \quad F(a) = F(\frac{a+b}{2}) = F(b) = 0$ 根据 *Rolle* 定理: 存在 $\xi \in (a, b) : F''(\xi) = 0$

代入计算即可

法二： 根据 *Cauchy* 中值定理： 令 $F(x) = f(a) - 2f(\frac{a+x}{2}) + f(x)$ $G(x) = (x-a)^2$

$$F(a) = 0, G(a) = 0 \quad \text{只需证} \quad \frac{F(b)}{G(b)} = \frac{1}{4}f''(\xi) \quad \text{即可}$$

$$\frac{F(b)}{G(b)} = \frac{F''(\eta)}{G''(\eta)} = \frac{f'(\eta) - f'(\frac{a+\eta}{2})}{2(\eta-a)} = \frac{f''(\xi)\frac{a+b}{2}}{2(\eta-a)} = \frac{1}{4}f''(\xi)$$

▷

Example5:

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 三阶可导, 证明： 存在 $\xi \in (a, b) : f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(b) - f'(a)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi)$

◁

法一： 令 $F(x) = f(x) - f(a) - \frac{1}{2}(x-a)[f'(x) - f'(a)]$ $G(x) = (x-a)^3$

$$F(a) = F'(a) = 0, F''(x) = -\frac{1}{2}(x-a)f'''(x), G(a) = G'(a) = 0, G''(x) = 6(x-a)$$

根据 *Cauchy* 中值定理有： $\frac{F(x)}{G(x)} = \frac{F''(\xi)}{G''(\xi)} = -\frac{1}{12}f'''(\xi)$ 代入移项即可

$$\text{法二：构造 } F(x) = \begin{vmatrix} f(x) & (x-a)^3 & (x-a)^2 & x-a & 1 \\ f(b) & (b-a)^3 & (b-a)^2 & b-a & 1 \\ f(a) & 0 & 0 & 0 & 1 \\ f'(b) & 3(b-a)^2 & 2(b-a) & 1 & 0 \\ f'(a) & 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$F(a) = F(b) = 0$ 根据 *Rolle* 定理： 存在 $\eta \in (a, b) : F'(\eta) = 0$

$F'(a) = F'(b) = F'(\eta) = 0$ 同理： 存在 $\xi \in (a, b) : F'''(\xi) = 0$

根据行列式函数的求导法则即可得到结论, 计算有点繁琐这里就不写具体过程了

▷

Corollary1:

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 可导, 导数有界, 则 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 一致连续

Corollary2:

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| = +\infty$ 则 $f(x)$ 一定不一致连续

Corollary3:

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A > 0$ 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

凹凸性

I 是 \mathbb{R} 上的区间, 给定 I 上定义实值函数 f 那么下面的几个性质是等价的：

- 1). 对任意 $x, y \in I$ 任意 $t \in [0, 1]$, 有： $f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$
- 2). 对任意 $x, y, z \in I$ 如果 $x < y < z$, 那么： $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$
- 3). 对任意 $x, y, z \in I$ 如果 $x < y < z$, 那么： $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ f(x) & f(y) & f(z) \end{vmatrix} \geq 0$

Jensen Inequality

Example1:

证明：
$$\frac{3}{3+2} + \frac{3^2}{3^2+2} + \dots + \frac{3^n}{3^n+2} > \frac{n^2}{n+1}$$

◁

即证明：
$$\frac{1}{1+\frac{2}{3}} + \frac{1}{1+\frac{2}{3^2}} + \dots + \frac{1}{1+\frac{2}{3^n}} > \frac{n^2}{n+1}$$

令 $f(x) = \frac{1}{1+x_k}$ $x_k = \frac{2}{3^k}$ $k = 1, 2, \dots, n$ $f(x)$ 是下凸函数

根据 Jensen 不等式, 可得：
$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \geq \frac{n}{1 + \frac{1}{n}(\frac{2}{3} + \frac{2}{3^2} + \dots + \frac{2}{3^n})} > \frac{n}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{n^2}{n+1}$$

▷

Example2:

证明： $(a+b)e^{a+b} \leq ae^{2a} + be^{2b}$ ($a > 0, b > 0$)

◁

令 $f(x) = e^{2x}$ $\lambda_1 = \frac{a}{a+b}$ $\lambda_2 = \frac{b}{a+b}$ 根据 Jensen 不等式可得：

$$\frac{a}{a+b}e^{2a} + \frac{b}{a+b}e^{2b} \geq e^{2\frac{a^2+b^2}{a+b}} \Rightarrow ae^{2a} + be^{2b} \geq (a+b)e^{2\frac{a^2+b^2}{a+b}} \geq (a+b)e^{a+b}$$

▷

Example3:

证明： 设 $0 < \alpha < \beta$ $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ 则有：
$$\left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \dots + a_n^\alpha}{n}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \leq \left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \dots + a_n^\beta}{n}\right)^{\frac{1}{\beta}}$$

◁

令 $p = \frac{\beta}{\alpha} \geq 1$, $x_1, \dots, x_n > 0$ 根据 Jensen 不等式：

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right)^p \leq \frac{x_1^p + x_2^p + \dots + x_n^p}{n} \quad \text{将 } x_1 = a_1^\alpha, \dots, x_n = a_n^\alpha \text{ 代入上述不等式再开 } \beta \text{ 次根即可}$$

▷

Example4:

证明： $(\sin x)^{\sin x} < (\cos x)^{\cos x}$ (其中 $0 < x < \frac{\pi}{2}$)

◁

令 $f(x) = \ln x$ 取 $b = \cos x + \sin x$ $a = \sin x$ $t = \tan x$ $t \in (0, 1)$

$\ln x$ 是上凸函数, 根据定义有： $\ln(ta + (1-t)b) \geq t \ln a + (1-t) \ln b$

$$\Rightarrow \ln \cos x \geq \tan x \ln \sin x + (1 - \tan x) \ln (\cos x + \sin x)$$

其中 $(1 - \tan x) \ln (\cos x + \sin x) > (1 - \tan x) \ln \left(\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{4}\right) > 0$

因此 $\ln \cos x \geq \tan x \ln \sin x \Rightarrow \cos x \ln \cos x \geq \sin x \ln \sin x \Rightarrow (\sin x)^{\sin x} < (\cos x)^{\cos x}$

▷

Example5:

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可导, $f(0) = 0$, $f'(x)$ 单调增加 证明： $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 单调增加

◁

$$\sqrt[5]{x^5 + 7x^4 + 2} = x(1 + \frac{7x^4 + 2}{x^5})^{\frac{1}{5}} = x(1 + \frac{1}{5}(\frac{7}{x} + \frac{2}{x^5}) + o(\frac{1}{x})) = x + \frac{7}{5} + xo(\frac{1}{x})$$

$$\text{因此 } a = 1, b = \frac{7}{5}$$



Example4:

$$\text{设 } \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{f(x)}{x^2}) = 0 \quad \text{设 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处二阶可导, 求 } f(0), f'(0), f''(0)$$



$$\begin{aligned} \text{根据 Taylor 公式: } f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + o(x^2) \\ \frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{f(x)}{x^2} &= \frac{\sin 3x + xf(x)}{x^3} = \frac{3x - \frac{9}{2}x^3 + f(0)x + f'(0)x^2 + \frac{1}{2}f''(0)x^3 + o(x^3)}{x^3} \\ \text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{f(x)}{x^2}) &= 0 \text{ 故有 } f(0) = 3, f'(0) = 0, f''(0) = 9 \end{aligned}$$



Example5:

$$\text{设 } f(x) \in \mathbb{C}[0, 4], \text{ 在 } [0, 4] \text{ 二阶可导, } f(0) = 0, f(1) = 1, f(4) = 2 \quad \text{证明: 存在 } \xi : f''(\xi) = -\frac{1}{3}$$



$$\begin{aligned} \text{根据 } f(x) \text{ 在 } x_0 = 1 \text{ 的 Talor 公式: } f(x) &= f(1) + f'(1)(x - 1) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - 1)^2 \quad \xi \in [0, 4] \\ \text{代入 } x = 0 \Rightarrow 0 &= 1 - f'(1) + \frac{f''(\xi_1)}{2} \\ \text{代入 } x = 4 \Rightarrow 2 &= 1 + 3f'(1) + \frac{9}{2}f''(\xi_2) \\ \text{消去 } f'(1) \Rightarrow 3f''(\xi_1) + 9f''(\xi_2) &= -4 \quad \text{根据 Darboux 定理, 存在 } \xi \in (\xi_1, \xi_2) : f''(\xi) = \frac{1}{4}f''(\xi_1) + \frac{3}{4}f''(\xi_2) \\ \text{即 } f''(\xi) &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$



Example6:

$$\text{设 } f(x) \text{ 在 } (a, +\infty) \text{ 上二阶可导, 且 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) \text{ 存在}$$

$$\text{证明: } \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0$$



$$\begin{aligned} f(x+1) &= f(x) + f'(x)(x+1-x) + \frac{f''(\xi_1)}{2} \quad \xi_1 \in (x, x+1) \\ f(x-1) &= f(x) + f'(x)(x-1-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2} \quad \xi_2 \in (x-1, x) \\ \text{上式减下式} \Rightarrow f(x+1) - f(x-1) &= 2f'(x) + \frac{[f''(\xi_1) - f''(\xi_2)]}{2} \quad \text{等式两端对 } x \rightarrow +\infty \text{ 取极限得:} \\ 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) &= 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0 \\ \text{又因为 } f(x+1) &= f(x) + f'(x)(x+1-x) + \frac{f''(\xi_1)}{2} \quad \xi_1 \in (x, x+1) \quad \text{等式两端对 } x \rightarrow +\infty \text{ 取极限得:} \\ \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(\xi_1) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0 \end{aligned}$$



Thinking:

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上 n 阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$ 存在

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = \dots = \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = 0$

Example7:

设 $f(x) \in C[a, b]$, 且在 (a, b) 二阶可导 $p(x)$ 是过 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 的一个线性函数

求证: 对任意 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b): p(x) - f(x) = \frac{(x-a)(b-x)}{2} f''(\xi)$



根据两点式公式可以设 $p(x) = \frac{b-x}{b-a} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b)$ 根据 $p(x)$ 的 *Taylor* 公式可得:

$$f(a) = f(x) + f'(x)(a-x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(a-x)^2$$

$$f(b) = f(x) + f'(x)(b-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(b-x)^2$$

将上述两个等式代入 $p(x)$ 中得到: $p(x) = f(x) + \frac{(b-x)(x-a)}{2} [\frac{x-a}{b-a} f''(\xi_1) + \frac{b-x}{b-a} f''(\xi_2)]$

最后根据 *Darboux* 定理: 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2): \frac{x-a}{b-a} f''(\xi_1) + \frac{b-x}{b-a} f''(\xi_2) = f''(\xi)$



Example8:

求 $\sqrt{\underbrace{111\dots1}_{1998\uparrow}}$ 小数点后的第999位, 第1000位, 第1006位



$$\begin{aligned} \sqrt{\underbrace{111\dots1}_{1998\uparrow}} &= \sqrt{\frac{1000\dots0 - 1}{9}} = \sqrt{\frac{10^{1998}}{9} (1 - \frac{1}{10^{1998}})} = \frac{10^{999}}{3} (1 - \frac{1}{10^{1998}})^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{10^{999}}{3} (1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{10^{1998}} + \varepsilon) \quad |\varepsilon| < 10^{-2 \times 1998} (Taylor) \\ &= 10^{-999} \times \frac{10^{1998}}{3} (1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{10^{1998}} + \varepsilon) = 10^{-999} (\frac{10^{1998}}{3} - \frac{1}{6} + \eta) \quad |\eta| < \frac{1}{3} \times 10^{-1998} \\ &= 10^{-999} (\frac{10^{1998} - 1}{3} + \frac{1}{6} + \eta) = 10^{-999} (\underbrace{333\dots3}_{1998\uparrow} + 0.16666\dots + \eta) = \underbrace{33\dots3}_{999\uparrow} \underbrace{.333\dots}_{999\uparrow} 16666\dots + 10^{-999} \eta \end{aligned}$$

显然第999位是3, 第1000位是1, 第1001位是6



微分学复习题

Q1:

设 $f(x) = \begin{cases} |x| & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ 证明: $f(x)$ 不存在原函数



Corollary : 导函数不存在第一类间断点, 由 *Lagrange* 中值定理易证

若存在原函数 $F(x)$ 则 $F'(x) = f(x)$ 但 $F'(x)$ 有第一类间断点

注意 : 这里所指的第一类间断点是指可去间断点和跳跃间断点

▷

Q2:

设 $f(x) = |x^3|$ 证明 : $f'''(0)$ 不存在

◁

$f'''(x) = \begin{cases} 6 & x > 0 \\ -6 & x < 0 \end{cases}$ 若 $f'''(0)$ 存在, 不能有第一类间断点, 矛盾! 故 $f'''(0)$ 不存在

▷

Q3:

$$\sin^2 x < \sin x^2 \quad (0 < x < \sqrt{\frac{\pi}{2}})$$

◁

$\sin x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 单调增加, 当 $1 \leq x \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 时, $1 \leq x \leq x^2 \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin^2 x < \sin x < \sin x^2$

当 $0 < x < 1$ 时, $0 < x^2 < x < 1 < \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ $\frac{\sin x}{x} < \frac{\sin x^2}{x^2} \Rightarrow x \sin x < \sin x^2 \Rightarrow \sin^2 x < \sin x^2$

▷

Q4:

证明 : $\sin(\tan x) < \tan(\sin x) \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$

◁

当 $x \in [\arctan \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 时 (注 : $x > 0$ 时 $x > \arctan x$) 因为 $4 + \pi^2 < 16$

故 $\tan(\sin(\arctan \frac{\pi}{2})) = \tan(\frac{\pi}{\sqrt{4 + \pi^2}}) > 1$ 因此 $x \in [\arctan \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 时 $\sin(\tan x) < 1 < \tan(\sin x)$

当 $x \in (0, \arctan \frac{\pi}{2})$ 时 $0 < \tan x < \frac{\pi}{2}$ 令 $f(x) = \tan(\sin x) - \sin(\tan x)$

$$f'(x) = \frac{\cos x}{\cos^2(\sin x)} - \frac{\cos(\tan x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2(\sin x) \cos^2 x} (\cos^3 x - \cos(\tan x) \cos^2(\sin x))$$

其中 $\cos(\tan x) \cos^2(\sin x) \leq (\frac{\cos(\tan x) + \cos(\sin x) + \cos(\sin x)}{3})^3$ (均值不等式)

$$\leq \cos^3(\frac{\tan x + 2 \sin x}{3}) \quad (Jensen \text{ 不等式}) < \cos^3 x \quad (\text{注 : } \tan x + 2 \sin x > 3x)$$

因此 $f'(x) > 0$, 又因为 $f(0) = 0 \Rightarrow f(x) > 0 \quad (0 < x < \arctan \frac{\pi}{2})$

综上所述 $\sin(\tan x) < \tan(\sin x) \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$

▷

Q5:

设 $f(x)$ 在 (a, b) 可导, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = -\infty$ 且当 $x \in (a, b)$ 时 $f'(x) + f^2(x) \geq -1$

证明 : $b - a \geq \pi$

◁

$$\frac{d(\arctan f(x) + x)}{dx} = \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} + 1 \geq 0 \quad \text{因此 } \arctan f(x) + x \text{ 在 } (a, b) \text{ 单调增加}$$

$$\text{所以 } \frac{\pi}{2} + a \leq -\frac{\pi}{2} + b \Rightarrow b - a \geq \pi \quad (f(x) = \cot x \quad a = 0, b = \pi \text{ 取等})$$

▷

Q6:

$$\text{证明: } (\sin x)^{1-\cos 2x} + (\cos x)^{1+\cos 2x} \geq \sqrt{2} \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$$

◁

我们知道: $1 - \cos x = 2 \sin^2 x, 1 + \cos x = 2 \cos^2 x$ 所以问题等价于证明: $(\sin^2 x)^{\sin^2 x} + (\cos^2 x)^{\cos^2 x} \geq \sqrt{2}$

$$\text{令 } f(x) = x^x, x \in (0, 1) \quad f'(x) = x^x(\ln x + 1) \quad f''(x) = x^x(\ln x + 1)^2 + \frac{x^x}{x} > 0$$

所以 $f(x)$ 是在 $(0, 1)$ 的下凸函数

$$\text{根据 Jensen 不等式: } \frac{(\sin^2 x)^{\sin^2 x} + (\cos^2 x)^{\cos^2 x}}{2} \geq \frac{1}{2}^{\frac{1}{2}}$$

▷

Q7:

$$\text{证明: } x - \frac{1}{x} < 2 \ln x \quad (0 < x < 1)$$

$$x - \frac{1}{x} > 2 \ln x \quad (x > 1)$$

◁

$$\text{令 } f(x) = x - \frac{1}{x} - 2 \ln x, f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} = (1 - \frac{1}{x})^2 > 0 \quad f(1) = 0$$

$$\text{因此 } x - \frac{1}{x} < 2 \ln x \quad (0 < x < 1)$$

$$x - \frac{1}{x} > 2 \ln x \quad (x > 1)$$

$$\text{在上述不等式中令 } x = \sqrt{t}, t > 0, t \neq 1 \text{ 可以得到: } \frac{\ln t}{t-1} < \frac{1}{\sqrt{t}}$$

$$\text{特别地, 令 } t = x+1, x > 0, \text{ 可以得到: } \ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}} \text{ 或 } \ln^2(1+\frac{1}{x}) < \frac{1}{x(x+1)}$$

▷

Q8:

求对任意正整数 n 使得不等式 $(1 + \frac{1}{n})^{n+\alpha} \leq e \leq (1 + \frac{1}{n})^{n+\beta}$ 成立的 α 的最大值和 β 的最小值

◁

$$\text{不等式等价于: } \alpha \leq \frac{1}{\ln(1+\frac{1}{n})} - n \quad \beta \geq \frac{1}{\ln(1+\frac{1}{n})} \quad n \in \mathbb{N}^*$$

$$\text{令 } f(x) = \frac{1}{\ln(1+\frac{1}{x})} - x \quad x \in [1, +\infty) \quad f'(x) = \frac{1}{x(x+1)\ln^2(1+\frac{1}{x})} - 1 > 0 \quad (\text{根据 Q7 最后的结论})$$

$$\text{则 } \alpha_{\max} = \frac{1}{\ln 2} - 1 \quad \beta_{\min} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \frac{1}{2}$$

▷

Q9:

设 $f(x)$ 在 (a, b) 有二阶导数, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

证明: 1. 存在 $x_n \in (a, +\infty) : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0$

2. 存在 $\xi \in (a, +\infty) : f''(\xi) = 0$



1. 由 *Lagrange* 中值定理: $f(a+n+1) - f(a+n) = f'(x_n) \quad x_n \in (a+n, a+n+1) \quad n = 1, 2, \dots$

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0$

2. 若不存在 $\xi \in (a, +\infty) : f''(\xi) = 0$, 由 *Darboux* 定理可得 $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上不变号

不失一般性设 $f''(x) > 0, x \in (a, +\infty)$, 则 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 严格单调增加, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0 \Rightarrow f'(x) < 0$

故 $f(x)$ 严格单调减少, 这与 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 矛盾, 故存在 $\xi \in (a, +\infty) : f''(\xi) = 0$

