



哈爾濱工業大學

第3章 随机变量及其分布

第15讲 连续型随机变量




连续型随机变量



定义 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 若存在一个非负的函数 $f(x)$, 对任何实数 x , 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

称 X 为**连续型随机变量**, 称 $f(x)$ 为 X 的**概率密度函数**, 简称**概率密度**. 也可记为 $f_X(x)$.



连续型随机变量



□ 由定义，可得下面两个结论

- (1) 连续型随机变量的分布函数一定是连续的；
- (2) 对 $f(x)$ 的连续点，有

$$\left. \begin{array}{l} F'(x) = f(x) \\ F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \end{array} \right\} F(x) \text{与} f(x) \text{可以互推.}$$

概率密度的性质



(i) $f(x) \geq 0$,


(ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

这两条是判定函数
 $f(x)$ 是否为概率密
度函数的充要条件.

$$F(+\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

面积是1




概率密度的性质



$$(iii) P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx.$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$



连续型随机变量



✚ 连续型随机变量取任一指定值的概率为0,
即 $P(X = a) = 0$.

这是因为

$$0 \leq P(X = a) \leq P(a - \Delta x < X \leq a) = F(a) - F(a - \Delta x), \Delta x > 0.$$

由 $F(x)$ 连续得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (F(a) - F(a - \Delta x)) = 0 \Rightarrow P(X = a) = 0.$$

连续型随机变量



$$P(X = a) = 0 \not\Rightarrow (X = a) = \emptyset.$$

同理 $P(A) = 0$ 不能推出 $A = \emptyset$,

$P(B) = 1$ 不能推出 $B = S$.

$$P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b).$$

连续型随机变量



- $f(x)$ 的值是如何反应概率呢？


若 x 是 $f(x)$ 的连续点，则

$$f(x) = F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x < X \leq x + \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt}{\Delta x}.$$

$$P(x < X \leq x + \Delta x) \approx f(x) \Delta x.$$

表明 X 落在 x 附近领域 $(x, x + \Delta x)$ 的概率约等于 $f(x) \Delta x$.



$$f(x_2) > f(x_1)$$



例1 设连续型随机变量 X 的概率密度

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 + x, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求(1) 系数 c ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P(-0.5 < X < 0.3)$).

解

$$\begin{aligned} \underline{1} &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{0.5} (cx^2 + x) dx = \left(\frac{c}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right) \bigg|_0^{0.5} \\ &= \frac{c}{24} + \frac{1}{8}, \Rightarrow c = 21. \end{aligned}$$

\swarrow

$$P(0 \leq X \leq 0.5) = 1.$$



$$(2) F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$


$$\text{由 } P(0 \leq X \leq 0.5) = 1.$$

$$f(x) = \begin{cases} 21x^2 + x, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$1^0 \text{ 当 } x < 0 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0;$$

$$2^0 \text{ 当 } x \geq 0.5 \text{ 时, } F(x) = P(X \leq x) = 1.$$

$$\begin{aligned} 3^0 \text{ 当 } 0 \leq x < 0.5 \text{ 时, } F(x) &= \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x (21t^2 + t) dt \\ &= 7x^3 + x^2 / 2; \end{aligned}$$





$$\text{即, } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 7x^3 + x^2 / 2, & 0 \leq x < 0.5, \\ 1, & x \geq 0.5. \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 21x^2 + x, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (3) P(-0.5 < X < 0.3) &= \int_{-0.5}^{0.3} f(x) dx = \int_0^{0.3} (21x^2 + x) dx \\ &= (7x^3 + x^2 / 2)_0^{0.3} = 0.234. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{或 } P(-0.5 < X < 0.3) &= F(0.3) - F(-0.5) \\ &= 7 \cdot (0.3)^3 + (0.3)^2 / 2 - 0 = 0.234. \end{aligned}$$

练习



1. 设 $X \sim f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 求 $F(x)$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

解

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ \int_0^1 t dt + \int_1^x (2-t) dt = 2x - 1 - \frac{x^2}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$



例2 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases} \text{ 求 } X \text{ 的概率密度.}$$

解

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$


几种重要的连续型随机变量



■ 均匀分布(Uniform)

定义 若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (a < b).$$



称 X 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 记为 $X \sim U[a, b]$.

$$f(x) \geq 0; \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = 1.$$

满足概率密度性质.

均匀分布



➤ 均匀的含义是等可能

若 $X \sim U[a, b]$, (x_1, x_2) 为 $[a, b]$ 中的任一子区间,

则

$$P(x_1 < X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{b-a} = \frac{1}{b-a} (x_2 - x_1).$$

说明: X 落在长度相等的各个子区间的可能是相等的. 属于几何概率.


若 $X \sim U[a, b]$, 则 $P(a \leq X \leq b) = 1$.

概率密度的性质



若 $X \sim U[a, b]$, 则 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$




$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

均匀分布的用途



- 设通过某站的汽车10分钟一辆，则乘客候车时间 X 在 $[0, 10]$ 上服从均匀分布；
- 某电台每隔20分钟发一个信号，我们随手打开收音机，等待时间 X 在 $[0, 20]$ 上服从均匀分布；
- 随机投一根针于坐标纸上，它和坐标轴的夹角 X 在 $[0, \pi]$ 上服从均匀分布.



例3 设随机变量 $X \sim U(1,6)$, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

解 由 $X \sim U(1,6)$ 得 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & 1 < x < 6, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

方程有实根 $\Leftrightarrow \Delta \geq 0 \Leftrightarrow X^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow X \geq 2$ 或 $X \leq -2$,

故, 方程有实根的概率为

$$P(X \geq 2) + P(X \leq -2) = \int_2^6 \frac{1}{5} dx + 0 = \frac{4}{5}.$$

练习




1. 设随机变量 X 在 $(2,5)$ 上服从均匀分布，现对 X 进行三次独立观测，试求至少有两观测值大于3的概率。

解 因为随机变量 X 在 $(2,5)$ 上服从均匀分布，所以 X 的概率密度为


$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 2 < x < 5 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

事件“对 X 的观测值大于3”的概率为 $P\{X > 3\} = \int_3^5 \frac{1}{3} dx = \frac{2}{3}$
设 Y 表示三次独立观测中观测值大于3的次数，则 $Y \sim B\left(3, \frac{2}{3}\right)$
于是

$$P\{Y \geq 2\} = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{1}{3} + C_3^3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}$$

- 
- 区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布 $U(0, 1)$ 在计算机模拟中起着重要的作用.
 - 实用中, 用计算机程序可以在短时间内产生大量服从 $(0, 1)$ 上均匀分布的随机数. 它是由一种迭代过程产生的.
 - 严格地说, 计算机中产生的 $U(0, 1)$ 随机数并非完全随机, 但很接近随机, 故常称为伪随机数.

- 如取 n 足够大，独立产生 n 个 $U(0, 1)$ 随机数，则从用这 n 个数字画出的频率直方图就可看出，它很接近于 $(0, 1)$ 上的均匀分布 $U(0, 1)$ 。



指数分布(Exponential)



■ 定义 若连续型随机变量 X 的概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad (\lambda > 0).$$

称 X 服从参数为 λ 的指数分布. 记为 $X \sim E(\lambda)$.

满足: $f(x) \geq 0$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = 1$.
分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad \lambda > 0.$$

指数分布常用来近似地表示各种寿命的分布.

指数分布的无记忆性



$$X \sim E(\lambda), \quad \forall s > 0, t > 0,$$

$$P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t).$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

因为

$$\begin{aligned} P\{X > s+t \mid X > s\} &= \frac{P\{X > s+t, X > s\}}{P\{X > s\}} \\ &= \frac{P\{X > s+t\}}{P\{X > s\}} = \frac{1 - F(s+t)}{1 - F(s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} \\ &= P(X > t). \end{aligned}$$




例4 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, a 为常数且大于零, 则 $P(X < a+1 | X > a) = \underline{\hspace{2cm}}$

解 已知 $X \sim E(1)$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P(X < a+1 | X > a) &= 1 - P(X \geq a+1 | X > a) = 1 - P(X \geq 1) \\ &= P(X < 1) = F(1) = 1 - e^{-1} \end{aligned}$$



例5 设机器相邻两次故障的时间间隔(小时) X 服从参数为 $1/5$ 的指数分布, 求在机器已经无故障工作了8小时的情况下, 再无故障工作10小时的概率.

解 已知

$$X \sim E(1/5). \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/5}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P(X > 18 | X > 8) &= P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) \\ &= 1 - F(10) = 1 - (1 - e^{-10/5}) = e^{-10/5} = e^{-2}. \end{aligned}$$



谢 谢！