# 小胶质细胞分化

**2026年3月2日星期一**

- iPSC-160 初始种植密度为300k 细胞每孔（6孔板）
- 配置所需要的溶液
- 在4C解冻StemPro34营养添加剂，把13ml营养添加剂加入500ml StemPro34 SFM 中
- 配置基地培养液
    - 取出50ml 培养基， 加入0.45mM MTG
        - 使用注射器吸取50ml 培养基，使用0.22um 滤网进行过滤
    - 加入 200ug/ml transferrin， 500 ul Glutamax, 0.5mM Vc至过滤完毕的液体中
- Day 0 培液， 取出4 ml 基地培养液 加入 5ng/ml BMP4， 50ng/mlVEGF 以及2uM CHIR99021

- 弃mTESR上清，加入Day 0 培养液

**2026年3月3日星期二**

- 拍照观察Day 1 的小胶质细胞。 图片来源 D-Da—小胶质细胞-Day1
    - 备注- 细胞死亡较多，疑似为CHIR99021 浓度不准

Day_1.jpg



**2026年3月4日星期三**

- 配置Day2 培养液， 基地培养液加入 5ng/ml BMP4 + 50ng/ml VEGF + 20ng/ml bFGF
- 弃上清，更换Day 2 培养液
- 拍照观察
    - 虽然细胞死亡较多（与之前比较）但是中非曾分化迹象明显
    - 图片来源 D-Da-小胶质细胞-Day2

Explore the Notebook

DAY_2.jpg



**2026年3月5日星期四**

- 配置Day4 培养液， 基地培养液加入 15ng/ml VEGF + 5ng/ml bFGF
- 03/06准备更换分化培液Day 4