

Chapitre 0 : Quelques rappels et notations

1 Notations relatives aux ensembles et à la logique

1.1 Rudiments de logique

Soient A et B deux propositions (ou affirmations).

On dit que A implique B , noté $A \Rightarrow B$, si B est vrai à chaque fois que A est vrai.

Exemple : (la température est de -10°C) \Rightarrow (l'eau gèle).

On dit que A et B sont équivalentes, noté $A \Leftrightarrow B$, si à la fois $A \Rightarrow B$ et $B \Rightarrow A$. Autrement dit, A et B sont soit toutes les deux vraies, soit toutes les deux fausses.

Exemple : (la température est inférieure à 0°C) \Leftrightarrow (l'eau gèle).

1.2 Ensembles

Un ensemble est une collection quelconque d'éléments (nombres, points, ensembles...). Par exemple, l'ensemble constitué des nombres 1, 2 et 3 est noté $\{1, 2, 3\}$. L'ensemble vide, qui ne contient aucun élément, est noté \emptyset .

Si x est un élément d'un ensemble E (on dit aussi que x appartient à E), on note $x \in E$. Dans l'exemple précédent, $1 \in \{1, 2, 3\}$.

On dit qu'un ensemble E est inclus dans un autre ensemble F , noté $E \subset F$, si $x \in E \Rightarrow x \in F$. On dit aussi que E est une partie de F . Exemple : $\{1, 3\} \subset \{1, 2, 3\}$.

La réunion et l'intersection de deux ensembles E et F sont respectivement définies par :

$$E \cup F = \{x, x \in E \text{ ou } x \in F\},$$

$$E \cap F = \{x, x \in E \text{ et } x \in F\}.$$

Exemples : $\{1, 2, 3\} \cup \{2, 5, 7\} = \{1, 2, 3, 5, 7\}$ et $\{1, 2, 3\} \cap \{2, 5, 7\} = \{2\}$.

On définit également la différence d'ensembles par

$$E \setminus F = \{x, x \in E \text{ et } x \notin F\}.$$

Exemple : $\{1, 2, 3\} \setminus \{2, 5, 7\} = \{1, 3\}$.

Pour énoncer des propriétés qui sont vérifiées par un ou plusieurs éléments d'un ensemble, on utilise deux quantificateurs : "il existe", noté \exists , et "quel que soit", noté \forall .

Exemples :

$$\forall x \in \{1, 2, 3\}, 1 \leq x \leq 3,$$

$$\exists x \in \{1, 2, 3\}, x \leq 2.$$

Remarque : le symbole \exists n'exige pas l'unicité.

2 Calculs avec des nombres réels

2.1 Ensembles de nombres

Les ensembles de nombres classiques sont les suivants.

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$: ensemble des nombres entiers naturels.

$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$: ensemble des nombres entiers relatifs.

$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$: ensemble des nombres rationnels.

$\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$: ensemble des nombres réels (le symbole ∞ désigne l'infini).

$\mathbb{C} = \{x + iy, x, y \in \mathbb{R}\}$: ensemble des nombres complexes.

On a les inclusions :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

On note également :

$$\mathbb{R}_+ = [0, +\infty[= \{x \in \mathbb{R}, x \geq 0\}, \quad \mathbb{R}_- =]-\infty, 0] = \{x \in \mathbb{R}, x \leq 0\}.$$

Les ensembles \mathbb{Q} , \mathbb{R} et \mathbb{C} sont munis des quatre opérations classiques : addition, soustraction, multiplication et division.

2.2 Relation d'ordre

L'ensemble des nombres réels est muni d'une relation d'ordre \leq compatible avec l'addition et la multiplication de la façon suivante :

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, \quad x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z,$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \forall c \geq 0, \quad x \leq y \Rightarrow cx \leq cy.$$

2.3 Valeur absolue

La valeur absolue d'un nombre réel x , notée $|x|$, est le plus grand des deux nombres x et $-x$. Ainsi on a

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

Exemples : $|2| = 2$, $|-2| = 2$.

On a les relations suivantes (la seconde est appelée inégalité triangulaire) :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |xy| = |x||y|,$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |x + y| \leq |x| + |y|.$$

2.4 Identités remarquables

On rappelle que, pour tous nombres réels a et b , on a

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

3 Fonctions, limites

3.1 Notion de fonction

Soit D une partie de \mathbb{R} . Une fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ associe à tout élément de D un élément de \mathbb{R} . L'ensemble D est appelé domaine de définition de la fonction f . On note :

$$\begin{aligned} f : D &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x). \end{aligned}$$

Exemples : pour

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} & g : \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^2, & x &\mapsto \sqrt{x}, \end{aligned}$$

on a $f(1) = 1$, $f(2) = 4$, $f(4) = 16$, $g(1) = 1$, $g(2) = \sqrt{2}$, $g(4) = 2$.

3.2 Limite finie d'une fonction en un point

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, f une fonction définie au voisinage de x_0 (mais pas nécessairement en x_0) et soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers x_0 si on peut rendre $f(x)$ arbitrairement proche de ℓ à condition de prendre x assez proche de x_0 .¹ On note

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad f(x) \rightarrow \ell \ (x \rightarrow x_0).$$

Exemples.

- a) On a évidemment $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ (on dit que la fonction $x \mapsto x^2$ est continue en 2 car elle est définie en ce point et sa limite est égale à sa valeur).
b) Considérons maintenant la fonction

$$f : [-1, 0[\cup]0, +\infty[\mapsto f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$$

Cette fonction n'est pas définie en 0, mais elle est définie au voisinage de 0. En écrivant

$$f(x) = \frac{(\sqrt{1+x} - 1)(\sqrt{1+x} + 1)}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{(1+x) - 1}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1}$$

on obtient que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}$.

1. La définition exacte, non exigée, est la suivante : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, x \in]x_0 - \eta, x_0 + \eta[\cap D \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$.