МИИН

ПРАКТИЧЕСКИЙ
4-ДНЕВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
«НУТРИЦИОЛОГ С НУЛЯ: БАЗА»

КОНСТРУКТОР
ПОЛНОЦЕННОГО РАЦИОНА

ЗАВТРАК С 7:00 ДО 10:00

(в течение часа после пробуждения)

ФОРМУЛА ИДЕАЛЬНОГО ЗАВТРАКА

- Жиры до 60%
- Белок 20-40%
- Углеводы 20%

ИДЕАЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ ЗАВТРАКА

- Полезные жиры
- Животные и растительные белки
- Овощи
- Пробиотики (кокосовый йогурт, ферментированная капуста, овощи, кимчи)
- Можно добавить несколько ложек каши

БАЗОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Достаточное количество воды
- Фрукты и натуральные сладости – 30-50 гр. перед едой
- Пробиотики и пребиотики (в каждый прием пищи)

БЕЛКИ НА ЗАВТРАК

Жирные сорта рыбы, яйцо, красное мясо, соя, тыквенный или подсолнечный протеин, курица, индейка тофу, темпе, дикий лосось, креветки, гребешки, кальмары, перепелиные яйца

ЖИРЫ НА ЗАВТРАК

Авокадо, кокосовый йогурт с палео-гранолой, оливки, кето-кофе, ореховое молоко, жирные сорта сыра, кедровые орехи, тыквенные семечки, семена чиа, миндаль, фисташки, грецкие орехи, бразильские орехи, пекан, лен, кешью, печень трески, кето-хлебцы из миндальной муки, тхина, ореховый сыр

УГЛЕВОДЫ НА ЗАВТРАК

Киноа, просо, гречка, безглютеновый хлеб, бурый рис, амарант, кейл, корн, шпинат, руккола, бок-чой, мангольд, водный кресс, ромэн, клубника, черника, голубика, манго, вишня, ананас, малина, ежевика, годжи, тыква, морковь, помидоры, редис, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста

ОБЕД С 12:00 ДО 14:00

ФОРМУЛА ИДЕАЛЬНОГО ОБЕДА

- Жиры 15%
- Белок 25%
- Клетчатка *(зелень и овощи) до 60%*

ИДЕАЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ ОБЕДА

- Полезные жиры
- Белок
- Овощной суп
- Пробиотики *(ферментированная капуста, овощи, кимчи, кокосовый йогурт)*

БЕЛКИ НА ОБЕД

Жирные сорта рыбы, яйцо, красное мясо, соя, тыквенный или подсолнечный протеин, курица, индейка тофу, темпе, дикий лосось, креветки, гребешки, кальмары, перепелиные яйца

ЖИРЫ НА ОБЕД

Авокадо, кокосовый йогурт с палео-гранолой, оливки, кето-кофе, ореховое молоко, жирные сорта сыра, кедровые орехи, тыквенные семечки, семена чиа, миндаль, фисташки, грецкие орехи, бразильские орехи, пекан, лен, кешью, печень трески, кето-хлебцы из миндальной муки, тхина, ореховый сыр

УГЛЕВОДЫ НА ОБЕД

Шампиньоны, радиччо, вешенки, опята, брюссельская капуста, кольраби, цветная капуста, брокколи, кейл, корн, шпинат, руккола, бок-чой, мангольд, водный кресс, ромэн, болгарский перец, батат, цуккини, лук, огурцы, морковь, редис, кимчи, квашенная капуста

ЭУБИОТИЧЕСКИЙ УЖИН С 17:00 ДО 18:00

ФОРМУЛА ИДЕАЛЬНОГО УЖИНА

- Углеводы до 75%
- Жиры до 15%
- Белок до 15%

! Ужин едим не только мы, но и наши бактерии, поэтому он должен быть богат клетчаткой

ИДЕАЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ ОБЕДА

Большая миска овощного салата с пробиотическим соусом – 3-4 типа овощей:

- отварные
- запеченные
- ферментированные
- сырые

Для сытости можно добавить крупы (киноа, амарант и тофу)

БЕЛКИ НА УЖИН

Нут, фасоль, чечевица, горох, фалафель, темпе, соя, хумус, тофу, белая и красная фасоль, спаржа, зеленый горох

ЖИРЫ НА УЖИН

Авокадо, оливки, масло: оливковое, кокосовое, тыквенное, конопляное, авокадо, льняное, конопляные семечки, кунжут, тхина, лен, семена чиа, тыквенные семечки, семена подсолнечника

УГЛЕВОДЫ НА УЖИН

Шампиньоны, вешенки, опята, брюссельская капуста, кольраби, цветная капуста, брокколи, кейл, корн, шпинат, руккола, бок-чой, мангольд, водный кресс, ромэн, болгарский перец, батат, цуккини, лук, огурцы, морковь, редис, кимчи, квашенная капуста, ламинария, вакамэ, спирулина

ПЕРЕКУС (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

(при синдроме усталых надпочечников или если вам тяжело сразу перейти на 3-х разовое питание)

- 1-й перекус через 2-3 часа после завтрака
- 2-й перекус между обедом и ужином

ВАРИАНТЫ ПЕРЕКУСА

- Хумус с оливковым маслом + льняные хлебцы
- Ореховый сыр + хлебцы из семян подсолнечника
- Небольшой бутерброд с цельнозерновым бездрожжевым хлебом с семенами ибелком *(мясо, рыба, яйцо)*
- Льняные хлебцы с гуакамоле
- Жирные сорта сыра + льняные хлебцы

! Идеально – орехи и оливки; кокосовый йогурт с ореховой гранолой

РЕЖИМ ПРИЕМА ПИЩИ

Соблюдайте чистые промежутки без перекусов *(используя только воду)* между приемами пищи не менее 4 часов днем

- Профилактика инсулино- и лептинорезистентности

1. Henry RR, Gumbiner B, Ditzler T, Wallace P, Lyon R, Glauber HS. Intensive conventional insulin therapy for type ii diabetes. Diabetes Care. 1993 Jan; 16(1):23–31

2. Polonski K, Given B, Van Cauter E. Twenty-four hour profiles and pulsatile patterns of insulin secretion in normal and obese subjects. J Clin Invest. 1988 Feb; 81(2):442–8

Соблюдайте ночной «голодный» промежуток не менее 12 часов (например, с 19 вечера до 7 утра)

- Профилактика инсулинорезистентности возможна только при сохранении периодов пониженного инсулина в течении 50% времени суток и более.
- Поддерживает процессы детоксикации и восстановление организма, за счет выработки соматотропного гормона и активации глимфатической системы (восстановление нервной системы)

1. Bellisle F, McDevitt R, Prentice AM. Meal frequency and energy balance. Br J Nutr. 1997 Apr; 77 Suppl 1:S57–70.

2. Cameron JD, Cyr MJ, Doucet E. Increased meal frequency does not promote greater weight loss in subjects who were prescribed an 8-week equi-energetic energy restricted diet. Br J Nutr. 2010 Apr; 103(8):1098–101.

*3. M R Yelich 1, D M Umporowicz, B A Drolet. **Role of somatostatin in glucose regulation during endotoxicosis in the rat/** DOI: 10.1152/ajpregu.1993.264.2.R254*

4. Lauren M Hablitz Increased glymphatic influx is correlated with high EEG delta power and low heart rate in mice under anesthesia DOI: 10.1126/sciadv.aav5447