

Modello di Regressione Lineare

ADCOM 2025-2026

Filippo Gambarota PhD 

filippo.gambarota@unipd.it

Università di Padova

Ultimo aggiornamento: 04-29-2026

Dataset

Lavoriamo sempre sul dataset Di Marco et al. (2020):


```
dat <- readxl::read_xlsx("dimarco2020.xlsx")
```

	id	age	gender	education	status	residence	period	age_cat	period_cat
1	1	53	male	high_school	2	south	31	51-60	>31
2	2	60	male	degree	2	north	27	51-60	21-30
3	3	40	female	degree	2	north	13	31-40	11-15
4	4	57	male	degree	2	north	20	51-60	16-20
5	5	60	male	high_school	2	north	20	51-60	16-20
6	6	46	male	degree	2	north	14	41-50	11-15

	attachment	needs	bonds	perc_collective_efficacy	perc_self_efficacy	family
1		3.67	3.33	3.33	3.2	3.11 3.75
2		4.00	3.33	4.00	4.2	3.95 5.00
3		4.00	2.67	3.50	3.8	3.58 4.25
4		4.00	4.00	3.50	3.6	3.74 4.25
5		3.33	3.00	3.33	3.4	3.53 4.00
6		4.00	3.33	3.33	4.0	3.62 5.00


Relazione lineare

Quando abbiamo parlato di *correlazione*, abbiamo chiarito che due variabili sono correlate se la loro relazione è di tipo *lineare*. Lineare significa che la relazione può essere descritta da una retta. **Ma come disegniamo questa retta?**




Infinite rette

In uno spazio bidimensionale come questo grafico, possiamo disegnare infinite rette:




Come scegliere la retta migliore?

Intuitivamente, l'idea è di prendere una retta che *approssima meglio* la relazione tra le due variabili. Prendiamo come metrica di bontà della retta la distanza dai punti:







Come scegliere la retta migliore?

Per quantificare in un numero questa metrica, eleviamo al quadrato (togliamo il segno) e facciamo la somma. Calcoliamo quindi la devianza o Sum of Squares (SS):



Come scegliere la retta migliore?

Questo valore di per se non ci dice molto ma riassume la somma delle distanze (al quadrato) dalla retta. Facciamolo per diverse rette.




Come scegliere la retta migliore?

Come vediamo, diverse rette producono una diversa SS. Ovviamente, più piccola è la SS e più vicini sono i punti alla retta. Questo è il nostro criterio, dobbiamo trovare la retta che *minimizza* la distanza dei punti (al quadrato).

Questo metodo, dal punto di vista algoritmico, si chiama **metodo dei minimi quadrati** perchè appunto permette di trovare quella retta che minimizza la distanza dai punti (al quadrato).


Come disegnare una retta?

Prima di tutto però è necessario capire come una retta viene definita.
Abbiamo detto che per un piano bidimensionale passano infinite rette.
Allora intanto ancoriamoci ad un punto:



Come disegnare una retta?

Ora immaginiamo che tutte le rette (ancora infinite) passino da quel punto.
Di base ci serve solo definire l'inclinazione della retta.



Come disegnare una retta?

Quindi abbiamo bisogno di soli 2 elementi per disegnare una retta. Un punto di *ancoraggio* e un valore che indichi la pendenza della retta. Questi due valori sono chiamati rispettivamente **intercetta** e **pendenza** o coefficiente angolare (*slope*).


Più formalmente, una retta è definita come:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i$$

Dove β_0 è l'intercetta e β_1 è la pendenza. Nella pratica è una funzione con due parametri che dato un input x fornisce il valore di y . Il valore di y dipenderà dai valori di β_0 e β_1 .

Intercetta

Nella pratica, l'intercetta sposta verticalmente la retta. Qui la pendenza è la stessa ma sto spostando verticalmente tutta la retta.



Disegnare la retta, migliore

Quindi come disegniamo la retta migliore? L'idea è quella di trovare un modo per *minimizzare* la distanza della retta dai punti. In questo modo siamo in grado di stimare i parametri β_0 e β_1 . In particolare, β_1 :

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x - \bar{x})^2}$$

Invece β_0 :

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$

Il metodo dei minimi quadrati dimostra che questo modo di calcolare β_0 e β_1 è quello che minimizza le distanze (errori). La dimostrazione è fuori dallo scopo del corso.

Disegnare la retta, migliore

Proviamo a fare il calcolo, con le nostre due variabili:

```
x <- dat$burnout
y <- dat$satisfaction

b1 <- sum((x - mean(x)) * (y - mean(y))) / sum((x - mean(x))^2)
b0 <- mean(y) - b1 * mean(x)
```

```
b0
```

```
[1] 4.83504
```

```
b1
```

```
[1] -0.5072002
```

Anche senza sapere bene come interpretarli, proviamo a disegnare la retta. Per disegnarla riprendiamo la formula generale della retta $y = \beta_0 + \beta_1 x$.

Disegnare la retta, migliore

Per disegnarla prendiamo una serie di valori x e su ogni x applichiamo la formula. Usiamo direttamente i valori di `burnout` (salvati in `x`)

```
head(x)
```

```
[1] 1.8 1.4 2.7 1.9 2.6 2.1
```

```
yn <- b0 + b1 * x
```


```
# questi sono i valori per disegnare la retta
```

```
head(yn)
```

```
[1] 3.922080 4.124960 3.465599 3.871360 3.516319 3.769919
```

Disegnare la retta, migliore

```
plot(x, yn)
```



Cosa sono effettivamente β_0 e β_1 ?

Li abbiamo calcolati e visualizzato la retta, ma cosa vogliono dire quei numeri?

- β_0 (intercetta) è il valore di y (outcome) quando $x = 0$. E' il punto dove la retta interseca l'asse y
- β_1 (pendenza, slope) è l'incremento di y per ogni incremento unitario di x

Mentre β_0 è molto semplice, vediamo meglio β_1 . L'idea è questa, prendiamo un intervallo di valori sulla x , tramite la retta proiettiamo quell'intervallo sulla y . La proiezione su y è il nostro β_1 .

Cosa sono effettivamente β_0 e β_1 ?


Più formalmente, prendiamo due punti a e b sulla retta x e calcoliamo la differenza, chiamiamolo Δ_x . Poi proiettiamo questa differenza su y e calcoliamo la differenza, chiamiamolo Δ_y . Il rapporto tra queste due differenze è β_1 :

$$\beta_1 = \frac{y_a - y_b}{x_a - x_b} = \frac{\Delta_y}{\Delta_x}$$

Quindi, quando $x_a - x_b = 1$ allora:

$$\begin{aligned}y &= \beta_0 + \beta_1 x \\y^* &= \beta_0 + \beta_1(x + 1) \\y^* &= \beta_0 + \beta_1 x + \beta_1 \\y^* &= y + \beta_1\end{aligned}$$

Cosa sono effettivamente β_0 e β_1 ?



Cosa sono effettivamente β_0 e β_1 ?

Quindi in termini pratici:

- β_0 (intercetta) è la stima di *satisfaction* (*outcome*) quando il *burnout* (*predittore*) è zero.
- β_1 (slope) è l'incremento di *satisfaction* per un incremento unitario di *burnout*. Essendo che β_1 è negativo, questo è un decremento.

Ci sono due punti importanti per l'interpretazione dei valori di β_0 e β_1 :

- *burnout* messo a zero potrebbe non essere sensato. Immaginate di avere l'età al posto di *burnout*. β_0 sarebbe il valore di *satisfaction* quando l'età è zero.
- L'incremento unitario di *burnout* deve essere sensato. Se siamo 1 punto in più nella scala di *burnout* è un valore sensato, allora β_1 diventa direttamente interpretabile.

Cosa stiamo effettivamente facendo?

A prescindere dall'aspetto geometrico, cosa significa tracciare una retta e quindi trovare (stimare) i parametri β_0 e β_1 . Per farlo partiamo da un caso particolare ovvero una retta con $\beta_1 = 0$.

Se riprendiamo le formule:


$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$

$$\beta_0 = \bar{y}$$

Quindi quando $\beta_1 = 0$, β_0 corrisponde alla media di y (**satisfaction** nel nostro caso).


Cosa stiamo effettivamente facendo?

Questa retta sta ignorando **burnout** ($\beta_1 = 0$). Possiamo calcolare la SS sommando i segmenti rossi (al quadrato). Chiamiamo questa SS, SSE (errore):




Cosa stiamo effettivamente facendo?

Ora se invece che fissare $\beta_1 = 0$, usiamo **burnout** e vediamo se la retta si sposta:



Cosa stiamo effettivamente facendo?

In pratica la distanza tra la retta e i punti è, in media, ridotta. Vediamo per un punto in particolare. Spostare la retta (dalla rossa alla blu) *spiega* una parte della distanza (varianza).



Cosa stiamo effettivamente facendo?

Quindi se chiamiamo SS_E la somma dei quadrati rimasta dopo aver spostato la retta possiamo chiamare SS_T (totale, riga verde) quella prima di spostare la retta. Invece chiamiamo SS_R (regressione) quella che abbiamo tolto (in gergo, *spiegato*, blu). Possiamo quindi scrivere che:

$$SS_T = SS_R + SS_E$$

Quindi i parametri β_0 e β_1 vengono stimati (tramite il metodo dei minimi quadrati) in modo da minimizzare SS_E (o anche per massimizzare SS_R).

$$R^2$$




Inoltre, se SS_T è il nostro totale, possiamo esprimere il quale percentuale SS_R spiega. Chiamiamo R^2 questa percentuale. Formalmente:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_E}{SS_T}$$

Chiaramente maggiore è la riduzione di SS_E (la retta si avvicina molto ai punti) maggiore è R^2 .


Intuizione

Un'altro modo di vedere la questione è, partendo dalla retta con $\beta_1 = 0$ (quella orizzontale). Senza un predittore x (**burnout**) la retta che minimizza SS_E è fondamentalmente la media.



Intuizione

Quando inseriamo un predittore `burnout` stiamo implicitamente dicendo che la media di y (`satisfaction`) si può spostare in funzione di `burnout`. Quindi la retta che minimizza è sempre la media ma spostata in funzione di `burnout`:



Più formalmente

Ora che abbiamo idea di cosa sta succedendo, definiamo meglio l'equazione della retta tenendo conto anche dell'errore:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$$

Dove y_i è il valore *osservato* (di *satisfaction*). La parte $\beta_0 + \beta_1 x_i$ viene anche chiamata componente sistematica perchè definisce semplicemente la retta una volta stimati β_0 e β_1 , senza errore. Il valore osservato è quindi formato dalla parte sistematica e dall'errore.

Errori

Ora, mentre la parte sistematica $\beta_0 + \beta_1 x_i$ per definizione è senza errore è importante ora capire di più riguardo a ϵ_i .

Abbiamo definito nel modulo di inferenza, che quando stimiamo dei parametri c'è sempre una quota d'errore. Inoltre questo **errore**, idealmente, dovrebbe essere di tipo **casuale** e non sistematico.

Quindi gli errori ϵ_i , attorno alla retta (parte sistematica) dovrebbero distribuirsi in modo casuale. In termini pratici i punti dovrebbero essere certe volte maggiori, altre volte minori della retta. La media degli errori quindi dovrebbe essere zero.

Errori


Più formalmente possiamo dire che:

- La media degli errori dovrebbe essere $\mu_{\epsilon} = 0$
- La dispersione degli errori σ_{ϵ} (la varianza/deviazione standard) è per definizione diversa da zero (c'è sempre una quota d'errore) ma aumenta/diminuisce in base a quanto la retta è vicina ai punti.

Quindi un buon modo di descrivere gli errori (idealmente) potrebbe essere quello di immaginare una distribuzione $\epsilon \sim \mathcal{D}(\mu = 0, \sigma_{\epsilon})$.

Errori

Una buona distribuzione potrebbe essere proprio quella **Normale**. Infatti essendo simmetrica le deviazioni dalla media sono per definizione casuali. Deviazioni positive e negative sono bilanciate attorno al centro, ovvero la media.



Errori

Quindi possiamo dire che costruiamo una retta che, tramite β_0 e β_1 minimizza le distanze dai punti. Le distanze *residue* sono distribuite in modo casuale come una distribuzione normale con $\mu = 0$ e deviazione standard σ_ϵ .

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$$

$$\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\epsilon_i})$$


Definiamo anche $\hat{y}$ (ovvero y stimato) come:

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_i$$

Ovvero il valore che la retta prevede per l'osservazione i .



Errori, graficamente

Stiamo assumendo che per ogni $\hat{y}_i$, gli errori intorno siano distribuiti come una normale con $\mu = 0$ e deviazione standard σ_ϵ .



Perche $\mu = 0$?

Se provate a sottrarre (*centrare*) da ogni dato osservato y_i il dato previsto dalla retta $\hat{y}_i$ otteniamo questo. La deviazione standard di $y - \hat{y}$ è una stima di σ_ϵ .



Riassumendo

Abbiamo *scomposto* ogni dato osservato y_i come:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$$

Se definiamo $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_i$ allora:

$$y_i = \hat{y}_i + \epsilon_i$$

Inoltre, definiamo come **residui**:

$$\epsilon_i = y_i - \hat{y}_i$$

Infine, quando $\beta_1 = 0$ abbiamo visto che:

$$y_i = \beta_0 + \epsilon_i = \bar{y} + \epsilon_i$$

Riassumendo

Inoltre abbiamo definito gli errori come casuali ($\mu = 0$) e distribuiti normalmente con deviazione standard σ_ϵ . Possiamo quindi definire queste quantità:

$$SS_T = SS_R + SS_E$$

$$SS_T = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

$$SS_R = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$SS_E = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y})^2$$

$$R^2 = 1 - \frac{SS_E}{SS_T}$$


Riassumendo

Questo che abbiamo definito è un modello lineare. Ogni modello lineare ha una parte sistematica $\beta_0 + \beta_1 x$ e una parte casuale ϵ . I parametri da stimare in questo caso sono quindi β_0 , β_1 e σ_ϵ .

Quindi, una relazione tra due variabili, si può approssimare con una retta della quale dobbiamo stimare i parametri. Inoltre, i punti possono essere più o meno dispersi attorno alla retta stimata determinando più o meno errore di stima.

Stesso β_1 , diversa σ_ϵ

Vediamo dei casi dove la pendenza/slope della retta è la stessa ma la deviazione standard dei residui cambia. Dove è più forte la relazione secondo voi?



Stesso β_1 , diversa σ_ϵ


E' chiaro che la forza della relazione, in termini di pendenza è la stessa ma è chiaramente più intensa la relazione nel primo grafico. Il problema è che la variazione di y e x cambia da un grafico all'altro. Forse possiamo *standardizzare* in qualche modo.

Partiamo standardizzando (trasformare in punti z) x , **burnout** nel nostro caso. Ora cambiamo l'unità di misura che diventa una deviazione standard.

Quindi β_1 diventa l'incremento di **satisfaction** quando **burnout** cresce di una deviazione standard.

Stesso β_1 , diversa σ_ϵ

Quindi, all'aumentare di una deviazione standard di **burnout**, **satisfaction** diminuisce di 0.29.



Stesso β_1 , diversa σ_ϵ

Vediamolo in pratica, vi ricordo la formula:

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x - \bar{x})^2}$$

```
# standardizzo il burnout e metto su x per comodità
x <- (dat$burnout - mean(dat$burnout)) / sd(dat$burnout)


# metto su y per comodità
y <- dat$satisfaction

sum((x - mean(x)) * (y - mean(y))) /
  sum((x - mean(x))^2)
```

```
[1] -0.2945735
```

Stesso β_1 , diversa σ_ϵ

Ora proviamo a *standardizzare* anche *satisfaction*. β_1 ci dirà di quante deviazioni standard aumenta *satisfaction* all'aumentare di una deviazione standard di *burnout*.



Stesso β_1 , diversa σ_ϵ

Vediamolo in R:

```
# standardizzo il burnout e metto su x per comodità
x <- (dat$burnout - mean(dat$burnout)) / sd(dat$burnout)

# metto su y per comodità
y <- (dat$satisfaction - mean(dat$satisfaction)) / sd(dat$satisfaction)

sum((x - mean(x)) * (y - mean(y))) /
  sum((x - mean(x))^2)
```

```
[1] -0.5549457
```

Calcoliamo anche la correlazione:

```
cor(x, y)
```

```
[1] -0.5549457
```

Stesso β_1 , diversa σ_ϵ

Come vedete, standardizzando le variabili β_1 equivale alla correlazione. Esiste infatti una relazione diretta:

$$\beta_1 = r_{xy} \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$$

Trovare la miglior retta che minimizza la SS equivale a calcolare il coefficiente di correlazione.

Chiaramente nei tre grafici con σ_ϵ diversa essendo fissa la parte sistematica $\beta_0 + \beta_1 x$ allora la varianza di y è maggiore. Se σ_y aumenta per mantenere lo stesso rapporto (abbiamo fissato β_1) necessariamente r_{xy} deve scendere. Per questo se calcoliamo la correlazione, questa diminuisce (a parità di β_1) all'aumentare della dispersione attorno alla retta (σ_ϵ).

Riassumendo

- Il metodo dei minimi quadrati ci permette di disegnare, stimando β_0 e β_1 la miglior retta
- I coefficienti sono rispettivamente la media di y quando $x = 0$ e l'incremento di y per incremento unitario di x
- Una volta definita la retta, abbiamo una componente sistematica $\beta_0 + \beta_1 x$ e una componente d'errore (casuale) ϵ
- Minore è la distanza dei punti dalla retta, minore è la SS_E e quindi maggiore è R^2
- La dispersione dei punti attorno alla retta stimata viene catturata dal parametro σ_ϵ

Modello statistico

Quello che abbiamo costruito passo per passo è un **modello di regressione lineare**. Ma cosa si intende per modello statistico?

Un modello statistico è un **modello matematico che descrive, in modo semplificato, la relazione tra variabili**. Quello che viene definito processo generativo dei dati (data-generating process).

Ogni modello statistico ha una parte **sistematica** e una parte d'**errore (casuale)**. L'obiettivo è quindi, tramite un campione, **stimare** la componente sistematica.

Ogni modello statistico, per definizione, fa delle **assunzioni**. Queste assunzioni sono necessarie per trarre conclusioni appropriate. Il modello statistico quindi non scopre la realtà ma cerca di capire se i dati (e di conseguenza la popolazione) possono essere approssimati tramite le assunzioni/vincoli del modello stesso.

Modello statistico

In generale, possiamo descrivere un modello statistico come:


$$y = f(\mathbf{X}) + \epsilon$$

Dove y è la variabile *outcome*, $\mathbf{X}$ sono i predittori (grassetto per indicare uno o più predittori, x_1, x_2 , etc.) ϵ è l'errore e $f(\cdot)$ è la parte sistematica del modello.

Nel nostro caso $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\epsilon)$ e $f() = \beta_0 + \beta_1 x$ è uno dei modelli possibili e queste sono *assunzioni*. Assumendo che la relazione sia lineare e che gli errori siano distribuiti normalmente, $f() = \beta_0 + \beta_1 x$ descrive i dati.


Esempio

Immaginiamo di avere dei dati di questo tipo. E' chiaro che la relazione non è *lineare*. Se stimiamo la nostra retta qui otteniamo questo:




Esempio

Proviamo a rappresentare graficamente ϵ (i residui) vs i valori stimati dal modello (retta blu del grafico precedente).




Esempio

E' chiaro che pur avendo stimato la retta che minimizza la SS_E questa non sia una buona approssimazione dei dati. Ci serve un modello più complesso:





Esempio

Questi sono i residui in questo caso. La retta non era una buona approssimazione.



Esempio

Questi due modelli differiscono per $f()$. Uno è più semplice (la retta) ma evidenti problematiche. L'altro è più complesso (β_2 e β_3) da stimare ma approssima meglio.



Messaggio finale

All models are wrong, but some are useful.
– *George Box*

Quindi, i modelli statistici sono semplificazioni matematiche della realtà tramite assunzioni e vincoli.

Il modello lineare ad esempio, assume che una retta sia una buona approssimazione della realtà. Modelli più complessi possono approssimare meglio ma richiedono anche più parametri.

I parametri vengono *stimati* (con errore) e la qualità della stima è funzione della variabilità del fenomeno e del numero di osservazioni.

Modelli complessi richiedono maggior numero di informazione (soggetti) per essere stimati in modo affidabile.

Modello lineare

Modello lineare

Ora ci focalizziamo sul modello lineare con la consapevolezza che $f()$ possa essere molte cose. Formalmente:

$$\mathbf{y}_{n \times 1} = \mathbf{X}_{n \times p} \boldsymbol{\beta}_{p \times 1} + \boldsymbol{\epsilon}_{n \times 1}$$

Il grassetto (o matrix formulation) è un modo compatto per scrivere anche modelli lunghi. Infatti possiamo avere:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1_i} + \beta_2 x_{2_i} + \epsilon_i$$

Modello lineare semplice

Quello che abbiamo usato fino ad ora $\beta_0 + \beta_1 x$ è definito **modello lineare semplice** perchè abbiamo un solo predittore x . Ovviamente i modelli possono avere anche molti predittori, in quel caso si chiamano **modelli lineari multipli**.

Terminologia

Definiamo della terminologia utile:

- con **valori osservati** y_i intendiamo la combinazione di componente sistematica $\mathbf{X}\beta$ ed errore ϵ .
- con **valori predetti** μ_i intendiamo la sola componente sistematica $\mathbf{X}\beta$ (senza errore). Sono i valori esattamente sulla retta.
- con **residui** intendiamo la componente di errore ϵ_i ovvero la differenza $y_i - \mu_i$


Predittore categoriale

Proviamo ad inserire un predittore categoriale a due livelli `sex`. L'outcome è l'`altezza` (per vedere una chiara differenza)¹:


```
boxplot(altezza ~ sex, data = adcom)
```

1. Stiamo usando i nostri dati del questionario

Predittore categoriale



Predittore categoriale



Predittore categoriale

Proviamo a farlo direttamente in R:

```
fit <- lm(altezza ~ sex, data = adcom)
summary(fit)
```

Call:

```
lm(formula = altezza ~ sex, data = adcom)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-14.3517	-4.3517	-0.8077	5.6483	13.6483

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	164.3517	0.3540	464.33	<2e-16 ***
sexMaschile	12.4559	0.9768	12.75	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.565 on 394 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.2922, Adjusted R-squared: 0.2904

F-statistic: 162.6 on 1 and 394 DF, p-value: < 2.2e-16

Predittore categoriale

Per capire quello che sta succedendo prima dobbiamo capire cosa succede a **sex** quando entra in un modello lineare.

L'idea è che nonostante la variabili categoriali siano non numeriche (superficialmente) possiamo rappresentare la stessa informazione usando $k - 1$ (dove k è il numero di modalità) variabili numeriche.

In questo caso, **sex** ha due livelli quindi $k = 2$ e ci servono $k - 1 = 1$ variabili numeriche. Di base si usano quelle che si chiamano **dummy-variables** ovvero variabili con valore 0 o 1.

Dummy variables

La funzione `lm` crea automaticamente queste variabili quando inseriamo dei predittori categoriali. Per vedere quello che succede possiamo usare la funzione `model.matrix()`:

```
model.matrix(~ sex, data = adcom)
```

	(Intercept)	sexMaschile
1	1	0
2	1	0
3	1	0
4	1	0
5	1	0
6	1	0
7	1	0
8	1	0
9	1	0
10	1	0
11	1	1
12	1	0
13	1	0

Dummy variables

Possiamo lasciare stare l'intercetta per il momento, la colonna `sexMaschile` è la versione *dummy* della variabile categoriale `sex`. Possiamo anche crearla manualmente:

```
head(adcom$sex, 15)
```

```
[1] "Femminile" "Femminile" "Femminile" "Femminile" "Femminile"  
"Femminile"  
[7] "Femminile" "Femminile" "Femminile" "Femminile" "Maschile"  
"Femminile"  
[13] "Femminile" "Femminile" "Maschile"
```

```
adcom$sex_dummy <- ifelse(adcom$sex == "Maschile", 1, 0) # o l'inverso  
head(adcom$sex_dummy, 15)
```

```
[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
```

Non è necessario farlo manualmente, ma è importante capire cosa fa il software. A prescindere da R, tendenzialmente tutti i software lavorano così.

Dummy variables

Quindi quando inseriamo una variabile categoriale con k livelli, vengono create $k - 1$ variabili *dummy*. Sono variabili numeriche a tutti gli effetti, quindi i coefficienti si interpretano come tali. Riprendiamo (concentriamoci sui parametri):

```
summary(fit)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	164.3517	0.3540	464.33	<2e-16	***
sexMaschile	12.4559	0.9768	12.75	<2e-16	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Dummy variables

- **(Intercept)** è il valore di y (**altezza**) quando $x = 0$ (**sex**). **sex** = 0 per la variabile *dummy* è il sesso femminile. Quindi è l'altezza media delle femmine.
- **sexMaschile** (β_1) è l'incremento di **altezza** per incremento unitario in **sex**.

Essendo che sono variabili dummy, dire *aumento unitario* equivale a dire mi sposto da una categoria all'altra. Quindi β_1 è la **differenza di altezza tra maschi e femmine**.

T-test

In altri termini, abbiamo fatto sostanzialmente un t-test. Infatti possiamo confrontare i risultati. Notate i valori della statistica t e p value:

```
t.test(altezza ~ sex, var.equal = TRUE, data = adcom)
```

Two Sample t-test

```
data: altezza by sex
t = -12.752, df = 394, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means between group Femminile and group Maschile is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -14.37629 -10.53561
sample estimates:
mean in group Femminile  mean in group Maschile
          164.3517          176.8077
```

```
summary(fit)
```

```
Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 164.3517     0.3540   464.33  <2e-16 ***
sexMaschile  12.4559     0.9768   12.75  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Scriviamo l'equazione


Con i modelli lineari, scrivere l'equazione (componente sistematica) è molto importante e fa capire molte cose.

$$\widehat{\text{altezza}} = \beta_0 + \beta_1 \text{sex} \quad \text{sex} = \{0, 1\}$$

$$\widehat{\text{altezza}} = \beta_0 + \beta_1 \times 1 \quad \text{sex} = 1$$

$$\begin{aligned} \widehat{\text{altezza}} &= \beta_0 + \beta_1 \times 0 \quad \text{sex} = 0 \\ &= \beta_0 \end{aligned}$$

Graficamente



Inferenza

Da dove vengono quelle statistiche test t e p value? Vengono calcolati esattamente come già sappiamo. Dobbiamo definire H_0 e H_1 anche nel caso di modelli di regressione lineare dove:

$$H_0 : \beta_j = 0$$

$$H_1 : \beta_j \neq 0$$

Dove β_j è uno dei possibili coefficienti di regressione che siamo interessati a valutare. Ovviamente possiamo anche fare dei test monodirezionali.

Inferenza

Ogni coefficiente di regressione ha la sua stima campionaria $\hat{\beta}_j$ e quindi ha anche il suo errore standard $\text{SE}_{\hat{\beta}_j}$ che indica quanto è precisa la stima del coefficiente di regressione. Quindi possiamo definire una statistica test standardizzata come:

$$t = \frac{\hat{\beta}_j}{\text{SE}_{\hat{\beta}_j}}$$

Questa statistica test sotto H_0 si distribuisce come una t di Student con $\nu = n - p$ gradi di libertà dove p è il numero totale di coefficienti stimati dal modello. Nel caso dell'altezza, $p = 2$ (β_0 e β_1) quindi $\nu = n - p = 396 - 2 = 394$.

R^2 aggiustato

Nella tabella di regressione vedete anche il valore di R^2 aggiustato.

$$R^2_{\text{adj}} = 1 - \frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - p}$$

Dove n è la numerosità campionaria e p il numero di coefficienti stimati. Sostanzialmente questa formula riduce il valore di R^2 in funzione del numero dei parametri stimati. A parità di R^2 (non aggiustato), quello aggiustato sarà minore se sono serviti più parametri per arrivare alla stessa varianza spiegata.

Assunzioni

Il modello lineare funziona correttamente nel momento in cui alcune assunzioni sono rispettate:

- **Linearità.** Si assume che la relazione tra x e y sia lineare, sia nella regressione semplice sia in quella multipla.
- **Indipendenza.** I residui devono essere indipendenti tra loro. In sostanza, non devono esserci strutture sistematiche o fattori non misurati che li rendano dipendenti.
- **Normalità.** Si assume che i residui siano distribuiti normalmente. Non è necessario che x e y siano normali, purché lo siano i residui.
- **Omoschedasticità.** La varianza dei residui deve essere costante. In pratica, la dispersione dei residui deve rimanere simile per tutti i valori predetti μ e, idealmente, per tutti i valori dei predittori x .

Linearità

Questa assunzione riguarda la **componente sistematica** del modello. In regressione lineare, “lineare” significa **lineare nei parametri**.

Ad esempio, questi sono modelli lineari:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$$

è un modello lineare. Pur non rappresentando una retta, resta lineare perché i coefficienti β_0 , β_1 e β_2 compaiono linearmente.

$$y = \beta_0 + x^{\beta_1}$$

non è un modello lineare, perché il parametro β_1 compare come esponente e quindi non entra in forma lineare.

Indipendenza

Questa assunzione è *by-design* nel senso che dipende dal tipo di dato. In termini pratici significa che le righe del nostro dataset devono essere indipendenti. Indipendenza in questo caso significa, sostanzialmente, che ogni riga appartiene ad un soggetto diverso. Ad esempio:

- 100 soggetti dove misuro p variabili (questionari, socio-anagrafiche, etc.) - > dataset con righe indipendenti
- 100 soggetti misurati prima/dopo un trattamento. Il valore pre e post sono correlati (dipendenti) perchè sono appartenenti allo stesso soggetto

In questo secondo caso è necessario usare dei modelli che tengano conto della dipendenza, come quelli multilivello. In tutti gli altri casi, il modello lineare che stiamo usando è adeguato.

Normalità dei residui

La normalità dei residui, come dice il nome significa che i residui (e non la variabile dipendente) devono essere distribuiti normalmente. In linea teorica, i residui devono avere media $\mu = 0$ e $\sigma = \sigma_\epsilon$ (quella stimata dal modello). Nella pratica devono avere una forma normale e non contenere pattern e/o deviazioni dalla media $\mu = 0$.

Questa assunzione si vede principalmente a livello grafico e guardando statistiche descrittive dei residui. Alcuni propongono di usare dei test per valutare la normalità (tipo Shapiro-Wilk). Tuttavia il metodo migliore è quello grafico.

Normalità dei residui

La cosa più semplice da fare è rappresentare graficamente i residui con un istogramma e/o un QQ-plot.

Riprendiamo un modello lineare semplice:

Call:

```
lm(formula = satisfaction ~ burnout, data = dat)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.16992	-0.22280	0.02072	0.27720	1.03872

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	4.83504	0.15688	30.821	< 2e-16	***
burnout	-0.50720	0.07842	-6.468	4.43e-09	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.4439 on 94 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.308, Adjusted R-squared: 0.3006

F-statistic: 41.83 on 1 and 94 DF, p-value: 4.43e-09


Normalità dei residui

Come vedete su R c'è una sezione specifica riguardo i residui che vi fornisce alcune statistiche descrittive in particolare minimo, primo quartile, mediana, terzo quartile e massimo. Già qui possiamo farci un'idea del pattern:

- i residui devono essere simmetrici attorno a zero, vediamo che la mediana è molto vicina a zero
- se i residui sono normali, 1 e 3 quartile dovrebbero essere lo stesso valore (o molto simile) semplicemente con segno diverso
- lo stesso vale anche per massimo e minimo ma questi sono estremamente sensibili a valori anomali


Normalità dei residui

Vediamo con un'istogramma. Le linee rosse sono i quantili che sono riportati nel summary del modello:



Normalità dei residui

Un modo però ancora più efficace è quello del QQ plot perchè ci fa vedere direttamente delle deviazioni dalla normalità:



Normalità dei residui

In questo caso sulle code abbiamo della deviazione dalla normalità ma in generale possiamo dire che il modello è abbastanza adeguato. Deviazioni importanti dalla normalità sicuramente devono essere evidenziate.

Solitamente la principale motivazione di non normalità dei residui è legata al fatto che il modello lineare non è il modello adeguato per quella tipologia di dato. In particolare, la variabile outcome può avere bisogno di un'altro modello.

Omoschedasticità dei residui


Oltre alla normalità, il modello lineare richiede che la varianza dei residui σ_ϵ sia costante per ogni valore di μ . In termini pratici, la dispersione attorno alla retta di regressione stimata deve essere costante.

Ovviamente questo è legato al fatto che stimando un solo parametro di varianza dei residui, questo per essere informativo non deve variare in funzione di x , altrimenti σ_ϵ diventa meno informativo.

Anche questo criterio è facilmente verificabile a livello grafico e quindi consiglio di evitare i test statistici per questo tipo di cose.

Omoschedasticità dei residui

L'Omoschedasticità dei residui si intende condizionata rispetto al valore stimato dal modello. In altri termini, per ogni valore stimato ci si aspetta che la varianza dei residui (attorno al valore stimato) sia normale (assunzione precedente) con varianza costante.



Omoschedasticità dei residui


In questo grafico le cose da osservare sono:

- se la linea rossa (una sorta di stima non lineare della relazione) è orizzontale. In questo caso significa che non c'è un pattern nella relazione. Il caso ideale è la linea rossa il più simile possibile a quella tratteggiata orizzontale.
- se la dispersione dei punti attorno alla linea rossa (idealmente quella tratteggiata) è costante. Ovvero non ci sono incrementi o decrementi di variabilità.

Nel grafico precedente la dispersione sembra abbastanza costante a parte agli estremi dove aumenta a sinistra e si riduce a destra. Attenzione che con poche osservazioni è difficile vedere chiaramente eventuali problemi.

Un caso ideale (positivo e negativo)

Vi mostro dei dati simulati per vedere dei casi prototipici di deviazioni rispetto a questi assunti. Questi sono dei dati simulati seguendo esattamente gli assunti. Relazione lineare tra x e y .



Un caso ideale (positivo e negativo)

Fittiamo il modello lineare e vediamo i residui:

Call:

```
lm(formula = y ~ x, data = dat)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-35.485	-6.685	0.095	6.589	37.085

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	29.766543	0.200295	148.6	<2e-16	***
x	0.304761	0.003443	88.5	<2e-16	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1



Residual standard error: 9.958 on 9998 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.4393, Adjusted R-squared: 0.4392

F-statistic: 7833 on 1 and 9998 DF, p-value: < 2.2e-16


Un caso ideale (positivo e negativo)

A prescindere da coefficienti ed interpretazione, possiamo vedere che i residui sono chiaramente normali guardando solo i quantili riportati. Vediamo comunque un grafico:




Un caso ideale (positivo e negativo)

Vediamo adesso i valori predetti vs i residui per vedere pattern nella relazione e la dispersione attorno ai valori predetti:



Un caso ideale (positivo e negativo)

Vediamo adesso un caso dove gli assunti sono chiaramente violati:



Un caso ideale (positivo e negativo)

Anche qui facciamo il modello lineare:

Call:

```
lm(formula = y ~ x, data = dat)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-51.305	-9.219	-0.065	8.825	74.407

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	13.297876	0.281222	47.29	<2e-16	***
x	1.300242	0.004866	267.22	<2e-16	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1



Residual standard error: 14.01 on 9998 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8772, Adjusted R-squared: 0.8772

F-statistic: 7.141e+04 on 1 and 9998 DF, p-value: < 2.2e-16


Un caso ideale (positivo e negativo)

A parte la forma chiaramente non lineare e la dispersione non costante, i quantili dei residui non sono estremamente problematici, vediamo il grafico. E' presente un'asimmetria positiva essendoci dei valori estremi grandi che non sono bilanciati attorno allo zero.



Un caso ideale (positivo e negativo)

Vediamo ora i valori predetti rispetto ai residui:



Un caso ideale (positivo e negativo)

Nel grafico vediamo chiaramente:

- un pattern che rimane (linea rossa non orizzontale) quindi il valore atteso (media) dei residui calcolata per ogni valore predetto dal modello non è sempre zero
- la dispersione dei punti attorno ai valori predetti dal modello non è costante ed anzi ha un pattern crescente in questo caso

Qualche precisazione

Un'aspetto fondamentale rispetto alla verifica delle assunzioni, in particolare normalità e omoschedasticità riguarda il fatto che le assunzioni devono essere verificate sui residui e non sull'outcome y “grezzo”.

In altri termini, la variabile y potrebbe sembrare non-normale ma una volta ripulita dalla componente sistematica, quindi calcolando i residui, questi risultano normali e con varianza costante.

Regressione Multipla