



Tutorial / Lösungshinweise (RStudio)

Dennis Klinkhammer (2022)

Aufgabe: WOMEN & CARS

Analysemodelle





Univariate Analysen

```
summary(women)
```

```
##      height      weight
## Min.   :58.0   Min.    :115.0
## 1st Qu.:61.5   1st Qu.:124.5
## Median :65.0   Median  :135.0
## Mean   :65.0   Mean    :136.7
## 3rd Qu.:68.5   3rd Qu.:148.0
## Max.   :72.0   Max.    :164.0
```

```
summary(cars)
```

```
##      speed      dist
## Min.   : 4.0   Min.    : 2.00
## 1st Qu.:12.0   1st Qu.: 26.00
## Median :15.0   Median  : 36.00
## Mean   :15.4   Mean    : 42.98
## 3rd Qu.:19.0   3rd Qu.: 56.00
## Max.   :25.0   Max.    :120.00
```

Bivariate Analysen

```
cor(women)
```

```
##      height  weight
## height 1.0000000 0.9954948
## weight 0.9954948 1.0000000
```

```
cor(cars)
```

```
##      speed  dist
## speed 1.0000000 0.8068949
## dist  0.8068949 1.0000000
```

Multivariate Analysen

```
summary(lm(weight~height, data=women))
```

```
##
## Call:
## lm(formula = weight ~ height, data = women)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.7333 -1.1333 -0.3833  0.7417  3.1167
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -87.51667     5.93694  -14.74 1.71e-09 ***
## height       3.45000     0.09114   37.85 1.09e-14 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.525 on 13 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.991, Adjusted R-squared:  0.9903
## F-statistic: 1433 on 1 and 13 DF, p-value: 1.091e-14
```

```
summary(lm(dist~speed, data=cars)) # korrektes Modell
```

```
##
## Call:
## lm(formula = dist ~ speed, data = cars)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -29.069  -9.525  -2.272   9.215  43.201
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -17.5791     6.7584  -2.601   0.0123 *
## speed        3.9324     0.4155   9.464 1.49e-12 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 15.38 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6511, Adjusted R-squared:  0.6438
## F-statistic: 89.57 on 1 and 48 DF,  p-value: 1.49e-12
```

Abhängige und unabhängige Variable vertauschen

```
summary(lm(speed~dist, data=cars)) # nicht korrektes Modell
```

```
##
## Call:
## lm(formula = speed ~ dist, data = cars)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -7.5293 -2.1550  0.3615  2.4377  6.4179
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  8.28391     0.87438   9.474 1.44e-12 ***
## dist         0.16557     0.01749   9.464 1.49e-12 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.156 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6511, Adjusted R-squared:  0.6438
## F-statistic: 89.57 on 1 and 48 DF,  p-value: 1.49e-12
```