

# Fundamentos e Formulação da Análise Multivariada

Departamento de Estatística e Matemática Aplicada/CC/UFC

Laboratório de Inovação em Estatística - StatLab

**Grupo de pesquisa de Inovação em Estatística e Ciência de Dados**

Versão Preliminar  
- Em Elaboração -



# Índice

|                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Informações Legais e Declaração de Uso de Inteligência Artificial</b>                            | <b>11</b>     |
| Direitos Autorais e Uso da Obra . . . . .                                                           | 11            |
| Declaração sobre o Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial . . . . .                          | 11            |
| <b>Prefácio</b>                                                                                     | <b>12</b>     |
| <b>Identificação da Disciplina</b>                                                                  | <b>13</b>     |
| EMENTA . . . . .                                                                                    | 13            |
| OBJETIVO GERAL . . . . .                                                                            | 13            |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS . . . . .                                                                     | 13            |
| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO . . . . .                                                                     | 14            |
| Módulo I – Fundamentos Matemáticos e Geométricos da Análise Multivariada                            | 14            |
| Módulo II – Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada                      | 14            |
| Módulo III – Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas                         | 14            |
| METODOLOGIA . . . . .                                                                               | 15            |
| AVALIAÇÃO . . . . .                                                                                 | 15            |
| CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO . . . . .                                                                    | 15            |
| BIBLIOGRAFIA BÁSICA . . . . .                                                                       | 16            |
| BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR . . . . .                                                                 | 16            |
| <br><b>I   Módulo I — Fundamentos Matemáticos e Geométricos da Análise Multi-<br/>      variada</b> | <br><b>17</b> |
| <b>1   Vetores e representação dos dados multivariados</b>                                          | <b>18</b>     |
| 1.1   Escalares, vetores e matrizes . . . . .                                                       | 19            |
| 1.1.1   Vetor-coluna, vetor-linha e transposição . . . . .                                          | 22            |
| 1.2   O espaço $\mathbb{R}^p$ . . . . .                                                             | 23            |
| 1.3   Representação matricial de um conjunto de dados . . . . .                                     | 26            |
| 1.3.1   Espaço das observações e espaço das variáveis . . . . .                                     | 28            |
| 1.4   Operações elementares com vetores . . . . .                                                   | 29            |
| 1.4.1   Soma e subtração . . . . .                                                                  | 29            |
| 1.4.2   Multiplicação por escalar . . . . .                                                         | 30            |
| 1.4.3   Combinações lineares . . . . .                                                              | 32            |
| 1.5   Produto interno, norma, ângulo e distância euclidiana . . . . .                               | 34            |
| 1.5.1   Produto interno euclidiano . . . . .                                                        | 34            |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.2    | Norma euclidiana . . . . .                                              | 35        |
| 1.5.3    | Desigualdade de Cauchy–Schwarz . . . . .                                | 36        |
| 1.5.4    | Ângulo entre vetores . . . . .                                          | 39        |
| 1.5.5    | Distância euclidiana . . . . .                                          | 41        |
| 1.5.6    | Desigualdade triangular . . . . .                                       | 43        |
| 1.5.7    | Produto externo . . . . .                                               | 44        |
| 1.6      | Síntese do capítulo . . . . .                                           | 46        |
| <b>2</b> | <b>Álgebra matricial aplicada</b>                                       | <b>48</b> |
| 2.1      | Operações matriciais fundamentais . . . . .                             | 49        |
| 2.1.1    | Soma e subtração de matrizes . . . . .                                  | 49        |
| 2.1.2    | Produto matriz-vetor . . . . .                                          | 52        |
| 2.1.3    | Produto entre matrizes . . . . .                                        | 55        |
| 2.1.4    | Propriedades do produto matricial . . . . .                             | 60        |
| 2.2      | Transposição, simetria e traço . . . . .                                | 61        |
| 2.2.1    | Transposição . . . . .                                                  | 61        |
| 2.2.2    | Matrizes simétricas . . . . .                                           | 63        |
| 2.2.3    | Traço . . . . .                                                         | 67        |
| 2.3      | Identidade, inversa, determinante, posto e sistemas lineares . . . . .  | 71        |
| 2.3.1    | Matriz identidade . . . . .                                             | 71        |
| 2.3.2    | Matriz inversa . . . . .                                                | 72        |
| 2.3.3    | Determinante . . . . .                                                  | 75        |
| 2.3.4    | Interpretação geométrica do determinante . . . . .                      | 79        |
| 2.3.5    | Posto . . . . .                                                         | 80        |
| 2.3.6    | Sistemas lineares . . . . .                                             | 83        |
| 2.3.7    | Aprofundamento: pseudoinversa . . . . .                                 | 87        |
| 2.4      | Matrizes ortogonais, diagonais e triangulares . . . . .                 | 88        |
| 2.4.1    | Matrizes ortogonais . . . . .                                           | 89        |
| 2.4.2    | Matrizes diagonais . . . . .                                            | 91        |
| 2.4.3    | Matrizes triangulares . . . . .                                         | 94        |
| 2.4.4    | Aprofundamento: sistemas triangulares . . . . .                         | 95        |
| 2.5      | Formas bilineares, formas quadráticas e positividade . . . . .          | 97        |
| 2.5.1    | Formas bilineares . . . . .                                             | 97        |
| 2.5.2    | Formas quadráticas . . . . .                                            | 98        |
| 2.5.3    | Positividade . . . . .                                                  | 101       |
| 2.5.4    | Superfícies de nível . . . . .                                          | 103       |
| 2.6      | Aprofundamento: matrizes particionadas e complemento de Schur . . . . . | 104       |
| 2.6.1    | Matrizes particionadas . . . . .                                        | 105       |
| 2.6.2    | Soma e multiplicação por escalar . . . . .                              | 106       |
| 2.6.3    | Transposição por blocos . . . . .                                       | 107       |
| 2.6.4    | Multiplicação por blocos . . . . .                                      | 107       |
| 2.6.5    | Complemento de Schur . . . . .                                          | 109       |
| 2.6.6    | Eliminação por blocos . . . . .                                         | 110       |

|          |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.6.7    | Determinante de uma matriz particionada . . . . .                   | 112        |
| 2.6.8    | Inversão em blocos . . . . .                                        | 113        |
| 2.6.9    | Positividade e complemento de Schur . . . . .                       | 114        |
| 2.7      | Síntese do capítulo . . . . .                                       | 117        |
| <b>3</b> | <b>Espaços vetoriais, bases e projeções</b>                         | <b>120</b> |
| 3.1      | Espaços, subespaços e geração . . . . .                             | 121        |
| 3.1.1    | Subespaços vetoriais . . . . .                                      | 123        |
| 3.1.2    | Subespaço gerado . . . . .                                          | 125        |
| 3.2      | Independência linear, bases e dimensão . . . . .                    | 126        |
| 3.2.1    | Independência linear . . . . .                                      | 126        |
| 3.2.2    | Independência linear e sistemas homogêneos . . . . .                | 128        |
| 3.2.3    | Bases . . . . .                                                     | 131        |
| 3.2.4    | Coordenadas em uma base . . . . .                                   | 132        |
| 3.2.5    | Base canônica . . . . .                                             | 134        |
| 3.2.6    | Bases ortogonais e ortonormais . . . . .                            | 135        |
| 3.2.7    | Dimensão . . . . .                                                  | 138        |
| 3.3      | Espaços fundamentais de uma matriz . . . . .                        | 140        |
| 3.3.1    | Espaço nulo . . . . .                                               | 140        |
| 3.3.2    | Espaço coluna . . . . .                                             | 143        |
| 3.3.3    | Espaço linha . . . . .                                              | 146        |
| 3.3.4    | Espaço nulo à esquerda . . . . .                                    | 147        |
| 3.3.5    | Extensão de uma base . . . . .                                      | 149        |
| 3.3.6    | Teorema Posto–Nulidade . . . . .                                    | 150        |
| 3.3.7    | Os quatro espaços fundamentais . . . . .                            | 154        |
| 3.3.8    | Complemento ortogonal . . . . .                                     | 154        |
| 3.3.9    | Relações de ortogonalidade . . . . .                                | 155        |
| 3.4      | Produtos internos, bases ortonormais e matrizes de Gram . . . . .   | 157        |
| 3.4.1    | Aprofundamento: produtos internos e geometrias induzidas . . . . .  | 157        |
| 3.4.2    | Matrizes de Gram . . . . .                                          | 162        |
| 3.4.3    | Propriedades da matriz de Gram . . . . .                            | 164        |
| 3.4.4    | Matrizes de Gram e bases ortonormais . . . . .                      | 166        |
| 3.4.5    | Produtos cruzados em uma matriz de dados . . . . .                  | 167        |
| 3.4.6    | Propriedades do complemento ortogonal . . . . .                     | 168        |
| 3.4.7    | Dimensão do complemento ortogonal . . . . .                         | 170        |
| 3.4.8    | Decomposição ortogonal . . . . .                                    | 173        |
| 3.4.9    | Decomposição dos espaços fundamentais . . . . .                     | 175        |
| 3.5      | Projeções ortogonais . . . . .                                      | 176        |
| 3.5.1    | Projeção sobre uma direção . . . . .                                | 177        |
| 3.5.2    | Projeção sobre um subespaço com base ortonormal . . . . .           | 182        |
| 3.5.3    | Projeção sobre o espaço coluna de uma matriz . . . . .              | 185        |
| 3.5.4    | Propriedades da matriz de projeção . . . . .                        | 189        |
| 3.5.5    | Aprofundamento: projeção residual e complemento ortogonal . . . . . | 193        |

|          |                                                              |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 3.5.6    | Projeção como melhor aproximação . . . . .                   | 198        |
| 3.5.7    | Aprofundamento: projeções e mínimos quadrados . . . . .      | 201        |
| 3.6      | Síntese do capítulo . . . . .                                | 205        |
| <b>4</b> | <b>Transformações lineares</b>                               | <b>208</b> |
| 4.1      | Transformações lineares e representação matricial . . . . .  | 209        |
| 4.1.1    | Transformação determinada por uma base . . . . .             | 211        |
| 4.1.2    | Representação matricial nas bases canônicas . . . . .        | 213        |
| 4.1.3    | Núcleo e imagem de uma transformação linear . . . . .        | 215        |
| 4.1.4    | Imagem de um subespaço . . . . .                             | 216        |
| 4.2      | Transformação de vetores e matrizes de dados . . . . .       | 217        |
| 4.2.1    | Novas variáveis como combinações lineares . . . . .          | 219        |
| 4.2.2    | Dimensão da configuração transformada . . . . .              | 221        |
| 4.2.3    | Efeito sobre diferenças e produtos internos . . . . .        | 224        |
| 4.2.4    | Transformação das matrizes de produtos internos . . . . .    | 226        |
| 4.3      | Composição, invertibilidade e perda de informação . . . . .  | 227        |
| 4.3.1    | Composição de transformações lineares . . . . .              | 227        |
| 4.3.2    | A ordem das transformações . . . . .                         | 229        |
| 4.3.3    | Transformação inversa . . . . .                              | 230        |
| 4.3.4    | Injetividade, sobrejetividade e bijetividade . . . . .       | 232        |
| 4.3.5    | Perda de informação . . . . .                                | 236        |
| 4.3.6    | Redução de dimensionalidade . . . . .                        | 237        |
| 4.3.7    | Transformações singulares . . . . .                          | 238        |
| 4.4      | Transformações geométricas . . . . .                         | 239        |
| 4.4.1    | Rotação . . . . .                                            | 240        |
| 4.4.2    | Reflexão . . . . .                                           | 241        |
| 4.4.3    | Escalonamento . . . . .                                      | 243        |
| 4.4.4    | Cisalhamento . . . . .                                       | 244        |
| 4.4.5    | Projeção . . . . .                                           | 246        |
| 4.4.6    | Comparação geométrica . . . . .                              | 247        |
| 4.4.7    | Determinante, volume e orientação . . . . .                  | 248        |
| 4.5      | Transformações ortogonais . . . . .                          | 249        |
| 4.5.1    | Transformação de uma matriz de dados . . . . .               | 252        |
| 4.5.2    | Determinante e orientação . . . . .                          | 253        |
| 4.5.3    | Matrizes ortogonais e bases ortonormais . . . . .            | 254        |
| 4.5.4    | Comparação com transformações não ortogonais . . . . .       | 255        |
| 4.6      | Mudanças de coordenadas e representação em bases . . . . .   | 256        |
| 4.6.1    | Conversão entre duas bases . . . . .                         | 258        |
| 4.6.2    | Representação de uma transformação em bases gerais . . . . . | 259        |
| 4.6.3    | Representação de um operador em uma nova base . . . . .      | 262        |
| 4.6.4    | Transformação ativa e mudança passiva . . . . .              | 264        |
| 4.6.5    | Mudança de coordenadas de uma matriz de dados . . . . .      | 266        |

|          |                                                                    |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.7      | Transformações afins e pré-processamento . . . . .                 | 267        |
| 4.7.1    | Translação . . . . .                                               | 268        |
| 4.7.2    | Transformação afim de uma matriz de dados . . . . .                | 269        |
| 4.7.3    | Centralização . . . . .                                            | 270        |
| 4.7.4    | Escalonamento das variáveis . . . . .                              | 273        |
| 4.7.5    | Padronização . . . . .                                             | 274        |
| 4.7.6    | Ordem entre centralização e escalonamento . . . . .                | 275        |
| 4.7.7    | Composição e inversão de transformações afins . . . . .            | 276        |
| 4.7.8    | Comparação das operações de pré-processamento . . . . .            | 278        |
| 4.8      | Síntese do capítulo . . . . .                                      | 278        |
| <b>5</b> | <b>Autovalores, autovetores e decomposição espectral</b>           | <b>286</b> |
| 5.1      | Direções invariantes, autovalores e autoespaços . . . . .          | 287        |
| 5.2      | Equação característica, multiplicidades e diagonalização . . . . . | 294        |
| 5.2.1    | Determinação dos autovalores e autoespaços . . . . .               | 296        |
| 5.2.2    | Autovalores complexos de matrizes reais . . . . .                  | 298        |
| 5.2.3    | Independência entre autovetores . . . . .                          | 299        |
| 5.2.4    | Multiplicidades algébrica e geométrica . . . . .                   | 301        |
| 5.2.5    | Diagonalização . . . . .                                           | 304        |
| 5.2.6    | Potências de uma matriz diagonalizável . . . . .                   | 307        |
| 5.3      | Matrizes simétricas e decomposição espectral . . . . .             | 308        |
| 5.3.1    | Decomposição espectral do exemplo condutor . . . . .               | 314        |
| 5.3.2    | Forma aditiva da decomposição espectral . . . . .                  | 316        |
| 5.3.3    | Projetores sobre autoespaços . . . . .                             | 317        |
| 5.3.4    | Não unicidade da matriz de autovetores . . . . .                   | 319        |
| 5.4      | Consequências da decomposição espectral . . . . .                  | 320        |
| 5.4.1    | Traço, determinante, posto e invertibilidade . . . . .             | 320        |
| 5.4.2    | Formas quadráticas em coordenadas espectrais . . . . .             | 324        |
| 5.4.3    | Superfícies de nível em coordenadas espectrais . . . . .           | 327        |
| 5.5      | Quociente de Rayleigh e otimização espectral . . . . .             | 330        |
| 5.5.1    | Representação espectral . . . . .                                  | 331        |
| 5.5.2    | Exemplo bidimensional . . . . .                                    | 334        |
| 5.5.3    | Formulação com restrição de norma . . . . .                        | 336        |
| 5.5.4    | Multiplicadores de Lagrange . . . . .                              | 338        |
| 5.5.5    | Direções sucessivas . . . . .                                      | 340        |
| 5.6      | Funções espectrais de matrizes . . . . .                           | 342        |
| 5.6.1    | Ação sobre os autoespaços . . . . .                                | 343        |
| 5.6.2    | Potências inteiras . . . . .                                       | 344        |
| 5.6.3    | Inversa espectral . . . . .                                        | 345        |
| 5.6.4    | Raiz quadrada principal . . . . .                                  | 346        |
| 5.6.5    | Raiz quadrada inversa . . . . .                                    | 347        |
| 5.6.6    | Pseudoinversa espectral . . . . .                                  | 349        |
| 5.6.7    | Exponencial e logaritmo matriciais . . . . .                       | 351        |

|          |                                                                         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.7      | Autovalores generalizados . . . . .                                     | 352        |
| 5.7.1    | Quociente de Rayleigh generalizado . . . . .                            | 354        |
| 5.7.2    | Redução a um problema espectral ordinário . . . . .                     | 356        |
| 5.7.3    | Ortogonalidade na métrica de $\mathbf{M}$ . . . . .                     | 359        |
| 5.7.4    | Diagonalização simultânea por congruência . . . . .                     | 361        |
| 5.7.5    | Exemplo numérico . . . . .                                              | 363        |
| 5.8      | Síntese do capítulo . . . . .                                           | 367        |
| <b>6</b> | <b>Decomposição em Valores Singulares</b>                               | <b>373</b> |
| 6.1      | Definição e formas da Decomposição em Valores Singulares . . . . .      | 374        |
| 6.1.1    | Vetores singulares . . . . .                                            | 377        |
| 6.1.2    | Interpretação como composição de transformações . . . . .               | 379        |
| 6.1.3    | SVD completa . . . . .                                                  | 380        |
| 6.1.4    | SVD compacta . . . . .                                                  | 381        |
| 6.1.5    | SVD compacta e SVD truncada . . . . .                                   | 382        |
| 6.1.6    | Não unicidade dos vetores singulares . . . . .                          | 383        |
| 6.2      | Construção da SVD e relação com a decomposição espectral . . . . .      | 385        |
| 6.2.1    | Simetria e semidefinição positiva . . . . .                             | 386        |
| 6.2.2    | Construção dos vetores singulares . . . . .                             | 391        |
| 6.2.3    | Demonstração da existência da SVD completa . . . . .                    | 395        |
| 6.2.4    | Decomposições espectrais associadas . . . . .                           | 397        |
| 6.2.5    | Exemplo de construção da SVD . . . . .                                  | 399        |
| 6.2.6    | Relação com a decomposição espectral de matrizes simétricas . . . . .   | 402        |
| 6.3      | Interpretação geométrica da SVD . . . . .                               | 404        |
| 6.3.1    | Imagem da bola unitária . . . . .                                       | 405        |
| 6.3.2    | Alteração dos comprimentos . . . . .                                    | 409        |
| 6.3.3    | Exemplo geométrico no plano . . . . .                                   | 411        |
| 6.3.4    | Transformações com núcleo não trivial . . . . .                         | 412        |
| 6.4      | Espaços fundamentais, posto, normas e condicionamento . . . . .         | 413        |
| 6.4.1    | Espaço coluna e espaço linha . . . . .                                  | 415        |
| 6.4.2    | Projetores ortogonais . . . . .                                         | 419        |
| 6.4.3    | Posto e nulidades . . . . .                                             | 422        |
| 6.4.4    | Produto interno de Frobenius . . . . .                                  | 423        |
| 6.4.5    | Normas e valores singulares . . . . .                                   | 424        |
| 6.4.6    | Invariância ortogonal . . . . .                                         | 427        |
| 6.4.7    | Determinante e invertibilidade . . . . .                                | 428        |
| 6.4.8    | Menor valor singular . . . . .                                          | 429        |
| 6.4.9    | Número de condição . . . . .                                            | 429        |
| 6.4.10   | Posto exato e posto numérico . . . . .                                  | 434        |
| 6.5      | SVD de uma matriz de dados . . . . .                                    | 435        |
| 6.5.1    | Coordenadas das observações nas direções singulares à direita . . . . . | 436        |
| 6.5.2    | Coordenadas das variáveis nas direções singulares à esquerda . . . . .  | 438        |
| 6.5.3    | Matrizes de Gram . . . . .                                              | 439        |

|          |                                                                                      |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.5.4    | Reconstrução das observações . . . . .                                               | 441        |
| 6.5.5    | Preservação de produtos internos . . . . .                                           | 442        |
| 6.5.6    | Centralização da matriz de dados . . . . .                                           | 443        |
| 6.5.7    | Antecipação: relação com a matriz de covariâncias amostral . . . . .                 | 444        |
| 6.5.8    | Magnitude quadrática da matriz centralizada . . . . .                                | 445        |
| 6.5.9    | Representação exata e aproximação . . . . .                                          | 448        |
| 6.6      | Forma expandida e aproximações de posto reduzido . . . . .                           | 449        |
| 6.6.1    | Parcelas de posto 1 . . . . .                                                        | 450        |
| 6.6.2    | Ortogonalidade das parcelas . . . . .                                                | 450        |
| 6.6.3    | SVD truncada . . . . .                                                               | 452        |
| 6.6.4    | Ortogonalidade entre aproximação e diferença . . . . .                               | 453        |
| 6.6.5    | Erro na norma espectral . . . . .                                                    | 455        |
| 6.6.6    | Teorema de Eckart–Young–Mirsky . . . . .                                             | 456        |
| 6.6.7    | Unicidade da aproximação . . . . .                                                   | 462        |
| 6.6.8    | Exemplo de aproximação de posto 1 . . . . .                                          | 463        |
| 6.6.9    | Aproximação de uma matriz de dados . . . . .                                         | 465        |
| 6.7      | Pseudoinversa e soluções de mínimos quadrados . . . . .                              | 467        |
| 6.7.1    | Relação com a pseudoinversa espectral . . . . .                                      | 469        |
| 6.7.2    | Condições de Moore–Penrose . . . . .                                                 | 470        |
| 6.7.3    | Pseudoinversa e projetores . . . . .                                                 | 474        |
| 6.7.4    | Sistemas lineares compatíveis . . . . .                                              | 476        |
| 6.7.5    | Solução de menor norma . . . . .                                                     | 478        |
| 6.7.6    | Sistemas incompatíveis e mínimos quadrados . . . . .                                 | 479        |
| 6.7.7    | Resíduo de mínimos quadrados . . . . .                                               | 481        |
| 6.7.8    | Conjunto das soluções de mínimos quadrados . . . . .                                 | 483        |
| 6.7.9    | Expressão espectral da solução . . . . .                                             | 485        |
| 6.7.10   | Valores singulares pequenos e instabilidade . . . . .                                | 486        |
| 6.7.11   | Pseudoinversa truncada . . . . .                                                     | 488        |
| 6.7.12   | Exemplo com o sistema condutor . . . . .                                             | 488        |
| 6.8      | Síntese do capítulo . . . . .                                                        | 491        |
| <b>7</b> | <b>Cálculo Diferencial, Integral e Matricial Aplicado à Estatística Multivariada</b> | <b>499</b> |
| 7.1      | Funções, variações e diferenciais . . . . .                                          | 499        |
| 7.1.1    | Tipos de funções . . . . .                                                           | 499        |
| 7.1.2    | Convenções de derivação . . . . .                                                    | 502        |
| 7.1.3    | Variação de uma função . . . . .                                                     | 503        |
| 7.1.4    | Diferencial . . . . .                                                                | 505        |
| 7.1.5    | Aproximação ao longo de uma direção . . . . .                                        | 507        |
| 7.1.6    | Diferenciabilidade de funções vetoriais . . . . .                                    | 507        |
| 7.2      | Gradiente, derivada direcional, Jacobiana e Hessiana . . . . .                       | 510        |
| 7.2.1    | Gradiente e derivada direcional . . . . .                                            | 510        |
| 7.2.2    | Gradiente e conjuntos de nível . . . . .                                             | 512        |
| 7.2.3    | Jacobiana . . . . .                                                                  | 514        |



|       |                                                                           |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.2.4 | Regra da cadeia . . . . .                                                 | 517 |
| 7.2.5 | Hessiana . . . . .                                                        | 519 |
| 7.3   | Aproximações de Taylor e classificação local . . . . .                    | 522 |
| 7.3.1 | Aproximação de Taylor de primeira ordem . . . . .                         | 522 |
| 7.3.2 | Aproximação de Taylor de segunda ordem . . . . .                          | 523 |
| 7.3.3 | Pontos estacionários . . . . .                                            | 525 |
| 7.3.4 | Classificação pela Hessiana . . . . .                                     | 526 |
| 7.3.5 | Caso inconclusivo . . . . .                                               | 530 |
| 7.4   | Convexidade e concavidade . . . . .                                       | 531 |
| 7.4.1 | Conjuntos convexos . . . . .                                              | 531 |
| 7.4.2 | Funções convexas . . . . .                                                | 532 |
| 7.4.3 | Caracterização de primeira ordem . . . . .                                | 532 |
| 7.4.4 | Caracterização pela Hessiana . . . . .                                    | 533 |
| 7.4.5 | Consequências para otimização . . . . .                                   | 534 |
| 7.4.6 | Funções quadráticas . . . . .                                             | 535 |
| 7.5   | Otimização sem restrições . . . . .                                       | 537 |
| 7.5.1 | Método de Newton . . . . .                                                | 537 |
| 7.6   | Otimização com restrições de igualdade . . . . .                          | 541 |
| 7.6.1 | Multiplicadores de Lagrange . . . . .                                     | 542 |
| 7.6.2 | Relação com problemas de autovalores . . . . .                            | 546 |
| 7.6.3 | Restrições lineares . . . . .                                             | 547 |
| 7.7   | Derivadas de formas lineares, quadráticas e funções de resíduos . . . . . | 549 |
| 7.7.1 | Formas lineares e bilineares . . . . .                                    | 549 |
| 7.7.2 | Formas quadráticas . . . . .                                              | 550 |
| 7.7.3 | Norma euclidiana . . . . .                                                | 553 |
| 7.7.4 | Funções de resíduos lineares . . . . .                                    | 553 |
| 7.7.5 | Equações normais . . . . .                                                | 555 |
| 7.7.6 | Mínimos quadrados ponderados . . . . .                                    | 557 |
| 7.7.7 | Funções compostas de resíduos . . . . .                                   | 559 |
| 7.7.8 | Mínimos quadrados não lineares . . . . .                                  | 560 |
| 7.8   | Diferenciais matriciais e cálculo por traços . . . . .                    | 562 |
| 7.8.1 | Regras básicas do diferencial matricial . . . . .                         | 563 |
| 7.8.2 | Identidades de traço . . . . .                                            | 564 |
| 7.8.3 | Função linear de uma matriz . . . . .                                     | 565 |
| 7.8.4 | Norma de Frobenius . . . . .                                              | 566 |
| 7.8.5 | Funções quadráticas de uma matriz . . . . .                               | 567 |
| 7.8.6 | Funções matriciais de resíduos . . . . .                                  | 569 |
| 7.8.7 | Ponderação de observações e respostas . . . . .                           | 573 |
| 7.9   | Derivadas de inversas, determinantes e log-determinantes . . . . .        | 575 |
| 7.9.1 | Diferencial da matriz inversa . . . . .                                   | 575 |
| 7.9.2 | Diferencial do determinante . . . . .                                     | 577 |
| 7.9.3 | Diferencial do log-determinante . . . . .                                 | 579 |
| 7.9.4 | Segunda variação do log-determinante . . . . .                            | 580 |

|         |                                                                           |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.9.5   | Traço envolvendo uma matriz inversa . . . . .                             | 582 |
| 7.9.6   | Forma quadrática com matriz inversa . . . . .                             | 583 |
| 7.9.7   | Critério com log-determinante e traço . . . . .                           | 584 |
| 7.9.8   | Parâmetros matriciais simétricos . . . . .                                | 588 |
| 7.10    | Vetorização, produto de Kronecker e parâmetros matriciais . . . . .       | 588 |
| 7.10.1  | Operador de vetorização . . . . .                                         | 589 |
| 7.10.2  | Produto de Kronecker . . . . .                                            | 590 |
| 7.10.3  | Identidade de vetorização . . . . .                                       | 592 |
| 7.10.4  | Aprofundamento: derivadas vetorizadas e parâmetros matriciais . . . . .   | 593 |
| 7.11    | Integração múltipla e mudança de variáveis . . . . .                      | 603 |
| 7.11.1  | Integrais múltiplas . . . . .                                             | 604 |
| 7.11.2  | Teoremas de Tonelli e Fubini . . . . .                                    | 605 |
| 7.11.3  | Densidades multivariadas . . . . .                                        | 606 |
| 7.11.4  | Distribuições marginais . . . . .                                         | 607 |
| 7.11.5  | Esperanças de funções escalares, vetoriais e matriciais . . . . .         | 608 |
| 7.11.6  | Mudança de variáveis . . . . .                                            | 609 |
| 7.11.7  | Transformação de densidades . . . . .                                     | 611 |
| 7.11.8  | Transformações afins . . . . .                                            | 612 |
| 7.11.9  | Interpretação geométrica do determinante Jacobiano . . . . .              | 613 |
| 7.11.10 | Coordenadas polares . . . . .                                             | 614 |
| 7.11.11 | Transformações elipsoidais . . . . .                                      | 616 |
| 7.11.12 | Aprofundamento: diferenciação sob o sinal de integração . . . . .         | 617 |
| 7.12    | Aprofundamento: aplicações à estimação e à inferência . . . . .           | 623 |
| 7.12.1  | Log-verossimilhança e vetor escore . . . . .                              | 623 |
| 7.12.2  | Informação observada e informação de Fisher . . . . .                     | 625 |
| 7.12.3  | Newton–Raphson . . . . .                                                  | 626 |
| 7.12.4  | Método do escore de Fisher . . . . .                                      | 627 |
| 7.12.5  | Expansão local de uma raiz do escore . . . . .                            | 628 |
| 7.12.6  | Método delta . . . . .                                                    | 629 |
| 7.12.7  | Aplicação de referência: estimação de um vetor de médias . . . . .        | 631 |
| 7.12.8  | Aplicação de referência: critério do modelo linear multivariado . . . . . | 632 |
| 7.13    | Síntese do capítulo . . . . .                                             | 634 |
| 7.13.1  | Identidades principais . . . . .                                          | 637 |
| 7.13.2  | Aprofundamentos . . . . .                                                 | 638 |
| 7.13.3  | Competências . . . . .                                                    | 638 |

## **II Módulo II — Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada 640**

|          |                                                                                       |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>8</b> | <b>Módulo II — Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada</b> | <b>641</b> |
| 8.1      | Matrizes de covariâncias e correlações . . . . .                                      | 641        |
| 8.2      | Distribuição Normal Multivariada . . . . .                                            | 641        |

|            |                                                                                          |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.3        | Estatísticas Amostrais e Estimação . . . . .                                             | 641        |
| 8.4        | Modelo Linear Multivariado e Hipóteses Lineares . . . . .                                | 641        |
| 8.5        | Inferência Multivariada . . . . .                                                        | 641        |
| <b>III</b> | <b>Módulo III — Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multi-<br/>variadas</b> | <b>642</b> |
| <b>9</b>   | <b>Módulo III — Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas</b>       | <b>643</b> |
| 9.1        | Problemas e estruturas das técnicas multivariadas . . . . .                              | 643        |
| 9.2        | Formulação da Análise de Componentes Principais . . . . .                                | 643        |
| 9.3        | Formulação da Análise Fatorial . . . . .                                                 | 643        |
| 9.4        | Formulação da Análise de Agrupamentos . . . . .                                          | 643        |
| 9.5        | Formulação do Escalonamento Multidimensional . . . . .                                   | 643        |
| 9.6        | Formulação da Análise de Correspondência . . . . .                                       | 643        |
| 9.7        | Formulação da MANOVA . . . . .                                                           | 643        |
| 9.8        | Formulação da Análise Discriminante . . . . .                                            | 643        |
| 9.9        | Formulação da Correlação Canônica . . . . .                                              | 643        |
| 9.10       | Formulação da Análise Conjunta . . . . .                                                 | 643        |
|            | <b>Referências</b>                                                                       | <b>644</b> |

# Informações Legais e Declaração de Uso de Inteligência Artificial

## Direitos Autorais e Uso da Obra

© 2026 — Os autores.

Todos os direitos reservados. Esta obra é protegida pela legislação brasileira de direitos autorais (Lei nº 9.610/1998). É vedada a reprodução, distribuição, armazenamento ou transmissão total ou parcial deste livro, por qualquer meio ou processo, eletrônico ou mecânico, sem autorização expressa e por escrito dos autores, salvo nos casos permitidos pela legislação vigente para fins exclusivamente acadêmicos e não comerciais, com a devida citação da fonte.

A utilização do material em ambientes de ensino é permitida desde que preservada a integridade do conteúdo, mencionada a autoria e respeitados os princípios de uso responsável da informação científica. A reprodução para fins comerciais, bem como a modificação substancial do conteúdo sem autorização, constitui violação de direitos autorais.

## Declaração sobre o Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Durante a elaboração deste livro foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial, em especial sistemas de apoio à escrita e organização textual, como recurso complementar no processo de produção acadêmica.

O uso de IA teve caráter **estritamente assistivo**, não substituindo o desenvolvimento conceitual, a formulação matemática, a interpretação estatística nem as decisões pedagógicas da obra. Todo conteúdo foi cuidadosamente revisado, validado e adaptado pelos autores, que assumem integral responsabilidade científica e intelectual pelo texto final.

Não foram delegadas à IA decisões metodológicas, inferenciais ou conclusões analíticas. A elaboração teórica, a seleção de exemplos, a validação matemática e a coerência didática resultam da experiência acadêmica e da atuação dos autores na área de Modelos de Regressão.

Reafirmamos que o uso responsável de tecnologias emergentes deve sempre preservar o rigor científico, a integridade acadêmica e o protagonismo intelectual humano.

# Prefácio

Este livro foi elaborado como material de apoio ao estudo da Análise Multivariada no curso de Bacharelado em Estatística da Universidade Federal do Ceará.

A Análise Multivariada costuma ser apresentada por meio de um conjunto de métodos com finalidades distintas, como reduzir a dimensionalidade, identificar estruturas latentes, formar grupos, representar associações, comparar vetores de médias ou classificar observações. Quando essas técnicas são estudadas isoladamente, pode ser difícil perceber que muitas delas compartilham os mesmos objetos e operações: vetores e matrizes, combinações lineares, projeções, formas quadráticas, matrizes de covariâncias, decomposições espectrais, valores singulares, distâncias e modelos probabilísticos.

O livro foi organizado para tornar essas relações explícitas. O **Módulo I** apresenta os fundamentos matemáticos e geométricos necessários à representação e à transformação dos dados multivariados. O **Módulo II** desenvolve os fundamentos probabilísticos e inferenciais, incluindo matrizes de covariâncias e correlações, distribuição normal multivariada, estatísticas amostrais, estimação, modelo linear e inferência. O **Módulo III** mostra como esses resultados são combinados na formulação matemática e estatística das principais técnicas multivariadas.

A exposição busca equilibrar rigor e interpretação. As definições e propriedades são acompanhadas, sempre que possível, por representações geométricas, exemplos numéricos e conexões com os problemas estatísticos que motivam cada resultado. As demonstrações são incluídas quando contribuem diretamente para a compreensão da estrutura dos métodos; resultados mais especializados são apresentados de forma compatível com os objetivos de uma disciplina de graduação.

As técnicas são inicialmente estudadas a partir do problema que procuram resolver, dos dados que utilizam e dos objetos matemáticos que definem sua solução. A formulação conceitual antecede os algoritmos, os procedimentos computacionais e a interpretação aplicada. Essa organização permite compreender por que cada técnica assume determinada forma e quais fundamentos são necessários para utilizá-la adequadamente.

# Identificação da Disciplina

Curso: Bacharelado em Estatística

Disciplina: Análise Multivariada

Carga Horária: 96 horas

Período Letivo: 2026.2

Professores: Dr. Rafael Bráz Azevedo Farias e Dra. Alessandra Cristina da Silva Farias

## EMENTA

Fundamentos matemáticos, geométricos, probabilísticos e inferenciais da Análise Multivariada. Representação vetorial e matricial dos dados, espaços vetoriais, projeções, transformações lineares, decomposição espectral e decomposição em valores singulares. Matrizes de covariâncias e correlações, distribuição normal multivariada, estatísticas amostrais, estimação, modelo linear e inferência multivariada. Formulação matemática e estatística das principais técnicas multivariadas.

## OBJETIVO GERAL

Compreender os fundamentos matemáticos, geométricos, probabilísticos e estatísticos que sustentam a Análise Multivariada e reconhecer como esses fundamentos são utilizados na formulação, na aplicação e na interpretação das principais técnicas multivariadas.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- representar dados multivariados por meio de vetores e matrizes;
- interpretar geometricamente observações, variáveis, distâncias, projeções e transformações;
- compreender o papel de autovalores, autovetores, decomposição espectral e decomposição em valores singulares;

- analisar a estrutura de matrizes de covariâncias e correlações;
- compreender os fundamentos da distribuição normal multivariada, da estimação e da inferência;
- identificar os problemas estatísticos que dão origem às principais técnicas multivariadas;
- relacionar cada técnica aos seus objetos matemáticos, critérios de otimização ou modelos probabilísticos;
- distinguir técnicas de redução de dimensionalidade, representação de estruturas latentes, agrupamento, associação, comparação e classificação;
- conduzir análises multivariadas com apoio computacional;
- interpretar criticamente os resultados e comunicar conclusões compatíveis com os dados e com os pressupostos adotados.

## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

### **Módulo I – Fundamentos Matemáticos e Geométricos da Análise Multivariada**

Vetores e representação dos dados multivariados  
 Álgebra matricial aplicada  
 Espaços vetoriais, bases e projeções  
 Transformações lineares  
 Autovalores, autovetores e decomposição espectral  
 Decomposição em valores singulares  
 Cálculo diferencial, integral e matricial aplicado à Estatística Multivariada

### **Módulo II – Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada**

Matrizes de covariâncias e correlações  
 Distribuição normal multivariada  
 Estatísticas amostrais e estimação  
 Modelo linear multivariado e hipóteses lineares  
 Inferência multivariada

### **Módulo III – Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas**

Problemas e estruturas das técnicas multivariadas  
 Análise de Componentes Principais  
 Análise Fatorial  
 Análise de Agrupamentos  
 Escalonamento Multidimensional  
 Análise de Correspondência

Análise Multivariada de Variância  
Análise Discriminante  
Correlação Canônica  
Análise Conjunta

## **METODOLOGIA**

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivo-dialogadas, atividades práticas em laboratório e exercícios de interpretação. Os fundamentos matemáticos, probabilísticos e inferenciais serão articulados à formulação e à aplicação das técnicas multivariadas.

Serão utilizados exemplos numéricos, representações geométricas, demonstrações selecionadas e conjuntos de dados reais ou simulados. A parte computacional será conduzida de modo a apoiar a compreensão dos métodos, a verificação dos pressupostos e a interpretação dos resultados.

## **AValiação**

As avaliações contemplarão os fundamentos teóricos, a condução das análises e a interpretação dos resultados. Poderão ser utilizadas provas escritas, avaliações práticas em laboratório, exercícios e outras atividades definidas no plano de ensino da disciplina.

A aprovação seguirá as normas vigentes da Universidade Federal do Ceará.

## **CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

Serão considerados:

- correção matemática e estatística;
- domínio conceitual;
- adequação das decisões metodológicas;
- interpretação dos resultados no contexto do problema;
- clareza e organização da exposição escrita;
- qualidade e reprodutibilidade das análises computacionais.



## BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANDERSON, T. W.

*An Introduction to Multivariate Statistical Analysis*. 3rd ed. Wiley, 2003. (Anderson, 2003)

ARTES, R.; BARROSO, L. P.; PAULA, G. A.

*Métodos Multivariados de Análise Estatística*. (Artes; Barroso, 2023)

HAIR, J. F. et al.

*Multivariate Data Analysis*. (Hair et al., 2018)

## BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARTES, R.; BARROSO, L. P.; PAULA, G. A.

*Métodos Multivariados de Análise Estatística*. (Artes; Barroso, 2023)

JOHNSON, R. A.; WICHERN, D. W.

*Applied Multivariate Statistical Analysis*. 6th ed. Pearson, 2007. (Johnson; Wichern, 2007)

MANLY, B. F. J.; ALBERTO, J. A. N.

*Métodos Estatísticos Multivariados: Uma Introdução*. (Manly; Navarro Alberto, 2019)

MARDIA, K. V.; KENT, J. T.; TAYLOR, C. C.

*Multivariate Analysis*. (Mardia; Kent; Taylor, 2024)

MINGOTI, S. A.

*Análise de Dados Através de Métodos de Estatística Multivariada: Uma Abordagem Aplicada*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. (Mingoti, 2005)

RENCER, A. C.; CHRISTENSEN, W. F.

*Methods of Multivariate Analysis*. (Rencher; Christensen, 2012)

## **Parte I**

# **Módulo I — Fundamentos Matemáticos e Geométricos da Análise Multivariada**

# 1 Vetores e representação dos dados multivariados

Em estudos multivariados, cada unidade observacional é descrita por várias características registradas simultaneamente. Quando são observadas  $p$  variáveis quantitativas, esses valores podem ser organizados em um vetor de  $\mathbb{R}^p$ .

Para  $n$  unidades, os vetores formam uma matriz de dados de dimensão  $n \times p$ , na qual as linhas representam as observações e as colunas representam as variáveis.

Essa representação permite interpretar as observações como pontos em um espaço multidimensional e estudar suas relações por meio de operações vetoriais e conceitos geométricos.

O capítulo apresenta escalares, vetores, matrizes, o espaço  $\mathbb{R}^p$ , a matriz de dados, as operações com vetores, o produto interno, a norma, o ângulo, a distância euclidiana e o produto externo.

## Convenções gerais de notação

As convenções abaixo indicam apenas como os objetos serão representados. Seus significados e propriedades serão definidos ao longo do capítulo.

- letras minúsculas sem negrito, como  $a$ ,  $x$  e  $\alpha$ , representam escalares;
- letras minúsculas em negrito, como  $\mathbf{x}$  e  $\mathbf{y}$ , representam vetores observados;
- letras maiúsculas em negrito, como  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{X}$ , representam matrizes;
- letras maiúsculas sem negrito, como  $X$ , representam variáveis aleatórias escalares;
- o vetor aleatório multivariado será representado por  $\mathbf{X}$ ;
- a realização observada de  $\mathbf{X}$  será representada por  $\mathbf{x}$ ;
- o elemento situado na posição  $i$  de um vetor será indicado por  $x_i$ ;
- o elemento situado na linha  $i$  e na coluna  $j$  de uma matriz será indicado por  $a_{ij}$ ;
- a  $i$ -ésima linha de uma matriz  $\mathbf{A}$  será representada por  $\mathbf{a}_i^\top$ ;
- a  $j$ -ésima coluna de uma matriz  $\mathbf{A}$  será representada por  $\mathbf{a}_{\cdot j}$ ;
- quando não houver ambiguidade,  $\mathbf{a}_i^\top$  poderá ser utilizada como forma abreviada de  $\mathbf{a}_i^\top$ ;
- o vetor-coluna associado à  $i$ -ésima linha será representado por  $\mathbf{a}_i \in \mathbb{R}^p$ ;
- o ponto na notação matricial indica o índice que varia;
- $\mathbb{R}^p$  representa o espaço dos vetores reais com  $p$  componentes;
- $\mathbb{R}^{n \times p}$  representa o conjunto das matrizes reais com  $n$  linhas e  $p$  colunas;
- o símbolo  $\top$  indica transposição;

- $\mathbf{0}$  representa um vetor ou uma matriz nula, com dimensão determinada pelo contexto.

Para a matriz de dados  $\mathbf{X}$ , será adotada a mesma convenção para as linhas:  $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p$  representa a observação  $i$ ,  $\mathbf{x}_i^\top$  representa essa observação como a  $i$ -ésima linha de  $\mathbf{X}$  e  $\mathbf{x}_{\cdot j} \in \mathbb{R}^n$  representa a coluna correspondente à variável  $j$ .

Quando houver risco de ambiguidade, a dimensão será indicada explicitamente.

## 1.1 Escalares, vetores e matrizes

Em uma análise univariada, cada observação é representada pelo valor de uma única variável. Quando várias variáveis são medidas na mesma unidade observacional, seus valores podem ser organizados em um vetor. Os vetores de todas as unidades formam uma matriz de dados.

**Definição 1.1** (Escalar). Um **escalar** é um número real:

$$a \in \mathbb{R}.$$

Em uma aplicação estatística, um escalar pode representar uma medida observada ou o coeficiente de uma expressão matemática.

Em Estatística, uma variável aleatória escalar será representada por uma letra maiúscula, como  $X$ . Uma realização dessa variável será representada pela letra minúscula correspondente:

$$x \in \mathbb{R}.$$

Por exemplo,  $X$  pode representar a massa de uma unidade selecionada aleatoriamente, enquanto  $x = 65$  representa um valor observado.

**Definição 1.2** (Vetor aleatório e vetor observado). Um **vetor aleatório** de dimensão  $p$  é uma coleção ordenada de  $p$  variáveis aleatórias:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_p \end{bmatrix} = (X_1, X_2, \dots, X_p)^\top.$$

Uma realização de  $\mathbf{X}$  é representada pelo vetor observado

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_p)^\top \in \mathbb{R}^p.$$

Cada componente  $x_j$  corresponde ao valor observado da variável  $j$ , para  $j = 1, \dots, p$ .

**Exemplo 1.1** (Representação de uma observação). Considere uma unidade descrita por três variáveis:

- $X_1$ : idade, em anos;
- $X_2$ : massa corporal, em quilogramas;
- $X_3$ : altura, em centímetros.

O vetor aleatório é

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}.$$

Para uma unidade com 52 anos, 74 quilogramas e 168 centímetros de altura, o vetor observado é

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 52 \\ 74 \\ 168 \end{bmatrix}.$$

A ordem das componentes identifica a correspondência entre valores e variáveis. Assim,

$$\begin{bmatrix} 52 \\ 74 \\ 168 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 74 \\ 52 \\ 168 \end{bmatrix}$$

O primeiro vetor representa uma unidade com 52 anos, 74 quilogramas e 168 centímetros de altura. O segundo representa uma unidade com 74 anos, 52 quilogramas e 168 centímetros de altura.

Neste momento, o vetor é utilizado apenas para organizar as medidas. A comparação geométrica de variáveis com unidades diferentes exigirá atenção às escalas.

Dois vetores  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$  são iguais quando suas componentes correspondentes são iguais:

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} \iff x_j = y_j, \quad j = 1, \dots, p.$$

**Definição 1.3** (Matriz). Uma **matriz** com  $n$  linhas e  $p$  colunas é um arranjo retangular de números:

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times p} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

O elemento  $a_{ij}$  ocupa a linha  $i$  e a coluna  $j$ .

A dimensão de  $\mathbf{A}$  é  $n \times p$ . O primeiro número indica a quantidade de linhas, e o segundo indica a quantidade de colunas.

Para a matriz  $\mathbf{A}$  definida anteriormente, a  $i$ -ésima linha é o vetor-linha

$$\mathbf{a}_{i\cdot}^\top = [a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{ip}] \in \mathbb{R}^{1 \times p},$$

enquanto a  $j$ -ésima coluna é o vetor-coluna

$$\mathbf{a}_{\cdot j} = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times 1}.$$

O ponto na notação indica o índice que varia. Assim:

- em  $\mathbf{a}_{i\cdot}^\top$ , a linha  $i$  permanece fixa e o índice das colunas varia;
- em  $\mathbf{a}_{\cdot j}$ , a coluna  $j$  permanece fixa e o índice das linhas varia.

#### Notação abreviada para linhas

Quando não houver risco de ambiguidade, a notação das linhas da matriz  $\mathbf{A}$  poderá ser simplificada. Em particular, o vetor associado à  $i$ -ésima linha será representado por

$$\mathbf{a}_i \in \mathbb{R}^p,$$

de modo que a  $i$ -ésima linha da matriz poderá ser escrita como

$$\mathbf{a}_i^\top = \mathbf{a}_{i\cdot}^\top.$$

A notação com ponto será utilizada quando for necessário distinguir explicitamente linhas e colunas da mesma matriz.

Essa convenção será especialmente útil para a matriz de dados  $\mathbf{X}$ , em que  $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p$  representa a  $i$ -ésima observação e  $\mathbf{x}_i^\top$  representa essa observação como a  $i$ -ésima linha de  $\mathbf{X}$ . As colunas permanecerão representadas explicitamente por  $\mathbf{x}_{.j}$ .

Com essas convenções, a matriz pode ser representada por suas linhas,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{1.}^\top \\ \mathbf{a}_{2.}^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{n.}^\top \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \end{bmatrix},$$

ou por suas colunas,

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_{.1} \ \mathbf{a}_{.2} \ \cdots \ \mathbf{a}_{.p}].$$

### 1.1.1 Vetor-coluna, vetor-linha e transposição

**Definição 1.4** (Vetor-coluna, vetor-linha e transposição). Um vetor-coluna com  $p$  componentes pode ser tratado como uma matriz de dimensão  $p \times 1$ :

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{p \times 1}.$$

A **transposição** é a operação que troca as linhas de uma matriz por suas colunas e é indicada pelo símbolo  $\top$ .

A transposta do vetor-coluna  $\mathbf{x}$  é o vetor-linha

$$\mathbf{x}^\top = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_p] \in \mathbb{R}^{1 \times p}.$$

Portanto,

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{p \times 1} \quad \implies \quad \mathbf{x}^\top \in \mathbb{R}^{1 \times p}.$$

A Tabela 1.1 resume a notação utilizada no capítulo.

Tabela 1.1: Notação utilizada para escalares, vetores e matrizes.

| Objeto                     | Notação                                      | Descrição                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Escalar                    | $a$                                          | Número real                                                                 |
| Variável aleatória escalar | $X$                                          | Variável que assume valores em $\mathbb{R}$                                 |
| Realização escalar         | $x$                                          | Valor observado de $X$                                                      |
| Vetor aleatório            | $\mathbf{X}$                                 | Coleção ordenada de variáveis aleatórias                                    |
| Vetor observado            | $\mathbf{x}$                                 | Realização de um vetor aleatório                                            |
| Matriz genérica            | $\mathbf{A}$                                 | Arranjo retangular de números                                               |
| Linha $i$ de uma matriz    | $\mathbf{a}_i^\top$ ou $\mathbf{a}_{i\cdot}$ | Vetor-linha formado pelos elementos da linha $i$ de $\mathbf{A}$            |
| Coluna $j$ de uma matriz   | $\mathbf{a}_{\cdot j}$                       | Vetor-coluna formado pelos elementos da coluna $j$ de $\mathbf{A}$          |
| Matriz de dados            | $\mathbf{X}$                                 | Matriz observada com linhas e colunas associadas às unidades e às variáveis |

Um escalar representa uma medida, um vetor reúne as medidas de uma unidade e uma matriz organiza os valores de várias unidades. A representação dos vetores em  $\mathbb{R}^p$  será desenvolvida na próxima seção.

## 1.2 O espaço $\mathbb{R}^p$

Os valores observados de  $p$  variáveis quantitativas podem ser organizados em um vetor com  $p$  componentes. O conjunto de todos os vetores desse tipo é denotado por  $\mathbb{R}^p$ .

**Definição 1.5** (Espaço  $\mathbb{R}^p$ ). O espaço  $\mathbb{R}^p$  é o conjunto

$$\mathbb{R}^p = \{(x_1, x_2, \dots, x_p)^\top : x_j \in \mathbb{R}, j = 1, \dots, p\}.$$

Cada elemento de  $\mathbb{R}^p$  é um vetor formado por  $p$  componentes reais.

Uma observação descrita por  $p$  variáveis pode ser representada por

$$\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \\ \vdots \\ x_{ip} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p,$$



em que  $x_{ij}$  é o valor da variável  $j$  observado na unidade  $i$ .

Neste livro, o espaço  $\mathbb{R}^p$  no qual são representadas as unidades observacionais será denominado **espaço das observações**. Cada vetor representa uma unidade, e cada componente corresponde a uma variável.

A dimensão do espaço é determinada pelo número de variáveis:

- para  $p = 1$ , cada observação possui uma componente;
- para  $p = 2$ , cada observação possui duas componentes;
- para  $p = 3$ , cada observação possui três componentes;
- para  $p > 3$ , a representação permanece definida em  $\mathbb{R}^p$ , embora não possa ser visualizada diretamente em sua totalidade.

A Figura 1.1 apresenta os três casos que podem ser representados graficamente.




Figura 1.1: Representação de observações em espaços de uma, duas e três dimensões.

**Exemplo 1.2** (Observação em duas dimensões). Considere duas variáveis quantitativas,  $X_1$  e  $X_2$ . A observação  $i$  é representada por

$$\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Se  $x_{i1} = 3$  e  $x_{i2} = 5$ , então

$$\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Esse vetor pode ser representado por uma seta que parte da origem e termina no ponto de coordenadas  $(3, 5)$ , como mostra a Figura 1.2.




Figura 1.2: Representação do vetor  $\mathbf{x}_i = (3, 5)^\top$  no plano.

A extremidade da seta determina o ponto  $(3, 5)$ . Assim, o vetor  $\mathbf{x}_i$  pode ser interpretado geometricamente como uma seta com origem em  $(0, 0)$  e extremidade em  $(3, 5)$ .

O número de observações e o número de variáveis possuem funções distintas. Para um conjunto com  $n$  observações e  $p$  variáveis:

- $n$  determina a quantidade de pontos;
- $p$  determina a dimensão do espaço ambiente.

As  $n$  observações formam uma nuvem de pontos em  $\mathbb{R}^p$ .

Os vetores correspondentes às  $n$  observações serão organizados em uma matriz de dados na próxima seção.

### 1.3 Representação matricial de um conjunto de dados

Considere  $n$  unidades observacionais descritas pelas mesmas  $p$  variáveis quantitativas. A observação  $i$  é representada pelo vetor

$$\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \\ \vdots \\ x_{ip} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p, \quad i = 1, \dots, n.$$

Cada componente  $x_{ij}$  corresponde ao valor da variável  $j$  observado na unidade  $i$ . Os  $n$  vetores observados podem ser organizados nas linhas de uma matriz.

**Definição 1.6** (Matriz de dados). A **matriz de dados** de  $n$  observações e  $p$  variáveis é definida por

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

O elemento  $x_{ij}$  representa o valor da variável  $j$  observado na unidade  $i$ .

As linhas da matriz correspondem às observações, e as colunas correspondem às variáveis. Essa organização coincide com a estrutura usual de uma planilha ou de um banco de dados.

Com a notação estabelecida anteriormente, a matriz de dados pode ser representada por suas linhas como

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \mathbf{x}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^\top \end{bmatrix},$$

ou por suas colunas como

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}_{.1} \ \mathbf{x}_{.2} \ \cdots \ \mathbf{x}_{.p}].$$

**Exemplo 1.3** (Matriz de dados com duas variáveis). Considere quatro unidades observacionais descritas pelas variáveis  $X_1$  e  $X_2$ . Os vetores observados são

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_4 = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

A matriz de dados é

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \\ 5 & 7 \\ 8 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 2}.$$

A terceira observação é

$$\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix},$$

e aparece na matriz como a terceira linha,

$$\mathbf{x}_3^\top = \begin{bmatrix} 5 & 7 \end{bmatrix}.$$

O elemento

$$x_{32} = 7$$

é o valor da segunda variável observado na terceira unidade.

### 1.3.1 Espaço das observações e espaço das variáveis

A organização da matriz de dados permite considerar dois conjuntos de vetores.

Pelas linhas,

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p, \quad i = 1, \dots, n,$$

cada vetor representa uma observação descrita pelas  $p$  variáveis.

Pelas colunas,

$$\mathbf{x}_{.j} \in \mathbb{R}^n, \quad j = 1, \dots, p,$$

cada vetor representa uma variável observada nas  $n$  unidades.

No **espaço das observações**, cada unidade observacional é representada por um ponto em  $\mathbb{R}^p$ , cujas coordenadas correspondem às variáveis.

No **espaço das variáveis**, cada variável é representada por um vetor em  $\mathbb{R}^n$ , cujas componentes correspondem às unidades observacionais.

A Tabela 1.2 resume essas duas representações.

Tabela 1.2: Representações da matriz de dados por linhas e colunas.

| Representação           | Vetor             | Objeto representado | Espaço         | Quantidade  |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Linhas de $\mathbf{X}$  | $\mathbf{x}_i$    | Observação $i$      | $\mathbb{R}^p$ | $n$ vetores |
| Colunas de $\mathbf{X}$ | $\mathbf{x}_{.j}$ | Variável $j$        | $\mathbb{R}^n$ | $p$ vetores |

A interpretação utilizada depende do objeto de interesse. Relações entre unidades observacionais são estudadas a partir das linhas da matriz, enquanto relações entre variáveis são estudadas a partir de suas colunas.

## 1.4 Operações elementares com vetores

Considere os vetores

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p$$

e um escalar  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Dois vetores são iguais quando suas componentes correspondentes são iguais:

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} \iff x_j = y_j, \quad j = 1, \dots, p.$$

### 1.4.1 Soma e subtração

A soma de dois vetores é realizada componente a componente:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_p + y_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p.$$

A diferença também é calculada componente a componente:

$$\mathbf{x} - \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 - y_1 \\ x_2 - y_2 \\ \vdots \\ x_p - y_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p.$$

O vetor  $\mathbf{x} - \mathbf{y}$  representa o deslocamento de  $\mathbf{y}$  até  $\mathbf{x}$ .

**Exemplo 1.4** (Soma e subtração de vetores). Considere

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2,0 \\ 1,5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1,0 \\ 3,0 \end{bmatrix}.$$

A soma é

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2,0 + 1,0 \\ 1,5 + 3,0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3,0 \\ 4,5 \end{bmatrix}.$$

A diferença é

$$\mathbf{x} - \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2,0 - 1,0 \\ 1,5 - 3,0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,0 \\ -1,5 \end{bmatrix}.$$

**Definição 1.7** (Vetor nulo). O **vetor nulo** de  $\mathbb{R}^p$  é definido por

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ele é o elemento neutro da adição:

$$\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}.$$

A Figura 1.3 apresenta a interpretação geométrica da soma em  $\mathbb{R}^2$ .

Na figura, os vetores  $\mathbf{x}$  e  $\mathbf{y}$  formam dois lados de um paralelogramo. A diagonal que parte da origem representa  $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ .

## 1.4.2 Multiplicação por escalar

A multiplicação do vetor  $\mathbf{x}$  pelo escalar  $\alpha$  é definida por

$$\alpha \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p.$$

A norma do vetor resultante satisfaz

$$\|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|.$$

Portanto, para  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ :

- se  $|\alpha| > 1$ , o comprimento do vetor aumenta;




Figura 1.3: Soma de vetores pela regra do paralelogramo.



- se  $0 < |\alpha| < 1$ , o comprimento do vetor diminui;
- se  $|\alpha| = 1$ , o comprimento do vetor é preservado;
- se  $\alpha = 0$ , o resultado é o vetor nulo;
- se  $\alpha < 0$ , o sentido do vetor é invertido.

As alterações de comprimento dependem de  $|\alpha|$ , enquanto a inversão do sentido depende do sinal de  $\alpha$ . Assim, um escalar negativo pode aumentar, diminuir ou preservar o comprimento do vetor.

Quando  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , tem-se

$$\alpha \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

para qualquer  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

**Exemplo 1.5** (Multiplicação por escalar). Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2,0 \\ -1,5 \end{bmatrix}$$

e  $\alpha = -2$ , tem-se

$$-2\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2(2,0) \\ -2(-1,5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4,0 \\ 3,0 \end{bmatrix}.$$

### 1.4.3 Combinações lineares

Uma combinação linear é construída por meio das duas operações apresentadas anteriormente: a multiplicação de vetores por escalares e a adição de vetores.

**Definição 1.8** (Combinação linear de vetores). Sejam

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^p$$

e

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}.$$

Uma **combinação linear** dos vetores  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$  é qualquer vetor da forma

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k.$$

O resultado também pertence a  $\mathbb{R}^p$ , pois é obtido por multiplicações por escalares e somas de vetores de  $\mathbb{R}^p$ :

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^p.$$

**Exemplo 1.6** (Combinação linear de vetores). Considere

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

A combinação linear  $2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$  é

$$2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

As combinações lineares permitem construir novos vetores a partir de vetores já conhecidos. Seus coeficientes determinam quanto cada vetor contribui para o resultado.

**Exemplo 1.7** (Combinação linear das variáveis). Considere as variáveis  $X_1$ ,  $X_2$  e  $X_3$  e os coeficientes

$$a_1 = 2,0, \quad a_2 = -0,5, \quad a_3 = 3,0.$$

A combinação linear definida por esses coeficientes é

$$Y = 2,0X_1 - 0,5X_2 + 3,0X_3.$$

Para uma observação com valores

$$x_1 = 4,0, \quad x_2 = 2,0, \quad x_3 = 1,5,$$

o valor observado da combinação linear é

$$y = 2,0(4,0) - 0,5(2,0) + 3,0(1,5) = 11,5.$$

Em uma combinação linear, cada coeficiente determina a contribuição do vetor ou da variável correspondente para o resultado.

As operações anteriores produzem novos vetores ou novas variáveis. A próxima operação tem natureza diferente: o produto interno associa dois vetores a um número real e permite construir as noções de comprimento, ângulo, ortogonalidade e distância.

## 1.5 Produto interno, norma, ângulo e distância euclidiana

O produto interno associa dois vetores de  $\mathbb{R}^p$  a um número real. A partir dessa operação, definem-se norma, ângulo, ortogonalidade e distância euclidiana.

### 1.5.1 Produto interno euclidiano

**Definição 1.9** (Produto interno euclidiano). Para  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ , o **produto interno euclidiano** entre  $\mathbf{x}$  e  $\mathbf{y}$  é definido por

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{j=1}^p x_j y_j.$$

Em termos das componentes,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_p y_p.$$

O resultado do produto interno é um escalar.

**Exemplo 1.8** (Cálculo do produto interno). Considere

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Então,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 2(4) + 1(2) + 3(-1) = 7.$$

**Proposição 1.1** (Propriedades do produto interno euclidiano). *Para quaisquer vetores  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^p$  e quaisquer escalares  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , o produto interno euclidiano satisfaz as seguintes propriedades:*

*1. Simetria*

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle.$$

*2. Linearidade no primeiro argumento*

$$\langle \alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{z}, \mathbf{y} \rangle = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \beta \langle \mathbf{z}, \mathbf{y} \rangle.$$

3. *Linearidade no segundo argumento*

$$\langle \mathbf{x}, \alpha \mathbf{y} + \beta \mathbf{z} \rangle = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \beta \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle.$$

4. *Não negatividade*

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geq 0.$$

5. *Positividade definida*

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

### 1.5.2 Norma euclidiana

**Definição 1.10** (Norma euclidiana). A **norma euclidiana** de  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  é definida por

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_p^2}.$$

A norma representa o comprimento do vetor em relação à origem.

Para qualquer  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  e  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,

$$\|\mathbf{x}\| \geq 0,$$

$$\|\mathbf{x}\| = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

e

$$\|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|.$$

**Exemplo 1.9** (Norma de um vetor). Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

A Figura 1.4 mostra a representação geométrica desse vetor no plano. O comprimento da seta corresponde à norma euclidiana do vetor.




Figura 1.4: A norma euclidiana corresponde ao comprimento do vetor.

Nesse caso, a norma coincide com a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos têm comprimentos 3 e 4.

### 1.5.3 Desigualdade de Cauchy–Schwarz

**Teorema 1.1** (Desigualdade de Cauchy–Schwarz). *Para quaisquer vetores  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ ,*

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

*A igualdade ocorre se, e somente se, um dos vetores é múltiplo escalar do outro. (Meyer, 2023)*

*Comprovação.* Se  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ , então

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$$

e

$$\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| = 0.$$

Portanto, a desigualdade é satisfeita com igualdade. Além disso,

$$\mathbf{y} = 0\mathbf{x},$$

de modo que um dos vetores é múltiplo escalar do outro.

Considere agora  $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ . Para qualquer escalar  $\alpha \in \mathbb{R}$ , a não negatividade do produto interno implica

$$\langle \mathbf{x} - \alpha\mathbf{y}, \mathbf{x} - \alpha\mathbf{y} \rangle \geq 0.$$

Escolha

$$\alpha = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{y}\|^2}.$$

Expandindo o produto interno,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle \mathbf{x} - \alpha\mathbf{y}, \mathbf{x} - \alpha\mathbf{y} \rangle \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle - \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle - \alpha \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle + \alpha^2 \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 - 2\alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \alpha^2 \|\mathbf{y}\|^2. \end{aligned}$$

Na última igualdade, foi utilizada a simetria do produto interno:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle.$$

Substituindo o valor escolhido para  $\alpha$ ,

$$\begin{aligned}
0 &\leq \|\mathbf{x}\|^2 - 2 \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{y}\|^2} \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \\
&\quad + \left( \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{y}\|^2} \right)^2 \|\mathbf{y}\|^2 \\
&= \|\mathbf{x}\|^2 - \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2}{\|\mathbf{y}\|^2}.
\end{aligned}$$

Logo,

$$\frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2}{\|\mathbf{y}\|^2} \leq \|\mathbf{x}\|^2.$$

Como  $\|\mathbf{y}\|^2 > 0$ , podemos multiplicar os dois lados por esse valor e obter

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \leq \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2.$$

Tomando a raiz quadrada dos dois lados,

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

Resta examinar quando ocorre a igualdade. Na construção anterior, a igualdade é satisfeita se, e somente se,

$$\langle \mathbf{x} - \alpha \mathbf{y}, \mathbf{x} - \alpha \mathbf{y} \rangle = 0.$$

Pela positividade definida do produto interno, isso ocorre se, e somente se,

$$\mathbf{x} - \alpha \mathbf{y} = \mathbf{0},$$

ou seja,

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{y}.$$

Portanto, quando  $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ , a igualdade ocorre se, e somente se,  $\mathbf{x}$  é múltiplo escalar de  $\mathbf{y}$ .

Reunindo os dois casos, concluímos que a igualdade ocorre se, e somente se, um dos vetores é múltiplo escalar do outro.  $\square$

Para vetores não nulos, a desigualdade de Cauchy–Schwarz também implica

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} \leq 1.$$

Assim, a desigualdade fornece uma justificativa algébrica de que a razão utilizada no cálculo do ângulo pertence ao intervalo  $[-1, 1]$ , que é o domínio da função arccos.

### 1.5.4 Ângulo entre vetores

**Definição 1.11** (Ângulo entre vetores). Para  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$  não nulos, o **ângulo** entre os vetores é o único valor  $\theta \in [0, \pi]$  que satisfaz

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}.$$

A existência desse ângulo é garantida pela desigualdade de Cauchy–Schwarz, pois

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} \leq 1.$$

Equivalentemente,

$$\theta = \arccos \left( \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} \right).$$

A relação que define o ângulo também pode ser escrita como

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| \cos(\theta).$$

### Interpretação geométrica

A divisão pelo produto das normas retira o efeito dos comprimentos dos vetores. Desse modo, o valor de  $\cos(\theta)$  descreve apenas o alinhamento entre suas direções.

Como  $\|\mathbf{x}\|$  e  $\|\mathbf{y}\|$  são positivos, o sinal do produto interno depende apenas do sinal de  $\cos(\theta)$ :

- se  $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ , o ângulo é agudo e

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle > 0;$$



- se  $\theta = \frac{\pi}{2}$ , o ângulo é reto e

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0;$$

- se  $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$ , o ângulo é obtuso e


$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle < 0.$$

Geometricamente, o produto interno é positivo quando os vetores apontam para direções relativamente próximas, é nulo quando são ortogonais e é negativo quando apontam para direções relativamente opostas.


O ângulo não é definido quando um dos vetores é nulo, pois o vetor nulo não possui direção determinada e o denominador da expressão seria igual a zero.

A Figura 1.5 apresenta essas três situações.

Ângulo agudo



Ângulo reto



Ângulo obtuso




Figura 1.5: Sinal do produto interno segundo o ângulo formado entre dois vetores.

**Definição 1.12** (Vetores ortogonais). Dois vetores  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$  são **ortogonais** quando

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0.$$

Se ambos forem não nulos, o ângulo entre eles é igual a  $90^\circ$ .

O vetor nulo é ortogonal a todos os vetores, pois

$$\langle \mathbf{0}, \mathbf{x} \rangle = 0.$$

O ângulo entre o vetor nulo e outro vetor não é definido porque  $\|\mathbf{0}\| = 0$ .

### 1.5.5 Distância euclidiana

**Definição 1.13** (Distância euclidiana). A **distância euclidiana** entre  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$  é definida por

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Em termos das componentes,

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_j - y_j)^2}.$$

A distância euclidiana corresponde ao comprimento do segmento que liga os pontos representados por  $\mathbf{x}$  e  $\mathbf{y}$ .

**Exemplo 1.10** (Distância entre duas observações). Considere

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

A diferença entre os vetores é

$$\mathbf{x} - \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5.$$

#### Escalas das variáveis

A distância euclidiana depende das unidades e das escalas das variáveis. Uma variável com valores numericamente maiores pode contribuir mais para a distância entre as observações.




Figura 1.6: Os vetores  $x$  e  $y$  são representados por setas. A distância euclidiana é o comprimento do segmento que une suas extremidades.

A padronização e outras geometrias serão estudadas nos capítulos posteriores.

### 1.5.6 Desigualdade triangular

**Teorema 1.2** (Desigualdade triangular). *Para quaisquer vetores  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ ,*

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|.$$

*Consequentemente, para quaisquer pontos  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^p$ ,*

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + d_E(\mathbf{y}, \mathbf{z}).$$

(Meyer, 2023)

*Comprovação.* Pela definição da norma euclidiana,

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle.$$

Usando a linearidade e a simetria do produto interno,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2. \end{aligned}$$

Pela desigualdade de Cauchy–Schwarz,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \leq |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &\leq \|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2 \\ &= (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2. \end{aligned}$$

Como ambos os lados são não negativos, podemos tomar a raiz quadrada e obter

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|.$$

Para demonstrar a desigualdade triangular da distância euclidiana, observe que

$$\mathbf{x} - \mathbf{z} = (\mathbf{x} - \mathbf{y}) + (\mathbf{y} - \mathbf{z}).$$

Aplicando a desigualdade triangular da norma,

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{z}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|.$$

Como

$$d_E(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|,$$

segue que

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + d_E(\mathbf{y}, \mathbf{z}).$$

□

O produto interno, em conjunto com as normas, determina o ângulo entre vetores. A norma mede o comprimento de um vetor, e a distância euclidiana mede a separação entre dois pontos. Esses conceitos completam a representação geométrica inicial dos dados multivariados.

### 1.5.7 Produto externo

O produto interno associa dois vetores de mesma dimensão a um escalar. Dois vetores também podem ser utilizados para construir uma matriz por meio do **produto externo**.

**Definição 1.14** (Produto externo). Para  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  e  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^q$ , o **produto externo** de  $\mathbf{x}$  e  $\mathbf{y}$ , denotado por

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}),$$

é definido como a matriz

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \cdots & x_1 y_q \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 & \cdots & x_2 y_q \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_p y_1 & x_p y_2 & \cdots & x_p y_q \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{p \times q}.$$

O elemento localizado na linha  $i$  e na coluna  $j$  é

$$[\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y})]_{ij} = x_i y_j.$$

O resultado do produto externo é uma matriz.

A estrutura do produto externo pode ser observada por suas colunas. Como

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = [y_1 \mathbf{x} \quad y_2 \mathbf{x} \quad \cdots \quad y_q \mathbf{x}],$$

cada coluna é um múltiplo escalar de  $\mathbf{x}$ .

Equivalentemente, considerando as linhas,

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} x_1 \mathbf{y}^\top \\ x_2 \mathbf{y}^\top \\ \vdots \\ x_p \mathbf{y}^\top \end{bmatrix},$$

de modo que cada linha é um múltiplo escalar de  $\mathbf{y}^\top$ .

**Exemplo 1.11** (Produto externo de dois vetores). Considere

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

e

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

O produto externo é

$$\begin{aligned} \text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \begin{bmatrix} 1(3) & 1(-1) & 1(4) \\ 2(3) & 2(-1) & 2(4) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 6 & -2 & 8 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

O resultado possui dimensão  $2 \times 3$ , correspondente às dimensões de  $\mathbf{x}$  e  $\mathbf{y}$ , respectivamente.

O produto interno e o produto externo produzem objetos de naturezas diferentes. Para  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ ,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \in \mathbb{R},$$

enquanto

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

Assim, o produto interno produz um escalar, enquanto o produto externo produz uma matriz. No próximo capítulo, após a definição do produto matricial, o produto externo será relacionado às operações entre matrizes e vetores, e suas propriedades matriciais serão desenvolvidas.

## 1.6 Síntese do capítulo

Uma observação descrita por  $p$  variáveis quantitativas pode ser representada por um vetor

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p.$$

Um conjunto formado por  $n$  observações e  $p$  variáveis é organizado na matriz de dados

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \mathbf{x}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

As linhas de  $\mathbf{X}$  representam as observações como pontos de  $\mathbb{R}^p$ , enquanto as colunas representam as variáveis como vetores de  $\mathbb{R}^n$ .

A soma, a subtração e a multiplicação por escalar permitem construir novos vetores. As combinações lineares permitem reunir diferentes vetores ou variáveis mediante coeficientes previamente definidos.

Para  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ , o produto interno euclidiano é definido por

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{j=1}^p x_j y_j.$$

A norma euclidiana de  $\mathbf{x}$  é

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle},$$

e representa o comprimento do vetor.

Para vetores não nulos, o ângulo  $\theta \in [0, \pi]$  é determinado por

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}.$$

Dois vetores são ortogonais quando

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0.$$

A distância euclidiana entre dois pontos é definida por

$$d_E(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Além das operações que produzem vetores ou escalares, dois vetores podem gerar uma matriz por meio do produto externo. Para

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \quad \text{e} \quad \mathbf{y} \in \mathbb{R}^q,$$

tem-se

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^{p \times q}.$$

Esses conceitos permitem interpretar os dados multivariados simultaneamente como vetores, matrizes e uma nuvem de pontos. O próximo capítulo desenvolverá as operações e as propriedades matriciais necessárias para manipular essas representações.



## 2 Álgebra matricial aplicada

No capítulo anterior, vetores foram apresentados nas formas coluna e linha, e a matriz de dados foi construída a partir da organização conjunta das observações e das variáveis. O produto externo mostrou ainda como dois vetores podem gerar uma matriz. Essas representações estabelecem a passagem natural da linguagem vetorial para a linguagem matricial.

Este capítulo desenvolve as operações e propriedades necessárias para manipular matrizes. O produto matriz-vetor e o produto entre matrizes permitem combinar linhas e colunas de dimensões compatíveis, enquanto a transposição, a simetria e o traço descrevem propriedades estruturais importantes dessas operações. Nesse contexto, o produto externo será retomado como um caso particular do produto matricial.

Também serão estudadas a identidade, a inversa, o determinante, o posto e sua relação com sistemas lineares, além de classes particulares de matrizes e de formas bilineares e quadráticas. As seções finais introduzem matrizes particionadas e complemento de Schur, preparando estruturas que serão utilizadas posteriormente na formulação de resultados multivariados.

### Convenções matriciais

As convenções gerais apresentadas no capítulo anterior permanecem válidas. Neste capítulo, serão utilizadas também as seguintes convenções:

- $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$  e  $\mathbf{C}$  representam matrizes gerais;
- $\mathbf{X}$  representa preferencialmente uma matriz de dados;
- $\mathbf{x}$ ,  $\mathbf{y}$  e  $\mathbf{b}$  representam vetores-coluna;
- $a_{ij}$  representa o elemento localizado na linha  $i$  e na coluna  $j$  de  $\mathbf{A}$ ;
- $\mathbf{A}_{n \times p}$  ou  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$  indica que  $\mathbf{A}$  possui  $n$  linhas e  $p$  colunas;
- $\mathbf{A}^\top$  representa a transposta de  $\mathbf{A}$ ;
- $\mathbf{A}^{-1}$  representa a inversa de  $\mathbf{A}$ , quando ela existe;
- $\mathbf{A}^+$  representa a pseudoinversa de Moore–Penrose;
- $\mathbf{I}_k$  representa a matriz identidade de ordem  $k$ ;
- $\mathbf{0}_{n \times p}$  representa a matriz nula de dimensão  $n \times p$ ;
- $\det(\mathbf{A})$  representa o determinante de uma matriz quadrada;
- $\text{tr}(\mathbf{A})$  representa o traço de uma matriz quadrada;
- $\text{posto}(\mathbf{A})$  representa o posto de  $\mathbf{A}$ .

Quando as linhas ou colunas de uma matriz forem consideradas individualmente, serão mantidas as convenções estabelecidas no capítulo anterior. Em particular,  $\mathbf{a}_i^\top$  representa,

de forma abreviada, a  $i$ -ésima linha de  $\mathbf{A}$ , enquanto  $\mathbf{a}_{.j}$  representa sua  $j$ -ésima coluna. As condições de existência e as propriedades de cada operação serão apresentadas nas seções correspondentes.

## 2.1 Operações matriciais fundamentais

As dimensões das matrizes determinam quais operações podem ser realizadas. A igualdade, a soma, a subtração e a multiplicação por escalar atuam sobre elementos correspondentes. O produto matricial combina linhas da primeira matriz com colunas da segunda.

**Definição 2.1** (Igualdade entre matrizes). Sejam  $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times p}$  e  $\mathbf{B} = (b_{ij})_{r \times s}$ . As matrizes  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{B}$  são iguais quando possuem as mesmas dimensões e elementos correspondentes iguais:

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} \iff n = r, \quad p = s \quad \text{e} \quad a_{ij} = b_{ij}$$

para  $i = 1, \dots, n$  e  $j = 1, \dots, p$ .

Assim,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

mas

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

A posição de cada elemento faz parte da estrutura da matriz.

### 2.1.1 Soma e subtração de matrizes

**Definição 2.2** (Soma e subtração de matrizes). Sejam  $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times p}$  e  $\mathbf{B} = (b_{ij})_{n \times p}$ . A soma e a subtração são definidas por

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (a_{ij} + b_{ij})_{n \times p}$$

e

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = (a_{ij} - b_{ij})_{n \times p}.$$

As duas operações exigem que as matrizes possuam as mesmas dimensões.

**Exemplo 2.1** (Soma e subtração de matrizes). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

A soma é

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1+4 & 2+(-2) \\ -1+2 & 3+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

A subtração é

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1-4 & 2-(-2) \\ -1-2 & 3-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}.$$

**Proposição 2.1** (Propriedades da adição matricial). *Sejam*

$$\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

*A adição de matrizes satisfaz as seguintes propriedades:*

**1. Comutatividade**

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}.$$

**2. Associatividade**

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}).$$

**3. Existência do elemento neutro**

$$\mathbf{A} + \mathbf{0}_{n \times p} = \mathbf{A},$$

em que  $\mathbf{0}_{n \times p}$  é o elemento neutro de dimensão  $n \times p$ :

$$\mathbf{0}_{n \times p} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

*4. Existência do elemento oposto*

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}_{n \times p}.$$

**Definição 2.3** (Multiplicação de matriz por escalar). Seja  $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times p}$  e seja  $\alpha \in \mathbb{R}$ . A multiplicação de  $\mathbf{A}$  por  $\alpha$  é definida por

$$\alpha \mathbf{A} = (\alpha a_{ij})_{n \times p}.$$

Cada elemento da matriz é multiplicado pelo mesmo escalar.

**Exemplo 2.2** (Multiplicação de matriz por escalar). Para

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

e  $\alpha = -2$ , tem-se

$$-2\mathbf{A} = -2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}.$$

**Proposição 2.2** (Propriedades da multiplicação por escalar). *Sejam  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$  e  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . A multiplicação de uma matriz por um escalar satisfaz as seguintes propriedades:*

*1. Distributividade em relação à adição de matrizes*

$$\alpha(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \alpha\mathbf{A} + \alpha\mathbf{B}.$$

*2. Distributividade em relação à adição de escalares*

$$(\alpha + \beta)\mathbf{A} = \alpha\mathbf{A} + \beta\mathbf{A}.$$

*3. Associatividade da multiplicação por escalares*

$$\alpha(\beta\mathbf{A}) = (\alpha\beta)\mathbf{A}.$$

#### 4. *Elemento neutro da multiplicação escalar*

$$1\mathbf{A} = \mathbf{A}.$$

A adição de matrizes e a multiplicação por escalar preservam as dimensões das matrizes envolvidas. O produto matricial, apresentado a seguir, utiliza uma regra diferente e pode produzir uma matriz com dimensões distintas das matrizes multiplicadas.

##### 2.1.2 Produto matriz-vetor

O produto de uma matriz por um vetor é definido quando o número de colunas da matriz coincide com o número de componentes do vetor.

Para

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad \text{e} \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p,$$

cada linha de  $\mathbf{A}$  pode ser associada a um produto interno com  $\mathbf{x}$ . A definição a seguir reúne esses produtos internos em um vetor de  $\mathbb{R}^n$ .

**Definição 2.4** (Produto matriz-vetor). Sejam

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

e

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p.$$

O produto de  $\mathbf{A}$  por  $\mathbf{x}$  é o vetor

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{x} \rangle \\ \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{x} \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{a}_n, \mathbf{x} \rangle \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Escrevendo

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times p}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix},$$

cada produto interno pode ser escrito como

$$\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{x} \rangle = \sum_{j=1}^p a_{ij} x_j.$$

Portanto,

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^p a_{1j} x_j \\ \sum_{j=1}^p a_{2j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^p a_{nj} x_j \end{bmatrix}.$$

A componente  $i$  do vetor resultante é, portanto,

$$(\mathbf{Ax})_i = \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} = \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{x} \rangle = \sum_{j=1}^p a_{ij} x_j.$$

O mesmo produto admite outra interpretação. Escrevendo  $\mathbf{A}$  por suas colunas,

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_p],$$

tem-se

$$\mathbf{Ax} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_p \mathbf{a}_p.$$

Assim, o produto matriz-vetor possui duas interpretações complementares:

- **pelas linhas**, cada componente de  $\mathbf{Ax}$  é um produto interno entre o vetor associado a uma linha de  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{x}$ ;
- **pelas colunas**,  $\mathbf{Ax}$  é uma combinação linear das colunas de  $\mathbf{A}$ , com coeficientes dados pelas componentes de  $\mathbf{x}$ .

**Exemplo 2.3** (Produto de uma matriz por um vetor). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Pelas linhas de  $\mathbf{A}$ ,

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} (1)(2) + (2)(-1) \\ (-1)(2) + (3)(-1) \\ (2)(2) + (0)(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Cada componente é um produto interno entre  $\mathbf{x}$  e uma linha de  $\mathbf{A}$ .

Pelas colunas,

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \mathbf{Ax} &= 2\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 \\ &= 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

As duas formas de cálculo produzem o mesmo vetor: pelas linhas, o resultado é obtido por produtos internos; pelas colunas, por uma combinação linear.

### 2.1.3 Produto entre matrizes

O produto entre matrizes estende o produto matriz-vetor. Se as colunas de uma matriz  $\mathbf{B}$  são

$$\mathbf{b}_{.1}, \mathbf{b}_{.2}, \dots, \mathbf{b}_{.r},$$

então multiplicar  $\mathbf{A}$  por  $\mathbf{B}$  equivale a multiplicar  $\mathbf{A}$  por cada uma dessas colunas:

$$\mathbf{AB} = \mathbf{A} [\mathbf{b}_{.1} \ \mathbf{b}_{.2} \ \dots \ \mathbf{b}_{.r}] = [\mathbf{Ab}_{.1} \ \mathbf{Ab}_{.2} \ \dots \ \mathbf{Ab}_{.r}].$$

Como cada componente de  $\mathbf{Ab}_{.j}$  é um produto interno entre uma linha de  $\mathbf{A}$  e a coluna  $\mathbf{b}_{.j}$ , cada elemento do produto matricial também pode ser interpretado como um produto interno.

**Definição 2.5** (Produto entre matrizes). Sejam

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

e

$$\mathbf{B} = [\mathbf{b}_{.1} \ \mathbf{b}_{.2} \ \dots \ \mathbf{b}_{.r}] \in \mathbb{R}^{p \times r}.$$

O produto de  $\mathbf{A}$  por  $\mathbf{B}$  é a matriz

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \mathbf{b}_{.1} & \mathbf{a}_1^\top \mathbf{b}_{.2} & \dots & \mathbf{a}_1^\top \mathbf{b}_{.r} \\ \mathbf{a}_2^\top \mathbf{b}_{.1} & \mathbf{a}_2^\top \mathbf{b}_{.2} & \dots & \mathbf{a}_2^\top \mathbf{b}_{.r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \mathbf{b}_{.1} & \mathbf{a}_n^\top \mathbf{b}_{.2} & \dots & \mathbf{a}_n^\top \mathbf{b}_{.r} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times r}.$$

Portanto, o elemento localizado na linha  $i$  e na coluna  $j$  do produto é

$$(\mathbf{AB})_{ij} = \mathbf{a}_i^\top \mathbf{b}_{.j} = \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{b}_{.j} \rangle.$$

Escrevendo

$$\mathbf{A} = (a_{ik})_{n \times p}$$



e

$$\mathbf{B} = (b_{kj})_{p \times r},$$

o mesmo elemento pode ser expresso como

$$(\mathbf{AB})_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj},$$

para

$$i = 1, \dots, n \quad \text{e} \quad j = 1, \dots, r.$$

Assim, o produto matricial admite duas leituras complementares:

- **pelos elementos**, cada entrada de  $\mathbf{AB}$  é o produto interno entre uma linha de  $\mathbf{A}$  e uma coluna de  $\mathbf{B}$ ;
- **pelas colunas**, cada coluna de  $\mathbf{AB}$  é obtida multiplicando  $\mathbf{A}$  pela coluna correspondente de  $\mathbf{B}$ .

#### Compatibilidade dimensional

O produto  $\mathbf{AB}$  é definido somente quando o número de colunas de  $\mathbf{A}$  coincide com o número de linhas de  $\mathbf{B}$ :

$$\underset{n \times p}{\mathbf{A}} \underset{p \times r}{\mathbf{B}} = \underset{n \times r}{\mathbf{AB}}.$$

As dimensões internas devem coincidir. As dimensões externas determinam a dimensão do resultado.

**Exemplo 2.4** (Produto entre duas matrizes). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

e

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

Como o número de colunas de  $\mathbf{A}$  coincide com o número de linhas de  $\mathbf{B}$ , o produto está definido e possui dimensão  $2 \times 2$ .

Cada elemento é obtido pelo produto interno entre uma linha de  $\mathbf{A}$  e uma coluna de  $\mathbf{B}$ . Por exemplo,

$$(\mathbf{AB})_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = (1)(2) + (2)(0) + (0)(4) = 2,$$

enquanto

$$(\mathbf{AB})_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = (1)(1) + (2)(-1) + (0)(2) = -1.$$

Procedendo da mesma forma para os demais elementos,

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

### **i** Produto interno e produto externo como produtos matriciais

As operações entre vetores apresentadas anteriormente também podem ser expressas por meio do produto matricial.

Para  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ , o **produto interno** pode ser escrito como

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}.$$

Como

$$\mathbf{x}^\top \in \mathbb{R}^{1 \times p} \quad \text{e} \quad \mathbf{y} \in \mathbb{R}^{p \times 1},$$

o produto possui dimensão  $1 \times 1$  e corresponde a um escalar:

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_p y_p.$$

De forma semelhante, para

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \quad \text{e} \quad \mathbf{y} \in \mathbb{R}^q,$$

o **produto externo**, anteriormente denotado por

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}),$$

pode ser escrito como

$$\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{xy}^\top.$$

Nesse caso,

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{p \times 1} \quad \text{e} \quad \mathbf{y}^\top \in \mathbb{R}^{1 \times q},$$

de modo que

$$\mathbf{xy}^\top \in \mathbb{R}^{p \times q}.$$

Portanto, a ordem e a orientação dos vetores determinam objetos diferentes:

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{y} \text{ é um escalar}$$

enquanto

$$\mathbf{xy}^\top \text{ é uma matriz.}$$

**Exemplo 2.5** (Produtos envolvendo uma matriz de dados). Considere a matriz de dados

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \\ 6 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}.$$

As quatro linhas correspondem às observações, e as três colunas correspondem às variáveis.

A matriz

$$\mathbf{X}^\top = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 & 4 \\ 1 & 5 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$$

é obtida escrevendo as colunas de  $\mathbf{X}$  como linhas. A operação de transposição e suas propriedades serão formalizadas adiante.

Considere ainda

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

O produto

$$\mathbf{X}\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 0 \\ 11 \\ 9 \\ 5 \end{bmatrix}$$

pode ser escrito, em termos das colunas de  $\mathbf{X}$ , como

$$\mathbf{X}\mathbf{a} = \mathbf{x}_{\cdot 1} + 2\mathbf{x}_{\cdot 2} - \mathbf{x}_{\cdot 3}.$$

Portanto, o vetor resultante contém os valores da nova variável formada pela combinação linear

$$X_1 + 2X_2 - X_3.$$

Considere agora o produto

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 65 & 41 & 40 \\ 41 & 39 & 31 \\ 40 & 31 & 46 \end{bmatrix}.$$

Esse produto possui dimensão  $3 \times 3$ . Cada elemento é o produto interno entre duas colunas de  $\mathbf{X}$  e, portanto, relaciona duas variáveis. Em geral,

$$(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})_{jk} = \langle \mathbf{x}_{\cdot j}, \mathbf{x}_{\cdot k} \rangle.$$

Por exemplo,

$$(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})_{12} = \langle \mathbf{x}_{\cdot 1}, \mathbf{x}_{\cdot 2} \rangle = 41.$$

Por outro lado,

$$\mathbf{X}\mathbf{X}^\top = \begin{bmatrix} 21 & 19 & 18 & 31 \\ 19 & 38 & 30 & 37 \\ 18 & 30 & 41 & 35 \\ 31 & 37 & 35 & 50 \end{bmatrix}$$

possui dimensão  $4 \times 4$ . Cada elemento é o produto interno entre duas linhas de  $\mathbf{X}$  e, portanto, relaciona duas observações. Em geral,

$$(\mathbf{X}\mathbf{X}^\top)_{ih} = \langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_h \rangle.$$

Por exemplo,

$$(\mathbf{X}\mathbf{X}^\top)_{12} = \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \rangle = 19.$$

Assim, a mesma matriz de dados gera dois produtos com interpretações distintas:

- $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$  relaciona as variáveis;
- $\mathbf{X}\mathbf{X}^\top$  relaciona as observações.

Esses produtos serão retomados no estudo de matrizes de Gram, produtos cruzados, covariâncias e decomposição em valores singulares.

### 2.1.4 Propriedades do produto matricial

**Proposição 2.3** (Propriedades do produto matricial). *Para matrizes com dimensões compatíveis, o produto matricial satisfaz as seguintes propriedades:*

*1. Associatividade*

$$(\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{C}).$$

*2. Distributividade à esquerda*

$$\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A}\mathbf{B} + \mathbf{A}\mathbf{C}.$$

*3. Distributividade à direita*

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{C} + \mathbf{B}\mathbf{C}.$$

*4. Compatibilidade com a multiplicação por escalar*

Para  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,

$$(\alpha\mathbf{A})\mathbf{B} = \alpha(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \mathbf{A}(\alpha\mathbf{B}).$$

O produto matricial, em geral, **não é comutativo**. Mesmo quando  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  e  $\mathbf{B}\mathbf{A}$  estão ambos definidos e possuem a mesma dimensão, pode ocorrer

$$\mathbf{A}\mathbf{B} \neq \mathbf{B}\mathbf{A}.$$

**Exemplo 2.6** (Não comutatividade do produto matricial). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Tem-se

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

enquanto

$$\mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}.$$

## 2.2 Transposição, simetria e traço

A transposição troca as linhas de uma matriz por suas colunas. Essa operação permite reorganizar produtos matriciais e definir matrizes simétricas.

### 2.2.1 Transposição

**Definição 2.6** (Matriz transposta). Seja  $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times p} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ . A **transposta** de  $\mathbf{A}$  é a matriz

$$\mathbf{A}^\top = (a_{ji})_{p \times n} \in \mathbb{R}^{p \times n}.$$

O elemento que ocupa a linha  $i$  e a coluna  $j$  de  $\mathbf{A}$  passa a ocupar a linha  $j$  e a coluna  $i$  de  $\mathbf{A}^\top$ .

**Exemplo 2.7** (Transposição de uma matriz). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Sua transposta é

$$\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

Para uma matriz de dados

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

a transposta possui dimensão

$$\mathbf{X}^\top \in \mathbb{R}^{p \times n}.$$

As linhas de  $\mathbf{X}$  tornam-se as colunas de  $\mathbf{X}^\top$ , e as colunas de  $\mathbf{X}$  tornam-se suas linhas.

**Proposição 2.4** (Propriedades da transposição). *Sejam  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{B}$  matrizes com dimensões compatíveis e seja  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Então,*

1.  $(\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}$ ,
2.  $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$ ,
3.  $(\alpha \mathbf{A})^\top = \alpha \mathbf{A}^\top$  e
4.  $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$ .
5. Em particular, para vetores  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  e  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^q$ ,  $(\mathbf{xy}^\top)^\top = \mathbf{yx}^\top$ .

A última propriedade mostra que a transposição de um produto inverte a ordem dos fatores. Em particular, ela será útil para reconhecer estruturas simétricas construídas a partir de produtos externos.

**Exemplo 2.8** (Transposta de um produto). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

O produto é

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 2 & 4 \end{bmatrix},$$

de modo que

$$(\mathbf{AB})^\top = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}.$$

Por outro lado,

$$\mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top.$$

### 2.2.2 Matrizes simétricas

A simetria compara uma matriz quadrada com sua transposta.

**Definição 2.7** (Matriz simétrica). Uma matriz  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  é **simétrica** quando

$$\mathbf{A}^\top = \mathbf{A}.$$

Em termos dos elementos,

$$a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, \dots, n.$$



Em uma matriz simétrica, os elementos situados em posições opostas em relação à diagonal principal são iguais.

**Exemplo 2.9** (Matriz simétrica). A matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 4 & 2 \\ -3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

é simétrica, pois

$$\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 4 & 2 \\ -3 & 2 & 5 \end{bmatrix} = \mathbf{A}.$$

A soma de matrizes simétricas de mesma dimensão é simétrica. Se  $\mathbf{A}$  é simétrica e  $\alpha \in \mathbb{R}$ , então  $\alpha\mathbf{A}$  também é simétrica.

Um caso particularmente importante é obtido pelo produto externo de um vetor consigo mesmo. Para  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ , tem-se

$$(\mathbf{x}\mathbf{x}^\top)^\top = \mathbf{x}\mathbf{x}^\top.$$

Portanto,

$$\mathbf{x}\mathbf{x}^\top$$

é uma matriz simétrica.

O produto de duas matrizes simétricas não é necessariamente simétrico. Para matrizes simétricas  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{B}$ ,

$$(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{BA}.$$

Portanto,  $\mathbf{AB}$  é simétrica quando

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA}.$$

**Definição 2.8** (Matriz antissimétrica). Uma matriz  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  é **antissimétrica** quando

$$\mathbf{A}^\top = -\mathbf{A}.$$

Os elementos da diagonal principal de uma matriz antissimétrica são iguais a zero. De fato,

$$a_{ii} = -a_{ii}$$

implica

$$a_{ii} = 0.$$

Uma matriz antissimétrica possui a forma

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

### Aprofundamento

A decomposição seguinte mostra que toda matriz quadrada pode ser separada em uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. A parte simétrica será particularmente importante no estudo das formas quadráticas.

**Teorema 2.1** (Decomposição em partes simétrica e antissimétrica). *Toda matriz quadrada  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  pode ser escrita de maneira única como*

$$\mathbf{A} = \mathbf{S} + \mathbf{K},$$

em que

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2}$$

é simétrica e

$$\mathbf{K} = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2}$$

é antissimétrica. (Horn; Johnson, 2013)

*Comprovação.* A transposta de  $\mathbf{S}$  é

$$\mathbf{S}^\top = \left( \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2} \right)^\top = \frac{\mathbf{A}^\top + \mathbf{A}}{2} = \mathbf{S}.$$

Logo,  $\mathbf{S}$  é simétrica.

Para  $\mathbf{K}$ ,

$$\mathbf{K}^\top = \left( \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2} \right)^\top = \frac{\mathbf{A}^\top - \mathbf{A}}{2} = -\mathbf{K}.$$

Logo,  $\mathbf{K}$  é antissimétrica. Além disso,

$$\mathbf{S} + \mathbf{K} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2} + \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2} = \mathbf{A}.$$

Para verificar a unicidade, suponha que

$$\mathbf{A} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{K}_1,$$

em que  $\mathbf{S}_1$  é simétrica e  $\mathbf{K}_1$  é antissimétrica. Transpondo essa igualdade,

$$\mathbf{A}^\top = \mathbf{S}_1 - \mathbf{K}_1.$$

Somando e subtraindo as duas expressões, obtém-se

$$\mathbf{S}_1 = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2}$$

e

$$\mathbf{K}_1 = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2}.$$

Portanto, as partes simétrica e antissimétrica são únicas. □

**Exemplo 2.10** (Partes simétrica e antissimétrica). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

A parte simétrica é

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2} = \frac{1}{2} \left( \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

A parte antissimétrica é

$$\mathbf{K} = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2} = \frac{1}{2} \left( \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}.$$

As matrizes de covariâncias também pertencem à classe das matrizes simétricas.

### 2.2.3 Traço

O traço reúne os elementos da diagonal principal de uma matriz quadrada. Apesar de sua definição simples, essa operação permite representar de forma compacta somas de quadrados, produtos internos, formas quadráticas e diversas expressões matriciais utilizadas em Estatística Multivariada.

**Definição 2.9** (Traço de uma matriz). Seja  $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . O **traço** de  $\mathbf{A}$  é definido por

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

**Exemplo 2.11** (Cálculo do traço). Para  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & -3 \end{bmatrix}$ , tem-se

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = 2 + 4 - 3 = 3.$$

**Proposição 2.5** (Propriedades básicas do traço). *Sejam  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  e  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Então,*

1. *Linearidade:*

$$\text{tr}(\alpha \mathbf{A} + \beta \mathbf{B}) = \alpha \text{tr}(\mathbf{A}) + \beta \text{tr}(\mathbf{B}).$$

2. *Invariância à transposição:*

$$\text{tr}(\mathbf{A}^\top) = \text{tr}(\mathbf{A}).$$

3. *Traço da matriz identidade:*

$$\text{tr}(\mathbf{I}_n) = n.$$

Consequentemente,

$$\text{tr}(\alpha \mathbf{I}_n) = \alpha n.$$

4. *Propriedade cíclica:* se  $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times p}$  e  $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{p \times n}$ , então

$$\text{tr}(\mathbf{CD}) = \text{tr}(\mathbf{DC}).$$

(Harville, 1997)

A primeira propriedade mostra que o traço é uma operação linear. A segunda decorre do fato de que a transposição não modifica os elementos da diagonal principal. A quarta permite reorganizar produtos matriciais dentro do traço, desde que seja preservada a ordem cíclica dos fatores.

A propriedade cíclica pode ser demonstrada diretamente a partir da definição do produto matricial.

*Comprovação.* Como  $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times p}$  e  $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{p \times n}$ ,

$$\text{tr}(\mathbf{CD}) = \sum_{i=1}^n (\mathbf{CD})_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p c_{ij} d_{ji}.$$

Trocando a ordem das somas,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p c_{ij} d_{ji} = \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^n d_{ji} c_{ij} = \text{tr}(\mathbf{DC}).$$

□

**Proposição 2.6** (Ciclicidade para vários fatores). *Para matrizes com dimensões compatíveis, os fatores de um produto podem ser deslocados ciclicamente dentro do traço. Por exemplo,*

$$\text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{BCA}) = \text{tr}(\mathbf{CAB}).$$

A propriedade é **cíclica**. Portanto, a ordem relativa dos fatores é preservada. Em geral,

$$\text{tr}(\mathbf{ABC}) \neq \text{tr}(\mathbf{ACB}).$$

**Proposição 2.7** (Traço, produto interno e produto externo). *Para  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ ,*

$$\text{tr}(\mathbf{xy}^\top) = \mathbf{y}^\top \mathbf{x} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

*Como  $\mathbf{xy}^\top = \text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ , também podemos escrever*

$$\text{tr}[\text{ext}(\mathbf{x}, \mathbf{y})] = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

*Em particular,*

$$\text{tr}(\mathbf{xx}^\top) = \mathbf{x}^\top \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2.$$

Essa propriedade estabelece uma ligação direta entre o traço e as operações vetoriais introduzidas anteriormente.

**Proposição 2.8** (Traço de produtos matriciais). *Para  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ,*

$$\text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{B}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{ij} b_{ij}.$$

*Consequentemente,*

$$\text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{ij}^2.$$

*Pela propriedade cíclica,*

$$\text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{A} \mathbf{A}^\top).$$

Portanto, o traço permite representar a soma dos quadrados de todos os elementos de uma matriz. Essa expressão será retomada posteriormente no estudo da norma de Frobenius, de matrizes de produtos cruzados e de decomposições matriciais.

**Exemplo 2.12** (Traço de produtos matriciais). Considere  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$  e  $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ .

Os produtos são

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 0 & 9 \\ -9 & 9 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{BA} = \begin{bmatrix} -1 & 13 \\ -7 & 10 \end{bmatrix}.$$

Embora

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA},$$

seus traços são iguais:

$$\text{tr}(\mathbf{AB}) = 0 + 9 = 9$$

e

$$\text{tr}(\mathbf{BA}) = -1 + 10 = 9.$$

O traço será utilizado repetidamente na representação de somas de quadrados, produtos cruzados, variâncias totais, formas quadráticas e expressões de verossimilhança. Sua relação com os autovalores será estabelecida no capítulo sobre decomposição espectral.

## 2.3 Identidade, inversa, determinante, posto e sistemas lineares

As matrizes identidade e inversa permitem representar operações que preservam ou recuperam vetores. A existência da inversa está relacionada ao determinante, ao posto e às soluções de sistemas lineares.

### 2.3.1 Matriz identidade

**Definição 2.10** (Matriz identidade). A **matriz identidade** de ordem  $n$  é a matriz quadrada

$$\mathbf{I}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Seus elementos podem ser representados pelo **delta de Kronecker**,

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

de modo que

$$(\mathbf{I}_n)_{ij} = \delta_{ij}.$$

O delta de Kronecker será utilizado posteriormente para representar de forma compacta relações de ortogonalidade e ortonormalidade.

A matriz identidade é o elemento neutro do produto matricial. Para

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

tem-se

$$\mathbf{I}_n \mathbf{A} = \mathbf{A}$$

e

$$\mathbf{A} \mathbf{I}_p = \mathbf{A}.$$



Para um vetor  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ ,

$$\mathbf{I}_p \mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

**Exemplo 2.13** (Produto pela matriz identidade). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Então,

$$\mathbf{I}_2 \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{A} \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

### 2.3.2 Matriz inversa

**Definição 2.11** (Matriz inversa). Uma matriz quadrada  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  é **invertível** quando existe uma matriz

$$\mathbf{A}^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

tal que

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{I}_n.$$

A matriz  $\mathbf{A}^{-1}$  é denominada **inversa** de  $\mathbf{A}$ .

Uma matriz que não possui inversa é denominada **singular**.

**Teorema 2.2** (Unicidade da matriz inversa). *Se uma matriz possui inversa, essa inversa é única.*

*Comprovação.* Suponha que  $\mathbf{B}$  e  $\mathbf{C}$  sejam inversas de  $\mathbf{A}$ . Então,

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}_n$$

e

$$\mathbf{AC} = \mathbf{CA} = \mathbf{I}_n.$$

Assim,

$$\mathbf{B} = \mathbf{BI}_n = \mathbf{B}(\mathbf{AC}) = (\mathbf{BA})\mathbf{C} = \mathbf{I}_n\mathbf{C} = \mathbf{C}.$$

Logo, a inversa é única. □

**Exemplo 2.14** (Verificação de uma matriz inversa). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calculando os produtos,

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_2$$

e

$$\mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_2.$$

Portanto,

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Além disso,

$$(\mathbf{A}^\top)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^\top$$

e, para  $\alpha \neq 0$ ,

$$(\alpha \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{\alpha} \mathbf{A}^{-1}.$$

**Teorema 2.3** (Inversa de um produto). *Se  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{B}$  são matrizes invertíveis de ordem  $n$ , então  $\mathbf{AB}$  é invertível e*

$$(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1}.$$

*Comprovação.* Tem-se

$$(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{A}(\mathbf{BB}^{-1})\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{AI}_n \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}_n.$$

Também,

$$(\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1})(\mathbf{AB}) = \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{I}_n \mathbf{B} = \mathbf{I}_n.$$

Logo,

$$(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1}.$$

□

A existência da inversa ainda não foi caracterizada. Essa condição será expressa por meio do determinante e do posto.

### 2.3.3 Determinante

O determinante associa uma matriz quadrada a um número real. Seu valor permite verificar a invertibilidade da matriz e quantificar alterações de área ou volume.

**Definição 2.12** (Menor e cofator). Seja

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}.$$

O **menor**  $M_{ij}$  é o determinante da matriz obtida pela retirada da linha  $i$  e da coluna  $j$  de  $\mathbf{A}$ .

O **cofator** do elemento  $a_{ij}$  é

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

**Definição 2.13** (Determinante). Para uma matriz de ordem um,

$$\mathbf{A} = [a_{11}],$$

define-se

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}.$$

Para  $n \geq 2$ , seja

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

O determinante de  $\mathbf{A}$  pode ser calculado recursivamente pela expansão em cofatores de qualquer linha fixa  $i$ :

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}.$$

Também pode ser calculado pela expansão de qualquer coluna fixa  $j$ :

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij}.$$

Em cada termo, o cofator  $C_{ij}$  envolve o determinante de uma matriz de ordem  $n - 1$ . O caso de ordem um encerra a definição recursiva.

Para uma matriz de ordem dois,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\det(\mathbf{A}) = ad - bc.$$

**Exemplo 2.15** (Determinante de uma matriz de ordem dois). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

O determinante é

$$\det(\mathbf{A}) = 3(4) - 1(2) = 10.$$

Para uma matriz de ordem três, a expansão pela primeira linha é

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}.$$

**Exemplo 2.16** (Determinante de uma matriz de ordem três). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Expandindo pela primeira linha,

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

Portanto,

$$\det(\mathbf{A}) = 1(1 - 8) - 2(3 - 0) = -13.$$

### Cálculo de determinantes

A expansão por cofatores é útil para compreender a definição do determinante e rea-

lizar cálculos de pequena ordem. Para matrizes maiores, a expansão direta se torna pouco eficiente. Nesses casos, o determinante costuma ser obtido por eliminação ou por decomposições matriciais, que serão estudadas posteriormente.

**Proposição 2.9** (Propriedades do determinante). *Para matrizes quadradas de ordem  $n$ :*

1.

$$\det(\mathbf{I}_n) = 1.$$

2.

$$\det(\mathbf{A}^\top) = \det(\mathbf{A}).$$

3.

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B}).$$

4. Para  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,

$$\det(\alpha \mathbf{A}) = \alpha^n \det(\mathbf{A}).$$

5. Se  $\mathbf{A}$  é triangular, então

$$\det(\mathbf{A}) = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

As operações elementares sobre as linhas modificam o determinante de maneira específica:

- a troca de duas linhas multiplica o determinante por  $-1$ ;
- a multiplicação de uma linha por  $\alpha$  multiplica o determinante por  $\alpha$ ;
- a adição de um múltiplo de uma linha a outra linha não altera o determinante.

Se as linhas de  $\mathbf{A}$  são linearmente dependentes, então

$$\det(\mathbf{A}) = 0.$$

A mesma conclusão vale quando as colunas são linearmente dependentes. A ocorrência de duas linhas ou duas colunas iguais é um caso particular dessa propriedade.

**Teorema 2.4** (Determinante e invertibilidade). *Para*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

*as afirmações seguintes são equivalentes:*

$$\mathbf{A} \text{ é invertível} \iff \det(\mathbf{A}) \neq 0.$$

Quando  $\mathbf{A}$  é invertível,

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}.$$

De fato,

$$\det(\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{I}_n) = 1,$$

e, pela propriedade multiplicativa,

$$\det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{A}^{-1}) = 1.$$

**Exemplo 2.17** (Verificação da invertibilidade). Para

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\det(\mathbf{A}) = 2(1) - 1(1) = 1.$$

Como

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0,$$

a matriz é invertível.

Considere agora

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Nesse caso,

$$\det(\mathbf{B}) = 2(2) - 4(1) = 0.$$

A matriz  $\mathbf{B}$  é singular.

### 2.3.4 Interpretação geométrica do determinante

Considere uma matriz quadrada

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

As colunas de  $\mathbf{A}$  podem ser interpretadas como vetores em  $\mathbb{R}^n$ . Esses vetores determinam uma região geométrica cuja medida depende de suas direções e comprimentos.

O valor absoluto do determinante,

$$|\det(\mathbf{A})|,$$

corresponde à medida do paralelepípedo determinado pelas colunas de  $\mathbf{A}$ :

- em uma dimensão, corresponde a um comprimento;
- em duas dimensões, corresponde à área do paralelogramo determinado pelas duas colunas;
- em três dimensões, corresponde ao volume do paralelepípedo determinado pelas três colunas;
- em  $\mathbb{R}^n$ , corresponde ao volume  $n$ -dimensional determinado pelas  $n$  colunas.

Como a matriz identidade  $\mathbf{I}_n$  possui determinante igual a 1, suas colunas determinam uma região de volume unitário. Assim,  $|\det(\mathbf{A})|$  também pode ser interpretado como o fator pelo qual esse volume unitário é ampliado ou reduzido quando os vetores canônicos são substituídos pelas colunas de  $\mathbf{A}$ .

O sinal do determinante acrescenta informação sobre a orientação dos vetores:

- se  $\det(\mathbf{A}) > 0$ , a orientação é preservada;
- se  $\det(\mathbf{A}) < 0$ , a orientação é invertida;
- se  $\det(\mathbf{A}) = 0$ , o volume  $n$ -dimensional é nulo.






Figura 2.1: Interpretação geométrica do determinante em duas dimensões.

No último caso, as colunas não determinam todas as direções necessárias para formar um volume  $n$ -dimensional. Em  $\mathbb{R}^2$ , por exemplo, duas colunas alinhadas formam uma região de área zero; em  $\mathbb{R}^3$ , três colunas contidas em um mesmo plano formam uma região de volume zero.

A Figura 2.1 apresenta essas situações em  $\mathbb{R}^2$ .

Na primeira situação,  $\det(\mathbf{A}) = 2$ : a área é multiplicada por 2 e a orientação é preservada. Na segunda,  $\det(\mathbf{A}) = 0$ : a região bidimensional é comprimida em uma reta. Na terceira,  $\det(\mathbf{A}) = -2$ : a área também é multiplicada por 2, mas a orientação é invertida.

O determinante informa se uma matriz quadrada é invertível. O posto amplia essa análise para matrizes quadradas ou retangulares.

### 2.3.5 Posto

O posto mede a dimensão da informação linearmente independente representada por uma matriz. Ele identifica o número máximo de direções que não podem ser obtidas como combinações lineares umas das outras.

**Definição 2.14** (Posto de uma matriz). Seja

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

O **posto** de  $\mathbf{A}$ , denotado por

$$\text{posto}(\mathbf{A}),$$

é a maior ordem de uma submatriz quadrada de  $\mathbf{A}$  com determinante diferente de zero.

Equivalentemente, o posto é:

- o número máximo de colunas linearmente independentes de  $\mathbf{A}$ ;
- o número máximo de linhas linearmente independentes de  $\mathbf{A}$ .

Esses dois números são sempre iguais. A interpretação do posto por meio dos espaços gerados pelas linhas e pelas colunas será desenvolvida no próximo capítulo.

O posto satisfaz

$$0 \leq \text{posto}(\mathbf{A}) \leq \min(n, p).$$

Uma matriz possui **posto completo** quando

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = \min(n, p).$$

Um caso importante é o produto externo. Se

$$\mathbf{x} \neq \mathbf{0} \quad \text{e} \quad \mathbf{y} \neq \mathbf{0},$$

então

$$\text{posto}(\mathbf{xy}^\top) = 1.$$

De fato, todas as colunas de  $\mathbf{xy}^\top$  são múltiplos escalares de  $\mathbf{x}$  e, como  $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ , pelo menos uma dessas colunas é não nula.

Essa estrutura será importante posteriormente nas decomposições matriciais, em que uma matriz poderá ser representada como soma de parcelas de posto 1.

Para uma matriz quadrada de ordem  $n$ ,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = n$$

equivale à existência de sua inversa.

**Teorema 2.5** (Condições equivalentes de invertibilidade). *Para*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

*as afirmações seguintes são equivalentes:*

$\mathbf{A}$  é invertível,

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0$$

e

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = n.$$

(Meyer, 2023)

**Exemplo 2.18** (Posto de matrizes). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\det(\mathbf{A}) = 1(4) - 2(3) = -2,$$

tem-se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = 2.$$

Considere agora

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\det(\mathbf{B}) = 0$$

e  $\mathbf{B} \neq \mathbf{0}$ ,

$$\text{posto}(\mathbf{B}) = 1.$$

A segunda linha de  $\mathbf{B}$  é o dobro da primeira, de modo que uma delas não acrescenta informação linear.

Para uma matriz de dados

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

tem-se

$$\text{posto}(\mathbf{X}) \leq \min(n, p).$$

Quando

$$\text{posto}(\mathbf{X}) < p,$$

existe redundância linear entre as variáveis. A interpretação do posto em termos de espaços gerados, independência linear e dimensão será desenvolvida no próximo capítulo.

### 2.3.6 Sistemas lineares

Um sistema de  $n$  equações lineares com  $p$  incógnitas pode ser escrito na forma matricial.

**Definição 2.15** (Sistema linear). Sejam

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$$

e

$$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n.$$

O sistema linear associado é

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}.$$

A matriz  $\mathbf{A}$  contém os coeficientes,  $\mathbf{x}$  contém as incógnitas e  $\mathbf{b}$  contém os termos independentes.

Em componentes, o sistema é

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1p}x_p &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2p}x_p &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{np}x_p &= b_n. \end{aligned}$$

A matriz aumentada do sistema é

$$[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{np} & b_n \end{bmatrix}.$$

**Teorema 2.6** (Existência e quantidade de soluções). *Sejam*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$$

e

$$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n.$$

O sistema

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

possui solução se, e somente se,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = \text{posto}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]).$$

Quando o sistema é consistente:

- a solução é única se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = p;$$

- existem infinitas soluções se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) < p.$$

A Tabela 2.1 resume a classificação das soluções de um sistema linear.

Tabela 2.1: Classificação das soluções de um sistema linear.

| Condição                                                                    | Resultado                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| $\text{posto}(\mathbf{A}) \neq \text{posto}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}])$  | Não existe solução         |
| $\text{posto}(\mathbf{A}) = \text{posto}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]) = p$ | Existe uma única solução   |
| $\text{posto}(\mathbf{A}) = \text{posto}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]) < p$ | Existem infinitas soluções |

**Exemplo 2.19** (Sistema com solução única). Considere

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 5, \\ x_1 + x_2 &= 3. \end{aligned}$$

A forma matricial é

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 1,$$

a matriz de coeficientes é invertível. A solução é

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

**Exemplo 2.20** (Sistemas com infinitas soluções e sem solução). Considere inicialmente o sistema

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 4. \end{aligned}$$

A segunda equação é o dobro da primeira. Portanto,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = \text{posto}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]) = 1 < 2.$$

O sistema possui infinitas soluções, que podem ser escritas como

$$x_1 = 2 - t, \quad x_2 = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Considere agora

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 &= 5. \end{aligned}$$

As linhas da matriz de coeficientes continuam proporcionais, mas os termos independentes não preservam a mesma proporção. Nesse caso,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = 1$$

e

$$\text{posto}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]) = 2.$$

Como os postos são diferentes, o sistema não possui solução.

Para uma matriz quadrada invertível,

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

possui a solução única

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}.$$

### Cálculo da solução

A expressão

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

caracteriza a solução quando  $\mathbf{A}$  é invertível. Em cálculos computacionais, sistemas lineares são resolvidos diretamente, sem calcular explicitamente a matriz inversa.

O número de equações e o número de incógnitas não determinam, isoladamente, a existência ou a quantidade de soluções:

- se  $n > p$ , o sistema é sobredeterminado;
- se  $n < p$ , o sistema é subdeterminado;
- se  $n = p$ , o sistema é quadrado.

A classificação completa depende dos postos de  $\mathbf{A}$  e de  $[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]$ .

### 2.3.7 Aprofundamento: pseudoinversa

#### Leitura de aprofundamento

A pseudoinversa permite estender a resolução de sistemas lineares para matrizes retangulares ou singulares. Sua construção será desenvolvida no capítulo sobre decomposição em valores singulares. Nesta seção, são apresentadas sua definição e suas principais consequências.

**Definição 2.16** (Pseudoinversa de Moore–Penrose). Seja

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

A **pseudoinversa de Moore–Penrose** de  $\mathbf{A}$  é a única matriz

$$\mathbf{A}^+ \in \mathbb{R}^{p \times n}$$

que satisfaz simultaneamente:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^+\mathbf{A} = \mathbf{A},$$

$$\mathbf{A}^+\mathbf{A}\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^+,$$

$$(\mathbf{A}\mathbf{A}^+)^{\top} = \mathbf{A}\mathbf{A}^+$$

e

$$(\mathbf{A}^+\mathbf{A})^{\top} = \mathbf{A}^+\mathbf{A}.$$

(Harville, 1997)

Quando  $\mathbf{A}$  é quadrada e invertível,

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^{-1}.$$

Considere o problema

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$



O vetor

$$\mathbf{x}^+ = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}$$

possui interpretações diferentes conforme a existência e a quantidade de soluções exatas.

Tabela 2.2: Interpretação da solução obtida pela pseudoinversa.

| Situação do sistema                              | Interpretação de $\mathbf{x}^+ = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}$                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O sistema é consistente e possui solução única   | $\mathbf{x}^+$ é a solução exata do sistema                                                                |
| O sistema é consistente e possui várias soluções | $\mathbf{x}^+$ é a solução exata de menor norma euclidiana                                                 |
| O sistema é inconsistente                        | $\mathbf{x}^+$ minimiza $\ \mathbf{Ax} - \mathbf{b}\ $ e possui a menor norma entre todos os minimizadores |

No caso inconsistente,  $\mathbf{x}^+$  resolve o problema de mínimos quadrados

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p} \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|.$$

#### Pseudoinversa e inversa

Em geral,

$$\mathbf{A}^+ \mathbf{A} \neq \mathbf{I}_p$$

e

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^+ \neq \mathbf{I}_n.$$

Portanto, a pseudoinversa não satisfaz todas as propriedades da inversa usual.

A construção de  $\mathbf{A}^+$ , sua interpretação por projeções e sua relação com o posto serão desenvolvidas no capítulo sobre decomposição em valores singulares.

## 2.4 Matrizes ortogonais, diagonais e triangulares

Algumas matrizes quadradas possuem estruturas que simplificam produtos, inversões e sistemas lineares. Nesta seção são consideradas as matrizes ortogonais, diagonais e triangulares.

### 2.4.1 Matrizes ortogonais

**Definição 2.17** (Matriz ortogonal). Uma matriz

$$\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

é **ortogonal** quando

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_n.$$

A condição anterior implica que  $\mathbf{Q}$  é invertível e

$$\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^\top.$$

Consequentemente,

$$\mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \mathbf{I}_n.$$

Escrevendo as colunas de  $\mathbf{Q}$  como

$$\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \cdots \ \mathbf{q}_n],$$

tem-se

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^\top \mathbf{q}_1 & \cdots & \mathbf{q}_1^\top \mathbf{q}_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{q}_n^\top \mathbf{q}_1 & \cdots & \mathbf{q}_n^\top \mathbf{q}_n \end{bmatrix}.$$

Portanto,  $\mathbf{Q}$  é ortogonal quando suas colunas satisfazem

$$\mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

As colunas possuem norma unitária e são ortogonais duas a duas. A mesma propriedade é satisfeita pelas linhas de  $\mathbf{Q}$ .

**Exemplo 2.21** (Verificação da ortogonalidade). Considere

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Sua transposta é

$$\mathbf{Q}^\top = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calculando o produto,

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_2.$$

Logo,  $\mathbf{Q}$  é ortogonal e

$$\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^\top.$$

**Teorema 2.7** (Preservação do produto interno). *Se  $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  é ortogonal, então, para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ,*

$$(\mathbf{Q}\mathbf{x})^\top (\mathbf{Q}\mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}.$$

*Comprovação.* Pela associatividade do produto matricial,

$$(\mathbf{Q}\mathbf{x})^\top (\mathbf{Q}\mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} \mathbf{y}.$$

Como

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_n,$$

obtém-se

$$(\mathbf{Q}\mathbf{x})^\top (\mathbf{Q}\mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{I}_n \mathbf{y} = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}.$$

□

Tomando  $\mathbf{y} = \mathbf{x}$ , obtém-se

$$\|\mathbf{Q}\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|.$$

Aplicando a mesma propriedade ao vetor  $\mathbf{x} - \mathbf{y}$ ,

$$\|\mathbf{Q}\mathbf{x} - \mathbf{Q}\mathbf{y}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Portanto, matrizes ortogonais preservam produtos internos, normas e distâncias euclidianas.

Além disso,

$$\det(\mathbf{Q})^2 = \det(\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q}) = \det(\mathbf{I}_n) = 1,$$

de modo que

$$\det(\mathbf{Q}) \in \{-1, 1\}.$$

O produto de matrizes ortogonais de mesma ordem também é ortogonal.

As interpretações das matrizes ortogonais como rotações, reflexões e mudanças de orientação serão desenvolvidas no capítulo sobre transformações lineares.

## 2.4.2 Matrizes diagonais

**Definição 2.18** (Matriz diagonal). Uma matriz

$$\mathbf{D} = (d_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

é **diagonal** quando

$$d_{ij} = 0 \quad \text{para} \quad i \neq j.$$

Uma matriz diagonal possui a forma

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix} = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n).$$

A matriz identidade é uma matriz diagonal:

$$\mathbf{I}_n = \text{diag}(1, 1, \dots, 1).$$

Toda matriz diagonal é simétrica, pois

$$\mathbf{D}^\top = \mathbf{D}.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

o produto por uma matriz diagonal é

$$\mathbf{D}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} d_1 x_1 \\ d_2 x_2 \\ \vdots \\ d_n x_n \end{bmatrix}.$$

Cada componente de  $\mathbf{x}$  é multiplicada pelo elemento correspondente da diagonal.

**Exemplo 2.22** (Produto por uma matriz diagonal). Considere

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Então,

$$\mathbf{D}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2(1) \\ -1(4) \\ 3(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ -6 \end{bmatrix}.$$

A soma e o produto de matrizes diagonais de mesma ordem também são diagonais. Se

$$\mathbf{D}_1 = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$$

e

$$\mathbf{D}_2 = \text{diag}(e_1, \dots, e_n),$$

então

$$\mathbf{D}_1 + \mathbf{D}_2 = \text{diag}(d_1 + e_1, \dots, d_n + e_n)$$

e

$$\mathbf{D}_1 \mathbf{D}_2 = \text{diag}(d_1 e_1, \dots, d_n e_n).$$

Duas matrizes diagonais de mesma ordem comutam:

$$\mathbf{D}_1 \mathbf{D}_2 = \mathbf{D}_2 \mathbf{D}_1.$$

O determinante de uma matriz diagonal é o produto dos elementos de sua diagonal:

$$\det(\mathbf{D}) = \prod_{i=1}^n d_i.$$

Logo,  $\mathbf{D}$  é invertível se, e somente se,

$$d_i \neq 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Nesse caso,

$$\mathbf{D}^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{d_1}, \frac{1}{d_2}, \dots, \frac{1}{d_n}\right).$$

Para um inteiro positivo  $k$ ,

$$\mathbf{D}^k = \text{diag}(d_1^k, d_2^k, \dots, d_n^k).$$

As matrizes diagonais serão utilizadas nas decomposições matriciais estudadas nos capítulos posteriores.

### 2.4.3 Matrizes triangulares

**Definição 2.19** (Matrizes triangulares). Uma matriz

$$\mathbf{U} = (u_{ij})_{n \times n}$$

é **triangular superior** quando

$$u_{ij} = 0 \quad \text{para} \quad i > j.$$

Sua forma geral é

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{bmatrix}.$$

Uma matriz

$$\mathbf{L} = (\ell_{ij})_{n \times n}$$

é **triangular inferior** quando

$$\ell_{ij} = 0 \quad \text{para} \quad i < j.$$

Sua forma geral é

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \ell_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \cdots & \ell_{nn} \end{bmatrix}.$$

A transposta de uma matriz triangular superior é triangular inferior:

$$\mathbf{U}^\top \text{ é triangular inferior.}$$

Da mesma forma,

$$\mathbf{L}^\top \text{ é triangular superior.}$$

A soma e o produto de matrizes triangulares superiores de mesma ordem permanecem triangulares superiores. A mesma propriedade vale para matrizes triangulares inferiores.

O determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos de sua diagonal:

$$\det(\mathbf{U}) = \prod_{i=1}^n u_{ii}$$

e

$$\det(\mathbf{L}) = \prod_{i=1}^n \ell_{ii}.$$

Uma matriz triangular é invertível se, e somente se, todos os elementos de sua diagonal são diferentes de zero.

**Exemplo 2.23** (Determinante de uma matriz triangular). Considere

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Como  $\mathbf{U}$  é triangular superior,

$$\det(\mathbf{U}) = 2(3)(5) = 30.$$

Como todos os elementos da diagonal são diferentes de zero,  $\mathbf{U}$  é invertível.

#### 2.4.4 Aprofundamento: sistemas triangulares

##### Leitura de aprofundamento

Os sistemas triangulares mostram como a estrutura de uma matriz pode simplificar a resolução de equações. Esses procedimentos também aparecem nas decomposições matriciais estudadas posteriormente.

Um sistema cuja matriz de coeficientes é triangular pode ser resolvido sequencialmente.

Para uma matriz triangular superior,

$$\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{b},$$



a última equação contém somente a incógnita  $x_n$ . Após determinar  $x_n$ , substitui-se seu valor na equação anterior. Esse procedimento continua até a determinação de  $x_1$  e é denominado **substituição regressiva**.

**Exemplo 2.24** (Sistema triangular superior). Considere o sistema

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 - x_3 &= 4, \\2x_2 + 3x_3 &= 7, \\x_3 &= 1.\end{aligned}$$

Sua forma matricial é

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A última equação fornece

$$x_3 = 1.$$

Substituindo na segunda equação,

$$2x_2 + 3(1) = 7,$$

de modo que

$$x_2 = 2.$$

Substituindo os valores obtidos na primeira equação,

$$x_1 + 2(2) - 1 = 4,$$

resulta

$$x_1 = 1.$$

Portanto,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Para um sistema

$$\mathbf{L}\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

com  $\mathbf{L}$  triangular inferior, a resolução começa pela primeira equação e segue até a última. Esse procedimento é denominado **substituição progressiva**.

As matrizes triangulares aparecem na resolução de sistemas e em decomposições matriciais. As formas bilineares e quadráticas serão estudadas na próxima seção.

## 2.5 Formas bilineares, formas quadráticas e positividade

As formas bilineares associam dois vetores a um escalar. Quando os dois vetores são iguais, obtém-se uma forma quadrática.

### 2.5.1 Formas bilineares

**Definição 2.20** (Forma bilinear). Seja

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

A função

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}, \quad \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p,$$

é uma **forma bilinear** associada à matriz  $\mathbf{A}$ .

Em termos das componentes,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y} = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p a_{ij} x_i y_j.$$

A bilinearidade significa que a expressão é linear em cada vetor quando o outro permanece fixo. Para  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,

$$B(\alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2, \mathbf{y}) = \alpha B(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}) + \beta B(\mathbf{x}_2, \mathbf{y})$$

e

$$B(\mathbf{x}, \alpha \mathbf{y}_1 + \beta \mathbf{y}_2) = \alpha B(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1) + \beta B(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2).$$

**Exemplo 2.25** (Cálculo de uma forma bilinear). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Tem-se

$$\mathbf{A}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \end{bmatrix} = -7.$$

## 2.5.2 Formas quadráticas

**Definição 2.21** (Forma quadrática). Seja

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

A função

$$q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p,$$

é uma **forma quadrática** associada à matriz  $\mathbf{A}$ .

Em termos das componentes,

$$q(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p a_{ij} x_i x_j.$$

Para

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

a forma quadrática é

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = ax_1^2 + (b+c)x_1x_2 + dx_2^2.$$

**Teorema 2.8** (Parte simétrica de uma forma quadrática). *Seja*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

*e seja*

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2}.$$

*Para todo*  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ ,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{S} \mathbf{x}.$$

*Comprovação.* A matriz  $\mathbf{A}$  pode ser escrita como

$$\mathbf{A} = \mathbf{S} + \mathbf{K},$$

em que

$$\mathbf{K} = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^\top}{2}$$

é antissimétrica. Assim,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{S} \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x}.$$

O escalar  $\mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x}$  satisfaz

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x} = (\mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x})^\top = \mathbf{x}^\top \mathbf{K}^\top \mathbf{x} = -\mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x}.$$

Portanto,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{K} \mathbf{x} = 0$$

e

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{S} \mathbf{x}.$$

□

Toda forma quadrática pode ser representada por uma matriz simétrica.

**Exemplo 2.26** (Expansão de uma forma quadrática). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Então,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Efetuando os produtos,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

obtém-se

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = 2(1)^2 + 2(1)(2) + 3(2)^2 = 18.$$

### 2.5.3 Positividade

A classificação de uma matriz simétrica depende dos valores assumidos por sua forma quadrática.

**Definição 2.22** (Classificação de matrizes simétricas pela forma quadrática). Seja

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

uma matriz simétrica. A classificação de  $\mathbf{A}$  é determinada pelos valores da forma quadrática

$$q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}.$$

A matriz  $\mathbf{A}$  é:

- **positiva definida** quando

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$$

para todo  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ;

- **semidefinida positiva** quando

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$$

para todo  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ ;

- **negativa definida** quando

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} < 0$$

para todo  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ;

- **semidefinida negativa** quando

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$$

para todo  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ ;

- **indefinida** quando existem vetores não nulos  $\mathbf{x}$  e  $\mathbf{y}$  tais que

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$$

e

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{A} \mathbf{y} < 0.$$

Um exemplo importante de matriz semidefinida positiva é obtido pelo produto externo de um vetor consigo mesmo. Para  $\mathbf{x}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^p$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{z}^\top (\mathbf{x} \mathbf{x}^\top) \mathbf{z} &= (\mathbf{x}^\top \mathbf{z})^2 \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathbf{x} \mathbf{x}^\top$$

é semidefinida positiva.

**Exemplo 2.27** (Classificação de formas quadráticas). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = 2x_1^2 + 3x_2^2.$$

A expressão é positiva para todo  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ . Portanto,  $\mathbf{A}$  é positiva definida.

Considere agora

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Nesse caso,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{B} \mathbf{x} = x_1^2 \geq 0.$$

A forma quadrática é igual a zero para vetores não nulos com  $x_1 = 0$ . Portanto,  $\mathbf{B}$  é semidefinida positiva.

Para

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{C} \mathbf{x} = x_1^2 - x_2^2.$$

A expressão assume valores positivos e negativos. Portanto,  $\mathbf{C}$  é indefinida.

### 2.5.4 Superfícies de nível

Uma superfície de nível de uma forma quadrática é definida por

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = c,$$

em que  $c$  é uma constante.

Quando  $\mathbf{A}$  é positiva definida e  $c > 0$ , as superfícies de nível são elipsoides. Em duas dimensões, correspondem a elipses. Para  $c = 0$ , a superfície contém somente o vetor nulo, enquanto, para  $c < 0$ , não existem pontos que satisfaçam a equação.

Quando  $\mathbf{A}$  é indefinida, a forma quadrática assume valores positivos e negativos. Em duas dimensões, no caso indefinido não singular, os níveis não nulos formam hipérbolas. O nível zero pode formar um par de retas que se cruzam na origem. Por exemplo,

$$x_1^2 - x_2^2 = 0$$



equivale a

$$x_2 = x_1 \quad \text{ou} \quad x_2 = -x_1.$$

A Figura 2.2 apresenta três formas quadráticas em  $\mathbb{R}^2$ .




Figura 2.2: Curvas de nível de formas quadráticas em duas dimensões. Na forma indefinida, níveis positivos, negativos e nulos são diferenciados também pelo tipo de linha.

A primeira forma produz circunferências. A segunda produz elipses com eixos de comprimentos diferentes. A terceira produz hipérboles.

Formas quadráticas aparecem em expressões de distância, variância e densidade. Os critérios baseados em autovalores serão apresentados no capítulo sobre decomposição espectral.

## 2.6 Aprofundamento: matrizes particionadas e complemento de Schur

### Leitura de aprofundamento

Esta seção pode ser utilizada como referência nos capítulos posteriores. As operações por blocos e o complemento de Schur serão retomados no estudo de covariâncias particionadas, distribuições condicionais, regressão entre blocos e correlação canônica.

Uma matriz pode ser dividida em submatrizes denominadas blocos. O particionamento organiza os elementos sem alterar a matriz e permite realizar operações matriciais utilizando os blocos.

### 2.6.1 Matrizes particionadas

**Definição 2.23** (Matriz particionada). Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{(m_1+m_2) \times (n_1+n_2)}.$$

Um particionamento de  $\mathbf{A}$  em quatro blocos pode ser escrito como

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

em que

$$\mathbf{A}_{11} \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1}, \quad \mathbf{A}_{12} \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_2},$$

$$\mathbf{A}_{21} \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_1}, \quad \mathbf{A}_{22} \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_2}.$$

Os blocos de uma mesma linha do particionamento possuem o mesmo número de linhas. Os blocos de uma mesma coluna possuem o mesmo número de colunas.

**Exemplo 2.28** (Particionamento de uma matriz). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}.$$

Separando as duas primeiras linhas e colunas das restantes,

$$\mathbf{A} = \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

com

$$\mathbf{A}_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{12} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}_{21} = \begin{bmatrix} 7 & 8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{22} = \begin{bmatrix} 9 \end{bmatrix}.$$

O particionamento pode ser definido de acordo com a organização do problema. Em uma matriz de dados, por exemplo, as colunas podem ser separadas em dois grupos de variáveis:

$$\mathbf{X} = [\mathbf{X}_1 \ \mathbf{X}_2],$$

em que

$$\mathbf{X}_1 \in \mathbb{R}^{n \times p_1}, \quad \mathbf{X}_2 \in \mathbb{R}^{n \times p_2}$$

e

$$p_1 + p_2 = p.$$

### 2.6.2 Soma e multiplicação por escalar

Considere matrizes com o mesmo particionamento:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{bmatrix}.$$

A soma pode ser realizada por blocos:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} + \mathbf{B}_{11} & \mathbf{A}_{12} + \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} + \mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{22} + \mathbf{B}_{22} \end{bmatrix}.$$

Para  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,

$$\alpha \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \alpha \mathbf{A}_{11} & \alpha \mathbf{A}_{12} \\ \alpha \mathbf{A}_{21} & \alpha \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

As operações exigem que os blocos correspondentes possuam as mesmas dimensões.

### 2.6.3 Transposição por blocos

A transposta de uma matriz particionada é

$$\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}^\top & \mathbf{A}_{21}^\top \\ \mathbf{A}_{12}^\top & \mathbf{A}_{22}^\top \end{bmatrix}.$$

Os blocos situados fora da diagonal trocam de posição e são transpostos.

Se  $\mathbf{A}$  é simétrica, então

$$\mathbf{A}_{11}^\top = \mathbf{A}_{11}, \quad \mathbf{A}_{22}^\top = \mathbf{A}_{22}$$

e

$$\mathbf{A}_{21} = \mathbf{A}_{12}^\top.$$

Nesse caso, a matriz pode ser escrita como

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{12}^\top & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

### 2.6.4 Multiplicação por blocos

Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(m_1+m_2) \times (n_1+n_2)}$$

e

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n_1+n_2) \times (r_1+r_2)},$$

com

$$\mathbf{B}_{11} \in \mathbb{R}^{n_1 \times r_1}, \quad \mathbf{B}_{12} \in \mathbb{R}^{n_1 \times r_2},$$

$$\mathbf{B}_{21} \in \mathbb{R}^{n_2 \times r_1}, \quad \mathbf{B}_{22} \in \mathbb{R}^{n_2 \times r_2}.$$

O produto é

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{22} \\ \mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{22} \end{bmatrix}.$$

A regra é a mesma utilizada no produto matricial, com os elementos substituídos por blocos de dimensões compatíveis.

**Exemplo 2.29** (Multiplicação de matrizes particionadas). Considere

$$\mathbf{A} = \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ \hline 2 & 0 & 4 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{B} = \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 3 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{bmatrix}.$$

Os blocos da primeira linha do produto são

$$\mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{21} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{22} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

Os blocos da segunda linha são

$$\mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{21} = \begin{bmatrix} -2 & 8 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{22} = \begin{bmatrix} 14 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$\mathbf{AB} = \left[ \begin{array}{cc|c} 4 & 4 & 4 \\ -1 & 7 & 9 \\ \hline -2 & 8 & 14 \end{array} \right].$$

As operações por blocos permitem manipular grupos de linhas e colunas como unidades matriciais. O complemento de Schur utiliza essa estrutura para representar a parcela de um bloco ajustada pelo outro.

### 2.6.5 Complemento de Schur

Matrizes particionadas permitem tratar uma matriz de grande dimensão a partir de blocos menores. Em vários problemas, é útil eliminar um desses blocos e estudar a estrutura que permanece no outro. O **complemento de Schur** é a matriz que surge naturalmente nesse processo de eliminação.

**Definição 2.24** (Complemento de Schur). Considere a matriz quadrada particionada

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

em que

$$\mathbf{A}_{11} \in \mathbb{R}^{p \times p}, \quad \mathbf{A}_{12} \in \mathbb{R}^{p \times q},$$

$$\mathbf{A}_{21} \in \mathbb{R}^{q \times p}, \quad \mathbf{A}_{22} \in \mathbb{R}^{q \times q}.$$

Os blocos diagonais  $\mathbf{A}_{11}$  e  $\mathbf{A}_{22}$  são quadrados. Quando um deles é invertível, podemos utilizá-lo para eliminar os efeitos dos blocos fora da diagonal.

Se  $\mathbf{A}_{22}$  é invertível, o **complemento de Schur de  $\mathbf{A}_{22}$**  em  $\mathbf{A}$  é

$$\mathbf{A}_{11.2} = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21}.$$

Se  $\mathbf{A}_{11}$  é invertível, o **complemento de Schur de  $\mathbf{A}_{11}$**  em  $\mathbf{A}$  é

$$\mathbf{A}_{22.1} = \mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21} \mathbf{A}_{11}^{-1} \mathbf{A}_{12}.$$

O complemento  $\mathbf{A}_{11.2}$  possui dimensão  $p \times p$ , enquanto  $\mathbf{A}_{22.1}$  possui dimensão  $q \times q$ .

A expressão pode ser compreendida como uma correção do bloco diagonal original. Por exemplo,

$$\mathbf{A}_{11.2} = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21}$$

parte de  $\mathbf{A}_{11}$  e retira a parcela associada às relações que passam pelo segundo bloco. Essa interpretação ficará mais clara ao observarmos a eliminação por blocos.

### 2.6.6 Eliminação por blocos

Suponha que  $\mathbf{A}_{22}$  seja invertível. Queremos eliminar o bloco  $\mathbf{A}_{12}$ , isto é, produzir uma matriz equivalente cuja posição superior direita seja ocupada por uma matriz nula.

Para isso, considere

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p & -\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_q \end{bmatrix}.$$

Multiplicando  $\mathbf{E}$  por  $\mathbf{A}$ ,

$$\mathbf{EA} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p & -\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Efetuando o produto por blocos,

$$\mathbf{EA} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{12} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{22} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Como  $\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{22} = \mathbf{I}_q$ ,

$$\mathbf{EA} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Portanto, o complemento de Schur aparece exatamente como o bloco que permanece depois da eliminação de  $\mathbf{A}_{12}$  utilizando  $\mathbf{A}_{22}$ .

Como

$$\mathbf{E}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p & \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_q \end{bmatrix},$$

também podemos escrever

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p & \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Essa fatoração é consequência direta da eliminação por blocos.

Um caso simples ajuda a reconhecer a estrutura. Para uma matriz  $2 \times 2$ ,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

com  $d \neq 0$ , o complemento de Schur de  $d$  é

$$a - bd^{-1}c.$$

Como veremos a seguir,

$$\det(\mathbf{A}) = d(a - bd^{-1}c) = ad - bc,$$

recuperando a expressão usual do determinante de uma matriz  $2 \times 2$ .

**Exemplo 2.30** (Cálculo de um complemento de Schur). Considere a matriz particionada

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

em que

$$\mathbf{A}_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{22} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Como  $\mathbf{A}_{22} = \mathbf{I}_2$ , tem-se  $\mathbf{A}_{22}^{-1} = \mathbf{I}_2$ . Logo,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{11.2} &= \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$



### 2.6.7 Determinante de uma matriz particionada

A eliminação por blocos mostra uma das principais utilidades do complemento de Schur: calcular o determinante de uma matriz particionada utilizando determinantes de matrizes menores.

**Teorema 2.9** (Determinante e complemento de Schur). *Para*

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

*se  $\mathbf{A}_{22}$  é invertível, então*

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}_{22}) \det(\mathbf{A}_{11.2}).$$

*Se  $\mathbf{A}_{11}$  é invertível, então*

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}_{11}) \det(\mathbf{A}_{22.1}).$$

*(Boyd; Vandenberghe, 2004)*

*Comprovação.* Suponha que  $\mathbf{A}_{22}$  seja invertível. Pela eliminação por blocos apresentada anteriormente,

$$\mathbf{EA} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

com

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p & -\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_q \end{bmatrix}.$$

Como  $\mathbf{E}$  é triangular por blocos e possui matrizes identidade na diagonal,

$$\det(\mathbf{E}) = 1.$$

Portanto,

$$\det(\mathbf{EA}) = \det(\mathbf{A}).$$

A matriz  $\mathbf{EA}$  também é triangular por blocos. Assim,

$$\det(\mathbf{EA}) = \det(\mathbf{A}_{11.2}) \det(\mathbf{A}_{22}).$$

Logo,

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}_{22}) \det(\mathbf{A}_{11.2}).$$

A segunda identidade é obtida de forma análoga, eliminando o bloco  $\mathbf{A}_{21}$  a partir de  $\mathbf{A}_{11}$ .  $\square$

No Exemplo 2.30,

$$\det(\mathbf{A}_{22}) = 1$$

e

$$\det(\mathbf{A}_{11.2}) = 3.$$

Consequentemente,

$$\det(\mathbf{A}) = 3.$$

### 2.6.8 Inversão em blocos

O complemento de Schur também permite obter a inversa de uma matriz particionada. A origem da expressão pode ser entendida a partir da mesma fatoração obtida pela eliminação por blocos.

Se  $\mathbf{A}_{22}$  é invertível,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_p & \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Se  $\mathbf{A}_{11.2}$  também é invertível, os dois fatores são invertíveis. Como a inversa de um produto inverte a ordem dos fatores, a inversa de  $\mathbf{A}$  pode ser construída a partir das inversas dessas duas matrizes mais simples.

**Teorema 2.10** (Inversa em blocos). *Considere*

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Se  $\mathbf{A}_{22}$  e  $\mathbf{A}_{11.2}$  são invertíveis, então

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11.2}^{-1} & -\mathbf{A}_{11.2}^{-1} \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \\ -\mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21} \mathbf{A}_{11.2}^{-1} & \mathbf{A}_{22}^{-1} + \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21} \mathbf{A}_{11.2}^{-1} \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \end{bmatrix}.$$

(Boyd; Vandenberghe, 2004)

A expressão pode parecer extensa, mas sua estrutura é determinada pela eliminação anterior. O bloco  $\mathbf{A}_{11.2}^{-1}$  representa a parte de  $\mathbf{A}_{11}$  que permanece depois da eliminação do segundo bloco.

Uma expressão equivalente pode ser obtida utilizando  $\mathbf{A}_{22.1}$  quando  $\mathbf{A}_{11}$  e  $\mathbf{A}_{22.1}$  são invertíveis.

## 2.6.9 Positividade e complemento de Schur

Outra aplicação importante ocorre em matrizes simétricas. O complemento de Schur permite verificar a definição positiva de uma matriz particionada por meio de matrizes de menor dimensão.

Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{12}^\top & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

Para estudar se  $\mathbf{A}$  é positiva definida, consideramos sua forma quadrática. Para  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  e  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^q$ ,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}^\top \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{11} \mathbf{x} + 2\mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{12} \mathbf{y} + \mathbf{y}^\top \mathbf{A}_{22} \mathbf{y}.$$

Quando  $\mathbf{A}_{22}$  é invertível, os termos envolvendo  $\mathbf{y}$  podem ser reorganizados completando a forma quadrática:

$$\begin{aligned} & \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{11} \mathbf{x} + 2\mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{12} \mathbf{y} + \mathbf{y}^\top \mathbf{A}_{22} \mathbf{y} \\ &= \mathbf{x}^\top (\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{12}^\top) \mathbf{x} \\ & \quad + (\mathbf{y} + \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{12}^\top \mathbf{x})^\top \mathbf{A}_{22} (\mathbf{y} + \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{12}^\top \mathbf{x}). \end{aligned}$$

O primeiro termo contém exatamente o complemento de Schur de  $\mathbf{A}_{22}$ .

**Teorema 2.11** (Positividade e complemento de Schur). *Considere a matriz simétrica*

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{12}^\top & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}.$$

*Se  $\mathbf{A}_{22}$  é positiva definida, então  $\mathbf{A}$  é positiva definida se, e somente se,*

$$\mathbf{A}_{11.2} = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{12}^\top$$

*é positiva definida. (Boyd; Vandenberghe, 2004)*

*Comprovação.* Pela decomposição da forma quadrática,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}^\top \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{11.2} \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{12}^\top \mathbf{x})^\top \mathbf{A}_{22} (\mathbf{y} + \mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{12}^\top \mathbf{x}).$$

Suponha inicialmente que  $\mathbf{A}_{11.2}$  e  $\mathbf{A}_{22}$  sejam positivas definidas.

Se  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ , então

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{11.2} \mathbf{x} > 0,$$

enquanto a segunda parcela é não negativa.

Se  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , então  $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$  e a forma quadrática reduz-se a

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{A}_{22} \mathbf{y} > 0.$$

Logo,  $\mathbf{A}$  é positiva definida.

Reciprocamente, suponha que  $\mathbf{A}$  seja positiva definida. Para qualquer  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ , escolha

$$\mathbf{y} = -\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{12}^\top \mathbf{x}.$$

Com essa escolha, a segunda parcela da decomposição é igual a zero. Portanto,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}^\top \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_{11.2} \mathbf{x} > 0.$$

Assim,  $\mathbf{A}_{11.2}$  é positiva definida. □

Uma condição equivalente pode ser formulada utilizando  $\mathbf{A}_{11}$  e o complemento  $\mathbf{A}_{22.1}$ .

O complemento de Schur aparece sempre que uma matriz particionada é estudada após a eliminação de um dos blocos. Por isso, ele será útil em diferentes partes da Análise Multivariada.

Algebricamente, o termo

$$\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21}$$

representa a correção associada ao segundo bloco, enquanto

$$\mathbf{A}_{11.2} = \mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{21}$$

representa o primeiro bloco depois dessa correção.

Essa interpretação é puramente matricial e vale para matrizes particionadas gerais.

Quando  $\mathbf{A}$  é uma matriz de covariâncias particionada,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{12}^\top & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

o complemento

$$\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{22}^{-1}\mathbf{A}_{12}^\top$$

adquire uma interpretação estatística adicional. Ele representa a matriz de covariâncias da parcela do primeiro bloco que permanece após o ajuste linear pelo segundo bloco. Sob normalidade conjunta, essa mesma matriz corresponde à covariância condicional do primeiro bloco dado o segundo.

Essa estrutura será retomada no estudo de covariâncias condicionais, regressão entre blocos e distribuição normal multivariada.

## 2.7 Síntese do capítulo

Uma matriz organiza valores em linhas e colunas e permite representar simultaneamente observações, variáveis, transformações e sistemas lineares. As dimensões determinam quais operações são possíveis e qual será a dimensão do resultado.

A tabela a seguir reúne os principais objetos desenvolvidos no capítulo.

Tabela 2.3: Principais objetos e operações matriciais desenvolvidos no capítulo.

| Objeto ou operação   | Expressão ou condição                                                    | Interpretação e utilização                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produto matriz-vetor | $\mathbf{Ax}$                                                            | Produz produtos internos pelas linhas e combinações lineares pelas colunas |
| Produto matricial    | $\mathbf{A}_{n \times p} \mathbf{B}_{p \times r}$                        | Combina linhas e colunas de matrizes com dimensões compatíveis             |
| Transposta           | $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$                   | Troca linhas por colunas e reorganiza produtos                             |
| Matriz simétrica     | $\mathbf{A}^\top = \mathbf{A}$                                           | Estrutura presente em formas quadráticas e matrizes de covariâncias        |
| Traço                | $\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_i a_{ii}$                                  | Resume a diagonal e reorganiza expressões matriciais                       |
| Matriz inversa       | $\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{I}_n$                              | Reverte a ação de uma matriz invertível                                    |
| Determinante         | $\det(\mathbf{A})$                                                       | Registra invertibilidade, alteração de volume e orientação                 |
| Posto                | $\text{posto}(\mathbf{A})$                                               | Mede a dimensão da informação linearmente independente                     |
| Matriz ortogonal     | $\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_n$                              | Preserva produtos internos, normas e distâncias                            |
| Forma bilinear       | $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}$                                  | Relaciona dois vetores por meio de uma matriz                              |
| Forma quadrática     | $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$                                  | Representa variâncias, distâncias e superfícies de nível                   |
| Complemento de Schur | $\mathbf{A}_{11} - \mathbf{A}_{12} \mathbf{A}_{22}^{-1} \mathbf{A}_{21}$ | Elimina um bloco e produz um bloco reduzido                                |

Para uma matriz quadrada

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

as condições

$\mathbf{A}$  é invertível,

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0$$

e

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = n$$

são equivalentes.

O posto também permite classificar as soluções do sistema

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}.$$

Quando a matriz não é invertível ou não é quadrada, a pseudoinversa permite formular soluções exatas de menor norma ou soluções de mínimos quadrados.

Para uma matriz simétrica, os valores da forma quadrática

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{Ax}$$

permitem classificá-la como positiva definida, semidefinida positiva, negativa definida, semidefinida negativa ou indefinida.

As seções sobre pseudoinversa, sistemas triangulares, matrizes particionadas e complemento de Schur funcionam como aprofundamentos. Esses resultados serão retomados quando sua utilização estatística se tornar necessária.

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- verificar a compatibilidade dimensional das operações matriciais;
- calcular e interpretar produtos matriz-vetor e matriz-matriz;
- utilizar transposição, simetria e traço;
- relacionar inversa, determinante e posto;
- classificar as soluções de sistemas lineares;
- reconhecer matrizes ortogonais, diagonais e triangulares;

- calcular e interpretar formas bilineares e quadráticas;
- classificar matrizes simétricas por meio de suas formas quadráticas;
- operar com matrizes particionadas em situações introdutórias.

O próximo capítulo desenvolverá espaços vetoriais, bases, dimensão e projeções, fornecendo uma interpretação geométrica mais ampla para o posto, os sistemas lineares e as transformações matriciais.



### 3 Espaços vetoriais, bases e projeções

Os capítulos anteriores apresentaram a representação vetorial dos dados e as operações matriciais utilizadas para manipulá-los. Neste capítulo, os vetores são estudados como elementos de conjuntos que preservam as operações de adição e multiplicação por escalar.

Essa estrutura permite identificar subespaços, verificar relações de dependência linear e representar um espaço por meio de uma base. O posto de uma matriz será interpretado a partir das dimensões de seus espaços fundamentais.

A parte final do capítulo desenvolve a projeção ortogonal. Essa operação decompõe um vetor em uma componente pertencente a um subespaço e uma componente ortogonal, fornecendo a interpretação geométrica dos problemas de melhor aproximação e mínimos quadrados.

#### Convenções para espaços vetoriais e subespaços

As convenções vetoriais e matriciais apresentadas nos capítulos anteriores permanecem válidas. Neste capítulo, serão utilizadas também as seguintes convenções:

- $V$  e  $W$  representam espaços vetoriais ou subespaços vetoriais;
- $S$  representa, em geral, um subespaço de  $\mathbb{R}^p$ ;
- $\mathcal{B}$  representa uma base;
- $\mathcal{B}_W$  representa uma base associada ao subespaço  $W$ ;
- $\dim(V)$  representa a dimensão do espaço vetorial  $V$ ;
- $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$  representa o subespaço gerado pelos vetores  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ ;
- $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$  representa o vetor de coordenadas de  $\mathbf{x}$  em relação à base  $\mathcal{B}$ ;
- $S^\perp$  representa o complemento ortogonal de  $S$ ;
- $\mathcal{C}(\mathbf{A})$  representa o espaço coluna de  $\mathbf{A}$ ;
- $\mathcal{L}(\mathbf{A})$  representa o espaço linha de  $\mathbf{A}$ ;
- $\mathcal{N}(\mathbf{A})$  representa o espaço nulo de  $\mathbf{A}$ ;
- $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$  representa o espaço nulo de  $\mathbf{A}^\top$ ;
- $\oplus$  representa soma direta de subespaços;
- $\text{proj}_S(\mathbf{x})$  representa a projeção ortogonal de  $\mathbf{x}$  sobre  $S$ ;
- $\mathbf{P}_S$  representa uma matriz de projeção ortogonal sobre  $S$ ;
- $\mathbf{G}$  representa, quando indicado, uma matriz de Gram.

Quando uma base for escrita como

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\},$$

a ordem dos vetores será considerada fixada sempre que forem utilizadas coordenadas em relação a essa base.

Os vetores continuarão sendo representados por letras minúsculas em negrito, como  $\mathbf{x}$ ,  $\mathbf{y}$  e  $\mathbf{v}$ , enquanto matrizes serão representadas por letras maiúsculas em negrito, como  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$  e  $\mathbf{Q}$ .

As definições e propriedades específicas de cada espaço, base, decomposição ou operador serão apresentadas nas seções correspondentes.

### 3.1 Espaços, subespaços e geração

Um espaço vetorial é um conjunto no qual a soma de vetores e a multiplicação por escalares permanecem definidas e satisfazem propriedades algébricas específicas.

**Definição 3.1** (Espaço vetorial). Um conjunto não vazio  $V$  é um **espaço vetorial real** quando estão definidas:

- a soma  $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in V$ , para  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ ;
- a multiplicação  $\alpha \mathbf{x} \in V$ , para  $\alpha \in \mathbb{R}$  e  $\mathbf{x} \in V$ ;

e são satisfeitas as seguintes propriedades:

1. Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ ,

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}.$$

2. Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$ ,

$$(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z}).$$

3. Existe um vetor  $\mathbf{0} \in V$  tal que, para todo  $\mathbf{x} \in V$ ,

$$\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}.$$

4. Para todo  $\mathbf{x} \in V$ , existe um vetor  $-\mathbf{x} \in V$  tal que

$$\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

5. Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$  e  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,

$$\alpha(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}.$$

6. Para quaisquer  $\mathbf{x} \in V$  e  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,

$$(\alpha + \beta)\mathbf{x} = \alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{x}.$$

7. Para quaisquer  $\mathbf{x} \in V$  e  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,

$$\alpha(\beta\mathbf{x}) = (\alpha\beta)\mathbf{x}.$$

8. Para todo  $\mathbf{x} \in V$ ,

$$1\mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

O espaço  $\mathbb{R}^p$ , com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar, é um espaço vetorial. Seus elementos são vetores com  $p$  componentes reais. O vetor nulo é

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

e, para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix},$$

seu inverso aditivo é

$$-\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_p \end{bmatrix}.$$

Os elementos de um espaço vetorial não precisam ser necessariamente vetores numéricos. Por exemplo, o conjunto de todas as matrizes reais de dimensão  $n \times p$ ,

$$\mathbb{R}^{n \times p},$$

também é um espaço vetorial com as operações usuais de adição de matrizes e multiplicação por escalar. Nesse caso, os elementos do espaço vetorial são matrizes.

### 3.1.1 Subespaços vetoriais

Um subconjunto de um espaço vetorial pode preservar a estrutura das operações.

**Definição 3.2** (Subespaço vetorial). Seja  $V$  um espaço vetorial. Um subconjunto não vazio  $W \subseteq V$  é um **subespaço vetorial** de  $V$  quando, para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in W$  e  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} \in W$$

e

$$\alpha \mathbf{x} \in W.$$

As duas condições garantem que toda combinação linear de vetores de  $W$  também pertence a  $W$ .

**Proposição 3.1** (Critério de subespaço). *Um subconjunto não vazio  $W \subseteq V$  é um subespaço vetorial se, e somente se,*

$$\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y} \in W$$

para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in W$  e  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . (Meyer, 2023)

O vetor nulo pertence a todo subespaço. De fato, para qualquer  $\mathbf{x} \in W$ ,

$$0\mathbf{x} = \mathbf{0} \in W.$$

**Exemplo 3.1** (Reta que é um subespaço). Considere

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ t \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Se

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} t_2 \\ t_2 \end{bmatrix}$$

pertencem a  $W$ , então

$$\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \alpha t_1 + \beta t_2 \\ \alpha t_1 + \beta t_2 \end{bmatrix} \in W.$$

Portanto,  $W$  é um subespaço de  $\mathbb{R}^2$ .

Uma reta que não passa pela origem não é um subespaço.

**Exemplo 3.2** (Reta que não é um subespaço). Considere

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ t+1 \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}.$$

O vetor nulo não pertence a  $S$ . Portanto,  $S$  não é um subespaço de  $\mathbb{R}^2$ .

Geometricamente,  $S$  é uma reta paralela a  $W$ , mas deslocada e sem passar pela origem.

A Figura 3.1 compara uma reta que é subespaço de  $\mathbb{R}^2$  com uma reta paralela que não é subespaço.




Figura 3.1: Comparação entre uma reta que é subespaço de  $\mathbb{R}^2$  e uma reta que não é subespaço.

A reta do primeiro painel contém a origem e é fechada em relação às combinações lineares. A reta do segundo painel não contém a origem e, por isso, não é um subespaço de  $\mathbb{R}^2$ .

### 3.1.2 Subespaço gerado

As combinações lineares de um conjunto de vetores formam um subespaço.

**Definição 3.3** (Subespaço gerado). Sejam

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in V.$$

O **subespaço gerado** por esses vetores é

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \{\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k : \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}\}.$$

Esse conjunto também é denominado **envoltória linear** dos vetores.

O subespaço gerado é o menor subespaço que contém todos os vetores  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ .

**Exemplo 3.3** (Subespaço gerado por um vetor). Considere

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

O conjunto

$$\text{span}\{\mathbf{v}\} = \left\{ \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} : \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$

é uma reta que passa pela origem.

**Exemplo 3.4** (Subespaço gerado por dois vetores). Considere

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Uma combinação linear desses vetores é

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}.$$

Para qualquer vetor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

basta escolher

$$\alpha_2 = x_2$$

e

$$\alpha_1 = x_1 - x_2.$$

Portanto,

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \mathbb{R}^2.$$

Um mesmo subespaço pode ser gerado por diferentes conjuntos de vetores. Alguns conjuntos podem conter vetores redundantes. A independência linear permite identificar quando um vetor acrescenta uma nova direção ao subespaço gerado.

## 3.2 Independência linear, bases e dimensão

Um conjunto de vetores pode gerar um subespaço mesmo quando contém vetores redundantes. A independência linear permite verificar se cada vetor acrescenta uma nova direção ao conjunto gerado.

### 3.2.1 Independência linear

**Definição 3.4** (Independência linear). Os vetores

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in V$$

são **linearmente independentes** quando a igualdade

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

implica

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 0.$$

Quando existe uma solução em que pelo menos um coeficiente é diferente de zero, os vetores são **linearmente dependentes**.

A solução

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 0$$

é denominada **solução trivial**. Um conjunto é linearmente independente quando a solução trivial é a única combinação linear que produz o vetor nulo.

**Exemplo 3.5** (Vetores linearmente dependentes). Considere

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{v}_1,$$

tem-se

$$2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}.$$

Os coeficientes 2 e  $-1$  não são ambos nulos. Portanto,  $\mathbf{v}_1$  e  $\mathbf{v}_2$  são linearmente dependentes.

Além disso,

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \text{span}\{\mathbf{v}_1\}.$$

O vetor  $\mathbf{v}_2$  não acrescenta uma nova direção ao subespaço gerado.



**Exemplo 3.6** (Vetores linearmente independentes). Considere

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Suponha que

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}.$$

Então,

$$\alpha_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A segunda equação fornece

$$\alpha_2 = 0,$$

e a primeira fornece

$$\alpha_1 = 0.$$

Portanto, os vetores são linearmente independentes.

A Figura 3.2 compara dois vetores dependentes com dois vetores independentes em  $\mathbb{R}^2$ .

No primeiro painel, os vetores pertencem à mesma reta e geram um subespaço unidimensional. No segundo, os vetores determinam duas direções distintas e geram  $\mathbb{R}^2$ .

### 3.2.2 Independência linear e sistemas homogêneos

Considere a matriz cujas colunas são os vetores analisados:

$$\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_k].$$

A combinação linear

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

pode ser escrita como




Figura 3.2: Comparação entre vetores linearmente dependentes e independentes em  $\mathbb{R}^2$ .

$$\mathbf{A}\alpha = \mathbf{0},$$

em que

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix}.$$

**Proposição 3.2** (Independência linear e sistema homogêneo). *As colunas de  $\mathbf{A}$  são linearmente independentes se, e somente se, o sistema*

$$\mathbf{A}\alpha = \mathbf{0}$$

*possui apenas a solução trivial*

$$\alpha = \mathbf{0}.$$

Se  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times k}$ , suas colunas são linearmente independentes quando

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = k.$$

Consequentemente, não pode haver mais de  $p$  vetores linearmente independentes em  $\mathbb{R}^p$ .

**Proposição 3.3** (Propriedades da independência linear). *Sejam  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$ .*

1. *Um conjunto que contém o vetor nulo é linearmente dependente.*
2. *Um conjunto formado por um único vetor é linearmente independente se, e somente se, esse vetor é diferente de zero.*
3. *Todo subconjunto de um conjunto linearmente independente também é linearmente independente.*
4. *Todo conjunto que contém um subconjunto linearmente dependente é linearmente dependente.*
5. *Se um vetor do conjunto pode ser escrito como combinação linear dos demais, o conjunto é linearmente dependente.*

A última propriedade fornece uma interpretação direta da redundância.

**Proposição 3.4** (Dependência linear e redundância). *O conjunto*

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$$

*é linearmente dependente se, e somente se, pelo menos um de seus vetores pode ser escrito como combinação linear dos demais.*

*Comprovação.* Suponha que o conjunto seja linearmente dependente. Então existem coeficientes, não todos nulos, tais que

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}.$$

Escolha um índice  $j$  para o qual  $\alpha_j \neq 0$ . Isolando  $\mathbf{v}_j$ ,

$$\mathbf{v}_j = - \sum_{i \neq j} \frac{\alpha_i}{\alpha_j} \mathbf{v}_i.$$

Portanto,  $\mathbf{v}_j$  é combinação linear dos demais.

Reciprocamente, se um vetor é combinação linear dos demais, essa igualdade pode ser reorganizada como uma combinação linear não trivial que produz o vetor nulo. Logo, o conjunto é linearmente dependente.  $\square$

A independência linear permite retirar vetores redundantes sem alterar o subespaço gerado. Um conjunto gerador sem redundâncias fornece uma base do subespaço.

### 3.2.3 Bases

Um conjunto gerador pode conter vetores redundantes. Quando os vetores geram o espaço e são linearmente independentes, obtém-se uma base.

**Definição 3.5** (Base). Seja  $V$  um espaço vetorial. Um conjunto

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k\}$$

é uma **base** de  $V$  quando:

1. os vetores  $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k$  são linearmente independentes;
2. os vetores geram  $V$ , isto é,

$$\text{span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\} = V.$$

Uma base fornece um conjunto de vetores suficiente para gerar o espaço sem incluir redundâncias.

**Exemplo 3.7** (Uma base de  $\mathbb{R}^2$ ). Considere

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Os vetores são linearmente independentes e geram  $\mathbb{R}^2$ . Portanto,

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$$

é uma base de  $\mathbb{R}^2$ .

Um mesmo espaço possui diferentes bases.

**Exemplo 3.8** (Bases diferentes do mesmo espaço). Os conjuntos

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

e

$$\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$

são bases de  $\mathbb{R}^2$ .

Os vetores de cada conjunto são linearmente independentes e geram todo o espaço.

### 3.2.4 Coordenadas em uma base

Uma base permite representar cada vetor por meio dos coeficientes de sua combinação linear.

**Teorema 3.1** (Representação única em uma base). *Se*

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\}$$

*é uma base de  $V$ , então todo vetor  $\mathbf{x} \in V$  pode ser escrito de maneira única como*

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_k \mathbf{b}_k.$$

*Comprovação.* Como  $\mathcal{B}$  gera  $V$ , existem escalares  $c_1, \dots, c_k$  tais que

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_k \mathbf{b}_k.$$

Suponha que também exista outra representação:

$$\mathbf{x} = d_1 \mathbf{b}_1 + \dots + d_k \mathbf{b}_k.$$

Subtraindo as duas expressões,

$$(c_1 - d_1) \mathbf{b}_1 + \dots + (c_k - d_k) \mathbf{b}_k = \mathbf{0}.$$

Como os vetores da base são linearmente independentes,

$$c_i - d_i = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Portanto,

$$c_i = d_i, \quad i = 1, \dots, k,$$

e a representação é única. □

**Definição 3.6** (Coordenadas em uma base). Se

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + c_k \mathbf{b}_k,$$

o vetor

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_k \end{bmatrix}$$

é o **vetor de coordenadas de  $\mathbf{x}$**  na base  $\mathcal{B}$ .

Considere a matriz formada pelos vetores da base:

$$\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_k].$$

A representação de  $\mathbf{x}$  pode ser escrita como

$$\mathbf{x} = \mathbf{B}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}.$$

**Exemplo 3.9** (Coordenadas de um vetor). Considere a base

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$

e o vetor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Deseja-se determinar  $c_1$  e  $c_2$  tais que

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Isso produz o sistema

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= 4, \\ c_1 - c_2 &= 2. \end{aligned}$$

Somando as equações,

$$2c_1 = 6,$$

de modo que

$$c_1 = 3.$$

Consequentemente,

$$c_2 = 1.$$

Logo,

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

As coordenadas dependem da base escolhida. O vetor permanece o mesmo, mas os coeficientes que o representam podem mudar.

As coordenadas de um vetor em uma base são os coeficientes que indicam quanto de cada vetor da base é necessário para reconstruir esse vetor por combinação linear. Assim, o vetor de coordenadas não é o próprio vetor, mas a representação desse vetor em relação à base escolhida.

### 3.2.5 Base canônica

**Definição 3.7** (Base canônica). A **base canônica** de  $\mathbb{R}^p$  é

$$\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p\},$$

em que  $\mathbf{e}_j$  possui valor 1 na posição  $j$  e valor 0 nas demais posições.

Em  $\mathbb{R}^3$ ,

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3.$$

Assim, as coordenadas de  $\mathbf{x}$  na base canônica coincidem com suas componentes usuais.

### 3.2.6 Bases ortogonais e ortonormais

A partir deste ponto, considere um subespaço  $S \subseteq \mathbb{R}^p$  com o produto interno euclidiano.

**Definição 3.8** (Base ortogonal). Uma base

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\}$$

de  $S$  é **ortogonal** quando

$$\mathbf{b}_i^\top \mathbf{b}_j = 0 \quad \text{para} \quad i \neq j.$$

**Definição 3.9** (Base ortonormal). Uma base  $\mathcal{B}$  de  $S$  é **ortonormal** quando seus vetores são ortogonais e possuem norma igual a 1:

$$\mathbf{b}_i^\top \mathbf{b}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Utilizando o delta de Kronecker, a condição de ortonormalidade pode ser escrita como

$$\mathbf{b}_i^\top \mathbf{b}_j = \delta_{ij}.$$

Se

$$\mathbf{Q} = [\mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \mathbf{b}_k]$$

possui como colunas os vetores de uma base ortonormal, então



$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_k.$$

Quando  $\mathbf{Q}$  é quadrada,

$$\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^\top.$$

Essa propriedade foi apresentada no capítulo anterior para matrizes ortogonais.

**Teorema 3.2** (Existência de bases ortonormais). *Todo subespaço de dimensão finita de  $\mathbb{R}^p$  possui uma base ortonormal.*

*A partir de qualquer base do subespaço, uma base ortonormal pode ser construída pelo processo de ortogonalização de Gram–Schmidt. (Meyer, 2023)*

Esse resultado garante que a geometria de um subespaço de dimensão finita pode ser descrita por direções mutuamente ortogonais e de norma unitária.

Em uma base ortogonal, os coeficientes da representação de um vetor podem ser determinados separadamente.

**Proposição 3.5** (Coordenadas em uma base ortogonal). *Se*

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\}$$

*é uma base ortogonal de um subespaço  $S \subseteq \mathbb{R}^p$ , então todo vetor  $\mathbf{x} \in S$  pode ser escrito de maneira única como*

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_k \mathbf{b}_k.$$

*Cada coordenada de  $\mathbf{x}$  na base  $\mathcal{B}$  pode ser obtida separadamente por*

$$c_j = \frac{\mathbf{b}_j^\top \mathbf{x}}{\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j}, \quad j = 1, \dots, k.$$

*Portanto,*

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^k \frac{\mathbf{b}_j^\top \mathbf{x}}{\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j} \mathbf{b}_j.$$

*Se a base é ortonormal, então  $\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j = 1$  para todo  $j$ , de modo que*

$$c_j = \mathbf{b}_j^\top \mathbf{x},$$

e

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^k (\mathbf{b}_j^\top \mathbf{x}) \mathbf{b}_j.$$

*Assim, em uma base ortogonal, cada coordenada pode ser determinada por meio de um produto interno, sem a necessidade de resolver simultaneamente um sistema linear. (Meyer, 2023)*

*Comprovação.* Como  $\mathcal{B}$  é uma base de  $S$ , todo vetor  $\mathbf{x} \in S$  pode ser escrito de maneira única como

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + c_k \mathbf{b}_k.$$

Multiplicando ambos os lados à esquerda por  $\mathbf{b}_j^\top$ ,

$$\mathbf{b}_j^\top \mathbf{x} = \sum_{i=1}^k c_i \mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_i.$$

Como a base é ortogonal,

$$\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_i = 0 \quad \text{para} \quad i \neq j.$$

Assim, todos os termos da soma com  $i \neq j$  são nulos, restando

$$\mathbf{b}_j^\top \mathbf{x} = c_j \mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j.$$

Como  $\mathbf{b}_j \neq \mathbf{0}$ ,

$$\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j = \|\mathbf{b}_j\|^2 > 0,$$

e, portanto,

$$c_j = \frac{\mathbf{b}_j^\top \mathbf{x}}{\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j}.$$

Se a base é ortonormal, então  $\|\mathbf{b}_j\| = 1$  e, consequentemente,

$$\mathbf{b}_j^\top \mathbf{b}_j = 1.$$

Logo,

$$c_j = \mathbf{b}_j^\top \mathbf{x},$$

o que fornece diretamente as coordenadas de  $\mathbf{x}$  na base ortonormal.  $\square$

A Figura 3.3 compara três bases de  $\mathbb{R}^2$  e destaca a diferença entre independência linear e ortogonalidade.




Figura 3.3: Comparação entre uma base canônica, uma base oblíqua e uma base ortonormal rotacionada de  $\mathbb{R}^2$ . O símbolo de ângulo reto identifica os pares de vetores ortogonais.

Na primeira e na terceira bases, os vetores são ortogonais e possuem norma igual a 1, como indicado pelos marcadores de ângulo reto. Portanto, ambas são bases ortonormais. Na base oblíqua, os vetores continuam sendo linearmente independentes e, por isso, formam uma base de  $\mathbb{R}^2$ , mas não são ortogonais.

### 3.2.7 Dimensão

Um espaço vetorial é denominado **finito-dimensional** quando possui uma base formada por um número finito de vetores.

Para que a dimensão possa ser definida pelo número de vetores de uma base, é necessário estabelecer primeiro que esse número não depende da base escolhida.

**Teorema 3.3** (Número de vetores de uma base). *Se um espaço vetorial  $V$  possui uma base finita, então todas as bases de  $V$  são finitas e possuem a mesma quantidade de vetores. (Meyer, 2023)*

**Definição 3.10** (Dimensão). Se as bases de um espaço vetorial finito-dimensional  $V$  possuem  $k$  vetores, a **dimensão** de  $V$  é definida por

$$\dim(V) = k.$$

Como a base canônica de  $\mathbb{R}^p$  possui  $p$  vetores,

$$\dim(\mathbb{R}^p) = p.$$

**Exemplo 3.10** (Dimensão de subespaços). A reta

$$W_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

possui dimensão 1.

O plano

$$W_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

possui dimensão 2.

O espaço  $\mathbb{R}^3$  possui dimensão 3.

**Proposição 3.6** (Independência, geração e dimensão). *Se  $\dim(V) = k$ , então:*

1. *qualquer conjunto com mais de  $k$  vetores é linearmente dependente;*
2. *qualquer conjunto com menos de  $k$  vetores não gera  $V$ ;*
3. *qualquer conjunto de  $k$  vetores linearmente independentes é uma base de  $V$ ;*
4. *qualquer conjunto de  $k$  vetores que gera  $V$  é uma base de  $V$ .*

Esses resultados relacionam bases, independência e geração. Para uma matriz, essa relação será expressa pelas dimensões de seus espaços coluna, linha e nulo.

### 3.3 Espaços fundamentais de uma matriz

Uma matriz está associada a subespaços determinados por suas linhas, por suas colunas e pelas soluções de sistemas homogêneos. Esses subespaços permitem interpretar geometricamente o posto, a dependência linear e as soluções de sistemas.

Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

Serão estudados quatro subespaços associados a  $\mathbf{A}$ :

- o espaço coluna;
- o espaço linha;
- o espaço nulo;
- o espaço nulo à esquerda.

Os dois primeiros são construídos a partir das colunas e das linhas da matriz. Os dois últimos são determinados pelas soluções dos sistemas homogêneos associados a  $\mathbf{A}$  e a  $\mathbf{A}^\top$ .

#### 3.3.1 Espaço nulo

**Definição 3.11** (Espaço nulo). O **espaço nulo** de uma matriz

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

é o conjunto

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p : \mathbf{Ax} = \mathbf{0}\}.$$

Quando  $\mathbf{A}$  é interpretada como a matriz associada a uma transformação linear, esse espaço corresponde ao **núcleo** da transformação. Essa interpretação será formalizada no capítulo seguinte.

O espaço nulo reúne todos os vetores  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  que são anulados pela multiplicação por  $\mathbf{A}$ , isto é, aqueles para os quais  $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ .

**Proposição 3.7** (O espaço nulo é um subespaço). *Para qualquer matriz*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

*o conjunto*

$$\mathcal{N}(\mathbf{A})$$

*é um subespaço de  $\mathbb{R}^p$ .*

*Comprovação.* O vetor nulo pertence a  $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ , pois

$$\mathbf{A}\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Se

$$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

então

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad \text{e} \quad \mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{0}.$$

Para quaisquer  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) &= \alpha\mathbf{A}\mathbf{x} + \beta\mathbf{A}\mathbf{y} \\ &= \alpha\mathbf{0} + \beta\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Logo,

$$\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

e  $\mathcal{N}(\mathbf{A})$  é um subespaço. □

A dimensão do espaço nulo é denominada **nulidade** da matriz:

$$\text{nul}(\mathbf{A}) = \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

**Exemplo 3.11** (Determinação do espaço nulo). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

Para determinar  $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ , resolve-se

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Assim,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

As duas equações são equivalentes, e o sistema reduz-se a

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 0.$$

Tomando

$$x_2 = s \quad \text{e} \quad x_3 = t,$$

obtém-se

$$x_1 = -2s + t.$$

Portanto,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2s + t \\ s \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Os dois vetores são linearmente independentes. Assim,

$$\text{nul}(\mathbf{A}) = 2.$$

Se

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\},$$

as colunas de  $\mathbf{A}$  são linearmente independentes. Nesse caso, o sistema homogêneo possui apenas a solução trivial.

### 3.3.2 Espaço coluna

**Definição 3.12** (Espaço coluna). O **espaço coluna** de uma matriz

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_{.1} \quad \mathbf{a}_{.2} \quad \cdots \quad \mathbf{a}_{.p}] \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

é o subespaço

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span} \{ \mathbf{a}_{.1}, \dots, \mathbf{a}_{.p} \} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

O produto matriz-vetor pode ser escrito como

$$\mathbf{Ax} = x_1 \mathbf{a}_{.1} + \cdots + x_p \mathbf{a}_{.p}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p.$$

Portanto, todo vetor produzido por  $\mathbf{A}$  é uma combinação linear de suas colunas.

Como

$$\mathbf{Ax} = x_1 \mathbf{a}_{.1} + \cdots + x_p \mathbf{a}_{.p},$$

o conjunto de todos os vetores que podem ser escritos na forma  $\mathbf{Ax}$  coincide com o espaço gerado pelas colunas de  $\mathbf{A}$ :

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \{ \mathbf{Ax} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \}.$$

Essa caracterização permite relacionar diretamente o espaço coluna à existência de soluções de sistemas lineares.



**Proposição 3.8** (Consistência de um sistema linear). *O sistema*

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

*possui pelo menos uma solução se, e somente se,*

$$\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

*Comprovação.* Se o sistema possui uma solução  $\mathbf{x}$ , então

$$\mathbf{b} = \mathbf{Ax},$$

de modo que  $\mathbf{b}$  é uma combinação linear das colunas de  $\mathbf{A}$ . Portanto,

$$\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

existem escalares  $x_1, \dots, x_p$  tais que

$$\mathbf{b} = x_1 \mathbf{a}_{.1} + \dots + x_p \mathbf{a}_{.p}.$$

Definindo

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p,$$

obtém-se

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}.$$

□

**Exemplo 3.12** (Determinação do espaço coluna). Considere novamente

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

As colunas são

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\mathbf{a}_2 = 2\mathbf{a}_1$$

e

$$\mathbf{a}_3 = -\mathbf{a}_1,$$

tem-se

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$$

Logo,

$$\dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = 1.$$

A dimensão do espaço coluna é igual ao posto da matriz:

$$\dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{posto}(\mathbf{A}).$$

Uma base de  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$  pode ser formada por quaisquer vetores linearmente independentes que gerem esse espaço. Quando se deseja obter uma base selecionando colunas da própria matriz  $\mathbf{A}$ , as posições das colunas pivô podem ser identificadas por escalonamento. Nesse procedimento, os vetores da base são as colunas correspondentes da matriz original, e não as colunas da matriz escalonada.

### 3.3.3 Espaço linha

**Definição 3.13** (Espaço linha). O **espaço linha** de uma matriz

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

é o subespaço de  $\mathbb{R}^p$  gerado por suas linhas.

Escrevendo as linhas de  $\mathbf{A}$  como

$$\mathbf{a}_1^\top, \mathbf{a}_2^\top, \dots, \mathbf{a}_n^\top,$$

o espaço linha pode ser representado por

$$\mathcal{L}(\mathbf{A}) = \text{span} \{ \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \} \subseteq \mathbb{R}^p.$$

Equivalentemente, como as linhas de  $\mathbf{A}$  são as colunas de  $\mathbf{A}^\top$ ,

$$\mathcal{L}(\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top).$$

O espaço linha e o espaço coluna possuem a mesma dimensão:

$$\dim \mathcal{L}(\mathbf{A}) = \dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{posto}(\mathbf{A}).$$

Essa igualdade permite interpretar o posto tanto como o número máximo de colunas linearmente independentes quanto como o número máximo de linhas linearmente independentes.

**Exemplo 3.13** (Determinação do espaço linha). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

As linhas de  $\mathbf{A}$  são

$$\mathbf{a}_1^\top = [1 \quad 2 \quad -1]$$

e

$$\mathbf{a}_2^\top = [2 \quad 4 \quad -2].$$

Os vetores-coluna associados a essas linhas são

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\mathbf{a}_2 = 2\mathbf{a}_1,$$

tem-se

$$\mathcal{L}(\mathbf{A}) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Logo,

$$\dim \mathcal{L}(\mathbf{A}) = 1.$$

As linhas não nulas de uma forma escalonada de  $\mathbf{A}$  formam uma base de  $\mathcal{L}(\mathbf{A})$ . Diferentemente do espaço coluna, pode-se utilizar diretamente as linhas da matriz escalonada, pois as operações elementares por linhas preservam o espaço linha.

### 3.3.4 Espaço nulo à esquerda

**Definição 3.14** (Espaço nulo à esquerda). O **espaço nulo à esquerda** de

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

é definido por

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{0}\}.$$

Um vetor  $\mathbf{y}$  pertence a  $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$  quando é ortogonal a todas as colunas de  $\mathbf{A}$ . De fato,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \mathbf{y} \\ \mathbf{a}_2^\top \mathbf{y} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_p^\top \mathbf{y} \end{bmatrix}.$$

Assim,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{0}$$

se, e somente se,

$$\mathbf{a}_j^\top \mathbf{y} = 0, \quad j = 1, \dots, p.$$

Portanto, todo vetor de  $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$  é ortogonal a cada coluna de  $\mathbf{A}$  e, conseqüentemente, a toda combinação linear dessas colunas. A relação entre o espaço nulo à esquerda e o complemento ortogonal do espaço coluna será formalizada adiante.

**Exemplo 3.14** (Determinação do espaço nulo à esquerda). Considere novamente

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

Para determinar  $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ , resolve-se

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{0}.$$

Assim,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

O sistema reduz-se a

$$y_1 + 2y_2 = 0.$$

Tomando

$$y_2 = t,$$

obtém-se

$$y_1 = -2t.$$

Portanto,

$$\mathbf{y} = t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

e

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Logo,

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = 1.$$

### 3.3.5 Extensão de uma base

Uma base de um subespaço pode ser completada acrescentando vetores até formar uma base de todo o espaço. Esse resultado será utilizado na demonstração do Teorema Posto–Nulidade.

**Teorema 3.4** (Extensão de uma base). *Seja  $W$  um subespaço de um espaço vetorial  $V$  de dimensão finita. Se*

$$\mathcal{B}_W = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_s\}$$

*é uma base de  $W$ , então existem vetores  $\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_r \in V$  tais que*

$$\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_s, \mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_r\}$$

*é uma base de  $V$ . (Meyer, 2023)*

*Comprovação.* Se  $\mathcal{B}_W$  já gera  $V$ , então  $\mathcal{B}_W$  é uma base de  $V$  e nada precisa ser acrescentado. Caso contrário, existe um vetor  $\mathbf{z}_1 \in V$  que não pertence ao subespaço gerado por  $\mathcal{B}_W$ . Assim,

$$\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_s, \mathbf{z}_1\}$$

é linearmente independente.

Se esse conjunto ainda não gera  $V$ , escolhe-se um vetor  $\mathbf{z}_2 \in V$  que não pertence ao subespaço gerado pelos vetores já selecionados. O novo conjunto continua linearmente independente.

Repetindo esse procedimento, acrescentam-se vetores enquanto o conjunto obtido não gerar  $V$ . Como  $V$  possui dimensão finita, não é possível acrescentar indefinidamente vetores linearmente independentes. Portanto, após um número finito de etapas, obtém-se um conjunto

$$\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_s, \mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_r\}$$

que é linearmente independente e gera  $V$ . Logo, esse conjunto é uma base de  $V$ .  $\square$

### 3.3.6 Teorema Posto–Nulidade

As dimensões do espaço nulo e do espaço coluna estão relacionadas ao número de colunas da matriz.

**Teorema 3.5** (Teorema Posto–Nulidade). *Se*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

*então*

$$\text{posto}(\mathbf{A}) + \text{nul}(\mathbf{A}) = p.$$

(Meyer, 2023)

*Comprovação.* Considere uma base do espaço nulo,

$$\mathcal{B}_\mathcal{N} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\},$$

em que

$$s = \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Pelo Teorema 3.4, essa base de  $\mathcal{N}(\mathbf{A})$  pode ser completada para formar uma base de  $\mathbb{R}^p$ . Assim, existem vetores  $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r \in \mathbb{R}^p$  tais que

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r\}$$

é uma base de  $\mathbb{R}^p$ .

Como essa base possui  $p$  vetores,

$$s + r = p.$$

Todo vetor  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  possui uma representação da forma

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^s \alpha_i \mathbf{v}_i + \sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{w}_j.$$

Como

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \mathbf{0}, \quad i = 1, \dots, s,$$

tem-se

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{A}\mathbf{w}_j.$$

Portanto,

$$\mathbf{A}\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{A}\mathbf{w}_r$$

geram  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ .

Para verificar a independência linear, suponha que

$$\sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{A}\mathbf{w}_j = \mathbf{0}.$$

Então,

$$\mathbf{A} \left( \sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{w}_j \right) = \mathbf{0},$$



de modo que

$$\sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{w}_j \in \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Esse vetor também pertence a

$$\text{span}\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r\}.$$

Como

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r\}$$

é uma base de  $\mathbb{R}^p$ , a interseção entre esses dois subespaços contém somente o vetor nulo. Assim,

$$\beta_1 = \dots = \beta_r = 0.$$

Logo,

$$\mathbf{A}\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{A}\mathbf{w}_r$$

formam uma base de  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ . Portanto,

$$r = \dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{posto}(\mathbf{A}).$$

Logo,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) + \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = p.$$

□

Aplicando o teorema a  $\mathbf{A}^\top$ ,

$$\text{posto}(\mathbf{A}^\top) + \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = n.$$

Como

$$\text{posto}(\mathbf{A}^\top) = \text{posto}(\mathbf{A}),$$

obtém-se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) + \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = n.$$

**Exemplo 3.15** (Aplicação do Teorema Posto–Nulidade). Para a matriz utilizada nesta seção,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = 1,$$

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = 2$$

e

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = 1.$$

Assim, para  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ ,

$$1 + 2 = 3,$$

confirmando que

$$\text{posto}(\mathbf{A}) + \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = 3.$$

Aplicando o resultado a  $\mathbf{A}^\top$ ,

$$1 + 1 = 2,$$

de modo que

$$\text{posto}(\mathbf{A}) + \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = 2.$$

Os resultados correspondem, respectivamente, às dimensões dos espaços ambientes  $\mathbb{R}^3$  e  $\mathbb{R}^2$ .

### 3.3.7 Os quatro espaços fundamentais

Os quatro subespaços associados a

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

são:

Tabela 3.1: Espaços fundamentais de uma matriz  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$  com posto  $r$ .

| Espaço                 | Definição                                                | Subespaço de   | Dimensão |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Espaço coluna          | $\mathcal{C}(\mathbf{A})$                                | $\mathbb{R}^n$ | $r$      |
| Espaço linha           | $\mathcal{L}(\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ | $\mathbb{R}^p$ | $r$      |
| Espaço nulo            | $\mathcal{N}(\mathbf{A})$                                | $\mathbb{R}^p$ | $p - r$  |
| Espaço nulo à esquerda | $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$                           | $\mathbb{R}^n$ | $n - r$  |

A Tabela 3.1 mostra que os quatro espaços se organizam em dois espaços ambientes. O espaço coluna e o espaço nulo à esquerda são subespaços de  $\mathbb{R}^n$ , enquanto o espaço linha e o espaço nulo são subespaços de  $\mathbb{R}^p$ .

### 3.3.8 Complemento ortogonal

**Definição 3.15** (Complemento ortogonal). Seja  $S$  um subespaço de  $\mathbb{R}^p$ . O **complemento ortogonal** de  $S$  é

$$S^\perp = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p : \mathbf{x}^\top \mathbf{s} = 0 \text{ para todo } \mathbf{s} \in S\}.$$

O complemento ortogonal reúne todos os vetores de  $\mathbb{R}^p$  que são ortogonais a cada vetor de  $S$ . Essa definição permite descrever relações importantes entre os quatro espaços fundamentais de uma matriz.

### 3.3.9 Relações de ortogonalidade

**Teorema 3.6** (Ortogonalidade entre os espaços fundamentais). *Para*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

*tem-se*

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp$$

*e*

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

*Comprovação.* Considere inicialmente

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Então

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Cada componente de  $\mathbf{A}\mathbf{x}$  é o produto interno entre uma linha de  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{x}$ . Portanto,  $\mathbf{x}$  é ortogonal a todas as linhas de  $\mathbf{A}$  e, conseqüentemente, a todo vetor de  $\mathcal{L}(\mathbf{A})$ . Logo,

$$\mathbf{x} \in \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp.$$

Assim,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp.$$

Reciprocamente, suponha que

$$\mathbf{x} \in \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp.$$

Então  $\mathbf{x}$  é ortogonal a todas as linhas de  $\mathbf{A}$ . Cada componente de  $\mathbf{A}\mathbf{x}$  é, portanto, igual a zero, de modo que

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

e

$$\mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp \subseteq \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Portanto,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp.$$

De forma análoga, para

$$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n,$$

a condição

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{0}$$

equivale a  $\mathbf{y}$  ser ortogonal a todas as colunas de  $\mathbf{A}$ . Portanto,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

□

Essas relações mostram que os espaços fundamentais se organizam em dois pares ortogonais:

$$\mathcal{L}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

em  $\mathbb{R}^p$ , e

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$$

em  $\mathbb{R}^n$ .

A decomposição dos espaços ambientes em somas diretas desses pares será obtida posteriormente a partir do resultado geral sobre complementos ortogonais.

## 3.4 Produtos internos, bases ortonormais e matrizes de Gram

O produto interno euclidiano

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}$$

define comprimentos, ângulos e ortogonalidade em  $\mathbb{R}^p$ . Além da geometria euclidiana, é possível definir outras geometrias atribuindo pesos e relações diferentes às coordenadas.

### 3.4.1 Aprofundamento: produtos internos e geometrias induzidas

#### Leitura de aprofundamento

Esta subseção generaliza o produto interno euclidiano por meio de matrizes positivas definidas e apresenta as normas, distâncias e relações de ortogonalidade associadas a essa generalização. Esses conceitos serão retomados no estudo da distância de Mahalanobis, de geometrias determinadas por matrizes de covariâncias e de problemas de mínimos quadrados ponderados.

Considere uma matriz simétrica positiva definida

$$\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

**Definição 3.16** (Produto interno induzido por uma matriz). O **produto interno induzido por  $\mathbf{M}$**  é definido por

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} = \mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{y}, \quad \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p.$$

A simetria de  $\mathbf{M}$  garante que

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle_{\mathbf{M}},$$

pois

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{y} = (\mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{y})^\top = \mathbf{y}^\top \mathbf{M}^\top \mathbf{x} = \mathbf{y}^\top \mathbf{M} \mathbf{x}.$$

A definição positiva garante que

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_{\mathbf{M}} = \mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{x} > 0$$

para todo  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ .

**Proposição 3.9** (Propriedades do produto interno induzido). *Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^p$  e  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,*

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle_{\mathbf{M}},$$

$$\langle \alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle_{\mathbf{M}} = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle_{\mathbf{M}} + \beta \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle_{\mathbf{M}},$$

e

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_{\mathbf{M}} > 0 \quad \text{para} \quad \mathbf{x} \neq \mathbf{0}.$$

(Horn; Johnson, 2013)

Quando

$$\mathbf{M} = \mathbf{I}_p,$$

recupera-se o produto interno euclidiano:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{I}_p} = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}.$$

**Exemplo 3.16** (Cálculo de um produto interno induzido). Considere

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Então,

$$\mathbf{M}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} = \mathbf{x}^{\top} \mathbf{M} \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = 3.$$

O produto interno euclidiano entre os mesmos vetores é

$$\mathbf{x}^{\top} \mathbf{y} = 1(2) + 2(-1) = 0.$$

Portanto, os vetores são ortogonais segundo o produto interno euclidiano, mas não segundo o produto interno induzido por  $\mathbf{M}$ .

### 3.4.1.1 Norma e distância induzidas

**Definição 3.17** (Norma induzida). A norma associada ao produto interno induzido por  $\mathbf{M}$  é

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{M}} = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_{\mathbf{M}}} = \sqrt{\mathbf{x}^{\top} \mathbf{M} \mathbf{x}}.$$

A distância associada é

$$d_{\mathbf{M}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_{\mathbf{M}},$$

ou, equivalentemente,

$$d_{\mathbf{M}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{y})^{\top} \mathbf{M} (\mathbf{x} - \mathbf{y})}.$$

Quando  $\mathbf{M} = \mathbf{I}_p$ , obtêm-se a norma e a distância euclidianas.

**Exemplo 3.17** (Norma e distância induzidas). Considere

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A norma euclidiana de  $\mathbf{x}$  é

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$



A norma induzida por  $\mathbf{M}$  é

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{M}} &= \sqrt{[2 \quad 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}} \\ &= \sqrt{8}.\end{aligned}$$

A segunda coordenada recebe peso maior na geometria definida por  $\mathbf{M}$ .

### 3.4.1.2 Ortogonalidade induzida

Dois vetores  $\mathbf{x}$  e  $\mathbf{y}$  são ortogonais segundo  $\mathbf{M}$  quando

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} = \mathbf{x}^{\top} \mathbf{M} \mathbf{y} = 0.$$

Uma base

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\}$$

é  $\mathbf{M}$ -ortonormal quando

$$\mathbf{b}_i^{\top} \mathbf{M} \mathbf{b}_j = \delta_{ij},$$

em que  $\delta_{ij}$  é o delta de Kronecker definido no capítulo anterior.

Se

$$\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \mathbf{b}_k],$$

essa condição pode ser escrita como

$$\mathbf{B}^{\top} \mathbf{M} \mathbf{B} = \mathbf{I}_k.$$

### 3.4.1.3 Relação com a geometria euclidiana

Como  $\mathbf{M}$  é simétrica positiva definida, existe uma matriz invertível  $\mathbf{C}$  tal que

$$\mathbf{M} = \mathbf{C}^\top \mathbf{C}.$$

Assim,

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} &= \mathbf{x}^\top \mathbf{C}^\top \mathbf{C} \mathbf{y} \\ &= (\mathbf{C} \mathbf{x})^\top (\mathbf{C} \mathbf{y}).\end{aligned}$$

Assim, o produto interno induzido por  $\mathbf{M}$  pode ser interpretado como o produto interno euclidiano entre os vetores  $\mathbf{C} \mathbf{x}$  e  $\mathbf{C} \mathbf{y}$ . Da mesma forma,

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{M}} = \|\mathbf{C} \mathbf{x}\|.$$

As curvas de nível

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{M}} = 1$$

satisfazem

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{x} = 1.$$

Na geometria euclidiana, essas curvas são circunferências quando  $\mathbf{M} = \mathbf{I}_2$  e elipses para outras matrizes positivas definidas.

A Figura 3.4 compara três geometrias em  $\mathbb{R}^2$ .

A matriz identidade produz a circunferência euclidiana. Uma matriz diagonal com pesos distintos produz uma elipse alinhada aos eixos coordenados. Elementos fora da diagonal podem alterar a orientação da elipse.

#### Matrizes semidefinidas positivas

Se  $\mathbf{M}$  é apenas semidefinida positiva, a expressão

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{M}} = \sqrt{\mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{x}}$$

pode ser igual a zero para algum vetor  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ .

Nesse caso, a expressão define uma **seminorma**, e não uma norma. Analogamente,

$$d_{\mathbf{M}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_{\mathbf{M}}$$




Figura 3.4: Curvas de norma unitária para diferentes produtos internos em  $\mathbb{R}^2$ .

pode ser igual a zero mesmo quando  $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ . Portanto, essa expressão define, em geral, uma **pseudodistância**.

Os produtos internos entre vários vetores podem ser organizados em uma matriz de Gram.

### 3.4.2 Matrizes de Gram

Os produtos internos entre um conjunto de vetores podem ser organizados em uma matriz.

**Definição 3.18** (Matriz de Gram). Sejam  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^p$  e

$$\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_k] \in \mathbb{R}^{p \times k}.$$

A **matriz de Gram** dos vetores é

$$\mathbf{G} = \mathbf{V}^\top \mathbf{V}.$$

Seu elemento na posição  $(i, j)$  é

$$g_{ij} = \mathbf{v}_i^\top \mathbf{v}_j.$$

A diagonal de  $\mathbf{G}$  contém os quadrados das normas:

$$g_{ii} = \mathbf{v}_i^\top \mathbf{v}_i = \|\mathbf{v}_i\|^2.$$

Os elementos fora da diagonal contêm os produtos internos entre vetores distintos.

Quando  $\mathbf{v}_i$  e  $\mathbf{v}_j$  são não nulos,

$$g_{ij} = \|\mathbf{v}_i\| \|\mathbf{v}_j\| \cos(\theta_{ij}).$$

Portanto, o produto interno depende tanto das normas quanto do ângulo entre os vetores.

**Exemplo 3.18** (Construção de uma matriz de Gram). Considere

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

A matriz de Gram é

$$\begin{aligned} \mathbf{G} &= \mathbf{V}^\top \mathbf{V} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Os elementos diagonais são

$$\|\mathbf{v}_1\|^2 = \|\mathbf{v}_2\|^2 = 2,$$

e o elemento fora da diagonal é

$$\mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_2 = 1.$$

### 3.4.3 Propriedades da matriz de Gram

**Proposição 3.10** (Propriedades da matriz de Gram). *Para*

$$\mathbf{G} = \mathbf{V}^\top \mathbf{V},$$

*tem-se:*

1.  $\mathbf{G}$  é simétrica;
2.  $\mathbf{G}$  é semidefinida positiva;
3.  $\mathbf{G}$  é positiva definida se, e somente se, as colunas de  $\mathbf{V}$  são linearmente independentes;
4.  $\text{posto}(\mathbf{G}) = \text{posto}(\mathbf{V})$ .

(Horn; Johnson, 2013)

*Comprovação.* A simetria decorre de

$$\mathbf{G}^\top = (\mathbf{V}^\top \mathbf{V})^\top = \mathbf{V}^\top \mathbf{V} = \mathbf{G}.$$

Para qualquer  $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^k$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{c}^\top \mathbf{G} \mathbf{c} &= \mathbf{c}^\top \mathbf{V}^\top \mathbf{V} \mathbf{c} \\ &= (\mathbf{V} \mathbf{c})^\top (\mathbf{V} \mathbf{c}) \\ &= \|\mathbf{V} \mathbf{c}\|^2 \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Logo,  $\mathbf{G}$  é semidefinida positiva.

Além disso,

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{G} \mathbf{c} = 0$$

se, e somente se,

$$\mathbf{V} \mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

Portanto,  $\mathbf{G}$  é positiva definida se, e somente se, o sistema homogêneo

$$\mathbf{V} \mathbf{c} = \mathbf{0}$$

possui apenas a solução trivial, o que equivale à independência linear das colunas de  $\mathbf{V}$ .  
Para demonstrar a igualdade dos núcleos, suponha inicialmente que

$$\mathbf{V}^\top \mathbf{V} \mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

Multiplicando à esquerda por  $\mathbf{c}^\top$ ,

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{V}^\top \mathbf{V} \mathbf{c} = \|\mathbf{V} \mathbf{c}\|^2 = 0.$$

Logo,

$$\mathbf{V} \mathbf{c} = \mathbf{0},$$

e, portanto,

$$\mathcal{N}(\mathbf{V}^\top \mathbf{V}) \subseteq \mathcal{N}(\mathbf{V}).$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{V} \mathbf{c} = \mathbf{0},$$

então

$$\mathbf{V}^\top \mathbf{V} \mathbf{c} = \mathbf{V}^\top \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

de modo que

$$\mathcal{N}(\mathbf{V}) \subseteq \mathcal{N}(\mathbf{V}^\top \mathbf{V}).$$

Assim,

$$\mathcal{N}(\mathbf{V}^\top \mathbf{V}) = \mathcal{N}(\mathbf{V}).$$

Como  $\mathbf{V}^\top \mathbf{V}$  e  $\mathbf{V}$  possuem o mesmo número de colunas, a igualdade das nulidades e o Teorema Posto–Nulidade implicam

$$\text{posto}(\mathbf{V}^\top \mathbf{V}) = \text{posto}(\mathbf{V}).$$

□

Uma consequência é:

$$\det(\mathbf{V}^\top \mathbf{V}) > 0$$

se, e somente se, as colunas de  $\mathbf{V}$  são linearmente independentes.

Quando as colunas são linearmente dependentes,

$$\det(\mathbf{V}^\top \mathbf{V}) = 0.$$

### 3.4.4 Matrizes de Gram e bases ortonormais

Se as colunas de  $\mathbf{Q}$  formam um conjunto ortonormal, então

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}.$$

Portanto, a matriz de Gram de um conjunto ortonormal é a matriz identidade.

Para uma base ortogonal não normalizada,

$$\mathbf{V}^\top \mathbf{V} = \text{diag}(\|\mathbf{v}_1\|^2, \dots, \|\mathbf{v}_k\|^2).$$

**Exemplo 3.19** (Matriz de Gram de uma base ortogonal). Considere

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_2 = 0,$$

os vetores são ortogonais.

A matriz de Gram é

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Normalizando os vetores,

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

obtém-se

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_2.$$

### 3.4.5 Produtos cruzados em uma matriz de dados

Considere uma matriz de dados

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}.$$

O produto

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

é a matriz de Gram das colunas de  $\mathbf{X}$ . Seus elementos são

$$(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})_{jk} = \sum_{i=1}^n x_{ij} x_{ik}.$$

Assim:

- os elementos diagonais são somas de quadrados das variáveis;
- os elementos fora da diagonal são produtos cruzados entre pares de variáveis.

O produto

$$\mathbf{X} \mathbf{X}^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

é a matriz de Gram das linhas de  $\mathbf{X}$ . Seus elementos são

$$(\mathbf{X} \mathbf{X}^\top)_{ij} = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j,$$

em que  $\mathbf{x}_i^\top$  e  $\mathbf{x}_j^\top$  representam duas observações.

A Tabela [3.2](#) resume as duas construções.



Tabela 3.2: Produtos de Gram associados a uma matriz de dados.

| Produto                      | Dimensão     | Vetores comparados    | Elemento genérico                |
|------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ | $p \times p$ | Colunas ou variáveis  | $\sum_{i=1}^n x_{ij}x_{ik}$      |
| $\mathbf{X}\mathbf{X}^\top$  | $n \times n$ | Linhas ou observações | $\mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j$ |

Quando as colunas da matriz de dados estão centradas,  $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$  reúne as somas de quadrados e produtos cruzados utilizadas na construção da matriz de covariâncias. Essa relação será retomada no capítulo sobre covariâncias e correlações.

As matrizes de Gram também aparecem na construção da projeção de um vetor sobre o espaço gerado pelas colunas de uma matriz.

### 3.4.6 Propriedades do complemento ortogonal

O complemento ortogonal, introduzido anteriormente na descrição dos espaços fundamentais de uma matriz, será agora estudado para um subespaço arbitrário de  $\mathbb{R}^p$ .

Se

$$S = \text{span}\{\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_k\},$$

então basta verificar a ortogonalidade em relação aos vetores geradores:

$$S^\perp = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p : \mathbf{s}_j^\top \mathbf{x} = 0, \quad j = 1, \dots, k \right\}.$$

Isso ocorre porque todo vetor de  $S$  é uma combinação linear dos vetores  $\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_k$ . Portanto, um vetor ortogonal a todos os geradores é ortogonal a todo o subespaço.

**Proposição 3.11** (O complemento ortogonal é um subespaço). *Se  $S$  é um subespaço de  $\mathbb{R}^p$ , então  $S^\perp$  também é um subespaço de  $\mathbb{R}^p$ .*

*Comprovação.* O vetor nulo pertence a  $S^\perp$ , pois

$$\mathbf{0}^\top \mathbf{s} = 0$$

para todo  $\mathbf{s} \in S$ .

Se

$$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in S^\perp,$$

então, para quaisquer  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  e  $\mathbf{s} \in S$ ,

$$(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y})^\top \mathbf{s} = \alpha\mathbf{x}^\top \mathbf{s} + \beta\mathbf{y}^\top \mathbf{s} = 0.$$

Portanto,

$$\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y} \in S^\perp,$$

e  $S^\perp$  é um subespaço de  $\mathbb{R}^p$ . □

**Exemplo 3.20** (Complemento ortogonal de uma reta). Considere

$$S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Um vetor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

pertence a  $S^\perp$  quando

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0.$$

Assim,

$$x_1 + 2x_2 = 0.$$

Tomando  $x_2 = t$ , obtém-se

$$x_1 = -2t.$$

Logo,

$$S^\perp = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

### 3.4.7 Dimensão do complemento ortogonal

**Proposição 3.12** (Dimensão do complemento ortogonal). *Se  $S$  é um subespaço de  $\mathbb{R}^p$ , então*

$$\dim(S) + \dim(S^\perp) = p.$$

*Comprovação.* Seja

$$\dim(S) = k.$$

Pelo Teorema 3.2, existe uma base ortonormal

$$\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k\}$$

de  $S$ .

Pelo Teorema 3.4, essa base de  $S$  pode ser completada para formar uma base de  $\mathbb{R}^p$ . Aplicando o processo de Gram–Schmidt aos vetores acrescentados, preservando os primeiros  $k$  vetores, obtém-se uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^p$ :

$$\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k, \mathbf{q}_{k+1}, \dots, \mathbf{q}_p\}.$$

Como a base é ortonormal,

$$\mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_j = 0, \quad i = 1, \dots, k, \quad j = k+1, \dots, p.$$

Portanto,

$$\mathbf{q}_{k+1}, \dots, \mathbf{q}_p \in S^\perp.$$

Além disso, esses vetores geram  $S^\perp$ . De fato, para qualquer

$$\mathbf{x} \in S^\perp,$$

como a coleção completa é uma base de  $\mathbb{R}^p$ , pode-se escrever

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \alpha_j \mathbf{q}_j.$$

Para  $i = 1, \dots, k$ ,

$$\mathbf{q}_i^\top \mathbf{x} = \alpha_i.$$

Como  $\mathbf{x} \in S^\perp$ ,

$$\mathbf{q}_i^\top \mathbf{x} = 0,$$

e, portanto,

$$\alpha_i = 0, \quad i = 1, \dots, k.$$

Logo,

$$\mathbf{x} = \sum_{j=k+1}^p \alpha_j \mathbf{q}_j,$$

de modo que

$$\{\mathbf{q}_{k+1}, \dots, \mathbf{q}_p\}$$

é uma base de  $S^\perp$ .

Assim,

$$\dim(S^\perp) = p - k,$$

e, como  $\dim(S) = k$ ,

$$\dim(S) + \dim(S^\perp) = p.$$

□

Consequentemente, se

$$\dim(S) = k,$$

então

$$\dim(S^\perp) = p - k.$$

Além disso,

$$S \cap S^\perp = \{\mathbf{0}\}.$$

De fato, se

$$\mathbf{x} \in S \cap S^\perp,$$

então  $\mathbf{x}$  é ortogonal a todos os vetores de  $S$ , inclusive a si próprio. Portanto,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2 = 0,$$

o que implica

$$\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Outra consequência importante é

$$(S^\perp)^\perp = S.$$

De fato,

$$S \subseteq (S^\perp)^\perp,$$

pois todo vetor de  $S$  é ortogonal a todos os vetores de  $S^\perp$ . Além disso,

$$\begin{aligned} \dim \left( (S^\perp)^\perp \right) &= p - \dim(S^\perp) \\ &= p - (p - k) \\ &= k \\ &= \dim(S). \end{aligned}$$

Como um subespaço está contido no outro e ambos possuem a mesma dimensão,

$$(S^\perp)^\perp = S.$$

### 3.4.8 Decomposição ortogonal

**Teorema 3.7** (Decomposição ortogonal). *Se  $S$  é um subespaço de  $\mathbb{R}^p$ , então todo vetor  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  pode ser escrito de maneira única como*

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_S + \mathbf{x}_{S^\perp},$$

em que

$$\mathbf{x}_S \in S$$

e

$$\mathbf{x}_{S^\perp} \in S^\perp.$$

Equivalentemente,

$$\mathbb{R}^p = S \oplus S^\perp.$$

O símbolo  $\oplus$  representa uma **soma direta**: cada vetor de  $\mathbb{R}^p$  possui uma única decomposição como soma de um vetor pertencente a  $S$  e um vetor pertencente a  $S^\perp$ .

*Comprovação.* Pelo Teorema 3.2, existe uma base ortonormal

$$\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k\}$$

de  $S$ .

Defina

$$\mathbf{x}_S = \sum_{j=1}^k (\mathbf{q}_j^\top \mathbf{x}) \mathbf{q}_j$$

e

$$\mathbf{x}_{S^\perp} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_S.$$

Por construção,

$$\mathbf{x}_S \in S.$$

Para cada  $i = 1, \dots, k$ ,

$$\begin{aligned}\mathbf{q}_i^\top \mathbf{x}_{S^\perp} &= \mathbf{q}_i^\top \mathbf{x} - \sum_{j=1}^k (\mathbf{q}_j^\top \mathbf{x}) \mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_j \\ &= \mathbf{q}_i^\top \mathbf{x} - \mathbf{q}_i^\top \mathbf{x} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbf{x}_{S^\perp} \in S^\perp,$$

o que demonstra a existência da decomposição.

Para demonstrar a unicidade, suponha que

$$\mathbf{x} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{r}_1 = \mathbf{s}_2 + \mathbf{r}_2,$$

com

$$\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2 \in S$$

e

$$\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \in S^\perp.$$

Então,

$$\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_2 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1.$$

O lado esquerdo pertence a  $S$ , enquanto o lado direito pertence a  $S^\perp$ . Portanto, esse vetor pertence a

$$S \cap S^\perp = \{\mathbf{0}\}.$$

Assim,

$$\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_2 = \mathbf{0}$$

e

$$\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathbf{s}_1 = \mathbf{s}_2 \quad \text{e} \quad \mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2.$$

Portanto, a decomposição é única. □

A decomposição separa  $\mathbf{x}$  em duas componentes únicas:  $\mathbf{x}_S \in S$  e  $\mathbf{x}_{S^\perp} \in S^\perp$ . Na seção seguinte, veremos que  $\mathbf{x}_S$  é precisamente a projeção ortogonal de  $\mathbf{x}$  sobre  $S$ , enquanto

$$\mathbf{x}_{S^\perp} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_S$$

é a componente ortogonal a  $S$ .

### 3.4.9 Decomposição dos espaços fundamentais

A decomposição ortogonal pode ser aplicada diretamente aos quatro espaços fundamentais de uma matriz.

**Proposição 3.13** (Decomposição dos espaços fundamentais). *Para uma matriz  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ,*

$$\mathbb{R}^p = \mathcal{L}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

e

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

De fato, pelo Teorema 3.6,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp.$$

Aplicando o Teorema 3.7,

$$\mathbb{R}^p = \mathcal{L}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Portanto, todo vetor  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  pode ser escrito de maneira única como



$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_{\mathcal{L}} + \mathbf{x}_{\mathcal{N}},$$

com  $\mathbf{x}_{\mathcal{L}} \in \mathcal{L}(\mathbf{A})$  e  $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ .

Analogamente,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp,$$

e, portanto,

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Assim, todo vetor  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  pode ser escrito de maneira única como

$$\mathbf{y} = \mathbf{y}_{\mathcal{C}} + \mathbf{y}_{\mathcal{N}^\top},$$

com  $\mathbf{y}_{\mathcal{C}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$  e  $\mathbf{y}_{\mathcal{N}^\top} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ .

Os quatro espaços fundamentais formam, portanto, dois pares de subespaços ortogonais complementares: um em  $\mathbb{R}^p$  e outro em  $\mathbb{R}^n$ .

### 3.5 Projeções ortogonais

O Teorema 3.7 estabelece que, para qualquer subespaço  $S \subseteq \mathbb{R}^p$ , todo vetor  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  admite uma decomposição única em uma componente pertencente a  $S$  e outra pertencente a  $S^\perp$ . Essa decomposição permite definir a projeção ortogonal sobre um subespaço.

**Definição 3.19** (Projeção ortogonal). Seja  $S$  um subespaço de  $\mathbb{R}^p$ . Pela decomposição ortogonal, todo vetor  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  pode ser escrito de maneira única como

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_S + \mathbf{x}_{S^\perp},$$

com  $\mathbf{x}_S \in S$  e  $\mathbf{x}_{S^\perp} \in S^\perp$ .

A **projeção ortogonal de  $\mathbf{x}$  sobre  $S$**  é definida por

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \mathbf{x}_S.$$

Consequentemente,

$$\mathbf{x} - \text{proj}_S(\mathbf{x}) \in S^\perp.$$

A forma da projeção depende de como o subespaço  $S$  é representado. Começaremos pelo caso mais simples, em que  $S$  possui dimensão 1.

### 3.5.1 Projeção sobre uma direção

Considere o subespaço unidimensional

$$S = \text{span}\{\mathbf{u}\},$$

em que

$$\mathbf{u} \neq \mathbf{0}.$$

A projeção de  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  sobre  $S$  deve pertencer ao próprio subespaço. Portanto, possui a forma

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \alpha \mathbf{u},$$

para algum  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

O resíduo

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \alpha \mathbf{u}$$

deve ser ortogonal a  $\mathbf{u}$ . Assim,

$$\mathbf{u}^\top (\mathbf{x} - \alpha \mathbf{u}) = 0.$$

Logo,

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{x} - \alpha \mathbf{u}^\top \mathbf{u} = 0,$$

e, como  $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ ,

$$\alpha = \frac{\mathbf{u}^\top \mathbf{x}}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}}.$$

**Proposição 3.14** (Projeção sobre uma direção). *Se*

$$S = \text{span}\{\mathbf{u}\}, \quad \mathbf{u} \neq \mathbf{0},$$

*então a projeção ortogonal de  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  sobre  $S$  é*

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{u}^\top \mathbf{x}}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} \mathbf{u}.$$

Como  $\mathbf{u}^\top \mathbf{x}$  é um escalar, pode-se escrever

$$\frac{\mathbf{u}^\top \mathbf{x}}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} \mathbf{u} = \frac{1}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} \mathbf{u} (\mathbf{u}^\top \mathbf{x}).$$

Pela associatividade da multiplicação matricial,

$$\mathbf{u} (\mathbf{u}^\top \mathbf{x}) = (\mathbf{u} \mathbf{u}^\top) \mathbf{x}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \text{proj}_S(\mathbf{x}) &= \frac{\mathbf{u}^\top \mathbf{x}}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} \mathbf{u} = \frac{1}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} \mathbf{u} (\mathbf{u}^\top \mathbf{x}) \\ &= \frac{1}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} (\mathbf{u} \mathbf{u}^\top) \mathbf{x} = \frac{\mathbf{u} \mathbf{u}^\top}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} \mathbf{x}. \end{aligned}$$

Portanto, definindo

$$\mathbf{P}_S = \frac{\mathbf{u} \mathbf{u}^\top}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}},$$

a projeção pode ser escrita na forma matricial

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \mathbf{P}_S \mathbf{x}.$$

A matriz

$$\mathbf{u} \mathbf{u}^\top$$

é o produto externo de  $\mathbf{u}$  por ele próprio. Como visto nos capítulos anteriores, essa matriz é simétrica e, para  $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ , possui posto 1. A normalização por  $\mathbf{u}^\top \mathbf{u}$  produz a matriz que projeta ortogonalmente os vetores sobre a direção gerada por  $\mathbf{u}$ .

Se  $\mathbf{u}$  possui norma igual a 1, então

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{u} = 1,$$

e as expressões reduzem-se a

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = (\mathbf{u}^\top \mathbf{x}) \mathbf{u}$$

e

$$\mathbf{P}_S = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top.$$

**Exemplo 3.21** (Projeção sobre uma reta). Considere

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Tomando

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{x} = 4$$

e

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{u} = 2.$$

Portanto,

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \frac{4}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Equivalentemente, a matriz de projeção é

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_S &= \frac{\mathbf{u}\mathbf{u}^\top}{\mathbf{u}^\top\mathbf{u}} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Assim,

$$\mathbf{P}_S\mathbf{x} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

O resíduo é

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \text{proj}_S(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

A ortogonalidade é verificada por

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 0.$$

Assim,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

com a primeira componente em  $S$  e a segunda em  $S^\perp$ .

A Figura 3.5 representa essa decomposição e destaca a ortogonalidade entre a projeção e o resíduo.

A projeção pertence ao subespaço  $S$ , enquanto o resíduo pertence a  $S^\perp$ . Essa decomposição será estendida para subespaços gerados por vários vetores.




Figura 3.5: Decomposição de um vetor em sua projeção sobre um subespaço e em um resíduo ortogonal.

### 3.5.2 Projeção sobre um subespaço com base ortonormal

Considere um subespaço

$$S = \text{span}\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k\} \subseteq \mathbb{R}^p,$$

em que

$$\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k\}$$

é uma base ortonormal de  $S$ .

A projeção de  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  sobre  $S$  é obtida somando as projeções de  $\mathbf{x}$  sobre cada vetor da base:

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^k (\mathbf{q}_j^\top \mathbf{x}) \mathbf{q}_j.$$

Como

$$(\mathbf{q}_j^\top \mathbf{x}) \mathbf{q}_j = \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top \mathbf{x},$$

tem-se

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \left( \sum_{j=1}^k \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top \right) \mathbf{x}.$$

Cada matriz

$$\mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top$$

é o produto externo do vetor  $\mathbf{q}_j$  por ele próprio. Como  $\mathbf{q}_j \neq \mathbf{0}$ , cada uma dessas matrizes possui posto 1 e projeta sobre a direção gerada por  $\mathbf{q}_j$ .

Reunindo os vetores da base na matriz

$$\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1 \quad \dots \quad \mathbf{q}_k] \in \mathbb{R}^{p \times k},$$

tem-se

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_k.$$

Além disso,

$$\mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \sum_{j=1}^k \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top.$$

Portanto,

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top \mathbf{x}.$$

**Proposição 3.15** (Projeção sobre uma base ortonormal). *Se as colunas de*

$$\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{p \times k}$$

*formam uma base ortonormal de  $S$ , então*

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top \mathbf{x}.$$

*A matriz de projeção sobre  $S$  é*

$$\mathbf{P}_S = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \sum_{j=1}^k \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top.$$

(Meyer, 2023)

O vetor

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^\top \mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{q}_k^\top \mathbf{x} \end{bmatrix}$$

contém as coordenadas da projeção de  $\mathbf{x}$  na base ortonormal de  $S$ . A multiplicação por  $\mathbf{Q}$  utiliza essas coordenadas para reconstruir o vetor projetado no espaço original:

$$\mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{Q}^\top} \mathbf{Q}^\top \mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{Q}} \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top \mathbf{x}.$$

Assim,  $\mathbf{Q}^\top$  obtém as coordenadas no subespaço, enquanto  $\mathbf{Q}$  reconstrói o vetor correspondente em  $\mathbb{R}^p$ .



**Exemplo 3.22** (Projeção sobre um plano). Considere o subespaço

$$S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Uma base ortonormal de  $S$  é formada por

$$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Assim,

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A matriz de projeção é

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_S &= \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{P}_S = \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^\top + \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2^\top.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \mathbf{P}_S \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

O resíduo é

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \text{proj}_S(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix},$$

que pertence a  $S^\perp$ .

### 3.5.3 Projecção sobre o espaço coluna de uma matriz

Considere vetores linearmente independentes

$$\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^p$$

e a matriz formada por esses vetores:

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \quad \dots \quad \mathbf{a}_k] \in \mathbb{R}^{p \times k}.$$

Como os vetores foram previamente nomeados e depois reunidos em  $\mathbf{A}$ , a notação  $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$  será mantida nesta subsecção.

O subespaço gerado pelas colunas de  $\mathbf{A}$  é

$$S = \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}.$$

A projecção de  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  sobre  $S$  deve pertencer ao espaço coluna de  $\mathbf{A}$ . Portanto, possui a forma

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{c},$$

para algum vetor de coeficientes

$$\mathbf{c} \in \mathbb{R}^k.$$

O resíduo

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{c}$$

deve pertencer ao complemento ortogonal de  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ . Assim, ele deve ser ortogonal a todas as colunas de  $\mathbf{A}$ :

$$\mathbf{A}^\top (\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{c}) = \mathbf{0}.$$

Desenvolvendo,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{x} - \mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{0},$$

de modo que

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{A}^\top \mathbf{x}.$$

A matriz

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$$

é a matriz de Gram das colunas de  $\mathbf{A}$ . Como essas colunas são linearmente independentes,  $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$  é positiva definida e, portanto, invertível.

Assim,

$$\mathbf{c} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{x}.$$

Substituindo em

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{c},$$

obtém-se

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{x}.$$

**Proposição 3.16** (Projeção sobre o espaço coluna). *Se*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times k}$$

*possui colunas linearmente independentes, a projeção ortogonal de  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  sobre  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$  é*

$$\text{proj}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}(\mathbf{x}) = \mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x},$$

*em que*

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} = \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top.$$

A matriz  $\mathbf{P}_\mathbf{A}$  depende apenas do subespaço gerado pelas colunas de  $\mathbf{A}$ , e não da base particular escolhida para representá-lo.

De fato, suponha que outra base do mesmo subespaço seja organizada em uma matriz

$$\mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{R},$$

em que  $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{k \times k}$  é invertível. Então

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_\mathbf{B} &= \mathbf{B} (\mathbf{B}^\top \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^\top \\ &= \mathbf{A} \mathbf{R} (\mathbf{R}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{R})^{-1} \mathbf{R}^\top \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{A} \mathbf{R} \mathbf{R}^{-1} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} (\mathbf{R}^\top)^{-1} \mathbf{R}^\top \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{P}_\mathbf{A}. \end{aligned}$$

Portanto, bases diferentes do mesmo subespaço produzem a mesma matriz de projeção ortogonal.

Quando as colunas de  $\mathbf{A}$  são ortonormais,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{I}_k,$$

e a expressão reduz-se a

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{A}^\top.$$

Esse é exatamente o resultado obtido anteriormente para uma matriz  $\mathbf{Q}$  cujas colunas formam uma base ortonormal:

$$\mathbf{P}_S = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top.$$

Portanto,

$$\mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top$$

é o caso ortonormal da expressão geral

$$\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top.$$

**Exemplo 3.23** (Projeção utilizando uma base não ortogonal). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

As colunas de  $\mathbf{A}$  são linearmente independentes. A matriz de Gram é

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

cuja inversa é

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Além disso,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Os coeficientes da projeção são

$$\begin{aligned}
\mathbf{c} &= (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{x} \\
&= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\text{proj}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}(\mathbf{x}) &= \mathbf{A}\mathbf{c} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 \\ 7/3 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1/3 \\ 8/3 \\ 7/3 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

O resíduo é

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \text{proj}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}.$$

A ortogonalidade pode ser verificada por

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\mathbf{r} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

### 3.5.4 Propriedades da matriz de projeção

**Proposição 3.17** (Propriedades da matriz de projeção). *Se*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times k}$$

*possui colunas linearmente independentes e*

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} = \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top,$$

então:

1.  $\mathbf{P}_\mathbf{A}$  é simétrica;
2.  $\mathbf{P}_\mathbf{A}$  é idempotente;
3.  $\mathcal{C}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})$ ;
4.  $\mathcal{N}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ ;
5.  $\text{posto}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \text{posto}(\mathbf{A}) = k$ .

*Comprovação.* A simetria decorre de

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_\mathbf{A}^\top &= \left[ \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \right]^\top \\ &= \mathbf{A} \left[ (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \right]^\top \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{P}_\mathbf{A}, \end{aligned}$$

pois  $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$  e sua inversa são simétricas.

Para verificar a idempotência,

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_\mathbf{A}^2 &= \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{P}_\mathbf{A}. \end{aligned}$$

Para determinar o espaço coluna, observe inicialmente que, para qualquer  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ ,

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{A} \left[ (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{x} \right].$$

Portanto,

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

e, conseqüentemente,

$$\mathcal{C}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{y} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

então existe  $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^k$  tal que

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{c}.$$

Assim,

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_\mathbf{A}\mathbf{y} &= \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{c} \\ &= \mathbf{A}\mathbf{c} \\ &= \mathbf{y}.\end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{P}_\mathbf{A}),$$

e, portanto,

$$\mathcal{C}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Para determinar o espaço nulo, observe que

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^\top\mathbf{P}_\mathbf{A} &= \mathbf{A}^\top\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top \\ &= \mathbf{A}^\top.\end{aligned}$$

Se

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{P}_\mathbf{A}),$$

então

$$\mathbf{P}_\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

e, portanto,

$$\mathbf{A}^\top\mathbf{x} = \mathbf{A}^\top\mathbf{P}_\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$



Logo,

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp,$$

então

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

e, conseqüentemente,

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Assim,

$$\mathcal{N}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Finalmente, como

$$\mathcal{C}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

tem-se

$$\text{posto}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = \text{posto}(\mathbf{A}).$$

Como as  $k$  colunas de  $\mathbf{A}$  são linearmente independentes,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = k.$$

Portanto,

$$\text{posto}(\mathbf{P}_\mathbf{A}) = k.$$

□

A idempotência possui uma interpretação direta: depois que um vetor foi projetado sobre  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ , uma nova aplicação da mesma projeção não o modifica:

$$\mathbf{P}_{\mathbf{A}} (\mathbf{P}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}) = \mathbf{P}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}.$$

Além disso, a igualdade

$$\mathcal{N}(\mathbf{P}_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^{\perp}$$

mostra que a projeção anula exatamente a componente de  $\mathbf{x}$  ortogonal ao subespaço projetado.

### 3.5.5 Aprofundamento: projeção residual e complemento ortogonal

#### Leitura de aprofundamento

Esta seção desenvolve a matriz que projeta um vetor sobre o complemento ortogonal de um subespaço. Essa representação será retomada no estudo de mínimos quadrados, da Decomposição em Valores Singulares e do modelo linear multivariado.

Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times k}$$

com colunas linearmente independentes e seja

$$\mathbf{P}_{\mathbf{A}}$$

a matriz de projeção ortogonal sobre  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ .

A componente de  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  que permanece fora desse subespaço é o resíduo

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{P}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}.$$

Definindo

$$\mathbf{M}_{\mathbf{A}} = \mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}},$$

tem-se

$$\mathbf{r} = \mathbf{M}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}.$$

**Definição 3.20** (Matriz de projeção residual). A matriz

$$\mathbf{M}_{\mathbf{A}} = \mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}}$$

é denominada **matriz de projeção residual**. Ela realiza a projeção ortogonal sobre

$$\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Como

$$\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top),$$

a matriz  $\mathbf{M}_{\mathbf{A}}$  também pode ser interpretada como a matriz de projeção ortogonal sobre o espaço nulo à esquerda de  $\mathbf{A}$ .

A decomposição ortogonal de  $\mathbf{x}$  pode ser escrita como

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}_{\mathbf{A}}\mathbf{x} + \mathbf{M}_{\mathbf{A}}\mathbf{x},$$

em que

$$\mathbf{P}_{\mathbf{A}}\mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$$

e

$$\mathbf{M}_{\mathbf{A}}\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Como essas duas componentes são ortogonais,

$$(\mathbf{P}_{\mathbf{A}}\mathbf{x})^\top (\mathbf{M}_{\mathbf{A}}\mathbf{x}) = 0.$$

Consequentemente, pelo Teorema de Pitágoras,

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \|\mathbf{P}_{\mathbf{A}}\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{M}_{\mathbf{A}}\mathbf{x}\|^2.$$

**Proposição 3.18** (Propriedades da matriz de projeção residual). *Se*

$$\mathbf{M}_{\mathbf{A}} = \mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}},$$

*então:*

1.  $\mathbf{M}_{\mathbf{A}}$  é simétrica;
2.  $\mathbf{M}_{\mathbf{A}}$  é idempotente;
3.  $\mathbf{P}_{\mathbf{A}}\mathbf{M}_{\mathbf{A}} = \mathbf{0}$  e  $\mathbf{M}_{\mathbf{A}}\mathbf{P}_{\mathbf{A}} = \mathbf{0}$ ;
4.  $\mathcal{C}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ ;
5.  $\mathcal{N}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})$ ;
6. se  $\mathbf{A}$  possui posto  $k$ , então  $\text{posto}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = p - k$ .

*Comprovação.* Como  $\mathbf{P}_{\mathbf{A}}$  é simétrica,

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_{\mathbf{A}}^\top &= (\mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}})^\top \\ &= \mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}}^\top \\ &= \mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}} \\ &= \mathbf{M}_{\mathbf{A}}.\end{aligned}$$

Portanto,  $\mathbf{M}_{\mathbf{A}}$  é simétrica.

Para verificar a idempotência,

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_{\mathbf{A}}^2 &= (\mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}})^2 \\ &= \mathbf{I}_p - 2\mathbf{P}_{\mathbf{A}} + \mathbf{P}_{\mathbf{A}}^2 \\ &= \mathbf{I}_p - \mathbf{P}_{\mathbf{A}} \\ &= \mathbf{M}_{\mathbf{A}},\end{aligned}$$

pois

$$\mathbf{P}_{\mathbf{A}}^2 = \mathbf{P}_{\mathbf{A}}.$$

Além disso,

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_A \mathbf{M}_A &= \mathbf{P}_A (\mathbf{I}_p - \mathbf{P}_A) \\ &= \mathbf{P}_A - \mathbf{P}_A^2 \\ &= \mathbf{0},\end{aligned}$$

e, de forma análoga,

$$\mathbf{M}_A \mathbf{P}_A = \mathbf{0}.$$

Para qualquer  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ ,

$$\mathbf{P}_A \mathbf{M}_A \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathbf{M}_A \mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{P}_A).$$

Como

$$\mathcal{N}(\mathbf{P}_A) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp,$$

tem-se

$$\mathcal{C}(\mathbf{M}_A) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{y} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp,$$

então

$$\mathbf{P}_A \mathbf{y} = \mathbf{0},$$

e, portanto,

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_A \mathbf{y} &= (\mathbf{I}_p - \mathbf{P}_A) \mathbf{y} \\ &= \mathbf{y}.\end{aligned}$$

Assim,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{M}_\mathbf{A}),$$

e

$$\mathcal{C}(\mathbf{M}_\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Agora, se

$$\mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

então

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

Consequentemente,

$$\mathbf{M}_\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

e

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{N}(\mathbf{M}_\mathbf{A}).$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{M}_\mathbf{A}),$$

então

$$(\mathbf{I}_p - \mathbf{P}_\mathbf{A}) \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

de modo que

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x}.$$

Como

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

segue que

$$\mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Portanto,

$$\mathcal{N}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Finalmente,

$$\mathcal{C}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Como

$$\dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = k,$$

o teorema da dimensão do complemento ortogonal fornece

$$\dim \mathcal{C}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = p - k.$$

Logo,

$$\text{posto}(\mathbf{M}_{\mathbf{A}}) = p - k.$$

□

### 3.5.6 Projeção como melhor aproximação

A projeção ortogonal pode ser caracterizada por uma propriedade de otimização: entre todos os vetores de um subespaço, ela é o único vetor que possui a menor distância até o vetor original.

**Teorema 3.8** (Teorema da melhor aproximação). *Seja  $S$  um subespaço de  $\mathbb{R}^p$  e seja*

$$\hat{\mathbf{x}} = \text{proj}_S(\mathbf{x}).$$

*Então, para qualquer  $\mathbf{y} \in S$ ,*

$$\|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

A igualdade ocorre se, e somente se,

$$\mathbf{y} = \hat{\mathbf{x}}.$$

(Meyer, 2023)

*Comprovação.* Como

$$\hat{\mathbf{x}} \in S$$

e

$$\mathbf{y} \in S,$$

tem-se

$$\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y} \in S.$$

Por outro lado, como  $\hat{\mathbf{x}}$  é a projeção ortogonal de  $\mathbf{x}$  sobre  $S$ , o resíduo

$$\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$$

pertence a  $S^\perp$ .

Portanto,

$$\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$$

e

$$\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}$$

são ortogonais.

Escrevendo

$$\mathbf{x} - \mathbf{y} = (\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}) + (\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}),$$

o Teorema de Pitágoras fornece



$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|^2 + \|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}\|^2.$$

Como

$$\|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}\|^2 \geq 0,$$

segue que

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 \geq \|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|^2.$$

A igualdade ocorre se, e somente se,

$$\|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{y}\|^2 = 0,$$

isto é,

$$\mathbf{y} = \hat{\mathbf{x}}.$$

□

Portanto, a projeção ortogonal pode ser caracterizada equivalentemente como

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \underset{\mathbf{y} \in S}{\text{argmin}} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2.$$

Assim, projetar ortogonalmente  $\mathbf{x}$  sobre  $S$  equivale a encontrar, entre todos os vetores pertencentes a  $S$ , aquele que está mais próximo de  $\mathbf{x}$  segundo a distância euclidiana.

Quando  $S = \mathcal{C}(\mathbf{A})$ , com  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times k}$ , todo vetor de  $S$  pode ser escrito como

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{c}, \quad \mathbf{c} \in \mathbb{R}^k.$$

Consequentemente, o problema de melhor aproximação pode ser escrito como

$$\hat{\mathbf{c}} \in \underset{\mathbf{c} \in \mathbb{R}^k}{\text{argmin}} \|\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{c}\|^2,$$

e o vetor mais próximo de  $\mathbf{x}$  em  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$  é

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{c}} = \text{proj}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}(\mathbf{x}).$$

Essa formulação estabelece a ligação entre projeção ortogonal e mínimos quadrados. O desenvolvimento algébrico dessa relação é apresentado a seguir como aprofundamento.

### 3.5.7 Aprofundamento: projeções e mínimos quadrados

#### Leitura de aprofundamento

Esta seção desenvolve algebricamente a relação entre projeção ortogonal e mínimos quadrados. As equações normais, os resíduos, as matrizes de projeção e a pseudoinversa serão retomados na Decomposição em Valores Singulares e no modelo linear multivariado.

Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times k}$$

e

$$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n.$$

O sistema

$$\mathbf{A}\beta = \mathbf{b}, \quad \beta \in \mathbb{R}^k,$$

possui solução exata se, e somente se,

$$\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Quando

$$\mathbf{b} \notin \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

não existe vetor  $\beta$  capaz de reproduzir exatamente  $\mathbf{b}$ . Nesse caso, procura-se a combinação linear das colunas de  $\mathbf{A}$  que mais se aproxima de  $\mathbf{b}$  no sentido da distância euclidiana.

O problema de mínimos quadrados é

$$\hat{\beta} \in \underset{\beta \in \mathbb{R}^k}{\operatorname{argmin}} \|\mathbf{b} - \mathbf{A}\beta\|^2.$$

Pelo Teorema 3.8, o vetor ajustado

$$\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{A}\hat{\beta}$$

é a projeção ortogonal de  $\mathbf{b}$  sobre o espaço coluna de  $\mathbf{A}$ :

$$\hat{\mathbf{b}} = \text{proj}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}(\mathbf{b}).$$

O vetor de resíduos é

$$\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\beta}.$$

Como a projeção é ortogonal,

$$\hat{\mathbf{e}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Pela relação entre os espaços fundamentais,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top),$$

portanto

$$\hat{\mathbf{e}} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Consequentemente,

$$\mathbf{A}^\top \hat{\mathbf{e}} = \mathbf{0}.$$

Substituindo

$$\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\beta},$$

obtém-se

$$\mathbf{A}^\top (\mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\beta}) = \mathbf{0},$$

e, portanto,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\hat{\beta} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}.$$

**Definição 3.21** (Equações normais). As equações

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}$$

são denominadas **equações normais** do problema de mínimos quadrados.

Se as colunas de  $\mathbf{A}$  são linearmente independentes, então

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = k$$

e a matriz de Gram

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$$

é positiva definida e invertível. Nesse caso, as equações normais possuem solução única:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b}.$$

O vetor ajustado pode então ser escrito como

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{b}} &= \mathbf{A} \hat{\boldsymbol{\beta}} \\ &= \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b} \\ &= \mathbf{P}_\mathbf{A} \mathbf{b}, \end{aligned}$$

enquanto o vetor de resíduos é

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{e}} &= \mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}} \\ &= (\mathbf{I}_n - \mathbf{P}_\mathbf{A}) \mathbf{b} \\ &= \mathbf{M}_\mathbf{A} \mathbf{b}. \end{aligned}$$

Aqui,

$$\mathbf{P}_\mathbf{A} = \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

projeta sobre  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ , enquanto

$$\mathbf{M}_\mathbf{A} = \mathbf{I}_n - \mathbf{P}_\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

projeta sobre

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

**Proposição 3.19** (Decomposição de mínimos quadrados). *No problema de mínimos quadrados,*

$$\mathbf{b} = \hat{\mathbf{b}} + \hat{\mathbf{e}},$$

em que

$$\hat{\mathbf{b}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$$

e

$$\hat{\mathbf{e}} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Consequentemente,

$$\hat{\mathbf{b}}^\top \hat{\mathbf{e}} = 0$$

e

$$\|\mathbf{b}\|^2 = \|\hat{\mathbf{b}}\|^2 + \|\hat{\mathbf{e}}\|^2.$$

(Golub; Van Loan, 2013)

Essa decomposição é a aplicação direta da decomposição ortogonal

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$$

ao vetor  $\mathbf{b}$ .

Se as colunas de  $\mathbf{A}$  são linearmente dependentes, o problema de mínimos quadrados pode possuir diferentes vetores de coeficientes que produzem o mesmo ajuste. Portanto,  $\hat{\beta}$  pode não ser único.

Entretanto, o vetor ajustado

$$\hat{\mathbf{b}} = \text{proj}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}(\mathbf{b})$$

permanece único, pois a projeção depende apenas do subespaço  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ .

Utilizando a pseudoinversa de Moore–Penrose (ver Definição 2.16),

$$\hat{\beta} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}$$

fornece, entre as soluções de mínimos quadrados, a solução de menor norma. O vetor ajustado pode ser escrito como

$$\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{A} \mathbf{A}^+ \mathbf{b},$$

de modo que

$$\mathbf{P}_{\mathbf{A}} = \mathbf{A} \mathbf{A}^+.$$

A pseudoinversa foi introduzida no capítulo anterior. Sua construção por meio da Decomposição em Valores Singulares será desenvolvida posteriormente.

As projeções ponderadas podem ser obtidas substituindo o produto interno euclidiano por um produto interno induzido por uma matriz positiva definida. Essa extensão será retomada no estudo de problemas de mínimos quadrados ponderados.

## 3.6 Síntese do capítulo

Os espaços vetoriais permitem organizar conjuntos de vetores que preservam as operações de adição e multiplicação por escalar. Dentro desses espaços, os subespaços representam estruturas lineares de menor dimensão, enquanto bases fornecem conjuntos de vetores linearmente independentes capazes de gerar todo o espaço considerado. Fixada uma base, cada vetor pode ser representado de maneira única por suas coordenadas nessa base.

A dimensão quantifica o número de direções independentes necessárias para representar um espaço. Para uma matriz

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

essa ideia conduz aos quatro espaços fundamentais:

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}), \quad \mathcal{L}(\mathbf{A}), \quad \mathcal{N}(\mathbf{A}) \quad \text{e} \quad \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Se  $r = \text{posto}(\mathbf{A})$ , suas dimensões são

$$\dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \dim \mathcal{L}(\mathbf{A}) = r,$$

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = p - r$$

e

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = n - r.$$

Esses espaços se organizam em pares ortogonais:

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{L}(\mathbf{A})^\perp$$

e

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Consequentemente,

$$\mathbb{R}^p = \mathcal{L}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

e

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

As matrizes de Gram organizam produtos internos entre conjuntos de vetores. Para uma matriz  $\mathbf{V}$ ,

$$\mathbf{G} = \mathbf{V}^\top \mathbf{V}$$

é simétrica e semidefinida positiva, e sua estrutura permite relacionar produtos internos, independência linear e posto.

A decomposição ortogonal estabelece que, para qualquer subespaço  $S \subseteq \mathbb{R}^p$ , todo vetor pode ser escrito de maneira única como

$$\mathbf{x} = \text{proj}_S(\mathbf{x}) + \mathbf{x}_{S^\perp},$$

com  $\text{proj}_S(\mathbf{x}) \in S$  e  $\mathbf{x}_{S^\perp} \in S^\perp$ .

Se as colunas de  $\mathbf{Q}$  formam uma base ortonormal de  $S$ , a matriz de projeção é

$$\mathbf{P}_S = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \sum_{j=1}^k \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top.$$

Se  $S = \mathcal{C}(\mathbf{A})$  e as colunas de  $\mathbf{A}$  são linearmente independentes, a mesma projeção pode ser escrita como

$$\mathbf{P}_A = \mathbf{A} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top.$$

A projeção ortogonal possui ainda uma interpretação por otimização:

$$\text{proj}_S(\mathbf{x}) = \underset{\mathbf{y} \in S}{\text{argmin}} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2.$$

Essa propriedade estabelece a ligação entre geometria, projeções e problemas de mínimos quadrados.

As partes de aprofundamento generalizam a geometria euclidiana por meio de produtos internos induzidos por matrizes positivas definidas e desenvolvem a matriz de projeção residual, as equações normais, o caso de posto deficiente e a pseudoinversa. Esses resultados serão retomados quando sua utilização se tornar necessária nos capítulos posteriores.

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- verificar se um conjunto é um subespaço vetorial;
- interpretar geração, dependência e independência linear;
- identificar bases e determinar dimensões;
- representar vetores por coordenadas em uma base;
- distinguir bases gerais, ortogonais e ortonormais;
- determinar e interpretar os quatro espaços fundamentais de uma matriz;
- relacionar posto, nulidade e dimensão;
- interpretar as relações de ortogonalidade entre os espaços fundamentais;
- construir e interpretar matrizes de Gram;
- determinar complementos ortogonais e decomposições ortogonais;
- calcular projeções sobre direções e subespaços;
- interpretar a projeção ortogonal como problema de melhor aproximação;
- reconhecer a relação geométrica entre projeções e mínimos quadrados.

No próximo capítulo, as matrizes serão estudadas como representações de transformações lineares entre espaços vetoriais. Os conceitos de base, dimensão, posto, espaços fundamentais e projeções desenvolvidos aqui permitirão interpretar como essas transformações atuam sobre vetores e subespaços. O espaço nulo e o espaço coluna também serão relacionados, nesse novo contexto, ao núcleo e à imagem da transformação associada a uma matriz.



## 4 Transformações lineares

Os capítulos anteriores apresentaram vetores, matrizes, espaços vetoriais, bases e projeções. Esses objetos permitem representar observações multivariadas e descrever relações lineares entre suas coordenadas.

Uma matriz também pode representar uma aplicação que transforma vetores. Essa aplicação pode alterar a orientação, a escala ou a dimensão da configuração original. Quando preserva combinações lineares, ela é denominada **transformação linear**.

No capítulo anterior, o espaço nulo e o espaço coluna foram definidos diretamente a partir de uma matriz. Neste capítulo, essas estruturas serão também interpretadas, respectivamente, como o núcleo e a imagem da transformação linear associada à matriz.

Este capítulo desenvolve a definição e a representação matricial das transformações lineares, sua aplicação a matrizes de dados, a composição de operações, a invertibilidade e a perda de informação. Também são estudadas transformações geométricas, transformações ortogonais, mudanças de coordenadas e transformações afins utilizadas no pré-processamento de dados.

### Convenções para transformações lineares

As convenções vetoriais e matriciais estabelecidas nos capítulos anteriores permanecem válidas. Neste capítulo, serão utilizadas também as seguintes convenções:

- $T : V \rightarrow W$  representa uma transformação entre os espaços vetoriais  $V$  e  $W$ ;
- $V$  representa o domínio e  $W$  o contradomínio da transformação;
- $\mathbf{x} \in V$  representa um vetor do domínio e  $T(\mathbf{x}) \in W$  sua imagem pela transformação;
- $T_{\mathbf{A}}$  representa a transformação linear associada à matriz  $\mathbf{A}$ ;
- $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}$  representa uma transformação de  $\mathbb{R}^p$  em  $\mathbb{R}^q$  quando utilizada na forma  $T_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax}$ ;
- $\ker(T)$  representa o núcleo de uma transformação linear;
- $\text{Im}(T)$  representa a imagem de uma transformação linear;
- $\mathcal{E}_p$  representa a base canônica de  $\mathbb{R}^p$ ;
- $[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$  representa a matriz de uma transformação em relação a uma base  $\mathcal{B}$  do domínio e a uma base  $\mathcal{C}$  do contradomínio.

As relações entre essas notações e os espaços fundamentais das matrizes serão estabelecidas ao longo do capítulo.

## 4.1 Transformações lineares e representação matricial

Uma aplicação entre espaços vetoriais associa a cada vetor do domínio um vetor do contradomínio. A linearidade exige que essa aplicação preserve as operações de adição e multiplicação por escalar.

**Definição 4.1** (Transformação linear). Sejam  $V$  e  $W$  espaços vetoriais reais. Uma aplicação

$$T : V \longrightarrow W$$

é uma **transformação linear** quando, para quaisquer vetores  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$  e escalares  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,

$$T(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) = \alpha T(\mathbf{u}) + \beta T(\mathbf{v}).$$

Tomando  $\alpha = \beta = 1$ , obtém-se a preservação da soma:

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}).$$

Tomando  $\beta = 0$ , obtém-se a preservação da multiplicação por escalar:

$$T(\alpha\mathbf{u}) = \alpha T(\mathbf{u}).$$

Assim, a imagem de uma combinação linear é a combinação linear das imagens:

$$T\left(\sum_{j=1}^k \alpha_j \mathbf{v}_j\right) = \sum_{j=1}^k \alpha_j T(\mathbf{v}_j).$$

A Figura 4.1 representa a preservação da soma. O paralelogramo formado pelos vetores originais é transformado em outro paralelogramo cujos lados são as imagens desses vetores.

No primeiro painel,  $\mathbf{u} + \mathbf{v}$  é a diagonal do paralelogramo formado pelos vetores originais. No segundo painel, a relação

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$$

é preservada.




Figura 4.1: Preservação da soma de vetores por uma transformação linear.

**Proposição 4.1** (Propriedades elementares das transformações lineares). *Se*

$$T : V \longrightarrow W$$

*é uma transformação linear, então:*

1.  $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ ;
2.  $T(-\mathbf{x}) = -T(\mathbf{x})$ ;
3.  $T(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) - T(\mathbf{v})$ .

(Meyer, 2023)

*Comprovação.* Pela homogeneidade,

$$T(\mathbf{0}) = T(0\mathbf{x}) = 0T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Também pela homogeneidade,

$$T(-\mathbf{x}) = T((-1)\mathbf{x}) = -T(\mathbf{x}).$$

Consequentemente,

$$\begin{aligned}
T(\mathbf{u} - \mathbf{v}) &= T(\mathbf{u} + (-\mathbf{v})) \\
&= T(\mathbf{u}) + T(-\mathbf{v}) \\
&= T(\mathbf{u}) - T(\mathbf{v}).
\end{aligned}$$

□

A igualdade  $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$  é uma condição necessária para a linearidade. Se uma aplicação não envia o vetor nulo ao vetor nulo, ela não é uma transformação linear.

#### 4.1.1 Transformação determinada por uma base

Uma transformação linear é determinada por sua ação sobre os vetores de uma base do domínio.

**Teorema 4.1** (Determinação de uma transformação por uma base). *Seja  $V$  um espaço vetorial de dimensão finita e seja*

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$$

*uma base de  $V$ . Uma transformação linear*

$$T : V \longrightarrow W$$

*fica completamente determinada pelos vetores*

$$T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_k).$$

(Meyer, 2023)

*Comprovação.* Todo vetor  $\mathbf{x} \in V$  possui uma representação única na base  $\mathcal{B}$ :

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k.$$

Pela linearidade,

$$T(\mathbf{x}) = c_1 T(\mathbf{v}_1) + \dots + c_k T(\mathbf{v}_k).$$

Portanto, conhecidas as imagens dos vetores da base, a imagem de qualquer vetor do domínio fica determinada de maneira única. □

Considere uma transformação

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

definida sobre os vetores da base canônica por

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$T(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2,$$

tem-se

$$\begin{aligned} T(\mathbf{x}) &= x_1 T(\mathbf{e}_1) + x_2 T(\mathbf{e}_2) \\ &= x_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ x_1 + 3x_2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Essa expressão pode ser escrita como

$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

As colunas da matriz são as imagens dos vetores da base canônica.

### 4.1.2 Representação matricial nas bases canônicas

Considere uma transformação linear

$$T : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q.$$

Se

$$\mathcal{E}_p = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p\}$$

é a base canônica de  $\mathbb{R}^p$ , defina

$$\mathbf{a}_j = T(\mathbf{e}_j), \quad j = 1, \dots, p.$$

Organizando esses vetores nas colunas de uma matriz, obtém-se

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \quad \dots \quad \mathbf{a}_p] \in \mathbb{R}^{q \times p}.$$

Para

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + \dots + x_p \mathbf{e}_p,$$

a linearidade fornece

$$\begin{aligned} T(\mathbf{x}) &= x_1 T(\mathbf{e}_1) + \dots + x_p T(\mathbf{e}_p) \\ &= x_1 \mathbf{a}_1 + \dots + x_p \mathbf{a}_p \\ &= \mathbf{A}\mathbf{x}. \end{aligned}$$

**Teorema 4.2** (Representação matricial de uma transformação linear). *Toda transformação linear*

$$T : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$$

*pode ser representada de maneira única por uma matriz*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

*tal que*

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

para todo  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ .

A  $j$ -ésima coluna de  $\mathbf{A}$  é a imagem do  $j$ -ésimo vetor da base canônica:

$$\mathbf{a}_j = T(\mathbf{e}_j).$$

(Meyer, 2023)

Reciprocamente, toda matriz

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

define uma transformação linear

$$T_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$$

por

$$T_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}.$$

De fato,

$$\begin{aligned} T_{\mathbf{A}}(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) &= \mathbf{A}(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) \\ &= \alpha \mathbf{A}\mathbf{u} + \beta \mathbf{A}\mathbf{v} \\ &= \alpha T_{\mathbf{A}}(\mathbf{u}) + \beta T_{\mathbf{A}}(\mathbf{v}). \end{aligned}$$

A matriz apresentada nessa representação corresponde às bases canônicas do domínio e do contradomínio. A representação em bases gerais será desenvolvida posteriormente.

### 4.1.3 Núcleo e imagem de uma transformação linear

Dois subespaços descrevem aspectos fundamentais da ação de uma transformação linear: os vetores do domínio que são enviados ao vetor nulo e os vetores do contradomínio que podem ser obtidos pela transformação.

**Definição 4.2** (Núcleo e imagem de uma transformação linear). Seja

$$T : V \longrightarrow W$$

uma transformação linear.

O **núcleo** de  $T$  é o conjunto

$$\ker(T) = \{\mathbf{x} \in V : T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}.$$

A **imagem** de  $T$  é o conjunto

$$\text{Im}(T) = \{T(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in V\}.$$

O núcleo é um subespaço do domínio  $V$ , enquanto a imagem é um subespaço do contradomínio  $W$ .

Para a transformação matricial

$$T_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q, \quad T_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax},$$

o núcleo é

$$\begin{aligned} \ker(T_{\mathbf{A}}) &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p : \mathbf{Ax} = \mathbf{0}\} \\ &= \mathcal{N}(\mathbf{A}), \end{aligned}$$

e a imagem é

$$\begin{aligned} \text{Im}(T_{\mathbf{A}}) &= \{\mathbf{Ax} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p\} \\ &= \mathcal{C}(\mathbf{A}). \end{aligned}$$

Assim, o espaço nulo e o espaço coluna estudados no capítulo anterior correspondem, respectivamente, ao núcleo e à imagem da transformação linear associada à matriz  $\mathbf{A}$ .



#### 4.1.4 Imagem de um subespaço

Considere um subespaço

$$S = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq V.$$

Todo vetor  $\mathbf{x} \in S$  possui a forma

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k.$$

Aplicando  $T$ ,

$$T(\mathbf{x}) = \alpha_1 T(\mathbf{v}_1) + \dots + \alpha_k T(\mathbf{v}_k).$$

Portanto,

$$T(S) = \text{span}\{T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_k)\}.$$

A imagem de um subespaço por uma transformação linear também é um subespaço do contradomínio.

A transformação preserva as combinações lineares, mas pode reduzir a dimensão do espaço gerado. Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Os vetores canônicos  $\mathbf{e}_1$  e  $\mathbf{e}_2$  são linearmente independentes, mas

$$\mathbf{A}\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{A}\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A segunda direção é eliminada e a imagem da transformação possui dimensão 1. A relação entre preservação da independência linear, núcleo, posto e injetividade será desenvolvida na seção sobre invertibilidade e perda de informação.

## 4.2 Transformação de vetores e matrizes de dados

A representação

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

considera cada observação como um vetor-coluna. Em uma matriz de dados, as observações são organizadas nas linhas. A aplicação simultânea da transformação exige, portanto, a transposição da matriz que atua sobre cada vetor.

Considere

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \mathbf{x}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

em que

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p, \quad i = 1, \dots, n,$$

representa a  $i$ -ésima observação.

Se

$$T : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$$

é representada por

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p},$$

a imagem de cada observação é

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^q.$$

Transpondo essa igualdade,

$$\mathbf{y}_i^\top = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{A}^\top.$$

**Proposição 4.2** (Transformação de uma matriz de dados). *Se as observações estão organizadas nas linhas de*

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

*e cada observação é transformada por*

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p},$$

*então a matriz transformada é*

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{A}^\top \in \mathbb{R}^{n \times q}.$$

*Comprovação.* A  $i$ -ésima linha de  $\mathbf{Y}$  é

$$\mathbf{x}_i^\top \mathbf{A}^\top.$$

Como

$$\mathbf{x}_i^\top \mathbf{A}^\top = (\mathbf{A}\mathbf{x}_i)^\top = \mathbf{y}_i^\top,$$

tem-se

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1^\top \\ \mathbf{y}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{y}_n^\top \end{bmatrix} = \mathbf{X}\mathbf{A}^\top.$$

□

As dimensões da multiplicação são

$$\underbrace{\mathbf{X}}_{n \times p} \underbrace{\mathbf{A}^\top}_{p \times q} = \underbrace{\mathbf{Y}}_{n \times q}.$$

A transposição não altera a transformação definida sobre vetores-coluna. Ela adapta a multiplicação à organização das observações nas linhas da matriz de dados.

Em R, essa operação pode ser realizada por:

```
Y <- X %*% t(A)
```

### 4.2.1 Novas variáveis como combinações lineares

Seja

$$\mathbf{w}_j \in \mathbb{R}^p$$

o vetor de coeficientes associado à  $j$ -ésima coordenada transformada. As linhas de  $\mathbf{A}$  podem ser representadas por

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^\top \\ \mathbf{w}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{w}_q^\top \end{bmatrix},$$

de modo que

$$\mathbf{A}^\top = [\mathbf{w}_1 \quad \mathbf{w}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{w}_q].$$

Consequentemente,

$$\mathbf{Y} = [\mathbf{X}\mathbf{w}_1 \quad \mathbf{X}\mathbf{w}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{X}\mathbf{w}_q].$$

A  $j$ -ésima coluna da matriz transformada é

$$\mathbf{y}_{\cdot j} = \mathbf{X}\mathbf{w}_j.$$

Cada nova variável é, portanto, uma combinação linear das variáveis originais. Para a  $i$ -ésima observação,

$$y_{ij} = a_{j1}x_{i1} + a_{j2}x_{i2} + \cdots + a_{jp}x_{ip}.$$

Essa relação permite interpretar a transformação de duas maneiras complementares:

- cada linha de  $\mathbf{Y}$  é a imagem de uma observação;
- cada coluna de  $\mathbf{Y}$  é uma nova variável construída por combinação linear.

**Exemplo 4.1** (Transformação de um conjunto de observações). Considere

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Para uma observação genérica,

$$\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_i &= \mathbf{A}\mathbf{x}_i \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_{i1} + x_{i2} \\ 2x_{i1} - x_{i2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Como as observações estão nas linhas de  $\mathbf{X}$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= \mathbf{X}\mathbf{A}^\top \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

A primeira variável transformada é a soma das duas variáveis originais:

$$\mathbf{y}_{.1} = \mathbf{x}_{.1} + \mathbf{x}_{.2}.$$

A segunda é

$$\mathbf{y}_{.2} = 2\mathbf{x}_{.1} - \mathbf{x}_{.2}.$$

### 4.2.2 Dimensão da configuração transformada

Quando

$$q = p,$$

a transformação atua entre espaços de mesma dimensão:

$$T : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^p.$$

e o domínio e o contradomínio possuem a mesma dimensão. A dimensão efetiva da imagem, entretanto, pode ser menor que  $p$  quando  $\mathbf{A}$  não possui posto completo.

Quando

$$q < p,$$

a transformação produz vetores com menos coordenadas:

$$T : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q.$$

Quando

$$q > p,$$

os vetores passam a ser representados em um espaço com mais coordenadas. Esse aumento do contradomínio não implica aumento da dimensão efetiva da imagem.

Se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = r,$$

então

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) \subseteq \mathbb{R}^q$$

possui dimensão  $r$ . Como

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i,$$

todas as observações transformadas pertencem a esse espaço:

$$\mathbf{y}_i \in \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Portanto, todas as observações transformadas pertencem a um subespaço de dimensão

$$r = \text{posto}(\mathbf{A}).$$

Assim, a dimensão da configuração transformada não pode exceder  $\text{posto}(\mathbf{A})$ , embora possa ser menor, dependendo da configuração original dos dados.

Se

$$r = q,$$

a imagem coincide com todo o contradomínio.

Se

$$r < q,$$

a imagem ocupa apenas um subespaço próprio de  $\mathbb{R}^q$ .

Quando  $r < p$ , a transformação possui núcleo não trivial e elimina pelo menos uma direção do domínio. Existe, nesse caso, um vetor não nulo

$$\mathbf{v} \in \ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

tal que

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Para qualquer  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ ,

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{v}) &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{A}\mathbf{v} \\ &= \mathbf{A}\mathbf{x}.\end{aligned}$$

Vetores distintos podem, portanto, produzir a mesma imagem quando diferem por um elemento do espaço nulo.

A Figura 4.2 compara os efeitos de diferentes matrizes sobre uma mesma configuração de pontos.




Figura 4.2: Efeito de diferentes transformações lineares sobre uma mesma configuração de pontos.



A rotação gira a configuração em relação aos eixos coordenados sem alterar sua forma. A reflexão também preserva a forma, mas inverte sua orientação. O escalonamento modifica os comprimentos em cada direção, enquanto o cisalhamento altera uma coordenada de acordo com a outra. A projeção elimina a segunda coordenada e reduz a configuração a uma reta.

As cinco operações preservam combinações lineares. Entretanto, não preservam necessariamente comprimentos, ângulos, áreas ou dimensão.

### 4.2.3 Efeito sobre diferenças e produtos internos

Se duas observações são representadas por  $\mathbf{x}_i$  e  $\mathbf{x}_j$ , então

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_i - \mathbf{y}_j &= \mathbf{A}\mathbf{x}_i - \mathbf{A}\mathbf{x}_j \\ &= \mathbf{A}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j).\end{aligned}$$

A transformação das diferenças determina o efeito sobre as distâncias. O quadrado da distância entre as imagens é

$$\begin{aligned}\|\mathbf{y}_i - \mathbf{y}_j\|^2 &= [\mathbf{A}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)]^\top [\mathbf{A}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)] \\ &= (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j).\end{aligned}$$

A matriz

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$$

descreve, no domínio, como a transformação modifica produtos internos, comprimentos e distâncias. Quando  $\mathbf{A}$  possui posto completo nas colunas,  $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$  é positiva definida e determina um produto interno no domínio. Quando  $\mathbf{A}$  não possui posto completo nas colunas, essa matriz é apenas semidefinida positiva e algumas direções são eliminadas pela transformação.

Para quaisquer vetores  $\mathbf{x}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^p$ ,

$$\begin{aligned}T(\mathbf{x})^\top T(\mathbf{z}) &= (\mathbf{A}\mathbf{x})^\top (\mathbf{A}\mathbf{z}) \\ &= \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{z}.\end{aligned}$$

Em particular,

$$\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2 = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x}.$$

Como

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \|\mathbf{A} \mathbf{x}\|^2 \geq 0,$$

a matriz  $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$  é simétrica e semidefinida positiva.

Se  $\mathbf{A}$  possui posto completo nas colunas, então

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$$

e

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$$

para todo  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ . Nesse caso,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \succ 0,$$

e a expressão

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{A}^\top \mathbf{A}} = \sqrt{\mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}} = \|\mathbf{A} \mathbf{x}\|$$

define uma norma em  $\mathbb{R}^p$ .

Quando  $\mathbf{A}$  não possui posto completo nas colunas, existem vetores não nulos em

$$\ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

para os quais

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{A}^\top \mathbf{A}} = 0.$$

Nesse caso,  $\|\cdot\|_{\mathbf{A}^\top \mathbf{A}}$  define uma seminorma.

#### 4.2.4 Transformação das matrizes de produtos internos

A matriz de Gram entre as observações originais é

$$\mathbf{G}_X = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top.$$

Para

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{A}^\top,$$

tem-se

$$\begin{aligned}\mathbf{G}_Y &= \mathbf{Y}\mathbf{Y}^\top \\ &= \mathbf{X}\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{X}^\top.\end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathbf{G}_Y = \mathbf{X}\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{X}^\top.$$

Se

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{I}_p,$$

então

$$\mathbf{G}_Y = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top = \mathbf{G}_X.$$

Nesse caso, todos os produtos internos entre as observações são preservados.

A matriz de produtos cruzados entre as variáveis transformadas é

$$\begin{aligned}\mathbf{Y}^\top \mathbf{Y} &= (\mathbf{X}\mathbf{A}^\top)^\top (\mathbf{X}\mathbf{A}^\top) \\ &= \mathbf{A}\mathbf{X}^\top \mathbf{X}\mathbf{A}^\top.\end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbf{Y}^\top \mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}^\top \mathbf{X}\mathbf{A}^\top.$$

Essa expressão descreve como os produtos cruzados entre as novas variáveis são obtidos a partir dos produtos cruzados entre as variáveis originais.

Quando  $\mathbf{X}$  está centralizada, a mesma estrutura permite descrever posteriormente a transformação da matriz de covariâncias. Por enquanto, a relação mostra que uma transformação linear modifica simultaneamente a geometria das observações e as relações entre as variáveis.

## 4.3 Composição, invertibilidade e perda de informação

Transformações lineares podem ser aplicadas sucessivamente. A matriz da transformação resultante é obtida pelo produto das matrizes que representam cada etapa.

### 4.3.1 Composição de transformações lineares

Considere

$$T_1 : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$$

e

$$T_2 : \mathbb{R}^q \longrightarrow \mathbb{R}^r,$$

representadas, respectivamente, por

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

e

$$\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{r \times q}.$$

Para  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ ,

$$T_1(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}.$$

Aplicando  $T_2$  à imagem produzida por  $T_1$ ,

$$\begin{aligned} T_2(T_1(\mathbf{x})) &= \mathbf{B}(\mathbf{A}\mathbf{x}) \\ &= (\mathbf{B}\mathbf{A})\mathbf{x}. \end{aligned}$$

**Proposição 4.3** (Matriz de uma composição). *Se  $T_1$  é representada por  $\mathbf{A}$  e  $T_2$  é representada por  $\mathbf{B}$ , então a composição*

$$T_2 \circ T_1$$

*é representada por*

$$\mathbf{BA}.$$

*Em particular,*

$$[T_2 \circ T_1] = [T_2][T_1].$$

A ordem do produto é interpretada da direita para a esquerda:

1.  $\mathbf{A}$  atua primeiro;
2.  $\mathbf{B}$  atua depois.

As dimensões refletem essa sequência:

$$\underbrace{\mathbf{B}}_{r \times q} \underbrace{\mathbf{A}}_{q \times p} \underbrace{\mathbf{x}}_{p \times 1} \in \mathbb{R}^r.$$

Se as observações estão nas linhas de

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

a primeira transformação produz

$$\mathbf{Y} = \mathbf{XA}^\top.$$

A segunda produz

$$\begin{aligned} \mathbf{Z} &= \mathbf{YB}^\top \\ &= \mathbf{XA}^\top \mathbf{B}^\top \\ &= \mathbf{X}(\mathbf{BA})^\top. \end{aligned}$$

Portanto, a composição aplicada à matriz de dados é

$$\mathbf{Z} = \mathbf{X}(\mathbf{BA})^\top.$$

### 4.3.2 A ordem das transformações

Em geral,

$$\mathbf{BA} \neq \mathbf{AB}.$$

Consequentemente,

$$T_2 \circ T_1 \neq T_1 \circ T_2.$$

**Exemplo 4.2** (Composição de rotação e escalonamento). Considere uma rotação de  $45^\circ$ ,

$$\mathbf{Q}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \begin{bmatrix} \cos(\pi/4) & -\sin(\pi/4) \\ \sin(\pi/4) & \cos(\pi/4) \end{bmatrix},$$

e um escalonamento não uniforme,

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Aplicar primeiro a rotação e depois o escalonamento corresponde a

$$\mathbf{LQ}\left(\frac{\pi}{4}\right).$$

Aplicar primeiro o escalonamento e depois a rotação corresponde a

$$\mathbf{Q}\left(\frac{\pi}{4}\right)\mathbf{L}.$$

Como

$$\mathbf{LQ}\left(\frac{\pi}{4}\right) \neq \mathbf{Q}\left(\frac{\pi}{4}\right)\mathbf{L},$$

as duas sequências produzem transformações diferentes.

A Figura 4.3 compara as duas ordens de aplicação.

As duas composições utilizam as mesmas transformações, mas produzem configurações diferentes. Na primeira, a nuvem é rotacionada antes de ser escalonada em relação aos eixos coordenados. Na segunda, o escalonamento ocorre antes da mudança de orientação.




Figura 4.3: Efeito da ordem na composição de uma rotação e de um escalonamento não uniforme.

### 4.3.3 Transformação inversa

Uma transformação linear invertível permite recuperar de maneira única o vetor original a partir de sua imagem.

**Definição 4.3** (Transformação inversa). Uma transformação linear

$$T : V \longrightarrow W$$

é invertível quando existe uma transformação

$$T^{-1} : W \longrightarrow V$$

tal que

$$T^{-1}(T(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$$

para todo  $\mathbf{x} \in V$  e

$$T(T^{-1}(\mathbf{y})) = \mathbf{y}$$

para todo  $\mathbf{y} \in W$ .

Considere uma transformação

$$T : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^p$$

representada por uma matriz quadrada e invertível

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

Se

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x},$$

então

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{y}.$$

A transformação inversa é representada por  $\mathbf{A}^{-1}$ .

**Proposição 4.4** (Inversa de uma composição). *Se  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{B}$  são matrizes quadradas e invertíveis de dimensões compatíveis, então*

$$(\mathbf{BA})^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}.$$

*Comprovação.* Tem-se

$$\begin{aligned} (\mathbf{BA}) (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}) &= \mathbf{B} (\mathbf{AA}^{-1}) \mathbf{B}^{-1} \\ &= \mathbf{BB}^{-1} \\ &= \mathbf{I}. \end{aligned}$$

De forma análoga,

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}) (\mathbf{BA}) &= \mathbf{A}^{-1} (\mathbf{B}^{-1}\mathbf{B}) \mathbf{A} \\ &= \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} \\ &= \mathbf{I}. \end{aligned}$$

Logo,

$$(\mathbf{BA})^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}.$$

□



A ordem é invertida porque a última transformação aplicada deve ser a primeira a ser desfeita.

#### 4.3.4 Injetividade, sobrejetividade e bijetividade

As propriedades de injetividade e sobrejetividade descrevem, respectivamente, a possibilidade de distinguir vetores do domínio por suas imagens e a possibilidade de atingir todos os vetores do contradomínio.

**Definição 4.4** (Injetividade, sobrejetividade e bijetividade). Uma transformação

$$T : V \longrightarrow W$$

é:

1. **injetiva** quando

$$T(\mathbf{x}_1) = T(\mathbf{x}_2) \implies \mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2;$$

2. **sobrejetiva** quando, para todo  $\mathbf{y} \in W$ , existe pelo menos um  $\mathbf{x} \in V$  tal que

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{y};$$

3. **bijetiva** quando é simultaneamente injetiva e sobrejetiva.

Para uma transformação matricial

$$T_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q, \quad T_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x},$$

essas propriedades podem ser caracterizadas pelo núcleo, pelo espaço coluna e pelo posto.

**Teorema 4.3** (Caracterizações por núcleo, imagem e posto). *Seja*

$$T_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q, \quad T_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x},$$

com  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}$ . Então:

1.  $T_{\mathbf{A}}$  é injetiva se, e somente se,

$$\ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\};$$

2.  $T_{\mathbf{A}}$  é injetiva se, e somente se,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = p;$$

3.  $T_{\mathbf{A}}$  é sobrejetiva se, e somente se,

$$\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^q;$$

4.  $T_{\mathbf{A}}$  é sobrejetiva se, e somente se,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = q.$$

(Meyer, 2023)

*Comprovação.* Suponha inicialmente que  $T_{\mathbf{A}}$  seja injetiva. Se

$$\mathbf{x} \in \ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

então

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0} = \mathbf{A}\mathbf{0}.$$

Pela injetividade,

$$\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}.$$

Reciprocamente, suponha que

$$\ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$$

e que

$$\mathbf{Ax}_1 = \mathbf{Ax}_2.$$

Então,

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}.$$

Portanto,

$$\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in \ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

o que implica

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2.$$

Assim,  $T_{\mathbf{A}}$  é injetiva.

Pelo Teorema 3.5,

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) + \text{posto}(\mathbf{A}) = p.$$

Como  $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \ker(T_{\mathbf{A}})$ , tem-se

$$\ker(T_{\mathbf{A}}) = \{\mathbf{0}\}$$

se, e somente se,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = p.$$

Por outro lado,  $T_{\mathbf{A}}$  é sobrejetiva quando todo vetor de  $\mathbb{R}^q$  pertence à sua imagem. Como

$$\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

a sobrejetividade equivale a

$$\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^q.$$

Essa igualdade ocorre se, e somente se,

$$\dim \mathcal{C}(\mathbf{A}) = q,$$

isto é,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = q.$$

□

Uma transformação de  $\mathbb{R}^p$  em  $\mathbb{R}^q$  pode ser injetiva somente quando

$$q \geq p.$$

De forma análoga, pode ser sobrejetiva somente quando

$$p \geq q.$$

Se a transformação é bijetiva, então

$$p = q$$

e

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = p.$$

Combinando o Teorema 4.3 com o Teorema 2.5, obtém-se o resultado seguinte.

**Teorema 4.4** (Equivalências para uma transformação quadrada). *Considere*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

*e a transformação linear*

$$T_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^p, \quad T_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}.$$

*São equivalentes:*

1.  $T_{\mathbf{A}}$  é injetiva;
2.  $T_{\mathbf{A}}$  é sobrejetiva;
3.  $T_{\mathbf{A}}$  é bijetiva;
4.  $\ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$ ;
5.  $\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^p$ ;
6.  $\text{posto}(\mathbf{A}) = p$ ;
7.  $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ ;

8.  $\mathbf{A}^{-1}$  existe.

(Meyer, 2023)

A Tabela 4.1 resume as relações principais.

Tabela 4.1: Relações entre injetividade, sobrejetividade, bijetividade e posto.

| Propriedade     | Condição geométrica                                    | Condição matricial                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Injetividade    | Vetores distintos possuem imagens distintas            | $\ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$ e $\text{posto}(\mathbf{A}) = p$    |
| Sobrejetividade | Todo vetor do contradomínio é atingido                 | $\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^q$ e $\text{posto}(\mathbf{A}) = q$ |
| Bijetividade    | Há correspondência única entre domínio e contradomínio | $p = q = \text{posto}(\mathbf{A})$                                                                    |
| Invertibilidade | A transformação pode ser desfeita                      | $\mathbf{A}$ é quadrada e $\det(\mathbf{A}) \neq 0$                                                   |

#### 4.3.5 Perda de informação

Quando a transformação não é injetiva, existem vetores distintos com a mesma imagem.

Se

$$\mathbf{v} \in \ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

então, para qualquer  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{v}) &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{A}\mathbf{v} \\ &= \mathbf{A}\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Portanto, todos os vetores do conjunto

$$\mathbf{x} + \ker(T_{\mathbf{A}}) = \{\mathbf{x} + \mathbf{v} : \mathbf{v} \in \ker(T_{\mathbf{A}})\}$$

produzem a mesma imagem.

Reciprocamente, se

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_1 = \mathbf{A}\mathbf{x}_2,$$

então

$$\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

A ambiguidade na recuperação do vetor original é, assim, determinada pelo núcleo da transformação, que coincide com o espaço nulo da matriz associada.

Se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = r,$$

o Teorema Posto–Nulidade fornece

$$\dim(\mathcal{N}(\mathbf{A})) = p - r.$$

A transformação elimina  $p - r$  direções independentes e produz uma imagem de dimensão  $r$ .

#### 4.3.6 Redução de dimensionalidade

Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

com

$$q < p.$$

Mesmo que

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = q,$$

tem-se

$$\dim(\mathcal{N}(\mathbf{A})) = p - q > 0.$$

A perda de informação é inevitável quando a transformação é considerada sobre todo o espaço  $\mathbb{R}^p$ . Entretanto, sua restrição a um conjunto particular ou a um subespaço de dimensão menor ou igual a  $q$  pode ser injetiva. Assim, reduzir o número de coordenadas não implica necessariamente identificar observações distintas no conjunto de dados efetivamente analisado.

A redução pode ser útil quando a matriz é escolhida para preservar determinadas direções e eliminar outras. O critério utilizado para selecionar essas direções será desenvolvido posteriormente, no contexto das técnicas multivariadas.

#### 4.3.7 Transformações singulares

Uma matriz quadrada é singular quando

$$\det(\mathbf{A}) = 0.$$

Nesse caso,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) < p,$$

e a transformação leva  $\mathbb{R}^p$  a um subespaço de menor dimensão.

Por exemplo,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

transforma

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

em

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Todos os pontos com a mesma primeira coordenada produzem a mesma imagem.

A Figura 4.4 compara uma transformação invertível, a recuperação pela inversa e uma transformação singular.

A transformação representada por  $\mathbf{A}$  modifica a configuração, mas mantém uma correspondência única entre os pontos originais e transformados. A aplicação de  $\mathbf{A}^{-1}$  recupera a configuração inicial. A transformação singular elimina a segunda coordenada e reduz toda a nuvem a uma reta.

Para




Figura 4.4: Transformação invertível, recuperação pela inversa e colapso provocado por uma transformação singular.

$$T_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q,$$

as possibilidades podem ser resumidas da seguinte forma:

- se  $q < p$ , a transformação não pode ser injetiva;
- se  $q > p$ , a transformação não pode ser sobrejetiva;
- se  $q = p$ , ela é bijetiva quando  $\text{posto}(\mathbf{A}) = p$ ;
- se  $\text{posto}(\mathbf{A}) < \min(p, q)$ , ela não é injetiva nem sobrejetiva.

Essas relações permitem interpretar o posto como o número de direções independentes preservadas na imagem. A seção seguinte examina os efeitos geométricos produzidos por classes particulares de matrizes.

## 4.4 Transformações geométricas

Matrizes distintas produzem efeitos geométricos diferentes sobre vetores e conjuntos de pontos. Algumas modificam a posição da configuração em relação aos eixos coordenados sem deformar sua geometria, enquanto outras alteram comprimentos, ângulos, áreas ou dimensão.

Nesta seção, são examinadas cinco transformações no plano:

- rotação;
- reflexão;
- escalonamento;



- cisalhamento;
- projeção.

Todas preservam combinações lineares e, portanto, são transformações lineares. As propriedades geométricas preservadas dependem da matriz utilizada.

#### 4.4.1 Rotação

Uma rotação de ângulo  $\theta$  em torno da origem é representada por

$$\mathbf{Q}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

a imagem é

$$\mathbf{y} = \mathbf{Q}(\theta)\mathbf{x},$$

isto é,

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 \cos \theta - x_2 \sin \theta, \\ y_2 &= x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta. \end{aligned}$$

A matriz de rotação satisfaz

$$\mathbf{Q}(\theta)^\top \mathbf{Q}(\theta) = \mathbf{I}_2.$$

Consequentemente,

$$\mathbf{Q}(\theta)^{-1} = \mathbf{Q}(\theta)^\top = \mathbf{Q}(-\theta).$$

A transformação inversa corresponde a uma rotação pelo mesmo ângulo no sentido oposto.

Além disso,

$$\det(\mathbf{Q}(\theta)) = 1.$$

A rotação preserva comprimentos, distâncias, ângulos, áreas e orientação.

### 4.4.2 Reflexão

Uma reflexão no plano produz a imagem especular dos vetores em relação a uma reta que passa pela origem.

A reflexão em relação ao eixo horizontal é representada por

$$\mathbf{F}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

de modo que

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x_1 \\ -x_2 \end{bmatrix}.$$

A reflexão em relação ao eixo vertical é representada por

$$\mathbf{F}_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

e produz

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} -x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

As duas matrizes satisfazem

$$\mathbf{F}^\top \mathbf{F} = \mathbf{I}_2$$

e

$$\mathbf{F}^{-1} = \mathbf{F}.$$

Assim,

$$\mathbf{F}^2 = \mathbf{I}_2.$$

Aplicar duas vezes a mesma reflexão recupera o vetor original.

Considere agora uma reta gerada por um vetor unitário

$$\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2, \quad \|\mathbf{u}\| = 1.$$

A projeção de  $\mathbf{x}$  sobre essa reta é

$$\mathbf{u}\mathbf{u}^\top \mathbf{x},$$

enquanto sua componente ortogonal é

$$(\mathbf{I}_2 - \mathbf{u}\mathbf{u}^\top) \mathbf{x}.$$

Na reflexão, a componente paralela é preservada e a componente ortogonal tem seu sinal invertido:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\text{ref}} &= \mathbf{u}\mathbf{u}^\top \mathbf{x} - (\mathbf{I}_2 - \mathbf{u}\mathbf{u}^\top) \mathbf{x} \\ &= (2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top - \mathbf{I}_2) \mathbf{x}. \end{aligned}$$

Portanto, a reflexão em relação à reta gerada por  $\mathbf{u}$  é representada por

$$\mathbf{F}_{\mathbf{u}} = 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top - \mathbf{I}_2.$$

Essa matriz satisfaz

$$\mathbf{F}_{\mathbf{u}}^\top \mathbf{F}_{\mathbf{u}} = \mathbf{I}_2$$

e

$$\det(\mathbf{F}_{\mathbf{u}}) = -1.$$

A reflexão preserva comprimentos, distâncias, ângulos e áreas, mas inverte a orientação.

Em dimensão  $p$ , a matriz

$$\mathbf{H}_{\mathbf{u}} = \mathbf{I}_p - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top, \quad \|\mathbf{u}\| = 1,$$

representa a reflexão em relação ao hiperplano ortogonal a  $\mathbf{u}$ . Essa transformação é denominada **reflexão de Householder**.

Observe que as duas construções preservam componentes diferentes. A matriz  $2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top - \mathbf{I}$  preserva a componente na direção de  $\mathbf{u}$  e inverte as componentes ortogonais a ela, enquanto  $\mathbf{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top$  preserva as componentes ortogonais a  $\mathbf{u}$  e inverte a componente na direção de  $\mathbf{u}$ .

### 4.4.3 Escalonamento

Um escalonamento modifica o comprimento dos vetores ao longo de direções determinadas.

No plano, o escalonamento em relação aos eixos coordenados é representado por

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{bmatrix}.$$

A transformação correspondente é

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} s_1 x_1 \\ s_2 x_2 \end{bmatrix}.$$

Quando

$$s_1 = s_2 = s,$$

o escalonamento é uniforme:

$$\mathbf{L} = s\mathbf{I}_2.$$

Nesse caso, todos os comprimentos e todas as distâncias são multiplicados por  $|s|$ . Para  $s \neq 0$ , os ângulos são preservados.

Quando

$$s_1 \neq s_2,$$

o escalonamento é não uniforme. Cada direção coordenada é reescalada por um fator próprio, de modo que comprimentos, ângulos e proporções podem ser alterados. Se algum fator  $s_j$  for negativo, além da alteração de escala ocorre a inversão do sentido da coordenada correspondente.

O determinante da matriz é

$$\det(\mathbf{L}) = s_1 s_2.$$

A área de uma figura é, portanto, multiplicada por

$$|s_1 s_2|.$$

A transformação é invertível quando

$$s_1 \neq 0 \quad \text{e} \quad s_2 \neq 0.$$

Nesse caso,

$$\mathbf{L}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/s_1 & 0 \\ 0 & 1/s_2 \end{bmatrix}.$$

Se algum fator de escala for igual a zero, uma direção é eliminada. Por exemplo,

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

leva todo o plano ao eixo horizontal.

O escalonamento das variáveis será retomado na seção sobre pré-processamento.

#### 4.4.4 Cisalhamento

Um cisalhamento modifica uma coordenada adicionando a ela uma parcela proporcional a outra coordenada.

O cisalhamento horizontal é representado por

$$\mathbf{C}_{12}(k) = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Nesse caso,

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 + kx_2, \\ y_2 &= x_2. \end{aligned}$$

A segunda coordenada permanece inalterada, enquanto a primeira é modificada de acordo com o valor de  $x_2$ .

O cisalhamento vertical é representado por

$$\mathbf{C}_{21}(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix},$$

e produz

$$\begin{aligned}y_1 &= x_1, \\y_2 &= kx_1 + x_2.\end{aligned}$$

Em dimensão  $p$ , um cisalhamento elementar pode ser escrito como

$$\mathbf{C}_{ij}(k) = \mathbf{I}_p + k\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j^\top, \quad i \neq j.$$

Essa transformação adiciona à coordenada  $i$  uma parcela proporcional à coordenada  $j$ .

Como

$$\left(\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j^\top\right)^2 = \mathbf{0}$$

para  $i \neq j$ , tem-se

$$\begin{aligned}\mathbf{C}_{ij}(k)\mathbf{C}_{ij}(-k) &= \left(\mathbf{I}_p + k\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j^\top\right)\left(\mathbf{I}_p - k\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j^\top\right) \\ &= \mathbf{I}_p.\end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathbf{C}_{ij}(k)^{-1} = \mathbf{C}_{ij}(-k).$$

O determinante de um cisalhamento elementar é

$$\det\left(\mathbf{C}_{ij}(k)\right) = 1.$$

Assim, o cisalhamento preserva áreas e volumes, mas altera comprimentos e ângulos. Retas e paralelismo são preservados.

#### 4.4.5 Projeção

As projeções ortogonais foram desenvolvidas no capítulo anterior a partir da decomposição de um vetor em componentes pertencentes a subespaços ortogonais. Aqui, interessa interpretá-las como transformações lineares.

Considere uma direção unitária

$$\mathbf{u} \in \mathbb{R}^p, \quad \|\mathbf{u}\| = 1,$$

e o subespaço

$$S = \text{span}\{\mathbf{u}\}.$$

A matriz da projeção ortogonal sobre  $S$  é

$$\mathbf{P}_S = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top,$$

de modo que

$$T_{\mathbf{P}_S}(\mathbf{x}) = \mathbf{P}_S \mathbf{x}.$$

Como estudado no capítulo anterior,

$$\mathbf{P}_S^2 = \mathbf{P}_S$$

e

$$\mathbf{P}_S^\top = \mathbf{P}_S.$$

Do ponto de vista das transformações lineares,

$$\text{Im}(T_{\mathbf{P}_S}) = S$$

e

$$\ker(T_{\mathbf{P}_S}) = S^\perp.$$

Assim, a projeção preserva a componente pertencente a  $S$  e elimina toda a componente pertencente a  $S^\perp$ .

Para uma projeção sobre uma única direção,

$$\text{posto}(\mathbf{P}_S) = 1.$$

Consequentemente, quando  $p > 1$ ,

$$\det(\mathbf{P}_S) = 0,$$

e a transformação não é invertível. Vetores que diferem apenas por uma componente pertencente a  $S^\perp$  possuem a mesma imagem.

#### 4.4.6 Comparação geométrica

A Figura 4.5 mostra o efeito das transformações anteriores sobre o quadrado unitário. Como todos os painéis utilizam a mesma escala, alterações de forma, área e dimensão podem ser comparadas diretamente.




Figura 4.5: Efeito de diferentes transformações lineares sobre o quadrado unitário.



A rotação altera a posição do quadrado em relação aos eixos coordenados sem modificar sua forma, sua área ou sua orientação. A reflexão preserva a forma e a área, mas inverte a orientação. O escalonamento não uniforme modifica os comprimentos nas direções coordenadas e transforma o quadrado em um retângulo. O cisalhamento transforma o quadrado em um paralelogramo com a mesma área, mostrando que preservar área não implica preservar ângulos ou comprimentos. A projeção elimina uma direção e reduz a figura a um segmento de reta.

#### 4.4.7 Determinante, volume e orientação

Para uma matriz quadrada

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p},$$

o valor absoluto do determinante representa o fator pelo qual volumes são multiplicados.

**Teorema 4.5** (Alteração de volume por uma transformação linear). *Seja*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

*e seja  $E \subseteq \mathbb{R}^p$  um conjunto mensurável. Denote por*

$$\mathbf{A}E = \{\mathbf{A}\mathbf{x} : \mathbf{x} \in E\}$$

*sua imagem pela transformação linear representada por  $\mathbf{A}$ .*

*Então,*

$$\text{Vol}_p(\mathbf{A}E) = |\det(\mathbf{A})| \text{Vol}_p(E),$$

*em que  $\text{Vol}_p$  representa o volume  $p$ -dimensional.*

*Se  $\det(\mathbf{A}) = 0$ , a imagem está contida em um subespaço de dimensão inferior a  $p$  e seu volume  $p$ -dimensional é igual a zero.*

*(Meyer, 2023)*

A demonstração formal desse resultado, baseada no Jacobiano de uma transformação linear, será apresentada no capítulo dedicado ao cálculo multivariado.

No plano, o resultado descreve a alteração de área. Em  $\mathbb{R}^3$ , descreve a alteração de volume. Em dimensão geral, descreve a alteração do hipervolume.

Quando a transformação é invertível, o sinal do determinante descreve o efeito sobre a orientação:

- se  $\det(\mathbf{A}) > 0$ , a orientação é preservada;
- se  $\det(\mathbf{A}) < 0$ , a orientação é invertida.

Se  $\det(\mathbf{A}) = 0$ , a transformação não é invertível, sua imagem possui dimensão inferior a  $p$  e o volume  $p$ -dimensional é reduzido a zero.

A Tabela 4.2 resume as propriedades das transformações estudadas.

Tabela 4.2: Propriedades das principais transformações geométricas no plano.

| Transformação           | Matriz no plano                                | Determinante | Efeito geométrico             |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Rotação                 | $\mathbf{Q}(\theta)$                           | 1            | Gira a configuração           |
| Reflexão                | $\mathbf{F}$                                   | -1           | Produz uma imagem especular   |
| Escalonamento           | $\text{diag}(s_1, s_2)$                        | $s_1 s_2$    | Reescala direções coordenadas |
| Cisalhamento            | $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ | 1            | Inclina a configuração        |
| Projeção sobre uma reta | $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top$                    | 0            | Elimina uma direção           |

A preservação de área ou volume não implica preservação de distâncias e ângulos. O cisalhamento possui determinante igual a 1, mas deforma a configuração. A preservação integral da geometria euclidiana será estudada na seção seguinte.

## 4.5 Transformações ortogonais

A linearidade não garante a preservação de comprimentos, distâncias ou ângulos. Essas propriedades são preservadas pelas transformações representadas por matrizes ortogonais.

Retomando a Definição 2.17, uma matriz

$$\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

é ortogonal quando

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_p.$$

Essa condição implica

$$\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^\top$$

e

$$\mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \mathbf{I}_p.$$

A transformação

$$T_{\mathbf{Q}} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^p, \quad T_{\mathbf{Q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{Q}\mathbf{x},$$

é denominada **transformação ortogonal**.

**Proposição 4.5** (Preservação da geometria euclidiana). *Se  $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{p \times p}$  é ortogonal, então, para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ , a transformação*

$$T_{\mathbf{Q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{Q}\mathbf{x}$$

*preserva:*

1. o produto interno;
2. as normas;
3. as distâncias euclidianas;
4. os ângulos entre vetores não nulos;
5. a ortogonalidade.

*Comprovação.* Pelo Teorema 2.7,

$$(\mathbf{Q}\mathbf{x})^\top (\mathbf{Q}\mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}.$$

Portanto, o produto interno entre quaisquer dois vetores é preservado.

Tomando  $\mathbf{y} = \mathbf{x}$ ,

$$\begin{aligned}\|\mathbf{Q}\mathbf{x}\|^2 &= (\mathbf{Q}\mathbf{x})^\top (\mathbf{Q}\mathbf{x}) \\ &= \mathbf{x}^\top \mathbf{x} \\ &= \|\mathbf{x}\|^2.\end{aligned}$$

Como as normas são não negativas,

$$\|\mathbf{Q}\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|.$$

Para dois vetores  $\mathbf{x}$  e  $\mathbf{y}$ ,

$$\begin{aligned}\|\mathbf{Q}\mathbf{x} - \mathbf{Q}\mathbf{y}\| &= \|\mathbf{Q}(\mathbf{x} - \mathbf{y})\| \\ &= \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.\end{aligned}$$

Logo, todas as distâncias euclidianas entre pares de vetores são preservadas.

Para vetores não nulos, o ângulo  $\theta$  entre  $\mathbf{x}$  e  $\mathbf{y}$  é determinado por

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}.$$

Como o produto interno e as normas são preservados,

$$\frac{(\mathbf{Q}\mathbf{x})^\top (\mathbf{Q}\mathbf{y})}{\|\mathbf{Q}\mathbf{x}\| \|\mathbf{Q}\mathbf{y}\|} = \frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}.$$

Portanto, os ângulos também são preservados.

Em particular, se

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{y} = 0,$$

então

$$(\mathbf{Q}\mathbf{x})^\top (\mathbf{Q}\mathbf{y}) = 0,$$

e a ortogonalidade é preservada. □

Assim, transformações ortogonais preservam integralmente as relações métricas determinadas pelo produto interno euclidiano. Elas podem alterar a orientação da configuração, mas não deformam sua geometria interna.

### 4.5.1 Transformação de uma matriz de dados

Considere uma matriz de dados

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

e uma transformação ortogonal representada por

$$\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

Como as observações estão organizadas nas linhas, a matriz transformada é

$$\mathbf{Y} = \mathbf{XQ}^\top.$$

**Proposição 4.6** (Preservação da matriz de Gram). *Se*

$$\mathbf{Y} = \mathbf{XQ}^\top$$

*e  $\mathbf{Q}$  é ortogonal, então*

$$\mathbf{YY}^\top = \mathbf{XX}^\top.$$

*Comprovação.* Tem-se

$$\begin{aligned}\mathbf{YY}^\top &= (\mathbf{XQ}^\top)(\mathbf{XQ}^\top)^\top \\ &= \mathbf{XQ}^\top \mathbf{QX}^\top \\ &= \mathbf{XI}_p \mathbf{X}^\top \\ &= \mathbf{XX}^\top.\end{aligned}$$

□

A matriz de Gram reúne os produtos internos entre as observações. Sua preservação implica que permanecem inalterados:

- os quadrados das normas das observações;
- os produtos internos entre pares de observações;
- as distâncias entre as observações;
- os ângulos entre os vetores observados não nulos.

A nuvem de pontos pode ser rotacionada ou refletida, mas sua forma e suas relações internas permanecem as mesmas.

### 4.5.2 Determinante e orientação

**Proposição 4.7** (Determinante de uma matriz ortogonal). *Se  $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{p \times p}$  é ortogonal, então*

$$\det(\mathbf{Q}) \in \{-1, 1\}.$$

*Consequentemente,*

$$|\det(\mathbf{Q})| = 1,$$

*e a transformação preserva volumes  $p$ -dimensionais.*

*Comprovação.* Como

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_p,$$

tem-se

$$\begin{aligned} 1 &= \det(\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q}) \\ &= \det(\mathbf{Q}^\top) \det(\mathbf{Q}) \\ &= \det(\mathbf{Q})^2. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\det(\mathbf{Q}) = 1 \quad \text{ou} \quad \det(\mathbf{Q}) = -1.$$

Logo,

$$|\det(\mathbf{Q})| = 1.$$

□

No plano, a preservação do volume  $p$ -dimensional corresponde à preservação de áreas; em  $\mathbb{R}^3$ , corresponde à preservação de volumes.

Quando

$$\det(\mathbf{Q}) = 1,$$

a transformação é denominada **ortogonal própria**. Ela preserva a orientação.

No plano, toda transformação ortogonal própria é uma rotação e pode ser representada por

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

Quando

$$\det(\mathbf{Q}) = -1,$$

a transformação é denominada **ortogonal imprópria**. Ela inverte a orientação.

No plano, toda transformação ortogonal imprópria corresponde a uma reflexão em relação a uma reta que passa pela origem. Em dimensões superiores, pode combinar uma reflexão com rotações em subespaços ortogonais.

### 4.5.3 Matrizes ortogonais e bases ortonormais

As colunas de uma matriz ortogonal formam uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^p$ .

Se

$$\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{q}_p],$$

então suas colunas satisfazem

$$\mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_j = \delta_{ij},$$

em que  $\delta_{ij}$  é o delta de Kronecker definido no Capítulo 2. Portanto, as colunas de  $\mathbf{Q}$  possuem norma unitária e são ortogonais duas a duas.

Como

$$\mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \mathbf{I}_p,$$

as linhas de  $\mathbf{Q}$  também formam um conjunto ortonormal.

Uma matriz ortogonal admite, portanto, duas interpretações que devem ser distinguidas:

- como matriz de uma transformação linear que preserva a geometria euclidiana;
- como matriz cujas colunas constituem uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^p$ .

Na primeira interpretação, a matriz atua sobre o vetor e modifica sua posição no espaço. Na segunda, seus vetores-coluna definem um sistema de coordenadas. A relação entre essas duas interpretações será desenvolvida na seção seguinte.

#### 4.5.4 Comparação com transformações não ortogonais

A Figura 4.6 compara o efeito de diferentes matrizes sobre a circunferência unitária e sobre duas direções inicialmente ortogonais. O marcador de ângulo reto identifica os casos em que a ortogonalidade é preservada.




Figura 4.6: Efeito de transformações ortogonais e não ortogonais sobre a circunferência unitária e duas direções inicialmente ortogonais.

A rotação e a reflexão mantêm a circunferência unitária e preservam o ângulo reto entre as duas direções. O escalonamento não uniforme transforma a circunferência em uma elipse; embora as duas direções coordenadas permaneçam ortogonais neste exemplo particular, seus comprimentos são alterados e a transformação não é ortogonal. O cisalhamento deforma a circunferência e também altera o ângulo entre as direções.

A Tabela 4.3 compara as propriedades dessas transformações.



Tabela 4.3: Comparação entre transformações ortogonais e não ortogonais.

| Transformação              | Ortogonal            | Preserva normas      | Preserva distâncias  | Preserva ângulos   | $ \det(\mathbf{A}) $ |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Rotação                    | Sim                  | Sim                  | Sim                  | Sim                | 1                    |
| Reflexão                   | Sim                  | Sim                  | Sim                  | Sim                | 1                    |
| Escalonamento uniforme     | Somente se $ s  = 1$ | Somente se $ s  = 1$ | Somente se $ s  = 1$ | Sim, se $s \neq 0$ | $ s ^p$              |
| Escalonamento não uniforme | Não                  | Não                  | Não                  | Não, em geral      | $\prod_j  s_j $      |
| Cisalhamento               | Não                  | Não                  | Não                  | Não, em geral      | 1                    |
| Projeção própria           | Não                  | Não                  | Não                  | Não, em geral      | 0                    |

A condição

$$|\det(\mathbf{A})| = 1$$

não é suficiente para que uma matriz seja ortogonal. O cisalhamento possui determinante igual a 1 e preserva áreas, mas não preserva normas nem ângulos.

A condição que caracteriza a preservação da geometria euclidiana é

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{I}_p.$$

## 4.6 Mudanças de coordenadas e representação em bases

O Capítulo 3 mostrou que um vetor possui coordenadas diferentes quando é representado em bases distintas. O vetor geométrico permanece o mesmo; o que muda é o conjunto de coeficientes utilizado para descrevê-lo.

Retomando a Definição 3.6, seja

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$$

uma base de  $\mathbb{R}^p$ , com a ordem dos vetores fixada. Como definido no capítulo anterior, a matriz formada pelos vetores da base é

$$\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_p].$$

Como os vetores de  $\mathcal{B}$  são linearmente independentes,  $\mathbf{B}$  é invertível.

Se

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_p \end{bmatrix}$$

é o vetor de coordenadas de  $\mathbf{x}$  na base  $\mathcal{B}$ , então

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + c_p \mathbf{b}_p.$$

Em forma matricial,

$$\mathbf{x} = \mathbf{B}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}.$$

Consequentemente,

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{x}.$$

Assim,  $\mathbf{B}$  converte as coordenadas de  $\mathbf{x}$  na base  $\mathcal{B}$  em suas coordenadas na base canônica, enquanto  $\mathbf{B}^{-1}$  realiza a conversão no sentido contrário.

Quando  $\mathcal{B}$  é uma base ortonormal, pela Definição 3.9,

$$\mathbf{B}^{\top} \mathbf{B} = \mathbf{I}_p.$$

Logo,

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{B}^{\top}$$

e

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{B}^{\top} \mathbf{x}.$$

Nesse caso,

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1^\top \mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{b}_p^\top \mathbf{x} \end{bmatrix},$$

de modo que cada coordenada é obtida pelo produto interno entre  $\mathbf{x}$  e o vetor correspondente da base.

#### 4.6.1 Conversão entre duas bases

Considere duas bases de  $\mathbb{R}^p$ ,

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$$

e

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_p\},$$

e as respectivas matrizes

$$\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \mathbf{b}_p]$$

e

$$\mathbf{C} = [\mathbf{c}_1 \quad \dots \quad \mathbf{c}_p].$$

O mesmo vetor pode ser representado por

$$\mathbf{x} = \mathbf{B}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

e por

$$\mathbf{x} = \mathbf{C}[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}.$$

Igualando as duas expressões,

$$\mathbf{C}[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \mathbf{B}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}.$$

Multiplicando à esquerda por  $\mathbf{C}^{-1}$ ,

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}.$$

**Definição 4.5** (Matriz de mudança de base). A **matriz de mudança de base de  $\mathcal{B}$  para  $\mathcal{C}$**  é

$$\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}.$$

Ela transforma as coordenadas de um vetor na base  $\mathcal{B}$  em suas coordenadas na base  $\mathcal{C}$ :

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = (\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}) [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}.$$

O sentido da conversão deve ser observado na ordem das matrizes:

$$\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{C} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}.$$

No sentido contrário, a matriz de mudança de base é

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{C}.$$

As duas matrizes são inversas entre si:

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{C} = (\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B})^{-1}.$$

#### 4.6.2 Representação de uma transformação em bases gerais

Considere uma transformação linear

$$T : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$$

representada nas bases canônicas por

$$\mathbf{y} = \mathbf{Ax},$$

com

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}.$$

Seja  $\mathcal{B}$  uma base do domínio, com matriz

$$\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_p],$$

e seja  $\mathcal{C}$  uma base do contradomínio, com matriz

$$\mathbf{C} = [\mathbf{c}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{c}_q].$$

Como

$$\mathbf{x} = \mathbf{B}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}},$$

tem-se

$$\begin{aligned} [T(\mathbf{x})]_{\mathcal{C}} &= \mathbf{C}^{-1}T(\mathbf{x}) \\ &= \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{x} \\ &= \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

**Teorema 4.6** (Matriz de uma transformação em bases gerais). *Se uma transformação linear*

$$T : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$$

*é representada nas bases canônicas por  $\mathbf{A}$ , sua matriz em relação à base  $\mathcal{B}$  do domínio e à base  $\mathcal{C}$  do contradomínio é*

$$[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B}.$$

*Para todo  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ ,*

$$[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}.$$

*(Meyer, 2023)*

A fórmula pode ser interpretada pela sequência das operações, da direita para a esquerda:

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} \xrightarrow{\mathbf{B}} \mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{A}} T(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{C}^{-1}} [T(\mathbf{x})]_{\mathcal{C}}.$$

As colunas de

$$[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$$

são as coordenadas, na base  $\mathcal{C}$ , das imagens dos vetores da base  $\mathcal{B}$ :

$$[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} [T(\mathbf{b}_1)]_{\mathcal{C}} & \cdots & [T(\mathbf{b}_p)]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix}.$$

Essa construção generaliza a representação matricial nas bases canônicas.

**Exemplo 4.3** (Representação de uma transformação em bases distintas). Considere

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

representada na base canônica por

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Considere a base do domínio

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

e a base do contradomínio

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

As matrizes das bases são

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\mathbf{C}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} &= \mathbf{C}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

A primeira coluna é

$$[T(\mathbf{b}_1)]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix},$$

e a segunda é

$$[T(\mathbf{b}_2)]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

### 4.6.3 Representação de um operador em uma nova base

Considere um operador linear

$$T : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^p$$

representado na base canônica por  $\mathbf{A}$ .

Quando a mesma base  $\mathcal{B}$  é utilizada no domínio e no contradomínio,

$$[T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}.$$

Quando conveniente, essa matriz será denotada abreviadamente por

$$\mathbf{A}_{\mathcal{B}} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}.$$

**Definição 4.6** (Matrizes semelhantes). Duas matrizes quadradas  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{D}$  são **semelhantes** quando existe uma matriz invertível  $\mathbf{P}$  tal que

$$\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}.$$

Matrizes semelhantes representam o mesmo operador linear em bases diferentes. Por essa razão, preservam propriedades que não dependem do sistema de coordenadas.

**Proposição 4.8** (Invariantes por semelhança). *Sejam*

$$\mathbf{A}, \mathbf{D}, \mathbf{P} \in \mathbb{R}^{p \times p},$$

*com  $\mathbf{P}$  invertível. Se*

$$\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P},$$

*então*

$$\det(\mathbf{D}) = \det(\mathbf{A}),$$

$$\text{tr}(\mathbf{D}) = \text{tr}(\mathbf{A})$$

*e*

$$\text{posto}(\mathbf{D}) = \text{posto}(\mathbf{A}).$$

*(Horn; Johnson, 2013)*

*Comprovação.* Para o determinante,

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{D}) &= \det(\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}) \\ &= \det(\mathbf{P}^{-1}) \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{P}) \\ &= \det(\mathbf{A}). \end{aligned}$$

Para o traço, pela propriedade cíclica,



$$\begin{aligned}
\text{tr}(\mathbf{D}) &= \text{tr}(\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}) \\
&= \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{P}^{-1}) \\
&= \text{tr}(\mathbf{A}).
\end{aligned}$$

Como a multiplicação à esquerda ou à direita por uma matriz invertível não altera o posto,

$$\text{posto}(\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}) = \text{posto}(\mathbf{A}).$$

□

A relação entre matrizes semelhantes, autovalores e a representação das direções invariantes em bases diferentes será desenvolvida no capítulo seguinte.

#### 4.6.4 Transformação ativa e mudança passiva

Uma matriz pode representar a transformação de um vetor ou a alteração do sistema de coordenadas utilizado para descrevê-lo. Essas operações são relacionadas, mas não são idênticas.

Em uma **transformação ativa**, os eixos coordenados permanecem fixos e o vetor é modificado:

$$\mathbf{y} = \mathbf{Q}\mathbf{x}.$$

No caso de uma rotação, o vetor muda de posição em relação aos mesmos eixos.

Em uma **mudança passiva de coordenadas**, o vetor geométrico permanece fixo e a base é alterada.

Se as colunas de uma matriz ortogonal  $\mathbf{Q}$  formam a nova base

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_p\},$$

então

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{Q}^{\top} \mathbf{x} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{x}.$$

O vetor não se move. Apenas sua representação numérica é modificada.

Para a matriz de rotação  $\mathbf{Q}(\theta)$ ,

$$\mathbf{Q}(\theta)^{-1} = \mathbf{Q}(\theta)^{\top} = \mathbf{Q}(-\theta).$$

Girar os eixos pelo ângulo  $\theta$  transforma as coordenadas do vetor por uma rotação de ângulo  $-\theta$ .

A transformação ativa e a mudança passiva utilizam matrizes inversas:

$$\text{transformação ativa:} \quad \mathbf{y} = \mathbf{Q}\mathbf{x},$$

$$\text{mudança passiva:} \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{x}.$$

Quando  $\mathbf{Q}$  é ortogonal,

$$\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^{\top}.$$

Portanto, embora uma mesma matriz ortogonal possa aparecer nas duas interpretações, o sentido da operação é distinto: na transformação ativa,  $\mathbf{Q}$  atua sobre o vetor; na mudança passiva para a base formada pelas colunas de  $\mathbf{Q}$ , a conversão das coordenadas é realizada por  $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^{\top}$ .

A Figura 4.7 compara as duas interpretações.




Figura 4.7: Comparação entre uma transformação ativa e uma mudança passiva de coordenadas.

No primeiro painel, os eixos permanecem fixos e  $\mathbf{x}$  é transformado em  $\mathbf{Q}\mathbf{x}$ . No segundo, o vetor permanece fixo e os novos eixos são definidos por  $\mathbf{q}_1$  e  $\mathbf{q}_2$ .

### 4.6.5 Mudança de coordenadas de uma matriz de dados

Considere

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

com as observações organizadas nas linhas, e uma base ortonormal cujos vetores estão nas colunas de  $\mathbf{Q}$ .

As coordenadas da  $i$ -ésima observação na nova base são

$$\mathbf{z}_i = \mathbf{Q}^\top \mathbf{x}_i.$$

Transpondo,

$$\mathbf{z}_i^\top = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{Q}.$$

Portanto, a matriz de novas coordenadas é

$$\mathbf{Z} = \mathbf{X}\mathbf{Q}.$$

Essa expressão deve ser distinguida da transformação ativa por  $\mathbf{Q}$ , que produz

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{Q}^\top.$$

A Tabela 4.4 resume as duas operações.

Tabela 4.4: Transformação ativa e mudança passiva para uma base ortonormal.

| Operação                                                          | Vetor-coluna                              | Matriz de dados                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Transformação ativa por $\mathbf{Q}$                              | $\mathbf{y} = \mathbf{Q}\mathbf{x}$       | $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{Q}^\top$ |
| Mudança passiva para a base formada pelas colunas de $\mathbf{Q}$ | $\mathbf{z} = \mathbf{Q}^\top \mathbf{x}$ | $\mathbf{Z} = \mathbf{X}\mathbf{Q}$      |

Na transformação ativa, a configuração é modificada em relação a um sistema de coordenadas fixo. Na mudança passiva, a configuração permanece a mesma e cada observação passa a ser descrita pelas coordenadas em uma nova base.

## 4.7 Transformações afins e pré-processamento

Toda transformação linear mantém o vetor nulo fixo:

$$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}.$$

Operações que incluem um deslocamento constante não satisfazem essa propriedade. Elas pertencem a uma classe mais ampla, formada pelas transformações afins.

**Definição 4.7** (Transformação afim). Uma aplicação

$$T : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$$

é uma **transformação afim** quando pode ser escrita como

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b},$$

em que

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

e

$$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^q.$$

A matriz  $\mathbf{A}$  determina a parte linear da transformação, enquanto  $\mathbf{b}$  determina o deslocamento.

Quando

$$\mathbf{b} = \mathbf{0},$$

a transformação afim reduz-se a uma transformação linear.

Quando

$$\mathbf{b} \neq \mathbf{0},$$

tem-se

$$T(\mathbf{0}) = \mathbf{b} \neq \mathbf{0},$$

e a transformação não é linear.

#### 4.7.1 Translação

A translação é o caso particular

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{b}.$$

Todos os pontos são deslocados pelo mesmo vetor  $\mathbf{b}$ .

Para dois vetores  $\mathbf{x}_i$  e  $\mathbf{x}_j$ ,

$$\begin{aligned} T(\mathbf{x}_i) - T(\mathbf{x}_j) &= (\mathbf{x}_i + \mathbf{b}) - (\mathbf{x}_j + \mathbf{b}) \\ &= \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j. \end{aligned}$$

Consequentemente,

$$\|T(\mathbf{x}_i) - T(\mathbf{x}_j)\| = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|.$$

A translação preserva:

- diferenças entre os pontos;
- distâncias;
- ângulos entre segmentos;
- forma;
- áreas e volumes.

Ela modifica apenas a posição da configuração em relação à origem.

### 4.7.2 Transformação afim de uma matriz de dados

Considere uma transformação afim aplicada a cada observação:

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{b}.$$

Se as observações estão organizadas nas linhas de

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

a matriz transformada é

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{A}^\top + \mathbf{1}_n \mathbf{b}^\top,$$

em que

$$\mathbf{1}_n = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

A matriz

$$\mathbf{1}_n \mathbf{b}^\top$$

possui dimensão  $n \times q$  e contém  $n$  linhas iguais a  $\mathbf{b}^\top$ . Assim, o mesmo deslocamento é acrescentado a todas as observações.

As dimensões da transformação são

$$\underbrace{\mathbf{X}}_{n \times p} \underbrace{\mathbf{A}^\top}_{p \times q} + \underbrace{\mathbf{1}_n}_{n \times 1} \underbrace{\mathbf{b}^\top}_{1 \times q} = \underbrace{\mathbf{Y}}_{n \times q}.$$

No caso de uma translação pura,

$$\mathbf{A} = \mathbf{I}_p,$$

e

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X} + \mathbf{1}_n \mathbf{b}^\top.$$

### 4.7.3 Centralização

A centralização desloca uma configuração para que um vetor de localização coincida com a origem.

Para um vetor fixo

$$\mathbf{m} \in \mathbb{R}^p,$$

define-se

$$\mathbf{x}_c = \mathbf{x} - \mathbf{m}.$$

Essa operação é afim:

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{I}_p \mathbf{x} - \mathbf{m}.$$

Quando

$$\mathbf{m} \neq \mathbf{0},$$

ela não é linear, pois

$$T(\mathbf{0}) = -\mathbf{m}.$$

Para uma matriz de dados,

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^\top \end{bmatrix},$$

a centralização por  $\mathbf{m}$  é

$$\mathbf{X}_c = \mathbf{X} - \mathbf{1}_n \mathbf{m}^\top.$$

Quando o vetor de localização é a média amostral,

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i,$$

tem-se

$$\mathbf{X}_c = \mathbf{X} - \mathbf{1}_n \bar{\mathbf{x}}^\top.$$

Retomando a matriz de centralização,

$$\mathbf{H}_n = \mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top,$$

a matriz centralizada pode ser escrita como

$$\mathbf{X}_c = \mathbf{H}_n \mathbf{X}.$$

De fato,

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_n \mathbf{X} &= \left( \mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top \right) \mathbf{X} \\ &= \mathbf{X} - \mathbf{1}_n \left( \frac{1}{n} \mathbf{1}_n^\top \mathbf{X} \right) \\ &= \mathbf{X} - \mathbf{1}_n \bar{\mathbf{x}}^\top. \end{aligned}$$

A centralização de cada observação em torno de um vetor fixo é uma transformação afim. Em contraste, a aplicação

$$\mathbf{X} \mapsto \mathbf{H}_n \mathbf{X}$$

sobre o espaço das matrizes de dados é linear, pois  $\mathbf{H}_n$  é uma matriz fixa.

Além disso,

$$\mathbf{H}_n = \mathbf{H}_n^\top$$

e

$$\mathbf{H}_n^2 = \mathbf{H}_n.$$

Portanto,  $\mathbf{H}_n$  é uma matriz de projeção ortogonal. Como

$$\mathbf{H}_n \mathbf{1}_n = \mathbf{0},$$



seu núcleo é

$$\mathcal{N}(\mathbf{H}_n) = \text{span}\{\mathbf{1}_n\},$$

e sua imagem é o subespaço

$$\mathcal{C}(\mathbf{H}_n) = \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{1}_n^\top \mathbf{z} = 0\} = \text{span}\{\mathbf{1}_n\}^\perp.$$

Assim, multiplicar uma variável observada por  $\mathbf{H}_n$  equivale a projetá-la ortogonalmente sobre o subespaço dos vetores cujas componentes somam zero.

Como  $\mathbf{H}_n$  é simétrica e

$$\mathbf{H}_n \mathbf{1}_n = \mathbf{0},$$

tem-se também

$$\mathbf{1}_n^\top \mathbf{H}_n = \mathbf{0}^\top.$$

Consequentemente,

$$\mathbf{1}_n^\top \mathbf{X}_c = \mathbf{1}_n^\top \mathbf{H}_n \mathbf{X} = \mathbf{0}^\top.$$

Portanto, cada coluna de  $\mathbf{X}_c$  possui média igual a zero.

**Proposição 4.9** (Preservação das distâncias pela centralização). *Se*

$$\mathbf{x}_{ci} = \mathbf{x}_i - \mathbf{m}$$

*e*

$$\mathbf{x}_{cj} = \mathbf{x}_j - \mathbf{m},$$

*então*

$$\|\mathbf{x}_{ci} - \mathbf{x}_{cj}\| = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|.$$

*Comprovação.* Tem-se

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_{ci} - \mathbf{x}_{cj} &= (\mathbf{x}_i - \mathbf{m}) - (\mathbf{x}_j - \mathbf{m}) \\ &= \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j.\end{aligned}$$

Logo, as duas diferenças possuem a mesma norma.  $\square$

A centralização modifica a posição da nuvem em relação à origem, mas preserva sua configuração interna.

#### 4.7.4 Escalonamento das variáveis

Considere uma matriz diagonal

$$\mathbf{L} = \text{diag}(\ell_1, \dots, \ell_p),$$

com

$$\ell_j > 0, \quad j = 1, \dots, p.$$

A transformação

$$\mathbf{y} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{x}$$

divide cada coordenada por sua escala correspondente:

$$y_j = \frac{x_j}{\ell_j}.$$

Essa operação é linear e, para uma matriz de dados, assume a forma

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{L}^{-1}.$$

A multiplicação ocorre à direita porque as variáveis ocupam as colunas de  $\mathbf{X}$ .

Quando as escalas são diferentes, o escalonamento modifica, em geral, distâncias e ângulos. Alguns pares particulares de vetores podem manter sua relação angular, mas a geometria euclidiana não é preservada para todos os vetores. Para duas observações,

$$\|\mathbf{L}^{-1}\mathbf{x}_i - \mathbf{L}^{-1}\mathbf{x}_j\|^2 = (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)^\top \mathbf{L}^{-2} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j).$$

O escalonamento induz, no espaço original, a geometria determinada pela matriz positiva definida

$$\mathbf{L}^{-2}.$$

Variáveis associadas a escalas menores recebem maior peso nas distâncias transformadas. Quando todas as escalas são iguais, isto é,

$$\mathbf{L} = \ell \mathbf{I}_p,$$

o escalonamento é uniforme: todas as distâncias são multiplicadas pelo mesmo fator  $1/\ell$  e os ângulos são preservados.

#### 4.7.5 Padronização

A padronização combina centralização e escalonamento.

Para um vetor de localização  $\mathbf{m}$  e uma matriz diagonal de escalas positivas  $\mathbf{L}$ , define-se

$$\mathbf{z} = \mathbf{L}^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{m}).$$

Essa expressão pode ser reorganizada como

$$\mathbf{z} = \mathbf{L}^{-1} \mathbf{x} - \mathbf{L}^{-1} \mathbf{m}.$$

Portanto, a padronização é uma transformação afim com

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}^{-1}$$

e

$$\mathbf{b} = -\mathbf{L}^{-1} \mathbf{m}.$$

Para uma matriz de dados,

$$\mathbf{Z} = (\mathbf{X} - \mathbf{1}_n \mathbf{m}^\top) \mathbf{L}^{-1}.$$

Quando  $\mathbf{m} = \bar{\mathbf{x}}$  e os elementos diagonais de  $\mathbf{L}$  são os desvios-padrão amostrais, cada coluna de  $\mathbf{Z}$  possui média zero e desvio-padrão igual a 1. Essa transformação será retomada posteriormente

na relação entre matrizes de covariâncias e de correlações e na formulação de técnicas sensíveis à escala das variáveis.

Para duas observações padronizadas,

$$\begin{aligned}\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_j &= \mathbf{L}^{-1} (\mathbf{x}_i - \mathbf{m}) - \mathbf{L}^{-1} (\mathbf{x}_j - \mathbf{m}) \\ &= \mathbf{L}^{-1} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) .\end{aligned}$$

Logo,

$$\|\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_j\|^2 = (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)^\top \mathbf{L}^{-2} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) .$$

A translação associada à centralização não altera as diferenças entre observações. A alteração da geometria decorre do escalonamento.

#### 4.7.6 Ordem entre centralização e escalonamento

A padronização usual é

$$\mathbf{z} = \mathbf{L}^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{m}) .$$

Se o escalonamento for aplicado primeiro,

$$\mathbf{y} = \mathbf{L}^{-1} \mathbf{x} ,$$

o vetor de localização também deve ser expresso na nova escala:

$$\mathbf{L}^{-1} \mathbf{m} .$$

Assim,

$$\mathbf{z} = \mathbf{y} - \mathbf{L}^{-1} \mathbf{m} .$$

As duas sequências produzem o mesmo resultado quando o vetor de centralização é transformado juntamente com os dados.

### 4.7.7 Composição e inversão de transformações afins

Considere

$$T_1(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax} + \mathbf{b}$$

e

$$T_2(\mathbf{y}) = \mathbf{Cy} + \mathbf{d}.$$

A composição é

$$\begin{aligned} T_2(T_1(\mathbf{x})) &= \mathbf{C}(\mathbf{Ax} + \mathbf{b}) + \mathbf{d} \\ &= \mathbf{CAx} + \mathbf{Cb} + \mathbf{d}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$(T_2 \circ T_1)(\mathbf{x}) = \mathbf{CAx} + (\mathbf{Cb} + \mathbf{d}).$$

A composição de transformações afins também é afim.

Considere agora

$$\mathbf{y} = \mathbf{Ax} + \mathbf{b},$$

com  $\mathbf{A}$  quadrada e invertível. Subtraindo  $\mathbf{b}$  e multiplicando por  $\mathbf{A}^{-1}$ ,

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{b}).$$

A transformação inversa é

$$T^{-1}(\mathbf{y}) = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{y} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}.$$

Uma transformação afim de  $\mathbb{R}^p$  em  $\mathbb{R}^p$  é invertível se, e somente se, sua parte linear  $\mathbf{A}$  é invertível.




Figura 4.8: Efeito da centralização, do escalonamento e da padronização sobre uma mesma configuração de dados.

### 4.7.8 Comparação das operações de pré-processamento

A Figura 4.8 compara centralização, escalonamento e padronização de uma mesma nuvem de pontos. O mesmo vetor de escalas é utilizado no escalonamento e na padronização, permitindo separar visualmente o efeito da alteração de escala do efeito da centralização.

A centralização desloca a nuvem para que sua média coincida com a origem, sem modificar as diferenças nem as distâncias entre as observações. O escalonamento altera as unidades das coordenadas e, em geral, modifica comprimentos, distâncias e ângulos. A padronização combina esses dois efeitos: centraliza a nuvem e reescala suas coordenadas.

A Tabela 4.5 resume as diferenças entre as transformações estudadas nesta seção.

Tabela 4.5: Comparação entre transformações lineares, transformações afins e operações de pré-processamento.

| Operação             | Expressão para um vetor                    | Linear como função de $\mathbf{x}$ ? | Mantém a origem fixa? |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Transformação linear | $\mathbf{Ax}$                              | Sim                                  | Sim                   |
| Translação           | $\mathbf{x} + \mathbf{b}$                  | Não, se $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ | Não                   |
| Transformação afim   | $\mathbf{Ax} + \mathbf{b}$                 | Não, em geral                        | Não, em geral         |
| Centralização        | $\mathbf{x} - \mathbf{m}$                  | Não, se $\mathbf{m} \neq \mathbf{0}$ | Não                   |
| Escalação            | $\mathbf{L}^{-1}\mathbf{x}$                | Sim                                  | Sim                   |
| Padronização         | $\mathbf{L}^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{m})$ | Não, em geral                        | Não, em geral         |

Transformações lineares podem modificar direção, escala ou dimensão, mas mantêm necessariamente a origem fixa. Transformações afins acrescentam a possibilidade de deslocar a configuração. A centralização e a padronização pertencem a essa segunda classe quando consideradas como operações sobre uma observação individual e para parâmetros de localização e escala fixados. Quando a centralização de uma matriz de dados é escrita como  $\mathbf{X} \mapsto \mathbf{H}_n \mathbf{X}$ , a operação é linear no espaço das matrizes.

## 4.8 Síntese do capítulo

Uma transformação linear preserva combinações lineares. Para uma transformação

$$T : V \longrightarrow W,$$

tem-se

$$T(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) = \alpha T(\mathbf{u}) + \beta T(\mathbf{v}).$$

Essa propriedade implica, entre outras consequências,

$$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0},$$

e permite determinar uma transformação linear a partir de sua ação sobre uma base do domínio.

Fixadas as bases do domínio e do contradomínio, uma transformação linear possui uma representação matricial única. Em particular, nas bases canônicas, uma transformação

$$T_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$$

é representada por

$$T_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax}, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}.$$

Quando as observações ocupam as linhas de uma matriz de dados

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

a transformação simultânea das observações é

$$\mathbf{Y} = \mathbf{XA}^{\top}.$$

Cada linha de  $\mathbf{Y}$  representa uma observação transformada, enquanto cada coluna corresponde a uma combinação linear das variáveis originais.

A matriz associada à transformação permite relacionar os conceitos desenvolvidos neste capítulo aos espaços fundamentais estudados anteriormente:

$$\ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

e

$$\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Assim, o núcleo reúne os vetores eliminados pela transformação, enquanto a imagem contém todos os vetores que podem ser produzidos por ela. Pelo teorema posto-nulidade,



$$\dim \ker(T_{\mathbf{A}}) + \dim \text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = p,$$

ou, equivalentemente,

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) + \text{posto}(\mathbf{A}) = p.$$

O posto é, portanto, a dimensão da imagem da transformação. Quando o núcleo contém vetores não nulos, diferentes vetores do domínio podem possuir a mesma imagem e ocorre perda de informação.

Para uma transformação quadrada, as condições

$$\ker(T_{\mathbf{A}}) = \{\mathbf{0}\},$$

$$\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \mathbb{R}^p,$$

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = p,$$

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0$$

e a existência de  $\mathbf{A}^{-1}$  são equivalentes.

A composição de transformações corresponde ao produto de suas matrizes. Se  $T_1$  é representada por  $\mathbf{A}_1$  e  $T_2$  por  $\mathbf{A}_2$ , então

$$[T_2 \circ T_1] = \mathbf{A}_2 \mathbf{A}_1.$$

A matriz situada à direita atua primeiro. Como o produto matricial não é comutativo, a ordem das transformações pode alterar o resultado.

As transformações geométricas estudadas ilustram diferentes efeitos possíveis sobre uma configuração. Rotações e reflexões são transformações ortogonais e preservam a geometria euclidiana. Escalonamentos alteram as escalas das direções coordenadas; cisalhamentos modificam, em geral, ângulos e comprimentos; projeções eliminam componentes pertencentes ao complemento do subespaço sobre o qual se projeta.

Para uma transformação quadrada,

$$|\det(\mathbf{A})|$$

representa o fator de alteração do volume  $p$ -dimensional. Quando  $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ , seu sinal informa também o efeito sobre a orientação: valores positivos preservam a orientação e valores negativos a invertem. Se

$$\det(\mathbf{A}) = 0,$$

a transformação reduz a dimensão e o volume  $p$ -dimensional da imagem é igual a zero.

As transformações ortogonais são caracterizadas por

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}_p.$$

Elas preservam produtos internos e, conseqüentemente, normas, distâncias, ângulos e ortogonalidade. Além disso,

$$\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^\top$$

e

$$\det(\mathbf{Q}) \in \{-1, 1\},$$

de modo que também preservam volumes  $p$ -dimensionais.

As colunas de uma matriz ortogonal formam uma base ortonormal e satisfazem

$$\mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_j = \delta_{ij}.$$

Essa propriedade estabelece a ligação entre transformações ortogonais e sistemas de coordenadas ortonormais.

Se

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$$

é uma base de  $\mathbb{R}^p$  e

$$\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \quad \dots \quad \mathbf{b}_p],$$

então

$$\mathbf{x} = \mathbf{B}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

e

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{x}.$$

Para duas bases  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{C}$ , com matrizes  $\mathbf{B}$  e  $\mathbf{C}$ , respectivamente, a conversão das coordenadas de  $\mathcal{B}$  para  $\mathcal{C}$  é

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}.$$

Se uma transformação é representada nas bases canônicas por  $\mathbf{A}$ , sua matriz em relação à base  $\mathcal{B}$  do domínio e à base  $\mathcal{C}$  do contradomínio é

$$[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B}.$$

Quando a mesma base é utilizada no domínio e no contradomínio,

$$\mathbf{A}_{\mathcal{B}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B},$$

de modo que as duas matrizes são semelhantes e representam o mesmo operador em sistemas de coordenadas distintos.

A transformação ativa e a mudança passiva de coordenadas devem ser diferenciadas. Se  $\mathbf{Q}$  é ortogonal, na transformação ativa,

$$\mathbf{y} = \mathbf{Q}\mathbf{x},$$

enquanto, na mudança passiva para a base formada pelas colunas de  $\mathbf{Q}$ ,

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{Q}^{\top}\mathbf{x}.$$

Na primeira situação, o vetor é transformado em relação a eixos fixos. Na segunda, o vetor geométrico permanece o mesmo e apenas sua representação em coordenadas é alterada.

As transformações afins generalizam as transformações lineares por meio da inclusão de uma translação:

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}.$$

A centralização de uma observação em torno de um vetor fixo é uma transformação afim, enquanto o escalonamento é uma transformação linear diagonal. A padronização combina essas duas operações.

Para uma matriz de dados, a centralização pela média amostral pode ser escrita como

$$\mathbf{X}_c = \mathbf{H}_n \mathbf{X},$$

em que

$$\mathbf{H}_n = \mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top.$$

Como

$$\mathbf{H}_n^\top = \mathbf{H}_n$$

e

$$\mathbf{H}_n^2 = \mathbf{H}_n,$$

a matriz  $\mathbf{H}_n$  é uma matriz de projeção ortogonal. Sua imagem é

$$\mathcal{C}(\mathbf{H}_n) = \text{span}\{\mathbf{1}_n\}^\perp,$$

o subespaço dos vetores cujas componentes somam zero.

A Tabela 4.6 reúne algumas das principais expressões desenvolvidas no capítulo.

Tabela 4.6: Síntese das transformações desenvolvidas no capítulo.

| Objeto ou operação      | Expressão                                                            | Interpretação                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Transformação linear    | $T_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$                  | Preserva combinações lineares                              |
| Transformação dos dados | $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{A}^\top$                             | Transforma simultaneamente as observações                  |
| Núcleo                  | $\ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A})$                     | Reúne os vetores enviados ao vetor nulo                    |
| Imagem                  | $\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A})$                | Reúne os vetores alcançados pela transformação             |
| Composição              | $(T_2 \circ T_1)(\mathbf{x}) = \mathbf{A}_2 \mathbf{A}_1 \mathbf{x}$ | Aplica $T_1$ antes de $T_2$                                |
| Transformação inversa   | $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{y}$                            | Recupera o vetor original quando $\mathbf{A}$ é invertível |
| Rotação                 | $\mathbf{Q}(\theta)\mathbf{x}$                                       | Preserva a geometria e a orientação                        |

| Objeto ou operação                          | Expressão                                                                          | Interpretação                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Reflexão                                    | $\mathbf{F}\mathbf{x}$                                                             | Preserva a geometria; seu efeito sobre a orientação é determinado pelo determinante |
| Escalonamento                               | $\mathbf{L}\mathbf{x}$                                                             | Reescala direções coordenadas                                                       |
| Cisalhamento                                | $\mathbf{C}_{ij}(k)\mathbf{x}$                                                     | Inclina a configuração preservando volume no caso elementar                         |
| Projeção ortogonal                          | $\mathbf{P}_S\mathbf{x}$                                                           | Mantém a componente em $S$ e elimina a componente em $S^\perp$                      |
| Coordenadas em uma base                     | $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{x}$                           | Representa o mesmo vetor na base $\mathcal{B}$                                      |
| Mudança de $\mathcal{B}$ para $\mathcal{C}$ | $[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ | Converte coordenadas entre bases                                                    |
| Transformação em bases gerais               | $[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B}$   | Representa a transformação nas bases escolhidas                                     |
| Transformação afim                          | $\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$                                                | Combina transformação linear e translação                                           |
| Centralização dos dados                     | $\mathbf{X}_c = \mathbf{H}_n\mathbf{X}$                                            | Projeta cada variável no subespaço de média zero                                    |
| Padronização                                | $\mathbf{L}^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{m})$                                         | Ajusta localização e escala                                                         |

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- reconhecer e verificar a linearidade de uma transformação;
- construir a matriz de uma transformação a partir da imagem de uma base;
- relacionar núcleo e imagem de uma transformação ao espaço nulo e ao espaço coluna da matriz associada;
- interpretar posto, injetividade, sobrejetividade, bijetividade e perda de informação;
- representar a composição e a inversão de transformações por operações matriciais;
- interpretar geometricamente rotações, reflexões, escalonamentos, cisalhamentos e projeções;
- relacionar o determinante à alteração de volume, à orientação e à redução de dimensão;
- reconhecer transformações ortogonais e interpretar as propriedades geométricas que elas preservam;
- converter coordenadas entre bases;
- representar uma transformação linear em bases distintas do domínio e do contradomínio;
- distinguir transformação ativa e mudança passiva de coordenadas;
- interpretar transformações afins, centralização, escalonamento e padronização;

- reconhecer a matriz de centralização como uma matriz de projeção ortogonal.

No próximo capítulo, serão estudadas direções especiais para as quais a ação de uma transformação linear produz um múltiplo escalar do próprio vetor,

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

Essas direções conduzem aos conceitos de autovetores, autovalores, autoespaços e decomposição espectral.

## 5 Autovalores, autovetores e decomposição espectral

No capítulo anterior, uma transformação linear foi representada por uma matriz e interpretada como uma operação capaz de modificar direções, comprimentos, ângulos e volumes. Quando o domínio e o contradomínio coincidem, a transformação é um operador linear

$$T_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^p, \quad T_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x},$$

representado por uma matriz quadrada

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

Vimos também que a matriz de um operador depende da base utilizada para representá-lo. Uma mudança de base pode produzir uma matriz mais simples, embora o operador linear permaneça o mesmo. Neste capítulo, procuraremos bases especialmente adaptadas à ação do operador.

Algumas direções possuem um comportamento particularmente simples: quando um vetor pertence a uma dessas direções, sua imagem permanece na mesma reta que passa pela origem. A identificação dessas direções conduz aos conceitos de autovalor, autovetor e autoespaço.

Quando existem autovetores linearmente independentes em número suficiente, eles formam uma base na qual a matriz do operador é diagonal. A diagonalização pode, portanto, ser interpretada como uma mudança para um sistema de coordenadas em que a transformação atua separadamente sobre cada direção da base.

Para matrizes simétricas reais, essa simplificação possui propriedades adicionais: todos os autovalores são reais e existe uma base ortonormal de autovetores. A decomposição resultante permitirá interpretar formas quadráticas, matrizes positivas definidas, elipsoides, funções de matrizes e problemas de otimização. Essas estruturas serão retomadas nos capítulos de SVD, covariâncias e técnicas multivariadas.

### Convenções de notação

Ao longo deste capítulo:

- $\lambda$  representa um autovalor;

- $\mathbf{v}$  representa um autovetor;
- $\mathcal{E}_\lambda$  representa o autoespaço associado a  $\lambda$ ;
- $m_a(\lambda)$  e  $m_g(\lambda)$  representam, respectivamente, as multiplicidades algébrica e geométrica;
- $\mathcal{B}_\mathbf{A}$  representa uma base de autovetores de  $\mathbf{A}$ , quando tal base existe;
- $\mathbf{B}_\mathbf{A}$  representa a matriz formada pelos vetores da base  $\mathcal{B}_\mathbf{A}$ ;
- $\Lambda_\mathbf{A}$  representa a matriz diagonal dos autovalores correspondente à ordenação escolhida dos autovetores;
- $\mathbf{Q}_\mathbf{A}$  representa uma matriz ortogonal de autovetores quando  $\mathbf{A}$  é simétrica;
- $\Pi_\lambda$  representa o projetor espectral associado ao autoespaço de  $\lambda$ ;
- $\mathcal{R}_\mathbf{A}(\mathbf{x})$  representa o quociente de Rayleigh.

Salvo indicação contrária, as interpretações geométricas serão desenvolvidas em espaços vetoriais reais. Autovalores e autovetores complexos serão considerados explicitamente quando necessário.

## 5.1 Direções invariantes, autovalores e autoespaços

Considere uma matriz

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

Um subespaço

$$\mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}^p$$

é **invariante** sob  $\mathbf{A}$  quando

$$\mathbf{A}\mathbf{w} \in \mathcal{W}$$

para todo  $\mathbf{w} \in \mathcal{W}$ .

Uma reta que passa pela origem e é gerada por um vetor não nulo  $\mathbf{v}$  é o subespaço

$$\text{span}\{\mathbf{v}\} = \{c\mathbf{v} : c \in \mathbb{R}\}.$$

Essa reta é invariante sob  $\mathbf{A}$  quando a imagem de  $\mathbf{v}$  permanece na própria reta. Nesse caso, existe um escalar  $\lambda$  tal que



$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

**Definição 5.1** (Autovalor e autovetor). Seja

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

Um escalar  $\lambda \in \mathbb{R}$  é um **autovalor** de  $\mathbf{A}$  quando existe um vetor

$$\mathbf{v} \in \mathbb{R}^p, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0},$$

tal que

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

O vetor  $\mathbf{v}$  é denominado **autovetor** de  $\mathbf{A}$  associado ao autovalor  $\lambda$ . O par  $(\lambda, \mathbf{v})$  é denominado **autopar** de  $\mathbf{A}$ .

A equação

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

mostra que a transformação não combina a direção de  $\mathbf{v}$  com outras direções do espaço. Sua ação sobre esse vetor consiste em alterar seu comprimento e, possivelmente, seu sentido.

O módulo de  $\lambda$  determina a alteração do comprimento:

- se  $|\lambda| > 1$ , ocorre expansão;
- se  $0 < |\lambda| < 1$ , ocorre contração;
- se  $|\lambda| = 1$ , o comprimento é preservado;
- se  $\lambda = 0$ , o vetor é transformado no vetor nulo.

O sinal determina o sentido:

- se  $\lambda > 0$ , o sentido é preservado;
- se  $\lambda < 0$ , o sentido é invertido.

Portanto, quando  $\lambda = -1$ , o vetor tem seu sentido invertido sem alteração do comprimento. Quando  $\lambda = 0$ , a reta gerada pelo autovetor continua sendo um subespaço invariante, pois toda a reta é enviada ao vetor nulo, mas sua direção deixa de aparecer na imagem da transformação.

**Exemplo 5.1** (Direções invariantes de uma matriz simétrica). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Para o vetor

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{v}_1 &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} \\ &= 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Assim,

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = 4\mathbf{v}_1,$$

e  $\mathbf{v}_1$  é um autovetor associado ao autovalor

$$\lambda_1 = 4.$$

Para

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

obtém-se

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{v}_2 &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} \\ &= 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{v}_2,$$

e  $\mathbf{v}_2$  é um autovetor associado ao autovalor

$$\lambda_2 = 2.$$

Considere agora

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Sua imagem é

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Não existe um escalar  $\lambda$  que satisfaça

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Logo,  $\mathbf{x}$  não é um autovetor de  $\mathbf{A}$ . A transformação modifica seu comprimento e sua direção.

A Figura 5.1 compara as imagens dos autovetores  $\mathbf{v}_1$  e  $\mathbf{v}_2$  com a imagem do vetor genérico  $\mathbf{x}$ . As retas tracejadas em cinza representam as duas direções invariantes.

As retas tracejadas representam as direções geradas por  $\mathbf{v}_1$  e  $\mathbf{v}_2$ . A transformação amplia os vetores por fatores diferentes, mas mantém cada um na reta correspondente. O vetor  $\mathbf{x}$  não pertence a uma direção invariante e sua imagem ocupa outra direção.

Um mesmo autoespaço unidimensional contém infinitos autovetores associados ao mesmo autovalor, pois qualquer múltiplo não nulo de um autovetor permanece na mesma direção e satisfaz a mesma equação de autovalor.

**Proposição 5.1** (Múltiplos de um autovetor). *Se  $\mathbf{v}$  é um autovetor de  $\mathbf{A}$  associado ao autovalor  $\lambda$ , então todo múltiplo*

$$c\mathbf{v}, \quad c \neq 0,$$

*também é um autovetor associado a  $\lambda$ .*




Figura 5.1: Autovetores permanecem nas mesmas direções após a transformação, enquanto um vetor genérico pode ter sua direção modificada.

*Comprovação.* Como

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v},$$

pela linearidade,

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{c}\mathbf{v}) &= c\mathbf{A}\mathbf{v} \\ &= c\lambda\mathbf{v} \\ &= \lambda(\mathbf{c}\mathbf{v}).\end{aligned}$$

Como  $c \neq 0$  e  $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ , tem-se  $\mathbf{c}\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ . Portanto,  $\mathbf{c}\mathbf{v}$  é um autovetor associado a  $\lambda$ . □

Para reunir todos os autovetores associados ao mesmo autovalor, reorganiza-se a equação

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

como

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_p)\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

O conjunto de soluções é o núcleo de

$$\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_p.$$

**Definição 5.2** (Autoespaço). Se  $\lambda$  é um autovalor de

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p},$$

o **autoespaço** associado a  $\lambda$  é

$$\mathcal{E}_\lambda = \mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_p).$$

Os autovetores associados a  $\lambda$  são os elementos não nulos de  $\mathcal{E}_\lambda$ :

$$\mathcal{E}_\lambda \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

O vetor nulo pertence a todo autoespaço, mas não é considerado um autovetor. A igualdade

$$\mathbf{A}\mathbf{0} = \lambda\mathbf{0}$$

é satisfeita para qualquer  $\lambda$  e não identifica uma direção.

**Proposição 5.2** (Estrutura e invariância do autoespaço). *Se  $\lambda$  é um autovalor de  $\mathbf{A}$ , então  $\mathcal{E}_\lambda$  é um subespaço não trivial de  $\mathbb{R}^p$  e é invariante sob  $\mathbf{A}$ .*

*Comprovação.* Como

$$\mathcal{E}_\lambda = \mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_p),$$

o autoespaço é o núcleo de uma transformação linear e, portanto, é um subespaço de  $\mathbb{R}^p$ .

Como  $\lambda$  é um autovalor, existe pelo menos um vetor não nulo  $\mathbf{v}$  tal que

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_p)\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathcal{E}_\lambda \neq \{\mathbf{0}\}.$$

Para qualquer  $\mathbf{w} \in \mathcal{E}_\lambda$ ,

$$\mathbf{A}\mathbf{w} = \lambda\mathbf{w}.$$

Como  $\mathcal{E}_\lambda$  é fechado pela multiplicação por escalares,

$$\lambda\mathbf{w} \in \mathcal{E}_\lambda.$$

Portanto,

$$\mathbf{A}\mathbf{w} \in \mathcal{E}_\lambda,$$

e o autoespaço é invariante sob  $\mathbf{A}$ . □

Quando

$$\dim(\mathcal{E}_\lambda) = 1,$$

o autoespaço determina uma única direção invariante. Todos os autovetores associados a  $\lambda$  são múltiplos não nulos de um mesmo vetor.

Quando

$$\dim(\mathcal{E}_\lambda) > 1,$$

o autovalor está associado a várias direções linearmente independentes. Nesse caso, o objeto geométrico determinado pela matriz é todo o autoespaço. Uma base específica desse subespaço não é necessariamente única.

A definição do autoespaço transforma a busca por autovetores em um problema de núcleo. Para um valor fixado de  $\lambda$ , existem autovetores associados precisamente quando

$$\mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p) \neq \{\mathbf{0}\}.$$

Resta, portanto, determinar quais valores de  $\lambda$  tornam esse núcleo não trivial. Essa condição equivale à singularidade de  $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p$  e conduz à equação característica.

## 5.2 Equação característica, multiplicidades e diagonalização

A definição de autovalor permite verificar se um vetor conhecido determina uma direção invariante. Para encontrar essas direções a partir de uma matriz, é necessário determinar os valores de  $\lambda$  para os quais

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p) \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

possui soluções não triviais.

Esse é um sistema linear homogêneo. Se

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p$$

fosse invertível, sua única solução seria  $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ . Portanto, um autovalor deve tornar essa matriz singular.

**Teorema 5.1** (Caracterização dos autovalores pelo determinante). *Seja*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

*Um escalar  $\lambda \in \mathbb{R}$  é autovalor de  $\mathbf{A}$  se, e somente se,*

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p) = 0.$$

*Comprovação.* Se  $\lambda$  é autovalor de  $\mathbf{A}$ , existe um vetor não nulo  $\mathbf{v}$  tal que

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p) \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Como o sistema possui uma solução não trivial, a matriz

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p$$

não é invertível. Logo,

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p) = 0.$$

Reciprocamente, se

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p) = 0,$$

a matriz é singular. Portanto, seu núcleo contém pelo menos um vetor não nulo  $\mathbf{v}$ , para o qual

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p) \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Consequentemente,

$$\mathbf{A} \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v},$$

e  $\lambda$  é autovalor de  $\mathbf{A}$ . □



**Definição 5.3** (Polinômio e equação característicos). O **polinômio característico** de uma matriz

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

é definido por

$$p_{\mathbf{A}}(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p).$$

A equação

$$p_{\mathbf{A}}(\lambda) = 0$$

é denominada **equação característica** de  $\mathbf{A}$ . (Horn; Johnson, 2013)

Também é possível definir o polinômio característico por

$$\det(\lambda \mathbf{I}_p - \mathbf{A}).$$

As duas convenções diferem pelo fator  $(-1)^p$  e possuem as mesmas raízes. Portanto, produzem os mesmos autovalores.

O polinômio característico de uma matriz de ordem  $p$  possui grau  $p$ . Consideradas suas multiplicidades, ele possui  $p$  raízes no conjunto dos números complexos. Uma matriz real pode ter autovalores reais, autovalores complexos ou ambos.

### 5.2.1 Determinação dos autovalores e autoespaços

Considere novamente

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Tem-se

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{bmatrix}.$$

O polinômio característico é

$$\begin{aligned}
p_{\mathbf{A}}(\lambda) &= \det \begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{bmatrix} \\
&= (3-\lambda)^2 - 1 \\
&= \lambda^2 - 6\lambda + 8 \\
&= (\lambda - 4)(\lambda - 2).
\end{aligned}$$

Assim, os autovalores são

$$\lambda_1 = 4 \quad \text{e} \quad \lambda_2 = 2.$$

Para determinar o autoespaço associado a  $\lambda_1 = 4$ , resolve-se

$$(\mathbf{A} - 4\mathbf{I}_2) \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Como

$$\mathbf{A} - 4\mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix},$$

o sistema conduz a

$$-v_1 + v_2 = 0,$$

ou seja,

$$v_2 = v_1.$$

Portanto,

$$\mathcal{E}_4 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Para  $\lambda_2 = 2$ ,

$$\mathbf{A} - 2\mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

e o sistema correspondente fornece

$$v_1 + v_2 = 0.$$

Logo,

$$\mathcal{E}_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

O procedimento possui duas etapas:

1. resolver

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p) = 0$$

para obter os autovalores;

2. para cada autovalor  $\lambda$ , determinar

$$\mathcal{E}_\lambda = \mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p).$$

### 5.2.2 Autovalores complexos de matrizes reais

As definições de autovalor, autovetor, autoespaço e equação característica foram apresentadas inicialmente no espaço real. Elas se estendem ao espaço complexo substituindo

$$\mathbb{R}^p$$

por

$$\mathbb{C}^p$$

e permitindo

$$\lambda \in \mathbb{C}.$$

Nesse caso, um autovetor complexo é um vetor não nulo  $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^p$  que satisfaz

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

A caracterização

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p) = 0$$

permanece válida no espaço complexo.

Nem toda matriz real possui autovalores reais. Considere a rotação de  $90^\circ$ ,

$$\mathbf{Q}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Seu polinômio característico é

$$\begin{aligned} p_{\mathbf{Q}}(\lambda) &= \det \begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} \\ &= \lambda^2 + 1. \end{aligned}$$

A equação

$$\lambda^2 + 1 = 0$$

não possui raízes reais. Suas raízes complexas são

$$\lambda_1 = i \quad \text{e} \quad \lambda_2 = -i.$$

Portanto, a matriz não possui autovetores reais. Geometricamente, nenhuma reta real que passa pela origem permanece invariante sob uma rotação de  $90^\circ$ .

Quando o espaço é ampliado de  $\mathbb{R}^2$  para  $\mathbb{C}^2$ , a matriz possui autovalores e autovetores complexos. Neste capítulo, a interpretação geométrica será desenvolvida principalmente para matrizes cujos autovalores e autovetores são reais. Em particular, as matrizes simétricas reais sempre satisfazem essa condição.

### 5.2.3 Independência entre autovetores

Os autovetores associados a autovalores distintos possuem uma propriedade que permite construir bases de direções invariantes.

**Teorema 5.2** (Independência de autovetores associados a autovalores distintos). *Se*

$$\lambda_1, \dots, \lambda_r$$

*são autovalores distintos de uma matriz  $\mathbf{A}$  e*

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$$

*são autovetores associados, respectivamente, a esses autovalores, então*

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$$

*são linearmente independentes.*

*Comprovação.* A demonstração será feita por indução sobre  $r$ .

Para  $r = 1$ , o resultado é imediato porque um autovetor é não nulo.

Suponha que o resultado seja válido para  $r - 1$  autovetores e considere

$$c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_r \mathbf{v}_r = \mathbf{0}.$$

Multiplicando por  $\mathbf{A}$ ,

$$c_1 \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_r \lambda_r \mathbf{v}_r = \mathbf{0}.$$

Multiplicando a primeira igualdade por  $\lambda_r$  e subtraindo-a da segunda,

$$c_1 (\lambda_1 - \lambda_r) \mathbf{v}_1 + \dots + c_{r-1} (\lambda_{r-1} - \lambda_r) \mathbf{v}_{r-1} = \mathbf{0}.$$

Pela hipótese de indução,

$$c_j (\lambda_j - \lambda_r) = 0, \quad j = 1, \dots, r-1.$$

Como os autovalores são distintos,

$$\lambda_j - \lambda_r \neq 0,$$

e, portanto,

$$c_1 = \cdots = c_{r-1} = 0.$$

A igualdade original reduz-se a

$$c_r \mathbf{v}_r = \mathbf{0}.$$

Como  $\mathbf{v}_r \neq \mathbf{0}$ , segue que  $c_r = 0$ . Logo, os autovetores são linearmente independentes.  $\square$

Uma consequência imediata é que uma matriz de ordem  $p$  com  $p$  autovalores distintos possui uma base formada por autovetores. Essa condição é suficiente para a diagonalização, mas não é necessária: uma matriz também pode ser diagonalizável quando possui autovalores repetidos.

#### 5.2.4 Multiplicidades algébrica e geométrica

Quando um autovalor aparece mais de uma vez como raiz do polinômio característico, é necessário distinguir sua repetição algébrica da dimensão do autoespaço correspondente.

**Definição 5.4** (Multiplicidades de um autovalor). Seja  $\lambda$  um autovalor de  $\mathbf{A}$ .

A **multiplicidade algébrica** de  $\lambda$ , denotada por

$$m_a(\lambda),$$

é o número de vezes que  $\lambda$  aparece como raiz do polinômio característico.

A **multiplicidade geométrica** de  $\lambda$ , denotada por

$$m_g(\lambda),$$

é a dimensão do autoespaço correspondente:

$$m_g(\lambda) = \dim(\mathcal{E}_\lambda) = \dim \mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_p).$$

Para todo autovalor,

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda).$$

A multiplicidade geométrica é pelo menos 1 porque o autoespaço contém vetores não nulos. Ela representa o número máximo de autovetores linearmente independentes que podem ser escolhidos para aquele autovalor.

Considere duas matrizes com o mesmo polinômio característico:

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Em ambos os casos,

$$p_{\mathbf{A}_j}(\lambda) = (2 - \lambda)^2.$$

Portanto,

$$m_a(2) = 2.$$

Para  $\mathbf{A}_1$ ,

$$\mathbf{A}_1 - 2\mathbf{I}_2 = \mathbf{0},$$

de modo que

$$\mathcal{E}_2 = \mathbb{R}^2$$

e

$$m_g(2) = 2.$$

Todo vetor não nulo do plano é um autovetor de  $\mathbf{A}_1$  associado a  $\lambda = 2$ .

Para  $\mathbf{A}_2$ ,

$$\mathbf{A}_2 - 2\mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

O sistema correspondente impõe

$$v_2 = 0.$$

Assim,

$$\mathcal{E}_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

e

$$m_g(2) = 1.$$

Nesse caso, existe somente uma direção invariante linearmente independente.

A Figura 5.2 compara as estruturas dos dois autoespaços.




Figura 5.2: Matrizes com o mesmo autovalor repetido podem possuir autoespaços de dimensões diferentes.

As duas matrizes possuem o mesmo autovalor com a mesma multiplicidade algébrica. A diferença entre as multiplicidades geométricas determina se existem autovetores suficientes para formar uma base.



### 5.2.5 Diagonalização

No capítulo anterior, vimos que a matriz de um operador depende da base utilizada para representá-lo. A diagonalização corresponde à escolha de uma base particularmente conveniente: uma base formada por autovetores.

Considere uma matriz

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

e suponha que exista uma base de  $\mathbb{R}^p$  formada por autovetores de  $\mathbf{A}$ ,

$$\mathcal{B}_{\mathbf{A}} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}.$$

A matriz dessa base é

$$\mathbf{B}_{\mathbf{A}} = [\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_p].$$

Como os vetores da base são linearmente independentes,  $\mathbf{B}_{\mathbf{A}}$  é invertível.

Se

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_j = \lambda_j \mathbf{v}_j, \quad j = 1, \dots, p,$$

e

$$\Lambda_{\mathbf{A}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p),$$

então

$$\mathbf{A}\mathbf{B}_{\mathbf{A}} = \mathbf{B}_{\mathbf{A}}\Lambda_{\mathbf{A}}.$$

Multiplicando à esquerda por  $\mathbf{B}_{\mathbf{A}}^{-1}$ ,

$$\mathbf{B}_{\mathbf{A}}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B}_{\mathbf{A}} = \Lambda_{\mathbf{A}}.$$

**Definição 5.5** (Matriz diagonalizável). Uma matriz

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

é **diagonalizável sobre**  $\mathbb{R}$  quando existe uma base  $\mathcal{B}_{\mathbf{A}}$  de  $\mathbb{R}^p$  formada por autovetores de  $\mathbf{A}$ .

Equivalentemente, existem uma matriz invertível  $\mathbf{B}_{\mathbf{A}}$  e uma matriz diagonal  $\Lambda_{\mathbf{A}}$  tais que

$$\mathbf{A} = \mathbf{B}_{\mathbf{A}} \Lambda_{\mathbf{A}} \mathbf{B}_{\mathbf{A}}^{-1}.$$

A ordem das colunas de  $\mathbf{B}_{\mathbf{A}}$  deve coincidir com a ordem dos autovalores em  $\Lambda_{\mathbf{A}}$ .

Pela notação de mudança de base desenvolvida no capítulo anterior,

$$[T_{\mathbf{A}}]_{\mathcal{B}_{\mathbf{A}} \leftarrow \mathcal{B}_{\mathbf{A}}} = \mathbf{B}_{\mathbf{A}}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}_{\mathbf{A}} = \Lambda_{\mathbf{A}}.$$

Assim,  $\Lambda_{\mathbf{A}}$  é a matriz do mesmo operador quando tanto o domínio quanto o contradomínio são representados na base de autovetores.

Para qualquer vetor  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ , suas coordenadas nessa base são

$$\mathbf{z} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}_{\mathbf{A}}} = \mathbf{B}_{\mathbf{A}}^{-1} \mathbf{x},$$

de modo que

$$\mathbf{x} = \mathbf{B}_{\mathbf{A}} \mathbf{z}.$$

Nas coordenadas da base de autovetores,

$$[T_{\mathbf{A}}(\mathbf{x})]_{\mathcal{B}_{\mathbf{A}}} = \Lambda_{\mathbf{A}} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}_{\mathbf{A}}}.$$

Como

$$\Lambda_{\mathbf{A}} \mathbf{z} = \begin{bmatrix} \lambda_1 z_1 \\ \vdots \\ \lambda_p z_p \end{bmatrix},$$

a transformação atua separadamente sobre cada coordenada: a componente correspondente ao autovetor  $\mathbf{v}_j$  é multiplicada por  $\lambda_j$ .

A diagonalização é, portanto, uma mudança para um sistema de coordenadas no qual as direções da base são invariantes e a ação do operador deixa de misturar coordenadas.

**Teorema 5.3** (Critérios de diagonalização). *Seja*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{p \times p},$$

em que  $\mathbb{F}$  representa  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ , e suponha que seu polinômio característico se decompõe em fatores lineares sobre  $\mathbb{F}$ .

São equivalentes:

1.  $\mathbf{A}$  é diagonalizável sobre  $\mathbb{F}$ ;
2.  $\mathbf{A}$  possui  $p$  autovetores linearmente independentes em  $\mathbb{F}^p$ ;
3. existe uma base de  $\mathbb{F}^p$  formada por autovetores de  $\mathbf{A}$ ;
4. a soma das dimensões dos autoespaços é igual a  $p$ ;
5. para cada autovalor  $\lambda$ ,

$$m_g(\lambda) = m_a(\lambda).$$

(Horn; Johnson, 2013)

O requisito de decomposição do polinômio característico é necessário porque uma matriz real pode não possuir todos os seus autovalores em  $\mathbb{R}$ . A matriz de rotação  $\mathbf{Q}(\pi/2)$  não é diagonalizável sobre  $\mathbb{R}$ , mas é diagonalizável sobre  $\mathbb{C}$ , pois possui dois autovalores complexos distintos.

Uma condição suficiente para a diagonalização é a existência de  $p$  autovalores distintos. Nesse caso, o Teorema 5.2 garante  $p$  autovetores linearmente independentes.

Autovalores repetidos não impedem a diagonalização. Para

$$\mathbf{A}_1 = 2\mathbf{I}_2,$$

tem-se

$$m_g(2) = m_a(2) = 2,$$

e a matriz é diagonalizável.

Para

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$m_g(2) = 1 < m_a(2) = 2.$$

A matriz não possui autovetores linearmente independentes em número suficiente para formar uma base e, portanto, não é diagonalizável.

### 5.2.6 Potências de uma matriz diagonalizável

A representação diagonal também simplifica o cálculo de potências. Se

$$\mathbf{A} = \mathbf{B}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{B}_\mathbf{A}^{-1},$$

então

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^2 &= \mathbf{B}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{B}_\mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{B}_\mathbf{A}^{-1} \\ &= \mathbf{B}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A}^2 \mathbf{B}_\mathbf{A}^{-1}. \end{aligned}$$

De forma geral, para todo inteiro  $k \geq 0$ ,

$$\mathbf{A}^k = \mathbf{B}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A}^k \mathbf{B}_\mathbf{A}^{-1}.$$

Como  $\Lambda_\mathbf{A}$  é diagonal,

$$\Lambda_\mathbf{A}^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_p^k).$$

Assim, a aplicação repetida do operador pode ser analisada coordenada a coordenada na base de autovetores: após  $k$  aplicações, a coordenada associada a  $\mathbf{v}_j$  é multiplicada por  $\lambda_j^k$ .

Para matrizes quadradas arbitrárias, a diagonalização pode falhar. Para matrizes simétricas reais, existe sempre uma base ortonormal de autovetores. Essa propriedade conduz a uma diagonalização que preserva a geometria euclidiana.

## 5.3 Matrizes simétricas e decomposição espectral

A diagonalização estudada na seção anterior pode falhar para matrizes quadradas arbitrárias. Uma matriz pode não possuir autovalores reais ou pode não apresentar autovetores linearmente independentes em número suficiente para formar uma base.

As matrizes simétricas reais possuem uma estrutura mais regular. Retomando a Definição 2.7, uma matriz

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

é simétrica quando

$$\mathbf{A}^\top = \mathbf{A}.$$

Para essa classe de matrizes, todos os autovalores são reais e os autoespaços associados a autovalores distintos são ortogonais. Como consequência, existe uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^p$  formada por autovetores de  $\mathbf{A}$ .

**Teorema 5.4** (Teorema Espectral para matrizes simétricas reais). *Seja*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

*uma matriz simétrica. Então:*

- 1. todos os autovalores de  $\mathbf{A}$  são reais;*
- 2. autoespaços associados a autovalores distintos são ortogonais;*
- 3. existe uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^p$  formada por autovetores de  $\mathbf{A}$ ;*
- 4. existe uma matriz ortogonal*

$$\mathbf{Q}_\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

*e uma matriz diagonal*

$$\Lambda_\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

*tais que*

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top.$$

(Horn; Johnson, 2013)

*Comprovação.* Para demonstrar que os autovalores são reais, considere um autovalor possivelmente complexo  $\lambda$  e um autovetor complexo não nulo  $\mathbf{z}$ , de modo que

$$\mathbf{A}\mathbf{z} = \lambda\mathbf{z}.$$

Como  $\mathbf{A}$  é real e simétrica, ela também é hermitiana:

$$\mathbf{A}^* = \mathbf{A},$$

em que  $*$  representa a transposta conjugada.

Multiplicando a equação de autovalor à esquerda por  $\mathbf{z}^*$ ,

$$\mathbf{z}^* \mathbf{A} \mathbf{z} = \lambda \mathbf{z}^* \mathbf{z}.$$

A quantidade

$$\mathbf{z}^* \mathbf{A} \mathbf{z}$$

é real, pois

$$(\mathbf{z}^* \mathbf{A} \mathbf{z})^* = \mathbf{z}^* \mathbf{A}^* \mathbf{z} = \mathbf{z}^* \mathbf{A} \mathbf{z}.$$

Além disso,

$$\mathbf{z}^* \mathbf{z} > 0.$$

Portanto,

$$\lambda = \frac{\mathbf{z}^* \mathbf{A} \mathbf{z}}{\mathbf{z}^* \mathbf{z}}$$

é real.

Considere agora dois autovetores reais  $\mathbf{v}_i$  e  $\mathbf{v}_j$ , associados a autovalores distintos  $\lambda_i$  e  $\lambda_j$ . Como

$$\mathbf{A} \mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$$

e

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_j = \lambda_j\mathbf{v}_j,$$

tem-se

$$\begin{aligned}\lambda_i\mathbf{v}_i^\top\mathbf{v}_j &= (\mathbf{A}\mathbf{v}_i)^\top\mathbf{v}_j \\ &= \mathbf{v}_i^\top\mathbf{A}^\top\mathbf{v}_j \\ &= \mathbf{v}_i^\top\mathbf{A}\mathbf{v}_j \\ &= \lambda_j\mathbf{v}_i^\top\mathbf{v}_j.\end{aligned}$$

Logo,

$$(\lambda_i - \lambda_j)\mathbf{v}_i^\top\mathbf{v}_j = 0.$$

Como  $\lambda_i \neq \lambda_j$ ,

$$\mathbf{v}_i^\top\mathbf{v}_j = 0.$$

Portanto, os autoespaços associados a autovalores distintos são ortogonais.

A existência de uma base ortonormal de autovetores pode ser demonstrada por indução sobre a ordem  $p$  da matriz. Para  $p = 1$ , o resultado é imediato.

Suponha agora  $p > 1$ . Pelo Teorema Fundamental da Álgebra, o polinômio característico de  $\mathbf{A}$  possui pelo menos uma raiz em  $\mathbb{C}$ . Pela primeira parte da demonstração, essa raiz é real. Denote-a por  $\lambda_1$ .

Como

$$\det(\mathbf{A} - \lambda_1\mathbf{I}_p) = 0,$$

a matriz real

$$\mathbf{A} - \lambda_1\mathbf{I}_p$$

é singular e possui um vetor não nulo real em seu núcleo. Normalizando esse vetor, obtém-se um autovetor unitário  $\mathbf{q}_1$ .

Considere o complemento ortogonal

$$\mathcal{W} = \text{span} \{ \mathbf{q}_1 \}^\perp.$$

Para qualquer  $\mathbf{x} \in \mathcal{W}$ ,

$$\mathbf{q}_1^\top \mathbf{x} = 0.$$

Como  $\mathbf{A}$  é simétrica,

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_1^\top \mathbf{A} \mathbf{x} &= (\mathbf{A} \mathbf{q}_1)^\top \mathbf{x} \\ &= \lambda_1 \mathbf{q}_1^\top \mathbf{x} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbf{A} \mathbf{x} \in \mathcal{W},$$

e  $\mathcal{W}$  é invariante sob  $\mathbf{A}$ .

A restrição de  $\mathbf{A}$  a  $\mathcal{W}$  permanece simétrica. Como

$$\dim(\mathcal{W}) = p - 1,$$

a hipótese de indução garante uma base ortonormal

$$\mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_p$$

de  $\mathcal{W}$  formada por autovetores da restrição e, consequentemente, de  $\mathbf{A}$ .

Assim,

$$\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_p$$

formam uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^p$  composta por autovetores de  $\mathbf{A}$ .

Organizando esses vetores nas colunas de

$$\mathbf{Q}_\mathbf{A} = [\mathbf{q}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{q}_p],$$

tem-se



$$\mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} = \mathbf{I}_p.$$

Portanto,

$$\mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{-1} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top}.$$

Definindo

$$\Lambda_{\mathbf{A}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p),$$

a relação

$$\mathbf{A} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \Lambda_{\mathbf{A}}$$

fornece

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \Lambda_{\mathbf{A}} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top}.$$

□

A representação

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \Lambda_{\mathbf{A}} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top}$$

é denominada **decomposição espectral** de  $\mathbf{A}$ . Ela é uma diagonalização ortogonal.

Considere a base ortonormal de autovetores

$$\mathcal{B}_{\mathbf{A}} = \{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_p\}.$$

A matriz dessa base é

$$\mathbf{Q}_{\mathbf{A}} = [\mathbf{q}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{q}_p].$$

Assim, no caso simétrico, a matriz da base de autovetores introduzida na seção anterior pode ser escolhida ortogonal:

$$\mathbf{B}_{\mathbf{A}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}},$$

com

$$\mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{-1} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top}.$$

Pela notação de coordenadas desenvolvida no capítulo anterior,

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}_{\mathbf{A}}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top} \mathbf{x}.$$

Denotando

$$\mathbf{z} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}_{\mathbf{A}}},$$

tem-se

$$\mathbf{x} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \mathbf{z}.$$

A matriz do operador nessa base é

$$[T_{\mathbf{A}}]_{\mathcal{B}_{\mathbf{A}} \leftarrow \mathcal{B}_{\mathbf{A}}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} = \Lambda_{\mathbf{A}}.$$

Consequentemente,

$$[T_{\mathbf{A}}(\mathbf{x})]_{\mathcal{B}_{\mathbf{A}}} = \Lambda_{\mathbf{A}} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}_{\mathbf{A}}}.$$

Em coordenadas canônicas,

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \mathbf{x} &= \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \Lambda_{\mathbf{A}} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top} \mathbf{x} \\ &= \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \Lambda_{\mathbf{A}} \mathbf{z}. \end{aligned}$$

A ação da matriz pode ser interpretada em três etapas:

1.  $\mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top}$  converte o vetor para as coordenadas da base ortonormal de autovetores;
2.  $\Lambda_{\mathbf{A}}$  multiplica separadamente cada coordenada pelo autovalor correspondente;
3.  $\mathbf{Q}_{\mathbf{A}}$  reconstrói o vetor nas coordenadas canônicas.

Assim, uma matriz simétrica atua por fatores escalares independentes em direções ortogonais. Quando algum autovalor é negativo, o escalonamento na direção correspondente inclui também a inversão do sentido.

### 5.3.1 Decomposição espectral do exemplo condutor

**Exemplo 5.2** (Decomposição espectral de uma matriz simétrica). Considere novamente

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Os autovalores são

$$\lambda_1 = 4 \quad \text{e} \quad \lambda_2 = 2.$$

Os autovetores

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

são ortogonais, pois

$$\mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_2 = 0.$$

Normalizando-os, obtêm-se

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$\mathcal{B}_{\mathbf{A}} = \{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2\}$$

é uma base ortonormal de autovetores de  $\mathbb{R}^2$ .

A matriz dessa base é a matriz ortogonal

$$\mathbf{Q}_A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix},$$

e a matriz diagonal de autovalores é

$$\Lambda_A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Consequentemente,

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_A \Lambda_A \mathbf{Q}_A^\top.$$

De fato,

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_A \Lambda_A \mathbf{Q}_A^\top &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Na direção de  $\mathbf{q}_1$ , a transformação multiplica o comprimento por 4. Na direção ortogonal  $\mathbf{q}_2$ , multiplica o comprimento por 2.

A Figura 5.3 mostra a circunferência unitária em  $\mathbb{R}^2$  e sua imagem pela matriz  $\mathbf{A}$ . Como os dois autovalores são positivos, a imagem é uma elipse cujos semieixos possuem comprimentos 4 e 2 e estão alinhados aos autovetores.

Na base canônica, a ação da matriz combina as duas coordenadas. Na base formada por  $\mathbf{q}_1$  e  $\mathbf{q}_2$ , a transformação apenas multiplica as coordenadas por 4 e 2.

Para uma matriz simétrica arbitrária, os comprimentos dos semieixos da imagem da esfera unitária em  $\mathbb{R}^p$  são determinados por

$$|\lambda_1|, \dots, |\lambda_p|.$$

Autovalores negativos também invertem o sentido ao longo das direções correspondentes. Autovalores nulos colapsam os respectivos eixos, reduzindo a dimensão da imagem.




Figura 5.3: A decomposição espectral identifica as direções ortogonais nas quais uma matriz simétrica atua por fatores escalares independentes.

### 5.3.2 Forma aditiva da decomposição espectral

Como

$$\mathbf{Q}_A = [\mathbf{q}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{q}_p]$$

e

$$\Lambda_A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p),$$

a decomposição espectral também pode ser escrita como

$$\mathbf{A} = \sum_{j=1}^p \lambda_j \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top.$$

Cada matriz

$$\mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top$$

é o projetor ortogonal sobre a reta gerada por  $\mathbf{q}_j$ . Assim,

$$\mathbf{Ax} = \sum_{j=1}^p \lambda_j \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top \mathbf{x}.$$

A transformação pode ser interpretada como:

1. projetar  $\mathbf{x}$  sobre cada direção espectral;
2. multiplicar cada projeção pelo autovalor correspondente;
3. somar as parcelas resultantes.

No exemplo,

$$\mathbf{A} = 4\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^\top + 2\mathbf{q}_2 \mathbf{q}_2^\top.$$

### 5.3.3 Projetores sobre autoespaços

Quando um autovalor possui multiplicidade maior que 1, os autovetores individuais associados a ele não são únicos. O autoespaço, entretanto, é determinado pela matriz.

Considere os autovalores distintos

$$\lambda^{(1)}, \dots, \lambda^{(s)}$$

de  $\mathbf{A}$ . Para cada autovalor  $\lambda^{(h)}$ , seja

$$\mathbf{Q}_h$$

uma matriz cujas colunas formam uma base ortonormal do autoespaço correspondente.

Define-se o projetor espectral

$$\Pi_{\lambda^{(h)}} = \mathbf{Q}_h \mathbf{Q}_h^\top.$$

Esse projetor não depende da base ortonormal escolhida dentro do autoespaço.

**Proposição 5.3** (Decomposição por projetores espectrais). *Se  $\mathbf{A}$  é simétrica e possui autovalores distintos*

$$\lambda^{(1)}, \dots, \lambda^{(s)},$$

*então*

$$\mathbf{A} = \sum_{h=1}^s \lambda^{(h)} \Pi_{\lambda^{(h)}}.$$

Além disso,

$$\Pi_{\lambda^{(h)}}^\top = \Pi_{\lambda^{(h)}},$$

$$\Pi_{\lambda^{(h)}}^2 = \Pi_{\lambda^{(h)}},$$

$$\Pi_{\lambda^{(h)}} \Pi_{\lambda^{(\ell)}} = \mathbf{0}, \quad h \neq \ell,$$

e

$$\sum_{h=1}^s \Pi_{\lambda^{(h)}} = \mathbf{I}_p.$$

(Horn; Johnson, 2013)

*Comprovação.* As colunas de  $\mathbf{Q}_h$  são ortonormais. Portanto,

$$\Pi_{\lambda^{(h)}} = \mathbf{Q}_h \mathbf{Q}_h^\top$$

é o projetor ortogonal sobre o autoespaço associado a  $\lambda^{(h)}$ . Pela Proposição 3.17, ele é simétrico e idempotente.

Autoespaços associados a autovalores distintos são ortogonais. Logo,

$$\mathbf{Q}_h^\top \mathbf{Q}_\ell = \mathbf{0}$$

para  $h \neq \ell$ , e

$$\begin{aligned} \Pi_{\lambda^{(h)}} \Pi_{\lambda^{(\ell)}} &= \mathbf{Q}_h \mathbf{Q}_h^\top \mathbf{Q}_\ell \mathbf{Q}_\ell^\top \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

A soma direta ortogonal de todos os autoespaços é  $\mathbb{R}^p$ . Por isso,

$$\sum_{h=1}^s \Pi_{\lambda^{(h)}} = \mathbf{I}_p.$$

Agrupando na decomposição espectral todos os autovetores associados ao mesmo autovalor,

$$\mathbf{A} = \sum_{h=1}^s \lambda^{(h)} \Pi_{\lambda^{(h)}}.$$

□

A decomposição por projetores separa o que depende de uma escolha de base do que é determinado pelo operador. Quando um autovalor é simples, o projetor correspondente possui posto 1:

$$\Pi_{\lambda} = \mathbf{q}\mathbf{q}^{\top}.$$

Quando sua multiplicidade geométrica é maior que 1, o projetor representa todo o autoespaço e possui posto igual à sua dimensão.

### 5.3.4 Não unicidade da matriz de autovetores

A matriz

$$\mathbf{Q}_{\mathbf{A}}$$

não é necessariamente única.

Mesmo quando todos os autovalores são distintos, cada autovetor pode ser substituído por seu oposto:

$$\mathbf{q}_j \mapsto -\mathbf{q}_j.$$

A ordem dos autovetores também pode ser alterada, desde que a mesma alteração seja aplicada aos autovalores em

$$\Lambda_{\mathbf{A}}.$$

Quando há autovalores repetidos, qualquer base ortonormal do autoespaço correspondente pode ser utilizada.

Essas alterações não modificam a matriz original nem os projetores espectrais. O sinal, a ordem e a base escolhida dentro de um autoespaço são elementos da representação; os autovalores, os autoespaços e seus projetores são propriedades do operador.



A decomposição espectral fornece uma base ortonormal na qual formas quadráticas, determinantes, traços, postos, inversas e superfícies de nível podem ser analisados diretamente a partir dos autovalores.

## 5.4 Consequências da decomposição espectral

Considere uma matriz simétrica

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

com decomposição espectral

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top,$$

em que

$$\mathbf{Q}_\mathbf{A} = [\mathbf{q}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{q}_p]$$

é ortogonal e

$$\Lambda_\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p).$$

A representação diagonal permite obter propriedades da matriz diretamente de seus autovalores e autoespaços.

### 5.4.1 Traço, determinante, posto e invertibilidade

**Proposição 5.4** (Consequências espectrais básicas). *Se  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$  é simétrica e possui autovalores*

$$\lambda_1, \dots, \lambda_p,$$

*contados com suas multiplicidades algébricas, então:*

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^p \lambda_j,$$

$$\det(\mathbf{A}) = \prod_{j=1}^p \lambda_j,$$

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = \# \{j : \lambda_j \neq 0\},$$

e

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \# \{j : \lambda_j = 0\}.$$

Além disso,

$$\mathbf{A} \text{ é invertível} \iff \lambda_j \neq 0 \text{ para todo } j.$$

*Comprovação.* Pela propriedade cíclica do traço,

$$\begin{aligned} \text{tr}(\mathbf{A}) &= \text{tr}(\mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \Lambda_{\mathbf{A}} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top}) \\ &= \text{tr}(\Lambda_{\mathbf{A}} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}) \\ &= \text{tr}(\Lambda_{\mathbf{A}}) \\ &= \sum_{j=1}^p \lambda_j. \end{aligned}$$

Para o determinante,

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= \det(\mathbf{Q}_{\mathbf{A}}) \det(\Lambda_{\mathbf{A}}) \det(\mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top}) \\ &= \det(\Lambda_{\mathbf{A}}), \end{aligned}$$

pois

$$\det(\mathbf{Q}_{\mathbf{A}}) \det(\mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top}) = \det(\mathbf{I}_p) = 1.$$

Como  $\Lambda_{\mathbf{A}}$  é diagonal,

$$\det(\mathbf{A}) = \prod_{j=1}^p \lambda_j.$$

As matrizes  $\mathbf{A}$  e  $\Lambda_{\mathbf{A}}$  são semelhantes, pois

$$\Lambda_{\mathbf{A}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}.$$

Como a multiplicação à esquerda e à direita por matrizes invertíveis preserva o posto,  $\mathbf{A}$  e  $\Lambda_{\mathbf{A}}$  possuem o mesmo posto. O posto de uma matriz diagonal é igual ao número de elementos diagonais não nulos. Portanto,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = \# \{j : \lambda_j \neq 0\}.$$

Pelo Teorema Posto–Nulidade,

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) &= p - \text{posto}(\mathbf{A}) \\ &= \# \{j : \lambda_j = 0\}. \end{aligned}$$

Por fim,  $\mathbf{A}$  é invertível se, e somente se, seu determinante é diferente de zero. Como

$$\det(\mathbf{A}) = \prod_{j=1}^p \lambda_j,$$

isso ocorre exatamente quando todos os autovalores são não nulos. □

Os autoespaços também fornecem descrições diretas do núcleo e da imagem.

**Proposição 5.5** (Núcleo e imagem em termos dos autovetores). *Se*

$$\mathbf{A} = \sum_{j=1}^p \lambda_j \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^{\top}$$

*é a decomposição espectral de uma matriz simétrica, então*

$$\ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \text{span} \{ \mathbf{q}_j : \lambda_j = 0 \}$$

*e*

$$\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span} \{ \mathbf{q}_j : \lambda_j \neq 0 \}.$$

*Consequentemente,*

$$\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \ker(T_{\mathbf{A}})^{\perp},$$

ou, equivalentemente,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A})^\perp.$$

*Comprovação.* Todo vetor  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  pode ser escrito na base ortonormal de autovetores como

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^p z_j \mathbf{q}_j,$$

em que

$$z_j = \mathbf{q}_j^\top \mathbf{x}.$$

Aplicando  $\mathbf{A}$ ,

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \lambda_j z_j \mathbf{q}_j.$$

A igualdade

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

ocorre se, e somente se,

$$\lambda_j z_j = 0$$

para todo  $j$ . Portanto, as coordenadas de  $\mathbf{x}$  podem ser não nulas apenas nas direções associadas a autovalores iguais a zero. Logo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \text{span} \{ \mathbf{q}_j : \lambda_j = 0 \}.$$

Toda imagem  $\mathbf{A}\mathbf{x}$  é uma combinação linear dos autovetores associados a autovalores não nulos. Assim,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) \subseteq \text{span} \{ \mathbf{q}_j : \lambda_j \neq 0 \}.$$

Reciprocamente, se  $\lambda_j \neq 0$ , então

$$\mathbf{q}_j = \mathbf{A} \left( \frac{1}{\lambda_j} \mathbf{q}_j \right),$$

de modo que  $\mathbf{q}_j \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$ . Portanto,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span} \{ \mathbf{q}_j : \lambda_j \neq 0 \}.$$

Como os autovetores associados a autovalores nulos são ortogonais aos autovetores associados a autovalores não nulos, e juntos formam uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^p$ , os dois subespaços são complementos ortogonais.  $\square$

O autoespaço associado ao autovalor zero reúne exatamente as direções eliminadas pela transformação. Os autoespaços associados a autovalores não nulos constituem, em conjunto, a imagem da transformação.

### 5.4.2 Formas quadráticas em coordenadas espectrais

Retomando a Definição 2.21, considere

$$q_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}.$$

As coordenadas de  $\mathbf{x}$  na base espectral são

$$\mathbf{z} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}_{\mathbf{A}}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^\top \mathbf{x}.$$

Como

$$\mathbf{x} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \mathbf{z},$$

tem-se

$$\begin{aligned} q_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} \\ &= \mathbf{z}^\top \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^\top \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \Lambda_{\mathbf{A}} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^\top \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \mathbf{z} \\ &= \mathbf{z}^\top \Lambda_{\mathbf{A}} \mathbf{z} \\ &= \sum_{j=1}^p \lambda_j z_j^2. \end{aligned}$$

A mudança ortogonal de coordenadas elimina os produtos cruzados. A contribuição da direção  $\mathbf{q}_j$  para a forma quadrática é

$$\lambda_j z_j^2.$$

As possibilidades de sinal da forma quadrática são determinadas pelos sinais dos autovalores, enquanto o valor assumido para um vetor específico depende também de suas coordenadas espectrais  $z_1, \dots, z_p$ .

**Teorema 5.5** (Positividade e sinais dos autovalores). *Seja  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$  uma matriz simétrica. Então:*

1.  $\mathbf{A}$  é positiva definida se, e somente se,

$$\lambda_j > 0$$

para todo  $j$ ;

2.  $\mathbf{A}$  é semidefinida positiva se, e somente se,

$$\lambda_j \geq 0$$

para todo  $j$ ;

3.  $\mathbf{A}$  é negativa definida se, e somente se,

$$\lambda_j < 0$$

para todo  $j$ ;

4.  $\mathbf{A}$  é semidefinida negativa se, e somente se,

$$\lambda_j \leq 0$$

para todo  $j$ ;

5.  $\mathbf{A}$  é indefinida se, e somente se, possui pelo menos um autovalor positivo e pelo menos um autovalor negativo.

(Horn; Johnson, 2013)

*Comprovação.* Para qualquer  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ , escreva

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^p z_j \mathbf{q}_j.$$

Então,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \lambda_j z_j^2.$$

Se todos os autovalores são positivos e  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ , pelo menos uma coordenada  $z_j$  é não nula. Portanto,

$$\sum_{j=1}^p \lambda_j z_j^2 > 0,$$

e  $\mathbf{A}$  é positiva definida.

Reciprocamente, se  $\mathbf{A}$  é positiva definida, para cada autovetor unitário  $\mathbf{q}_j$ ,

$$\mathbf{q}_j^\top \mathbf{A} \mathbf{q}_j = \lambda_j > 0.$$

Logo, todos os autovalores são positivos.

As caracterizações semidefinidas e negativas seguem pelo mesmo argumento.

Se existem autovalores  $\lambda_i > 0$  e  $\lambda_j < 0$ , então

$$\mathbf{q}_i^\top \mathbf{A} \mathbf{q}_i = \lambda_i > 0$$

e

$$\mathbf{q}_j^\top \mathbf{A} \mathbf{q}_j = \lambda_j < 0.$$

Assim, a forma quadrática assume valores positivos e negativos, e a matriz é indefinida.

Reciprocamente, se a matriz é indefinida, a expressão

$$\sum_{j=1}^p \lambda_j z_j^2$$

deve assumir ambos os sinais. Isso exige a existência de autovalores positivos e negativos.  $\square$

Uma matriz simétrica positiva definida é necessariamente invertível, pois todos os seus autovalores são positivos. Uma matriz semidefinida positiva pode ser singular quando possui pelo menos um autovalor igual a zero.

### 5.4.3 Superfícies de nível em coordenadas espectrais

Considere uma matriz positiva definida e a superfície de nível

$$\mathcal{S}_c(\mathbf{A}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p : \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = c\}, \quad c > 0.$$

Nas coordenadas espectrais,

$$\sum_{j=1}^p \lambda_j z_j^2 = c.$$

Como todos os autovalores são positivos,

$$\sum_{j=1}^p \frac{z_j^2}{c/\lambda_j} = 1.$$

Essa é a equação de um elipsoide. Suas direções principais são os autovetores

$$\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_p,$$

e o comprimento do semieixo associado a  $\mathbf{q}_j$  é

$$r_j = \sqrt{\frac{c}{\lambda_j}}.$$

Autovalores maiores correspondem a semieixos menores. Autovalores menores correspondem a maior extensão da superfície na direção associada.

Para uma superfície centralizada em um vetor fixo  $\mathbf{x}_0$ ,

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{A} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = c,$$

os autovetores e os comprimentos dos semieixos permanecem os mesmos. O vetor  $\mathbf{x}_0$  determina o centro do elipsoide.

Quando  $\mathbf{A}$  é semidefinida positiva e singular, existem direções do núcleo nas quais a forma quadrática não se altera. Para  $c > 0$ , a superfície de nível é ilimitada nessas direções.



Quando  $\mathbf{A}$  é indefinida, a forma quadrática possui parcelas positivas e negativas. Suas superfícies de nível deixam de ser elipsoides e podem apresentar formas hiperbólicas.

**Exemplo 5.3** (Forma quadrática na base espectral). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Na base canônica,

$$\begin{aligned} q_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{x} \\ &= 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2. \end{aligned}$$

Os autovalores são

$$\lambda_1 = 4 \quad \text{e} \quad \lambda_2 = 2,$$

com autovetores unitários

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

As coordenadas espectrais são

$$z_1 = \mathbf{q}_1^{\top} \mathbf{x} = \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}}$$

e

$$z_2 = \mathbf{q}_2^{\top} \mathbf{x} = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}}.$$

Nessas coordenadas,

$$q_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) = 4z_1^2 + 2z_2^2.$$

A superfície de nível

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = 8$$

pode ser escrita como

$$4z_1^2 + 2z_2^2 = 8,$$

ou

$$\frac{z_1^2}{2} + \frac{z_2^2}{4} = 1.$$

O elipsoide possui semieixo de comprimento

$$\sqrt{2}$$

na direção de  $\mathbf{q}_1$  e semieixo de comprimento

$$2$$

na direção de  $\mathbf{q}_2$ . A direção associada ao menor autovalor apresenta a maior extensão.

O termo cruzado  $2x_1x_2$  presente nas coordenadas canônicas desaparece nas coordenadas espectrais porque os eixos coordenados passam a coincidir com as direções principais da forma quadrática.

A representação

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \lambda_j z_j^2$$

também permite comparar os valores assumidos pela forma quadrática entre vetores de mesmo comprimento.

Se

$$\|\mathbf{x}\| = 1,$$

então, como a mudança de coordenadas é ortogonal,

$$\|\mathbf{z}\| = 1$$

e

$$\sum_{j=1}^p z_j^2 = 1.$$

Nesse caso,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \lambda_j z_j^2$$

é uma média ponderada dos autovalores, com pesos não negativos que somam 1. Essa observação conduz ao quociente de Rayleigh e à caracterização variacional dos autovalores extremos.

## 5.5 Quociente de Rayleigh e otimização espectral

A decomposição espectral mostra que uma matriz simétrica atua por escalonamentos independentes em direções ortogonais. Essa estrutura permite identificar as direções nas quais uma forma quadrática assume seus maiores e menores valores.

Considere uma matriz simétrica

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

e um vetor não nulo

$$\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p.$$

**Definição 5.6** (Quociente de Rayleigh). O **quociente de Rayleigh** de  $\mathbf{A}$  avaliado em  $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$  é

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}) = \frac{\mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\top \mathbf{a}}.$$

O denominador normaliza a forma quadrática pelo comprimento ao quadrado do vetor. Por isso, o quociente depende da direção de  $\mathbf{a}$ , e não de sua magnitude.

Para qualquer escalar  $c \neq 0$ ,

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_{\mathbf{A}}(c\mathbf{a}) &= \frac{(c\mathbf{a})^\top \mathbf{A}(c\mathbf{a})}{(c\mathbf{a})^\top (c\mathbf{a})} \\ &= \frac{c^2 \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a}}{c^2 \mathbf{a}^\top \mathbf{a}} \\ &= \mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}).\end{aligned}$$

Assim, todos os vetores não nulos de uma mesma reta produzem o mesmo valor.

Quando

$$\|\mathbf{a}\| = 1,$$

tem-se

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a}.$$

Desse modo, estudar o quociente entre todos os vetores não nulos equivale a estudar a forma quadrática sobre a esfera unitária.

### 5.5.1 Representação espectral

Considere a decomposição espectral

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \Lambda_{\mathbf{A}} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^\top,$$

com autovalores ordenados de modo que

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p.$$

As coordenadas de  $\mathbf{a}$  na base espectral são

$$\mathbf{z} = [\mathbf{a}]_{\mathcal{B}_{\mathbf{A}}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^\top \mathbf{a},$$

de modo que

$$\mathbf{a} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \mathbf{z}.$$

Como  $\mathbf{Q}_\mathbf{A}$  é ortogonal,

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{a} = \mathbf{z}^\top \mathbf{z} = \sum_{j=1}^p z_j^2.$$

Além disso,

$$\begin{aligned} \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a} &= \mathbf{z}^\top \mathbf{\Lambda}_\mathbf{A} \mathbf{z} \\ &= \sum_{j=1}^p \lambda_j z_j^2. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathcal{R}_\mathbf{A}(\mathbf{a}) = \frac{\sum_{j=1}^p \lambda_j z_j^2}{\sum_{j=1}^p z_j^2}.$$

Definindo

$$\omega_j = \frac{z_j^2}{\sum_{\ell=1}^p z_\ell^2},$$

tem-se

$$\omega_j \geq 0$$

e

$$\sum_{j=1}^p \omega_j = 1.$$

Logo,

$$\mathcal{R}_\mathbf{A}(\mathbf{a}) = \sum_{j=1}^p \omega_j \lambda_j.$$

O quociente de Rayleigh é, portanto, uma média ponderada dos autovalores. Para uma base espectral fixada,  $\omega_j$  mede a proporção do comprimento ao quadrado de  $\mathbf{a}$  associada à direção  $\mathbf{q}_j$ .

Quando um autovalor  $\lambda$  possui multiplicidade maior que 1, a quantidade intrínseca ao autoespaço correspondente é a soma dos pesos associados aos vetores de uma base ortonormal desse autoespaço. Essa soma é igual à proporção do comprimento ao quadrado da projeção de  $\mathbf{a}$  sobre  $\mathcal{E}_\lambda$ .

**Teorema 5.6** (Extremos do quociente de Rayleigh). *Seja  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$  uma matriz simétrica, com autovalores ordenados como*

$$\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_p.$$

*Então, para todo  $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ ,*

$$\lambda_p \leq \mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}) \leq \lambda_1.$$

*Além disso,*

$$\max_{\mathbf{a} \neq \mathbf{0}} \mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}) = \lambda_1$$

*e*

$$\min_{\mathbf{a} \neq \mathbf{0}} \mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}) = \lambda_p.$$

*O máximo é atingido por todo vetor não nulo do autoespaço associado a  $\lambda_1$ , e o mínimo é atingido por todo vetor não nulo do autoespaço associado a  $\lambda_p$ . (Horn; Johnson, 2013)*

*Comprovação.* Como

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}) = \sum_{j=1}^p \omega_j \lambda_j,$$

com pesos não negativos que somam 1, o quociente não pode ser menor que o menor autovalor nem maior que o maior:

$$\lambda_p \leq \sum_{j=1}^p \omega_j \lambda_j \leq \lambda_1.$$

Se  $\mathbf{a}$  pertence ao autoespaço associado a  $\lambda_1$ , então

$$\mathbf{A}\mathbf{a} = \lambda_1\mathbf{a},$$

e

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}) = \frac{\mathbf{a}^\top \lambda_1 \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\top \mathbf{a}} = \lambda_1.$$

Portanto, o limite superior é atingido.

Analogamente, se  $\mathbf{a}$  pertence ao autoespaço associado a  $\lambda_p$ ,

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}) = \lambda_p,$$

e o limite inferior também é atingido. □

Se o maior autovalor é simples, a reta que maximiza o quociente é

$$\text{span}\{\mathbf{q}_1\}.$$

Se sua multiplicidade é maior que 1, todo vetor não nulo do autoespaço correspondente produz o mesmo valor máximo. Nesse caso, a solução é um subespaço, e não uma direção individual única.

### 5.5.2 Exemplo bidimensional

**Exemplo 5.4** (Quociente de Rayleigh em diferentes direções). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Os autovalores são

$$\lambda_1 = 4 \quad \text{e} \quad \lambda_2 = 2.$$

Um vetor unitário do plano pode ser escrito como

$$\mathbf{a}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}.$$

Como

$$\mathbf{a}(\theta)^\top \mathbf{a}(\theta) = 1,$$

o quociente de Rayleigh é

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}(\theta)) &= \mathbf{a}(\theta)^\top \mathbf{A} \mathbf{a}(\theta) \\ &= 3 \cos^2 \theta + 2 \cos \theta \sin \theta + 3 \sin^2 \theta \\ &= 3 + \sin(2\theta).\end{aligned}$$

O valor máximo é

$$4,$$

atingido quando

$$\sin(2\theta) = 1.$$

Uma das direções correspondentes é

$$\theta = \frac{\pi}{4},$$

associada ao autovetor

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

O valor mínimo é

$$2,$$

atingido quando

$$\sin(2\theta) = -1.$$

Uma direção correspondente é

$$\theta = -\frac{\pi}{4},$$



associada ao autovetor

$$\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

A Figura 5.4 mostra a variação de

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}(\theta))$$

ao longo das direções da circunferência unitária.




Figura 5.4: O quociente de Rayleigh assume seus valores extremos nas direções dos autovetores associados aos autovalores máximo e mínimo.

As direções opostas representam a mesma reta e, por isso, produzem o mesmo valor do quociente. Os máximos aparecem em duas posições angulares separadas por  $\pi$ , assim como os mínimos.

### 5.5.3 Formulação com restrição de norma

A invariância à escala permite substituir o problema sobre vetores não nulos por um problema sobre a esfera unitária:

$$\max_{\mathbf{a} \neq \mathbf{0}} \mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a})$$

é equivalente a

$$\max_{\mathbf{a}} \mathbf{a}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{a},$$

sujeito a

$$\mathbf{a}^{\top} \mathbf{a} = 1.$$

A restrição de norma separa a escolha da **direção** da escolha da magnitude do vetor. De fato,

$$(c\mathbf{a})^{\top} \mathbf{A} (c\mathbf{a}) = c^2 \mathbf{a}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{a}.$$

Portanto, sem uma normalização, o valor da forma quadrática pode ser alterado simplesmente pelo escalonamento do vetor, mesmo quando sua direção permanece a mesma.

Se existe uma direção para a qual

$$\mathbf{a}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{a} > 0,$$

o problema de maximização sem restrição é ilimitado superiormente. Analogamente, se existe uma direção para a qual

$$\mathbf{a}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{a} < 0,$$

o problema de minimização sem restrição é ilimitado inferiormente.

A condição

$$\mathbf{a}^{\top} \mathbf{a} = 1$$

elimina esse efeito de escala e restringe a otimização às direções representadas por vetores unitários.

### 5.5.4 Multiplicadores de Lagrange

Para obter as direções estacionárias do problema restrito, considere a função lagrangiana

$$\mathcal{L}(\mathbf{a}, \eta) = \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a} - \eta(\mathbf{a}^\top \mathbf{a} - 1),$$

em que  $\eta$  é o multiplicador de Lagrange.

Como  $\mathbf{A}$  é simétrica,

$$\nabla_{\mathbf{a}} (\mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a}) = 2\mathbf{A} \mathbf{a},$$

e

$$\nabla_{\mathbf{a}} (\mathbf{a}^\top \mathbf{a}) = 2\mathbf{a}.$$

A condição de primeira ordem é

$$\nabla_{\mathbf{a}} \mathcal{L} = \mathbf{0},$$

isto é,

$$2\mathbf{A} \mathbf{a} - 2\eta \mathbf{a} = \mathbf{0}.$$

Portanto,

$$\mathbf{A} \mathbf{a} = \eta \mathbf{a}.$$

Como a restrição impõe  $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ , essa equação mostra que toda direção estacionária é um autovetor de  $\mathbf{A}$  e que o multiplicador  $\eta$  é o autovalor correspondente.

Multiplicando a equação à esquerda por  $\mathbf{a}^\top$  e utilizando

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{a} = 1,$$

obtém-se

$$\begin{aligned} \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a} &= \eta \mathbf{a}^\top \mathbf{a} \\ &= \eta. \end{aligned}$$

Assim, no ponto estacionário, o valor da função objetivo coincide com o autovalor correspondente. Se esse autovalor for denotado por  $\lambda$ , então

$$\mathbf{A}\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a}$$

e

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{A}\mathbf{a} = \lambda.$$

Consequentemente:

- o maior autovalor fornece o máximo global;
- o menor autovalor fornece o mínimo global;
- os demais autovalores correspondem a valores estacionários intermediários.

**Teorema 5.7** (Autovalores como valores estacionários). *Seja  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$  simétrica. Os pontos estacionários do problema*

$$\text{otimizar } \mathbf{a}^\top \mathbf{A}\mathbf{a}$$

*sujeito a*

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{a} = 1$$

*são exatamente os autovetores unitários de  $\mathbf{A}$ . O valor da função objetivo em qualquer autovetor unitário associado ao autovalor  $\lambda$  é igual a  $\lambda$ .*

Esse resultado explica por que problemas de maximização de variância, separação ou associação conduzem frequentemente a equações de autovalores. Quando a função objetivo é uma forma quadrática e a restrição fixa o comprimento, as condições de primeira ordem produzem uma equação espectral.

### 5.5.5 Direções sucessivas

Depois de encontrar a direção associada ao maior autovalor, pode-se procurar a direção de maior valor entre aquelas ortogonais à primeira.

Considere

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p$$

e uma base ortonormal de autovetores

$$\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_p.$$

O segundo problema é

$$\max_{\mathbf{a}} \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a},$$

sujeito a

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{a} = 1$$

e

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{q}_1 = 0.$$

A restrição de ortogonalidade elimina qualquer componente na direção de  $\mathbf{q}_1$ . O maior valor restante é  $\lambda_2$ , atingido em  $\mathbf{q}_2$  quando  $\lambda_2$  é simples.

De forma geral, a  $k$ -ésima direção pode ser obtida por

$$\max_{\mathbf{a}} \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a},$$

sujeito a

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{a} = 1$$

e

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{q}_j = 0, \quad j = 1, \dots, k-1.$$

**Teorema 5.8** (Caracterização variacional de direções sucessivas). *Se  $\mathbf{A}$  é simétrica e seus autovalores estão ordenados como*

$$\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_p,$$

*então*

$$\lambda_k = \max_{\substack{\mathbf{a}^\top \mathbf{a} = 1 \\ \mathbf{a}^\top \mathbf{q}_j = 0, j < k}} \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a}.$$

*O máximo é atingido por qualquer autovetor unitário associado a  $\lambda_k$  que satisfaça as restrições. (Horn; Johnson, 2013)*

*Comprovação.* Se  $\mathbf{a}$  é ortogonal a

$$\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{k-1},$$

sua expansão espectral possui a forma

$$\mathbf{a} = \sum_{j=k}^p z_j \mathbf{q}_j.$$

Como  $\|\mathbf{a}\| = 1$ ,

$$\sum_{j=k}^p z_j^2 = 1.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a} &= \sum_{j=k}^p \lambda_j z_j^2 \\ &\leq \lambda_k \sum_{j=k}^p z_j^2 \\ &= \lambda_k. \end{aligned}$$

Tomando

$$\mathbf{a} = \mathbf{q}_k,$$

obtém-se

$$\mathbf{q}_k^\top \mathbf{A} \mathbf{q}_k = \lambda_k.$$

Portanto, o limite superior é atingido.  $\square$

Quando há autovalores repetidos, as direções sucessivas dentro do mesmo autoespaço não são individualmente determinadas. Qualquer base ortonormal desse autoespaço fornece o mesmo valor da função objetivo e descreve o mesmo subespaço ótimo. Nesse caso, o subespaço espectral é intrínseco, enquanto a escolha de vetores individuais dentro dele não é única.

A caracterização variacional relaciona três objetos:

forma quadrática  $\longleftrightarrow$  problema de otimização  $\longleftrightarrow$  equação de autovalores.

A decomposição espectral também permite aplicar funções escalares aos autovalores e, desse modo, definir potências, raízes, inversas e outras funções de matrizes simétricas.

## 5.6 Funções espectrais de matrizes

A decomposição espectral permite construir novas matrizes aplicando uma função escalar aos autovalores. Esse procedimento fornece expressões para potências, inversas, raízes quadradas, exponenciais, logaritmos e pseudoinversas de matrizes simétricas.

Considere uma matriz simétrica

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

com decomposição espectral

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top,$$

em que

$$\Lambda_\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p).$$

Se  $f$  é uma função escalar real definida em todos os autovalores de  $\mathbf{A}$ , pode-se aplicá-la aos elementos diagonais:

$$f(\Lambda_\mathbf{A}) = \text{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_p)).$$

**Definição 5.7** (Função espectral de uma matriz simétrica). Seja

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top$$

uma matriz simétrica e seja  $f$  uma função real definida no espectro de  $\mathbf{A}$ .

A **função espectral**  $f(\mathbf{A})$  é definida por

$$f(\mathbf{A}) = \mathbf{Q}_\mathbf{A} f(\Lambda_\mathbf{A}) \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top.$$

A definição não depende da base ortonormal escolhida dentro de um autoespaço associado a um autovalor repetido.

De fato, considerando os autovalores distintos

$$\lambda^{(1)}, \dots, \lambda^{(s)}$$

e os respectivos projetores espectrais, a função também pode ser escrita como

$$f(\mathbf{A}) = \sum_{h=1}^s f(\lambda^{(h)}) \Pi_{\lambda^{(h)}}.$$

Os projetores são determinados pelos autoespaços, independentemente da base ortonormal utilizada para representá-los.

### 5.6.1 Ação sobre os autoespaços

**Proposição 5.6** (Ação de uma função espectral). *Se  $\mathbf{v}$  pertence ao autoespaço de  $\mathbf{A}$  associado ao autovalor  $\lambda$ , então*

$$f(\mathbf{A})\mathbf{v} = f(\lambda)\mathbf{v}.$$

(Horn; Johnson, 1991)

*Comprovação.* Como

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v},$$

o vetor  $\mathbf{v}$  pertence à imagem do projetor



$$\Pi_\lambda$$

e é anulado pelos projetores associados aos demais autovalores. Assim,

$$\begin{aligned} f(\mathbf{A})\mathbf{v} &= \sum_{h=1}^s f(\lambda^{(h)}) \Pi_{\lambda^{(h)}} \mathbf{v} \\ &= f(\lambda)\mathbf{v}. \end{aligned}$$

□

Portanto, todo autovetor de  $\mathbf{A}$  associado a  $\lambda$  também é autovetor de  $f(\mathbf{A})$ , agora associado ao autovalor  $f(\lambda)$ . Mais geralmente, todo o autoespaço  $\mathcal{E}_\lambda$  de  $\mathbf{A}$  permanece invariante sob  $f(\mathbf{A})$ .

A função pode fazer autovalores originalmente distintos assumirem o mesmo valor. Se

$$f(\lambda_i) = f(\lambda_j),$$

os autoespaços correspondentes passam a pertencer ao mesmo autoespaço de  $f(\mathbf{A})$ . Por isso,  $f(\mathbf{A})$  pode possuir autoespaços de dimensão maior que os autoespaços individuais de  $\mathbf{A}$ .

### 5.6.2 Potências inteiras

Para um inteiro  $k \geq 0$ , escolha

$$f(\lambda) = \lambda^k.$$

Então,

$$\mathbf{A}^k = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A}^k \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top,$$

com

$$\Lambda_\mathbf{A}^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_p^k).$$

Essa expressão coincide com a fórmula obtida pela diagonalização, mas a ortogonalidade de  $\mathbf{Q}_\mathbf{A}$  fornece

$$\mathbf{Q}_\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top.$$

**Exemplo 5.5** (Potência de uma matriz simétrica). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix},$$

com decomposição espectral

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top.$$

Então,

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top.$$

Efetuando a multiplicação,

$$\mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}.$$

A aplicação de  $\mathbf{A}$  duas vezes multiplica a componente na direção de  $\mathbf{q}_1$  por

$$4^2 = 16$$

e a componente na direção de  $\mathbf{q}_2$  por

$$2^2 = 4.$$

### 5.6.3 Inversa espectral

Se todos os autovalores são diferentes de zero, define-se

$$f(\lambda) = \frac{1}{\lambda}.$$

Nesse caso,

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A}^{-1} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top,$$

em que

$$\Lambda_{\mathbf{A}}^{-1} = \text{diag} \left( \frac{1}{\lambda_1}, \dots, \frac{1}{\lambda_p} \right).$$

A inversa desfaz o escalonamento em cada direção espectral:

$$\mathbf{A}^{-1} \mathbf{q}_j = \frac{1}{\lambda_j} \mathbf{q}_j.$$

Para o exemplo anterior,

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top},$$

o que resulta em

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Se pelo menos um autovalor é igual a zero, a inversa usual não existe.

### 5.6.4 Raiz quadrada principal

Para uma matriz semidefinida positiva, todos os autovalores são não negativos. Assim, pode-se definir

$$f(\lambda) = \sqrt{\lambda}.$$

**Definição 5.8** (Raiz quadrada principal). Se

$$\mathbf{A} \succeq 0,$$

a **raiz quadrada principal** de  $\mathbf{A}$  é

$$\mathbf{A}^{1/2} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \Lambda_{\mathbf{A}}^{1/2} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top},$$

em que

$$\Lambda_{\mathbf{A}}^{1/2} = \text{diag} \left( \sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_p} \right).$$

A matriz  $\mathbf{A}^{1/2}$  é simétrica, semidefinida positiva e satisfaz

$$\mathbf{A}^{1/2} \mathbf{A}^{1/2} = \mathbf{A}.$$

Além disso, ela é a única matriz simétrica semidefinida positiva com essa propriedade.

Para

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\mathbf{A}^{1/2} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top.$$

Logo,

$$\mathbf{A}^{1/2} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 + \sqrt{2} & 2 - \sqrt{2} \\ 2 - \sqrt{2} & 2 + \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

A raiz quadrada principal multiplica as componentes espectrais por

$$\sqrt{\lambda_j}.$$

Aplicada duas vezes, ela produz o escalonamento original por  $\lambda_j$ .

### 5.6.5 Raiz quadrada inversa

Se

$$\mathbf{A} \succ 0,$$

todos os autovalores são estritamente positivos. Define-se então

$$\mathbf{A}^{-1/2} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A}^{-1/2} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top,$$

em que

$$\Lambda_{\mathbf{A}}^{-1/2} = \text{diag} \left( \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{\lambda_p}} \right).$$

Como  $\mathbf{A} \succ 0$ , a raiz quadrada principal é invertível e

$$\mathbf{A}^{-1/2} = (\mathbf{A}^{1/2})^{-1}.$$

Além disso,

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1/2} \mathbf{A}^{-1/2}$$

e

$$\mathbf{A}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1/2} = \mathbf{I}_p.$$

De fato,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1/2} &= \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \Lambda_{\mathbf{A}}^{-1/2} \Lambda_{\mathbf{A}} \Lambda_{\mathbf{A}}^{-1/2} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top} \\ &= \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \mathbf{I}_p \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top} \\ &= \mathbf{I}_p. \end{aligned}$$

A transformação

$$\mathbf{z} = \mathbf{A}^{-1/2} \mathbf{x}$$

reescala as componentes espectrais de  $\mathbf{x}$  segundo os fatores  $1/\sqrt{\lambda_j}$ . Além disso, converte a forma quadrática associada à inversa em uma norma euclidiana:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{\top} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{x} &= \mathbf{x}^{\top} \mathbf{A}^{-1/2} \mathbf{A}^{-1/2} \mathbf{x} \\ &= \mathbf{z}^{\top} \mathbf{z} \\ &= \|\mathbf{z}\|^2. \end{aligned}$$

Quando  $\mathbf{A}$  for uma matriz de covariâncias  $\Sigma \succ 0$ , essa construção será retomada no branqueamento. Para um vetor com média  $\mu$ , a transformação correspondente será aplicada ao vetor centralizado,

$$\mathbf{z} = \Sigma^{-1/2} (\mathbf{x} - \mu).$$

Nesse caso, a distância de Mahalanobis será interpretada como uma distância euclidiana nas coordenadas branqueadas.

### 5.6.6 Pseudoinversa espectral

Quando uma matriz possui autovalores nulos, não é possível inverter sua ação em todas as direções. Ainda assim, é possível inverter os escalonamentos nas direções associadas a autovalores não nulos.

**Definição 5.9** (Pseudoinversa de uma matriz simétrica). Seja

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top$$

uma matriz simétrica.

Define-se

$$\lambda_j^+ = \begin{cases} 1/\lambda_j, & \lambda_j \neq 0, \\ 0, & \lambda_j = 0. \end{cases}$$

A pseudoinversa de Moore–Penrose de  $\mathbf{A}$  é

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A}^+ \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top,$$

em que

$$\Lambda_\mathbf{A}^+ = \text{diag}(\lambda_1^+, \dots, \lambda_p^+).$$

A pseudoinversa atua separadamente sobre os autoespaços: nas direções associadas a autovalores não nulos, aplica o fator  $1/\lambda$ ; no autoespaço associado ao autovalor zero, sua ação é nula. Assim, ela inverte a transformação sobre sua imagem e mantém eliminadas as componentes pertencentes ao núcleo.

**Exemplo 5.6** (Pseudoinversa de uma matriz singular). Considere

$$\mathbf{A}_0 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Seus autovalores são

$$\lambda_1 = 4 \quad \text{e} \quad \lambda_2 = 0,$$

com autovetores unitários

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

A matriz  $\mathbf{A}_0$  não é invertível porque possui um autovalor nulo. Para a pseudoinversa,

$$(\Lambda_{\mathbf{A}_0})^+ = \begin{bmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_0^+ &= \mathbf{Q}_{\mathbf{A}_0} \begin{bmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{Q}_{\mathbf{A}_0}^\top \\ &= \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

A componente na direção de  $\mathbf{q}_1$  é dividida por 4. A componente na direção de  $\mathbf{q}_2$ , pertencente ao núcleo de  $\mathbf{A}_0$ , é anulada.

Quando  $\mathbf{A}$  é invertível,

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^{-1}.$$

A pseudoinversa será retomada no capítulo seguinte, no qual será definida para matrizes retangulares por meio da decomposição em valores singulares.

### 5.6.7 Exponencial e logaritmo matriciais

A função exponencial é definida para qualquer matriz simétrica por

$$\exp(\mathbf{A}) = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \operatorname{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_p}) \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top}.$$

Como

$$e^{\lambda_j} > 0,$$

a matriz  $\exp(\mathbf{A})$  é positiva definida.

A exponencial matricial também pode ser representada pela série

$$\exp(\mathbf{A}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^k}{k!}.$$

Para uma matriz simétrica positiva definida, define-se o **logaritmo principal** por

$$\log(\mathbf{A}) = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} \operatorname{diag}(\log \lambda_1, \dots, \log \lambda_p) \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top}.$$

As identidades escalares são preservadas espectralmente:

$$\exp(\log(\mathbf{A})) = \mathbf{A}$$

para  $\mathbf{A} \succ 0$ , e

$$\log(\exp(\mathbf{A})) = \mathbf{A}$$

para toda matriz simétrica real.

A Tabela 5.1 reúne as principais funções desenvolvidas nesta seção.

Tabela 5.1: Principais funções espectrais de matrizes simétricas.

| Função              | Ação sobre $\lambda_j$ | Condição adicional               |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| $\mathbf{A}^k$      | $\lambda_j^k$          | $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$       |
| $\mathbf{A}^{-1}$   | $1/\lambda_j$          | $\lambda_j \neq 0$ para todo $j$ |
| $\mathbf{A}^{1/2}$  | $\sqrt{\lambda_j}$     | $\mathbf{A} \succeq 0$           |
| $\mathbf{A}^{-1/2}$ | $1/\sqrt{\lambda_j}$   | $\mathbf{A} \succ 0$             |



| Função             | Ação sobre $\lambda_j$                                     | Condição adicional                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| $\mathbf{A}^+$     | $1/\lambda_j$ se $\lambda_j \neq 0$ ; 0 se $\lambda_j = 0$ | nenhuma além da simetria assumida na seção |
| $\exp(\mathbf{A})$ | $e^{\lambda_j}$                                            | nenhuma além da simetria assumida na seção |
| $\log(\mathbf{A})$ | $\log \lambda_j$                                           | $\mathbf{A} \succ 0$                       |

As funções espectrais atuam separadamente sobre os autoespaços, transformando cada autovalor  $\lambda$  no valor escalar  $f(\lambda)$ . Essa construção permite obter diretamente potências, inversas, raízes e pseudoinversas e mostra como certas transformações matriciais podem ser compreendidas como reescalonamentos das direções espectrais.

Em particular, a raiz quadrada e a raiz quadrada inversa permitem converter problemas definidos por uma geometria induzida por uma matriz positiva definida em problemas euclidianos equivalentes. Essa ideia será utilizada imediatamente na formulação dos autovalores generalizados.

## 5.7 Autovalores generalizados

O quociente de Rayleigh compara uma forma quadrática com a norma euclidiana do vetor. Em outros problemas, a normalização também é definida por uma forma quadrática:

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a},$$

em que

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}^\top \succ 0.$$

Conforme a Definição 3.16, a matriz  $\mathbf{M}$  determina o produto interno

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{M}} = \mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{y}$$

e a norma

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{M}} = \sqrt{\mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{x}}.$$

Nesse contexto, procura-se uma direção que compare as formas quadráticas associadas a duas matrizes.

**Definição 5.10** (Autovalor e autovetor generalizados). Sejam

$$\mathbf{A}, \mathbf{M} \in \mathbb{R}^{p \times p},$$

com

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$$

e

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}^\top \succ 0.$$

Um escalar real

$$\lambda \in \mathbb{R}$$

é um **autovalor generalizado** do par  $(\mathbf{A}, \mathbf{M})$  quando existe um vetor não nulo

$$\mathbf{v} \in \mathbb{R}^p$$

tal que

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{M}\mathbf{v}.$$

O vetor  $\mathbf{v}$  é denominado **autovetor generalizado** associado a  $\lambda$ .

Quando

$$\mathbf{M} = \mathbf{I}_p,$$

recupera-se o problema ordinário:

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

A equação generalizada pode ser reorganizada como

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{M})\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Existem soluções não triviais se, e somente se,

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{M}) = 0.$$

Essa equação é a equação característica generalizada do par  $(\mathbf{A}, \mathbf{M})$  e determina seus autovalores generalizados.

### 5.7.1 Quociente de Rayleigh generalizado

**Definição 5.11** (Quociente de Rayleigh generalizado). Para

$$\mathbf{a} \neq \mathbf{0},$$

o **quociente de Rayleigh generalizado** associado ao par  $(\mathbf{A}, \mathbf{M})$  é

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A}, \mathbf{M}}(\mathbf{a}) = \frac{\mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a}}.$$

Como  $\mathbf{M} \succ 0$ ,

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a} > 0$$

para todo  $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ . Portanto, o quociente está definido em todas as direções não nulas.

Assim como no caso ordinário, ele é invariante à escala:

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A}, \mathbf{M}}(c\mathbf{a}) = \mathcal{R}_{\mathbf{A}, \mathbf{M}}(\mathbf{a})$$

para todo  $c \neq 0$ .

O problema

$$\max_{\mathbf{a} \neq \mathbf{0}} \mathcal{R}_{\mathbf{A}, \mathbf{M}}(\mathbf{a})$$

é equivalente a

$$\max_{\mathbf{a}} \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a},$$

sujeito a

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a} = 1.$$

A restrição fixa o comprimento de  $\mathbf{a}$  segundo a geometria determinada por  $\mathbf{M}$ .

A função lagrangiana é

$$\mathcal{L}(\mathbf{a}, \eta) = \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a} - \eta (\mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a} - 1),$$

em que  $\eta$  é o multiplicador de Lagrange.

Como  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{M}$  são simétricas,

$$\nabla_{\mathbf{a}} \mathcal{L} = 2\mathbf{A} \mathbf{a} - 2\eta \mathbf{M} \mathbf{a}.$$

A condição de primeira ordem produz

$$\mathbf{A} \mathbf{a} = \eta \mathbf{M} \mathbf{a}.$$

Como  $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ , o multiplicador  $\eta$  é um autovalor generalizado e  $\mathbf{a}$  é um autovetor generalizado correspondente.

Multiplicando a equação à esquerda por  $\mathbf{a}^\top$ ,

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a} = \eta \mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a}.$$

Sob a normalização

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a} = 1,$$

obtém-se

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a} = \eta.$$

Denotando o autovalor generalizado correspondente por  $\lambda$ , conclui-se que o valor da função objetivo em um autovetor generalizado normalizado é igual a  $\lambda$ .

### 5.7.2 Redução a um problema espectral ordinário

Como  $\mathbf{M} \succ 0$ , a matriz  $\mathbf{M}$  é invertível, e a equação generalizada também poderia ser escrita como

$$\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

Entretanto, mesmo que  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{M}$  sejam simétricas, a matriz  $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}$  não precisa ser simétrica. Para preservar a estrutura simétrica e poder aplicar diretamente o Teorema Espectral, é preferível transformar o problema utilizando a raiz quadrada de  $\mathbf{M}$ .

Como  $\mathbf{M} \succ 0$ , existem as matrizes simétricas

$$\mathbf{M}^{1/2}$$

e

$$\mathbf{M}^{-1/2}.$$

Defina

$$\mathbf{u} = \mathbf{M}^{1/2}\mathbf{v}.$$

Consequentemente,

$$\mathbf{v} = \mathbf{M}^{-1/2}\mathbf{u}.$$

Substituindo na equação generalizada,

$$\mathbf{A}\mathbf{M}^{-1/2}\mathbf{u} = \lambda\mathbf{M}\mathbf{M}^{-1/2}\mathbf{u}.$$

Como

$$\mathbf{M}\mathbf{M}^{-1/2} = \mathbf{M}^{1/2},$$

obtém-se

$$\mathbf{A}\mathbf{M}^{-1/2}\mathbf{u} = \lambda\mathbf{M}^{1/2}\mathbf{u}.$$

Multiplicando à esquerda por  $\mathbf{M}^{-1/2}$ ,

$$(\mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{M}^{-1/2}) \mathbf{u} = \lambda \mathbf{u}.$$

Defina

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{M}^{-1/2}.$$

Como  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{M}^{-1/2}$  são simétricas,

$$\tilde{\mathbf{A}}^\top = \tilde{\mathbf{A}}.$$

Assim, o problema generalizado é convertido no problema espectral ordinário

$$\tilde{\mathbf{A}} \mathbf{u} = \lambda \mathbf{u},$$

para uma matriz simétrica. Consequentemente, todos os autovalores generalizados do par  $(\mathbf{A}, \mathbf{M})$  são reais e os resultados do Teorema Espectral podem ser aplicados à matriz  $\tilde{\mathbf{A}}$ .

Essa transformação também converte o quociente generalizado em um quociente ordinário. Como

$$\mathbf{a} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{u},$$

tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a} &= \mathbf{u}^\top \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{M} \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{u} \\ &= \mathbf{u}^\top \mathbf{u} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a} &= \mathbf{u}^\top \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{u} \\ &= \mathbf{u}^\top \tilde{\mathbf{A}} \mathbf{u}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A}, \mathbf{M}}(\mathbf{a}) = \mathcal{R}_{\tilde{\mathbf{A}}}(\mathbf{u}).$$

A mudança de variáveis

$$\mathbf{u} = \mathbf{M}^{1/2} \mathbf{a}$$

transforma a geometria induzida por  $\mathbf{M}$  em geometria euclidiana, pois

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a} = \mathbf{u}^\top \mathbf{u}.$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{a} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{u}.$$

Geometricamente,  $\mathbf{M}^{-1/2}$  transforma a esfera unitária euclidiana no elipsoide

$$\{\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p : \mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a} = 1\}.$$

O problema generalizado pode, portanto, ser estudado como um problema de Rayleigh ordinário no sistema de coordenadas em que a métrica definida por  $\mathbf{M}$  se torna euclidiana.

Quando  $\mathbf{M}$  representar posteriormente uma matriz de covariâncias, essa mesma estrutura estará relacionada ao branqueamento. Aqui, porém,  $\mathbf{M}$  representa genericamente a matriz que define a geometria do problema.

**Teorema 5.9** (Extremos do quociente de Rayleigh generalizado). *Sejam  $\mathbf{A}$  simétrica e  $\mathbf{M}$  positiva definida. Denote por*

$$\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_p$$

*os autovalores generalizados do par  $(\mathbf{A}, \mathbf{M})$ .*

*Então, para todo  $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ ,*

$$\lambda_p \leq \mathcal{R}_{\mathbf{A}, \mathbf{M}}(\mathbf{a}) \leq \lambda_1.$$

*Além disso,*

$$\max_{\mathbf{a} \neq \mathbf{0}} \mathcal{R}_{\mathbf{A}, \mathbf{M}}(\mathbf{a}) = \lambda_1$$

*e*

$$\min_{\mathbf{a} \neq \mathbf{0}} \mathcal{R}_{\mathbf{A}, \mathbf{M}}(\mathbf{a}) = \lambda_p.$$

O máximo é atingido por todo vetor não nulo do autoespaço generalizado associado a  $\lambda_1$ , e o mínimo é atingido por todo vetor não nulo do autoespaço generalizado associado a  $\lambda_p$ .

*Comprovação.* A transformação

$$\mathbf{u} = \mathbf{M}^{1/2} \mathbf{a}$$

é invertível e estabelece

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A}, \mathbf{M}}(\mathbf{a}) = \mathcal{R}_{\tilde{\mathbf{A}}}(\mathbf{u}),$$

em que

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{M}^{-1/2}$$

é simétrica.

Os autovalores ordinários de  $\tilde{\mathbf{A}}$  são os autovalores generalizados do par  $(\mathbf{A}, \mathbf{M})$ . Aplicando o Teorema 5.6 a  $\tilde{\mathbf{A}}$ , obtêm-se os limites e os extremos apresentados.  $\square$

### 5.7.3 Ortogonalidade na métrica de $\mathbf{M}$

Os autovetores generalizados não precisam ser ortogonais segundo o produto interno euclidiano. Eles podem, entretanto, ser escolhidos ortonormais na geometria determinada por  $\mathbf{M}$ .

**Proposição 5.7** (Ortogonalidade e base de autovetores generalizados). *Sejam  $\mathbf{A}$  simétrica e  $\mathbf{M} \succ 0$ .*

*Se  $\mathbf{v}_i$  e  $\mathbf{v}_j$  são autovetores generalizados associados a autovalores distintos  $\lambda_i$  e  $\lambda_j$ , então*

$$\mathbf{v}_i^\top \mathbf{M} \mathbf{v}_j = 0.$$

*Além disso, existe uma base de  $\mathbb{R}^p$  formada por autovetores generalizados*

$$\mathcal{B}_g = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$$

*que pode ser escolhida de modo que*

$$\mathbf{v}_i^\top \mathbf{M} \mathbf{v}_j = \delta_{ij}.$$

(Horn; Johnson, 2013)



*Comprovação.* Para autovalores distintos,

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{M}\mathbf{v}_i$$

e

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_j = \lambda_j \mathbf{M}\mathbf{v}_j.$$

Como  $\mathbf{A}$  é simétrica,

$$\begin{aligned} \lambda_i \mathbf{v}_i^\top \mathbf{M}\mathbf{v}_j &= (\mathbf{A}\mathbf{v}_i)^\top \mathbf{v}_j \\ &= \mathbf{v}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{v}_j \\ &= \mathbf{v}_i^\top \mathbf{A}\mathbf{v}_j \\ &= \lambda_j \mathbf{v}_i^\top \mathbf{M}\mathbf{v}_j. \end{aligned}$$

Portanto,

$$(\lambda_i - \lambda_j) \mathbf{v}_i^\top \mathbf{M}\mathbf{v}_j = 0.$$

Como  $\lambda_i \neq \lambda_j$ ,

$$\mathbf{v}_i^\top \mathbf{M}\mathbf{v}_j = 0.$$

Para mostrar a existência de uma base completa, considere

$$\widetilde{\mathbf{A}} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{M}^{-1/2}.$$

Como  $\widetilde{\mathbf{A}}$  é simétrica, o Teorema Espectral garante uma base ortonormal de autovetores

$$\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}.$$

Defina

$$\mathbf{v}_j = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{u}_j.$$

Esses vetores são autovetores generalizados e

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_i^\top \mathbf{M} \mathbf{v}_j &= \mathbf{u}_i^\top \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{M} \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{u}_j \\
&= \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j \\
&= \delta_{ij}.
\end{aligned}$$

Assim, mesmo quando há autovalores generalizados repetidos, pode-se escolher uma base ortonormal segundo o produto interno induzido por  $\mathbf{M}$ .  $\square$

#### 5.7.4 Diagonalização simultânea por congruência

Considere a decomposição espectral

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{Q}_g \Lambda_g \mathbf{Q}_g^\top,$$

em que

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{M}^{-1/2}.$$

Defina

$$\mathbf{B}_g = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{Q}_g.$$

Como  $\mathbf{M}^{-1/2}$  é invertível e  $\mathbf{Q}_g$  é ortogonal,  $\mathbf{B}_g$  é invertível. Suas colunas formam uma base  $\mathbf{M}$ -ortonormal de autovetores generalizados.

De fato,

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} \mathbf{B}_g &= \mathbf{A} \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{Q}_g \\
&= \mathbf{M}^{1/2} \tilde{\mathbf{A}} \mathbf{Q}_g \\
&= \mathbf{M}^{1/2} \mathbf{Q}_g \Lambda_g \\
&= \mathbf{M} \mathbf{B}_g \Lambda_g.
\end{aligned}$$

Além disso,

$$\begin{aligned}
\mathbf{B}_g^\top \mathbf{M} \mathbf{B}_g &= \mathbf{Q}_g^\top \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{M} \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{Q}_g \\
&= \mathbf{Q}_g^\top \mathbf{Q}_g \\
&= \mathbf{I}_p,
\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
\mathbf{B}_g^\top \mathbf{A} \mathbf{B}_g &= \mathbf{Q}_g^\top \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{Q}_g \\
&= \mathbf{Q}_g^\top \tilde{\mathbf{A}} \mathbf{Q}_g \\
&= \Lambda_g.
\end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathbf{B}_g^\top \mathbf{M} \mathbf{B}_g = \mathbf{I}_p$$

e

$$\mathbf{B}_g^\top \mathbf{A} \mathbf{B}_g = \Lambda_g.$$

O par  $(\mathbf{A}, \mathbf{M})$  é, assim, reduzido simultaneamente por uma transformação de congruência:

$$(\mathbf{A}, \mathbf{M}) \longrightarrow (\Lambda_g, \mathbf{I}_p).$$

Essa operação deve ser distinguida da semelhança

$$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B},$$

utilizada para representar um único operador em outra base. Na congruência, as matrizes aparecem multiplicadas pela transposta da matriz de base à esquerda e pela própria matriz à direita.

Como

$$\mathbf{B}_g^\top \mathbf{M} \mathbf{B}_g = \mathbf{I}_p,$$

segue que

$$\mathbf{B}_g^{-1} = \mathbf{B}_g^\top \mathbf{M}.$$

Assim, se

$$\mathbf{a} = \mathbf{B}_g \mathbf{z},$$

então as coordenadas de  $\mathbf{a}$  nessa base são

$$\mathbf{z} = \mathbf{B}_g^{-1} \mathbf{a} = \mathbf{B}_g^{\top} \mathbf{M} \mathbf{a}.$$

Nessas coordenadas,

$$\mathbf{a}^{\top} \mathbf{M} \mathbf{a} = \mathbf{z}^{\top} \mathbf{z}$$

e

$$\mathbf{a}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{a} = \mathbf{z}^{\top} \Lambda_g \mathbf{z}.$$

Consequentemente,

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A}, \mathbf{M}}(\mathbf{a}) = \frac{\sum_{j=1}^p \lambda_j z_j^2}{\sum_{j=1}^p z_j^2}.$$

O quociente generalizado assume, portanto, a mesma forma do quociente de Rayleigh ordinário quando expresso na base  $\mathbf{M}$ -ortonormal de autovetores generalizados.

### 5.7.5 Exemplo numérico

**Exemplo 5.7** (Autovalores generalizados de duas formas quadráticas). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

As duas matrizes são simétricas e  $\mathbf{M}$  é positiva definida.

Os autovalores generalizados são obtidos por

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{M}) = 0.$$

Como

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 5 - 2\lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{M}) &= (5 - 2\lambda)(2 - \lambda) - 1 \\ &= 2\lambda^2 - 9\lambda + 9 \\ &= (2\lambda - 3)(\lambda - 3). \end{aligned}$$

Portanto,

$$\lambda_1 = 3$$

e

$$\lambda_2 = \frac{3}{2}.$$

Para  $\lambda_1 = 3$ ,

$$\mathbf{A} - 3\mathbf{M} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

O sistema fornece

$$v_2 = v_1,$$

de modo que um autovetor generalizado é

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

De fato,

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

e

$$3\mathbf{M}\mathbf{v}_1 = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Para

$$\lambda_2 = \frac{3}{2},$$

tem-se

$$\mathbf{A} - \frac{3}{2}\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

O sistema conduz a

$$v_2 = -2v_1.$$

Assim, pode-se escolher

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Esses vetores não são ortogonais no produto interno euclidiano:

$$\mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_2 = -1.$$

Entretanto,

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1^\top \mathbf{M} \mathbf{v}_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Logo, eles são ortogonais na geometria determinada por  $\mathbf{M}$ .

Suas normas nessa métrica são

$$\|\mathbf{v}_1\|_{\mathbf{M}} = \sqrt{3}$$

e

$$\|\mathbf{v}_2\|_{\mathbf{M}} = \sqrt{6}.$$

Os autovetores generalizados normalizados são

$$\mathbf{b}_{g,1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{b}_{g,2} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Reunindo-os nas colunas da matriz da base

$$\mathbf{B}_g = [\mathbf{b}_{g,1} \quad \mathbf{b}_{g,2}],$$

obtêm-se

$$\mathbf{B}_g^\top \mathbf{M} \mathbf{B}_g = \mathbf{I}_2$$

e

$$\mathbf{B}_g^\top \mathbf{A} \mathbf{B}_g = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3/2 \end{bmatrix}.$$

O maior valor da razão

$$\frac{\mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a}}$$

é 3 e ocorre no autoespaço generalizado gerado por  $\mathbf{v}_1$ . O menor valor é 3/2 e ocorre no autoespaço generalizado gerado por  $\mathbf{v}_2$ .

Os autovalores generalizados permitem comparar duas formas quadráticas em uma geometria definida por uma delas. Essa estrutura será utilizada posteriormente em problemas que comparam diferentes fontes de dispersão ou associação, sem antecipar aqui a formulação específica dessas técnicas.

## 5.8 Síntese do capítulo

Este capítulo desenvolveu a estrutura espectral das transformações lineares quadradas. O ponto de partida foi a identificação de direções invariantes, isto é, direções nas quais a ação de uma matriz reduz-se à multiplicação por um escalar.

Para

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v},$$

com  $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ , o escalar  $\lambda$  é um autovalor e  $\mathbf{v}$  é um autovetor correspondente. O conjunto formado pelo vetor nulo e por todos os autovetores associados a  $\lambda$  constitui o autoespaço

$$\mathcal{E}_\lambda = \mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_p).$$

Os autovalores são determinados pela condição

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_p) = 0.$$

A multiplicidade algébrica  $m_a(\lambda)$  registra a multiplicidade de  $\lambda$  como raiz do polinômio característico, enquanto a multiplicidade geométrica

$$m_g(\lambda) = \dim(\mathcal{E}_\lambda)$$

mede a dimensão do autoespaço correspondente.

Quando  $\mathbf{A}$  possui  $p$  autovetores linearmente independentes, eles formam uma base

$$\mathcal{B}_\mathbf{A} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\},$$

cujas matrizes é

$$\mathbf{B}_\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1 \quad \dots \quad \mathbf{v}_p].$$

Nessa base,

$$[T_\mathbf{A}]_{\mathcal{B}_\mathbf{A} \leftarrow \mathcal{B}_\mathbf{A}} = \mathbf{B}_\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}_\mathbf{A} = \Lambda_\mathbf{A},$$

e, portanto,



$$\mathbf{A} = \mathbf{B}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{B}_\mathbf{A}^{-1}.$$

A diagonalização é, assim, uma mudança para coordenadas nas quais o operador atua separadamente sobre cada direção da base de autovetores.

Para matrizes simétricas reais, o Teorema Espectral garante uma base ortonormal de autovetores. Nesse caso, a matriz da base pode ser escolhida ortogonal,

$$\mathbf{Q}_\mathbf{A} = [\mathbf{q}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{q}_p],$$

com

$$\mathbf{Q}_\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top,$$

e obtém-se a decomposição espectral

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top.$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{A} = \sum_{j=1}^p \lambda_j \mathbf{q}_j \mathbf{q}_j^\top.$$

Agrupando autovalores repetidos, essa representação pode ser escrita em termos dos projetores espectrais:

$$\mathbf{A} = \sum_h \lambda^{(h)} \Pi_{\lambda^{(h)}}.$$

Essa forma mostra que uma matriz simétrica atua projetando o vetor sobre autoespaços ortogonais e aplicando a cada componente o autovalor correspondente.

A decomposição espectral também permite recuperar diretamente propriedades da matriz:

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^p \lambda_j,$$

$$\det(\mathbf{A}) = \prod_{j=1}^p \lambda_j,$$

e

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = \#\{j : \lambda_j \neq 0\},$$

contando as multiplicidades.

Além disso,

$$\ker(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \text{span} \{ \mathbf{q}_j : \lambda_j = 0 \},$$

enquanto

$$\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span} \{ \mathbf{q}_j : \lambda_j \neq 0 \}.$$

Para matrizes simétricas,

$$\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \ker(T_{\mathbf{A}})^{\perp}.$$

A mesma decomposição simplifica as formas quadráticas. Se

$$\mathbf{z} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}_{\mathbf{A}}} = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^{\top} \mathbf{x},$$

então

$$\mathbf{x}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \lambda_j z_j^2.$$

As possibilidades de sinal da forma quadrática são, portanto, determinadas pelos sinais dos autovalores. Quando  $\mathbf{A} \succ 0$ , suas superfícies de nível são elipsoides cujos eixos estão alinhados aos autovetores.

O quociente de Rayleigh,

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}) = \frac{\mathbf{a}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^{\top} \mathbf{a}},$$

é uma média ponderada dos autovalores. Para

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p,$$

tem-se

$$\lambda_p \leq \mathcal{R}_{\mathbf{A}}(\mathbf{a}) \leq \lambda_1.$$

O máximo e o mínimo são atingidos nos autoespaços associados aos autovalores extremos. A otimização de uma forma quadrática sob a restrição

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{a} = 1$$

conduz à condição

$$\mathbf{A}\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a}.$$

Autovalores e autovetores podem, portanto, ser interpretados também como valores e direções estacionárias de problemas de otimização quadrática.

A decomposição espectral permite ainda definir funções de matrizes simétricas. Se  $f$  está definida no espectro de  $\mathbf{A}$ ,

$$f(\mathbf{A}) = \mathbf{Q}_{\mathbf{A}} f(\Lambda_{\mathbf{A}}) \mathbf{Q}_{\mathbf{A}}^\top.$$

Equivalentemente,

$$f(\mathbf{A}) = \sum_h f(\lambda^{(h)}) \Pi_{\lambda^{(h)}}.$$

Assim, a função espectral preserva os autoespaços e transforma cada autovalor  $\lambda$  no escalar  $f(\lambda)$ . Potências, inversas, raízes quadradas, raízes quadradas inversas, pseudoinversas, exponenciais e logaritmos são casos particulares dessa construção, sob as condições necessárias à definição de cada função.

Quando a geometria do problema é determinada por uma matriz simétrica positiva definida  $\mathbf{M}$ , surge o problema de autovalores generalizados

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{M}\mathbf{v},$$

com  $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$  e  $\mathbf{M} \succ 0$ .

O quociente correspondente é

$$\mathcal{R}_{\mathbf{A},\mathbf{M}}(\mathbf{a}) = \frac{\mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a}}.$$

A transformação

$$\mathbf{u} = \mathbf{M}^{1/2} \mathbf{a}$$

converte esse problema em um problema de Rayleigh ordinário para a matriz simétrica

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{M}^{-1/2}.$$

Consequentemente, os autovalores generalizados são reais e pode-se escolher uma base de autovetores generalizados cuja matriz  $\mathbf{B}_g$  satisfaz

$$\mathbf{B}_g^\top \mathbf{M} \mathbf{B}_g = \mathbf{I}_p$$

e

$$\mathbf{B}_g^\top \mathbf{A} \mathbf{B}_g = \Lambda_g.$$

A Tabela 5.2 reúne as expressões principais desenvolvidas no capítulo.

Tabela 5.2: Síntese dos principais objetos espectrais desenvolvidos no capítulo.

| Objeto                 | Expressão                                                                                                       | Interpretação                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Equação de autovalor   | $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$                                                                      | Identifica direções invariantes                          |
| Autoespaço             | $\mathcal{E}_\lambda = \mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_p)$                                           | Reúne os vetores associados a $\lambda$                  |
| Diagonalização         | $\mathbf{A} = \mathbf{B}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{B}_\mathbf{A}^{-1}$                              | Representa o operador em uma base de autovetores         |
| Decomposição espectral | $\mathbf{A} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top$                              | Diagonaliza ortogonalmente uma matriz simétrica          |
| Projeto espectral      | $\Pi_\lambda = \mathbf{Q}_\lambda \mathbf{Q}_\lambda^\top$                                                      | Projeta sobre o autoespaço associado a $\lambda$         |
| Forma quadrática       | $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_j \lambda_j z_j^2$                                                | Separa as contribuições das direções espectrais          |
| Quociente de Rayleigh  | $\mathcal{R}_\mathbf{A}(\mathbf{a}) = \frac{\mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\top \mathbf{a}}$ | Caracteriza valores e direções espectrais por otimização |
| Função espectral       | $f(\mathbf{A}) = \mathbf{Q}_\mathbf{A} f(\Lambda_\mathbf{A}) \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top$                        | Aplica uma função aos autovalores                        |
| Problema generalizado  | $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda \mathbf{M} \mathbf{v}$                                                          | Compara duas formas quadráticas                          |

| Objeto                         | Expressão                                                  | Interpretação                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Base generalizada              | $\mathbf{B}_g^\top \mathbf{M} \mathbf{B}_g = \mathbf{I}_p$ | Define ortonormalidade na geometria induzida por $\mathbf{M}$ |
| Diagonalização por congruência | $\mathbf{B}_g^\top \mathbf{A} \mathbf{B}_g = \Lambda_g$    | Reduz simultaneamente as duas formas quadráticas              |

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- identificar autovalores, autovetores e autoespaços e interpretar seu significado geométrico;
- distinguir multiplicidades algébrica e geométrica;
- determinar quando uma matriz é diagonalizável;
- interpretar a diagonalização como mudança para uma base de autovetores;
- aplicar o Teorema Espectral a matrizes simétricas reais;
- interpretar projetores e subespaços espectrais;
- relacionar autovalores a traço, determinante, posto, núcleo, imagem e positividade;
- representar formas quadráticas em coordenadas espectrais;
- formular problemas de otimização por meio do quociente de Rayleigh;
- construir e interpretar funções espectrais de matrizes;
- compreender inversas, raízes e pseudoinversas pela ação sobre os autovalores;
- formular e transformar problemas de autovalores generalizados;
- distinguir ortogonalidade euclidiana de ortogonalidade segundo uma matriz positiva definida.

A decomposição espectral fornece uma descrição particularmente simples para matrizes simétricas quadradas. Entretanto, matrizes de dados e muitas transformações de interesse são retangulares ou não simétricas e, portanto, não admitem diretamente essa decomposição. O próximo capítulo amplia essas ideias por meio da **Decomposição em Valores Singulares**, relacionando matrizes retangulares aos espectros de  $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$  e  $\mathbf{A} \mathbf{A}^\top$  e conectando valores singulares, espaços fundamentais, posto e aproximações de baixa dimensão.

## 6 Decomposição em Valores Singulares

No capítulo anterior, a decomposição espectral foi utilizada para representar uma matriz simétrica real na forma

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top.$$

Essa representação identifica uma base ortonormal de autovetores na qual a transformação atua separadamente sobre cada coordenada. A decomposição espectral ortogonal, entretanto, depende da simetria da matriz e é formulada para operadores cujo domínio e contradomínio possuem a mesma dimensão.

Em Análise Multivariada, um dos objetos mais frequentes é a matriz de dados

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

cujas linhas representam observações e cujas colunas representam variáveis. Em geral,

$$n \neq p,$$

de modo que  $\mathbf{X}$  é retangular. Mesmo quando uma matriz é quadrada, ela pode não ser simétrica nem possuir uma base ortonormal de autovetores.

A **Decomposição em Valores Singulares**, ou SVD, fornece uma representação aplicável a qualquer matriz real. Para uma transformação

$$T_\mathbf{A} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q, \quad T_\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x},$$

a SVD relaciona duas bases ortonormais:

- uma base do espaço de origem  $\mathbb{R}^p$ ;
- uma base do espaço de chegada  $\mathbb{R}^q$ .

A transformação associa determinadas direções dessas duas bases e multiplica os comprimentos por fatores não negativos denominados **valores singulares**.

Essa representação permite descrever:

- o posto da matriz;
- os espaços das linhas e das colunas;
- o núcleo e o núcleo da transposta;
- os fatores máximos e mínimos de alteração dos comprimentos;
- aproximações de posto reduzido;
- a pseudoinversa;
- soluções de mínimos quadrados.

A SVD também estabelece uma ligação entre os espaços das observações e das variáveis de uma matriz de dados. Essa dualidade será utilizada posteriormente na formulação de métodos de redução de dimensionalidade e de representação de estruturas matriciais.

### Convenções de notação

Ao longo deste capítulo:

- $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}$  representa uma matriz real e  $T_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$  a transformação linear associada;
- $r = \text{posto}(\mathbf{A})$  representa o posto de  $\mathbf{A}$ ;
- $d_1 \geq \dots \geq d_r > 0$  representam os valores singulares positivos de  $\mathbf{A}$ ;
- $\mathbf{v}_j \in \mathbb{R}^p$  representa um vetor singular à direita;
- $\mathbf{u}_j \in \mathbb{R}^q$  representa um vetor singular à esquerda;
- $\mathbf{U}$ ,  $\mathbf{D}$  e  $\mathbf{V}$  representam os fatores da SVD completa;
- $\mathbf{U}_r$ ,  $\mathbf{D}_r$  e  $\mathbf{V}_r$  representam os fatores da SVD compacta;
- $\mathbf{U}_k$ ,  $\mathbf{D}_k$  e  $\mathbf{V}_k$  representam os fatores de uma SVD truncada;
- $\mathbf{A}^+$  representa a pseudoinversa de Moore–Penrose;
- $\|\mathbf{A}\|_2$  e  $\|\mathbf{A}\|_F$  representam, respectivamente, as normas espectral e de Frobenius.

As convenções estabelecidas nos capítulos anteriores para núcleo, imagem, espaço coluna, espaço linha e bases ortonormais permanecem válidas.

## 6.1 Definição e formas da Decomposição em Valores Singulares

Considere uma matriz real

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p},$$

que representa uma transformação de  $\mathbb{R}^p$  em  $\mathbb{R}^q$ .

A matriz pode ser retangular, quadrada, simétrica ou não simétrica. Nenhuma hipótese de invertibilidade ou de posto completo é necessária para a existência da SVD.

**Teorema 6.1** (Existência da Decomposição em Valores Singulares). *Para toda matriz*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p},$$

*existem matrizes ortogonais*

$$\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{q \times q}$$

*e*

$$\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{p \times p},$$

*e uma matriz diagonal retangular*

$$\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

*tais que*

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^\top.$$

*As matrizes ortogonais satisfazem*

$$\mathbf{U}^\top \mathbf{U} = \mathbf{U}\mathbf{U}^\top = \mathbf{I}_q$$

*e*

$$\mathbf{V}^\top \mathbf{V} = \mathbf{V}\mathbf{V}^\top = \mathbf{I}_p.$$

*Os elementos diagonais não negativos de  $\mathbf{D}$  podem ser ordenados como*

$$d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_{\min(q,p)} \geq 0.$$

*Esses elementos são os **valores singulares** de  $\mathbf{A}$ . (Golub; Van Loan, 2013)*



A demonstração será apresentada posteriormente, após a construção da SVD a partir das decomposições espectrais de  $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$  e  $\mathbf{A}\mathbf{A}^\top$ .

A matriz  $\mathbf{D}$  é denominada diagonal retangular porque

$$D_{ij} = 0 \quad \text{quando } i \neq j.$$

Se

$$q > p,$$

a matriz  $\mathbf{D}$  possui linhas nulas abaixo de sua parte diagonal. Se

$$p > q,$$

ela possui colunas nulas à direita da parte diagonal.

Por exemplo, quando  $q > p$ ,

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_p \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{q \times p}.$$

Quando  $p > q$ ,

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_q & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{q \times p}.$$

Se

$$r = \text{posto}(\mathbf{A}),$$

então exatamente  $r$  valores singulares são positivos:

$$d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_r > 0,$$

enquanto os demais valores singulares são iguais a zero.

Assim, o número de valores singulares positivos é exatamente a dimensão da imagem de  $T_{\mathbf{A}}$ , isto é,

$$r = \dim(\operatorname{Im}(T_{\mathbf{A}})) = \operatorname{posto}(\mathbf{A}).$$

### 6.1.1 Vetores singulares

Escreva as matrizes ortogonais como

$$\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{u}_q]$$

e

$$\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_p].$$

**Definição 6.1** (Valores e vetores singulares). Na decomposição

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^\top,$$

os elementos diagonais não negativos

$$d_1, \dots, d_{\min(q,p)}$$

de  $\mathbf{D}$  são os **valores singulares** de  $\mathbf{A}$ .

As colunas

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$$

de  $\mathbf{V}$  são os **vetores singulares à direita**. Elas formam uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^p$ .

As colunas

$$\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_q$$

de  $\mathbf{U}$  são os **vetores singulares à esquerda**. Elas formam uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^q$ .

Para cada valor singular positivo,

$$d_j > 0, \quad j = 1, \dots, r,$$

os vetores singulares correspondentes satisfazem

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_j = d_j\mathbf{u}_j$$

e

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{u}_j = d_j\mathbf{v}_j.$$

A primeira igualdade mostra como a transformação associa uma direção no espaço de origem a uma direção no espaço de chegada:

$$\mathbf{v}_j \xrightarrow{\mathbf{A}} d_j\mathbf{u}_j.$$

Como

$$\|\mathbf{v}_j\| = \|\mathbf{u}_j\| = 1,$$

tem-se

$$\|\mathbf{A}\mathbf{v}_j\| = d_j.$$

Portanto,  $d_j$  mede o fator de alteração do comprimento na direção  $\mathbf{v}_j$ :

- se  $d_j > 1$ , ocorre ampliação;
- se  $0 < d_j < 1$ , ocorre contração;
- se  $d_j = 1$ , o comprimento é preservado;
- se  $d_j = 0$ , a direção correspondente é eliminada.

Os valores singulares são sempre não negativos. Diferentemente dos autovalores, eles não representam inversões de sentido. Possíveis mudanças de orientação ficam incorporadas às matrizes ortogonais  $\mathbf{U}$  e  $\mathbf{V}$ .

As colunas de  $\mathbf{V}$  correspondentes às colunas nulas de  $\mathbf{D}$  são transformadas no vetor nulo. Elas pertencem ao núcleo de  $\mathbf{A}$ . De maneira análoga, colunas de  $\mathbf{U}$  que correspondem às linhas nulas de  $\mathbf{D}$  pertencem ao núcleo de  $\mathbf{A}^\top$ . Essas relações serão formalizadas na seção dedicada aos espaços fundamentais.

### 6.1.2 Interpretação como composição de transformações

Para qualquer

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p,$$

a ação de  $\mathbf{A}$  pode ser escrita como

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{UDV}^\top \mathbf{x}.$$

Essa transformação pode ser decomposta em três etapas:

$$\mathbf{x} \mapsto \mathbf{V}^\top \mathbf{x} \mapsto \mathbf{DV}^\top \mathbf{x} \mapsto \mathbf{UDV}^\top \mathbf{x}.$$

Na primeira etapa,

$$\mathbf{z} = \mathbf{V}^\top \mathbf{x}$$

fornece as coordenadas de  $\mathbf{x}$  na base ortonormal dos vetores singulares à direita,

$$\mathcal{B}_V = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}.$$

Assim,

$$\mathbf{z} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}_V}.$$

Na segunda etapa,

$$\mathbf{Dz}$$

multiplica separadamente as coordenadas pelas entradas diagonais de  $\mathbf{D}$ . Como  $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{q \times p}$  pode ser retangular, essa etapa também realiza a passagem entre as dimensões do domínio e do contradomínio.

Na terceira etapa,  $\mathbf{U}$  reconstrói o resultado nas coordenadas canônicas de  $\mathbb{R}^q$  a partir da base ortonormal

$$\mathcal{B}_U = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_q\}.$$

Como  $\mathbf{U}$  e  $\mathbf{V}$  são ortogonais, essas duas matrizes preservam normas, distâncias, ângulos e produtos internos. As alterações de comprimento e a possível redução de dimensão são determinadas por  $\mathbf{D}$ .

### 6.1.3 SVD completa

**Definição 6.2** (SVD completa). A representação

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^\top,$$

com

$$\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{q \times q}, \quad \mathbf{D} \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

e

$$\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{p \times p},$$

é denominada **SVD completa** de  $\mathbf{A}$ .

As dimensões e os papéis dos fatores são apresentados na Tabela 6.1.

Tabela 6.1: Dimensões das matrizes na SVD completa.

| Matriz       | Dimensão     | Papel                                             |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
| $\mathbf{U}$ | $q \times q$ | Base ortonormal do espaço de chegada              |
| $\mathbf{D}$ | $q \times p$ | Matriz diagonal retangular dos valores singulares |
| $\mathbf{V}$ | $p \times p$ | Base ortonormal do espaço de origem               |

A SVD completa descreve bases ortonormais de todo o espaço de origem e de todo o espaço de chegada. Por isso, ela contém também as direções associadas ao núcleo de  $\mathbf{A}$  e ao núcleo de  $\mathbf{A}^\top$ .

#### 6.1.4 SVD compacta

Quando

$$r = \text{posto}(\mathbf{A}),$$

defina

$$\mathbf{U}_r = [\mathbf{u}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{u}_r] \in \mathbb{R}^{q \times r},$$

$$\mathbf{V}_r = [\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_r] \in \mathbb{R}^{p \times r}$$

e

$$\mathbf{D}_r = \text{diag}(d_1, \dots, d_r) \in \mathbb{R}^{r \times r}.$$

**Definição 6.3** (SVD compacta). A representação

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top,$$

formada somente pelos valores singulares positivos e por seus vetores singulares correspondentes, é denominada **SVD compacta** de  $\mathbf{A}$ .

A SVD compacta reconstrói exatamente a matriz original. Ela não é uma aproximação.

As colunas de  $\mathbf{U}_r$  e de  $\mathbf{V}_r$  são ortonormais:

$$\mathbf{U}_r^\top \mathbf{U}_r = \mathbf{I}_r$$

e

$$\mathbf{V}_r^\top \mathbf{V}_r = \mathbf{I}_r.$$

Quando  $r < q$ , tem-se

$$\mathbf{U}_r \mathbf{U}_r^\top \neq \mathbf{I}_q.$$

Quando  $r < p$ ,

$$\mathbf{V}_r \mathbf{V}_r^\top \neq \mathbf{I}_p.$$

Esses produtos são projetores ortogonais sobre os subespaços gerados pelas colunas das matrizes correspondentes. Sua interpretação será retomada na seção sobre os espaços fundamentais.

As dimensões da SVD compacta são apresentadas na Tabela 6.2.

Tabela 6.2: Dimensões das matrizes na SVD compacta.

| Matriz         | Dimensão     | Conteúdo                                                       |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| $\mathbf{U}_r$ | $q \times r$ | Vetores singulares à esquerda associados aos valores positivos |
| $\mathbf{D}_r$ | $r \times r$ | Valores singulares positivos                                   |
| $\mathbf{V}_r$ | $p \times r$ | Vetores singulares à direita associados aos valores positivos  |

A forma compacta contém toda a informação necessária para reconstruir  $\mathbf{A}$  e utiliza somente as direções que participam efetivamente da transformação. A forma completa acrescenta bases ortonormais para os complementos dessas direções.

### 6.1.5 SVD compacta e SVD truncada

A **SVD compacta** e a **SVD truncada** representam objetos diferentes.

A SVD compacta conserva os  $r$  valores singulares positivos e satisfaz exatamente

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top.$$

Uma SVD truncada conserva somente os  $k$  maiores valores singulares, com

$$1 \leq k < r.$$

Definindo

$$\mathbf{U}_k = [\mathbf{u}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{u}_k],$$

$$\mathbf{D}_k = \text{diag}(d_1, \dots, d_k)$$

e

$$\mathbf{V}_k = [\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_k],$$

obtem-se

$$\mathbf{A}_k = \mathbf{U}_k \mathbf{D}_k \mathbf{V}_k^\top.$$

Quando  $k < r$ ,

$$\mathbf{A}_k \neq \mathbf{A}.$$

A matriz  $\mathbf{A}_k$  é uma aproximação de posto  $k$ . Suas propriedades de otimalidade e os erros produzidos pelo truncamento serão desenvolvidos posteriormente.

Alguns textos utilizam as expressões **SVD reduzida** ou **SVD econômica** para formas que não incluem todas as colunas das matrizes ortogonais. Como essa terminologia não é uniforme, neste capítulo serão utilizadas as expressões:

- **SVD completa**, para a representação com bases ortonormais completas;
- **SVD compacta**, para a representação exata com os valores singulares positivos;
- **SVD truncada**, para a aproximação que conserva apenas os  $k < r$  maiores valores singulares.

### 6.1.6 Não unicidade dos vetores singulares

Os valores singulares de uma matriz são determinados de maneira única quando apresentados em ordem decrescente e consideradas suas multiplicidades. Os vetores singulares, entretanto, podem não ser únicos.

Para cada par associado a um valor singular positivo, a substituição simultânea

$$\mathbf{u}_j \mapsto -\mathbf{u}_j$$

e

$$\mathbf{v}_j \mapsto -\mathbf{v}_j$$

não altera a parcela

$$d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top,$$



pois

$$d_j(-\mathbf{u}_j)(-\mathbf{v}_j)^\top = d_j\mathbf{u}_j\mathbf{v}_j^\top.$$

Assim, cada par singular associado a um valor positivo é determinado apenas a menos de uma mudança simultânea de sinal.

Considere agora um valor singular positivo  $d$  com multiplicidade  $m$ . Se

$$\mathbf{U}_d \in \mathbb{R}^{q \times m}$$

e

$$\mathbf{V}_d \in \mathbb{R}^{p \times m}$$

contêm bases ortonormais dos subespaços singulares correspondentes, a contribuição desse valor é

$$d\mathbf{U}_d\mathbf{V}_d^\top.$$

Para qualquer matriz ortogonal

$$\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{m \times m},$$

tem-se

$$\begin{aligned} d(\mathbf{U}_d\mathbf{R})(\mathbf{V}_d\mathbf{R})^\top &= d\mathbf{U}_d\mathbf{R}\mathbf{R}^\top\mathbf{V}_d^\top \\ &= d\mathbf{U}_d\mathbf{V}_d^\top. \end{aligned}$$

Portanto, valores singulares positivos repetidos permitem rotações ortogonais simultâneas das bases à esquerda e à direita.

A situação é diferente nos subespaços associados ao valor singular zero. As colunas de  $\mathbf{V}_0$  formam uma base de

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

enquanto as colunas de  $\mathbf{U}_0$  formam uma base de

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Essas bases completam espaços diferentes e podem ser escolhidas independentemente, pois suas parcelas são multiplicadas por zero na SVD completa.

Portanto:

- os valores singulares são propriedades da matriz;
- os subespaços singulares associados aos valores positivos são propriedades da matriz;
- os núcleos de  $\mathbf{A}$  e de  $\mathbf{A}^\top$  são propriedades da matriz;
- sinais e bases ortonormais específicas dentro desses subespaços dependem da representação escolhida.

A existência da SVD e as relações entre os dois conjuntos de vetores singulares decorrem das decomposições espectrais das matrizes simétricas

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \quad \text{e} \quad \mathbf{A} \mathbf{A}^\top.$$

A próxima seção constrói essa relação e demonstra por que os quadrados dos valores singulares aparecem como autovalores dessas duas matrizes.

## 6.2 Construção da SVD e relação com a decomposição espectral

A existência da SVD decorre das propriedades das duas matrizes de Gram associadas a  $\mathbf{A}$ :

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \quad \text{e} \quad \mathbf{A} \mathbf{A}^\top.$$

Essas matrizes já apareceram no estudo dos espaços das variáveis e das observações. A SVD mostra agora que seus espectros estão diretamente relacionados e que essa relação permite construir bases ortonormais adaptadas à transformação

$$T_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q.$$

Para

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p},$$

tem-se

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

e

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top \in \mathbb{R}^{q \times q}.$$

Mesmo que  $\mathbf{A}$  seja retangular ou não simétrica, essas duas matrizes são quadradas, simétricas e semidefinidas positivas.

### 6.2.1 Simetria e semidefinição positiva

A simetria segue de

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^\top = \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$$

e

$$(\mathbf{A}\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}\mathbf{A}^\top.$$

Para qualquer

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p,$$

tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} &= (\mathbf{A} \mathbf{x})^\top (\mathbf{A} \mathbf{x}) \\ &= \|\mathbf{A} \mathbf{x}\|^2 \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \succeq 0.$$

De modo semelhante, para qualquer

$$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^q,$$

$$\begin{aligned} \mathbf{y}^\top \mathbf{A} \mathbf{A}^\top \mathbf{y} &= (\mathbf{A}^\top \mathbf{y})^\top (\mathbf{A}^\top \mathbf{y}) \\ &= \|\mathbf{A}^\top \mathbf{y}\|^2 \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top \succeq 0.$$

Pelo Teorema 5.4, as duas matrizes possuem autovalores reais não negativos e bases ortonormais de autovetores.

**Teorema 6.2** (Espectros associados à SVD). *Seja*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

*com posto*

$$r = \text{posto}(\mathbf{A}).$$

*Então:*

1. *as matrizes*

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$$

*e*

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top$$

*possuem os mesmos  $r$  autovalores positivos, incluindo suas multiplicidades;*

2. *esses autovalores podem ser escritos como*

$$d_1^2, \dots, d_r^2,$$

*em que*

$$d_1 \geq \dots \geq d_r > 0$$

*são os valores singulares positivos de  $\mathbf{A}$ ;*

3. os núcleos satisfazem

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

e

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}\mathbf{A}^\top) = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

(Golub; Van Loan, 2013)

*Comprovação.* Considere inicialmente

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Então,

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

e, conseqüentemente,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}).$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}),$$

então

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Multiplicando à esquerda por  $\mathbf{x}^\top$ ,

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} \\ &= \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

e

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) \subseteq \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Assim,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

O mesmo argumento, aplicado a  $\mathbf{A}^\top$ , fornece

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}\mathbf{A}^\top) = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Considere agora um autovalor positivo  $\lambda$  de

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$$

e um autovetor unitário  $\mathbf{v}$  associado:

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}.$$

Como  $\lambda > 0$ , defina

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}}{\sqrt{\lambda}}.$$

Esse vetor possui norma unitária, pois

$$\begin{aligned}\mathbf{u}^\top \mathbf{u} &= \frac{\mathbf{v}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{v}}{\lambda} \\ &= \frac{\lambda \mathbf{v}^\top \mathbf{v}}{\lambda} \\ &= 1.\end{aligned}$$

Além disso,

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}\mathbf{A}^\top \mathbf{u} &= \frac{\mathbf{A}\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{v}}{\sqrt{\lambda}} \\
&= \frac{\mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{v})}{\sqrt{\lambda}} \\
&= \frac{\mathbf{A}(\lambda \mathbf{v})}{\sqrt{\lambda}} \\
&= \lambda \mathbf{u}.
\end{aligned}$$

Portanto, todo autovalor positivo de

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$$

também é autovalor de

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top.$$

O argumento inverso é obtido começando por um autovetor de

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top$$

e definindo

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{A}^\top \mathbf{u}}{\sqrt{\lambda}}.$$

Para  $\lambda > 0$ , as aplicações

$$\mathbf{v} \mapsto \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}}{\sqrt{\lambda}}$$

e

$$\mathbf{u} \mapsto \frac{\mathbf{A}^\top \mathbf{u}}{\sqrt{\lambda}}$$

estabelecem aplicações lineares inversas entre o autoespaço de  $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$  associado a  $\lambda$  e o autoespaço de  $\mathbf{A}\mathbf{A}^\top$  associado ao mesmo autovalor. Portanto, esses autoespaços possuem a mesma dimensão e as multiplicidades dos autovalores positivos coincidem.

Como

$$\text{posto}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) = \text{posto}(\mathbf{A}) = r,$$

existem exatamente  $r$  autovalores positivos. O mesmo ocorre para

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top.$$

Definindo

$$d_j = \sqrt{\lambda_j},$$

obtêm-se os  $r$  valores singulares positivos de  $\mathbf{A}$ . □

As duas matrizes podem possuir quantidades diferentes de autovalores nulos. A matriz

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$$

tem ordem  $p$ , enquanto

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top$$

tem ordem  $q$ . Entretanto, seus espectros positivos coincidem.

### 6.2.2 Construção dos vetores singulares

Considere a decomposição espectral

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{V} \Lambda_V \mathbf{V}^\top,$$

em que

$$\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_p]$$

é ortogonal.

Ordene os autovalores de modo que

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$$



e

$$\lambda_{r+1} = \dots = \lambda_p = 0.$$

Defina

$$d_j = \sqrt{\lambda_j}, \quad j = 1, \dots, r.$$

Para cada autovalor positivo, defina

$$\mathbf{u}_j = \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}_j}{d_j}.$$

Os vetores assim construídos são ortonormais. Para  $i, j \leq r$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j &= \frac{\mathbf{v}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_j}{d_i d_j} \\ &= \frac{d_j^2 \mathbf{v}_i^\top \mathbf{v}_j}{d_i d_j} \\ &= \frac{d_j}{d_i} \mathbf{v}_i^\top \mathbf{v}_j. \end{aligned}$$

Como os vetores  $\mathbf{v}_j$  são ortonormais,

$$\mathbf{v}_i^\top \mathbf{v}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Logo,

$$\mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Portanto,

$$\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$$

formam um conjunto ortonormal.

Além disso, cada  $\mathbf{u}_j$  pertence à imagem de  $T_{\mathbf{A}}$ , pois

$$\mathbf{u}_j = \frac{1}{d_j} \mathbf{A} \mathbf{v}_j.$$

Como existem  $r = \text{posto}(\mathbf{A})$  vetores ortonormais desse tipo e

$$\dim(\text{Im}(T_{\mathbf{A}})) = r,$$

tem-se

$$\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}.$$

Assim,  $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$  formam uma base ortonormal da imagem da transformação.

Além disso,

$$\mathbf{A} \mathbf{v}_j = d_j \mathbf{u}_j$$

e

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^\top \mathbf{u}_j &= \frac{\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_j}{d_j} \\ &= \frac{d_j^2 \mathbf{v}_j}{d_j} \\ &= d_j \mathbf{v}_j. \end{aligned}$$

Assim, cada valor singular positivo associa um par de direções:

$$\mathbf{v}_j \in \mathbb{R}^p \quad \text{e} \quad \mathbf{u}_j \in \mathbb{R}^q.$$

Essas direções satisfazem

$$\mathbf{A} \mathbf{v}_j = d_j \mathbf{u}_j$$

e

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{u}_j = d_j \mathbf{v}_j.$$

Reunindo os pares associados aos valores singulares positivos,

$$\mathbf{U}_r = [\mathbf{u}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{u}_r],$$

$$\mathbf{D}_r = \text{diag}(d_1, \dots, d_r)$$

e

$$\mathbf{V}_r = [\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_r],$$

obtém-se

$$\mathbf{A}\mathbf{V}_r = \mathbf{U}_r\mathbf{D}_r.$$

Complete  $\mathbf{V}_r$  com uma matriz  $\mathbf{V}_0$  cujas colunas formam uma base ortonormal de  $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ . Então,

$$\mathbf{V} = [\mathbf{V}_r \quad \mathbf{V}_0]$$

é ortogonal e

$$\mathbf{I}_p = \mathbf{V}_r\mathbf{V}_r^\top + \mathbf{V}_0\mathbf{V}_0^\top.$$

Como

$$\mathbf{A}\mathbf{V}_0 = \mathbf{0},$$

tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{A}\mathbf{I}_p \\ &= \mathbf{A}(\mathbf{V}_r\mathbf{V}_r^\top + \mathbf{V}_0\mathbf{V}_0^\top) \\ &= \mathbf{A}\mathbf{V}_r\mathbf{V}_r^\top \\ &= \mathbf{U}_r\mathbf{D}_r\mathbf{V}_r^\top. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_r\mathbf{D}_r\mathbf{V}_r^\top,$$

que é a SVD compacta de  $\mathbf{A}$ .

Essa construção também explicita o papel dos três fatores:

- as colunas de  $\mathbf{V}_r$  formam uma base ortonormal das direções do domínio que não pertencem ao núcleo;
- $\mathbf{D}_r$  contém os fatores de escalonamento positivos;
- as colunas de  $\mathbf{U}_r$  formam uma base ortonormal da imagem da transformação.

### 6.2.3 Demonstração da existência da SVD completa

A construção anterior também demonstra o Teorema 6.1.

*Comprovação.* Os vetores

$$\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_p$$

estão associados ao autovalor zero de

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}.$$

Pelo Teorema 6.2,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Logo,

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_j = \mathbf{0}, \quad j = r + 1, \dots, p.$$

Como mostrado na construção da SVD compacta, os vetores

$$\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$$

formam uma base ortonormal de

$$\text{Im}(T_{\mathbf{A}}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Pela ortogonalidade entre os espaços fundamentais,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Complete esse conjunto com uma base ortonormal

$$\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_q$$

de

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Defina

$$\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1 \quad \dots \quad \mathbf{u}_q]$$

e mantenha

$$\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 \quad \dots \quad \mathbf{v}_p].$$

As duas matrizes são ortogonais.

Construa a matriz diagonal retangular

$$\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

colocando

$$d_1, \dots, d_r$$

em suas primeiras posições diagonais e zeros nas demais posições.

Para  $j \leq r$ ,

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_j = d_j\mathbf{u}_j.$$

Para  $j > r$ ,

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_j = \mathbf{0}.$$

Essas relações podem ser reunidas em

$$\mathbf{A}\mathbf{V} = \mathbf{U}\mathbf{D}.$$

Multiplicando à direita por  $\mathbf{V}^\top$ ,

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^\top.$$

Portanto, toda matriz real possui uma SVD completa. □

### 6.2.4 Decomposições espectrais associadas

A SVD compacta fornece diretamente as decomposições espectrais das duas matrizes de Gram:

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^\top \mathbf{A} &= (\mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top)^\top (\mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top) \\ &= \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r \mathbf{U}_r^\top \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top \\ &= \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^2 \mathbf{V}_r^\top.\end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^2 \mathbf{V}_r^\top.$$

Essa expressão possui dimensão  $p \times p$ , pois

$$\mathbf{V}_r \in \mathbb{R}^{p \times r}, \quad \mathbf{D}_r^2 \in \mathbb{R}^{r \times r}$$

e

$$\mathbf{V}_r^\top \in \mathbb{R}^{r \times p}.$$

De forma análoga,

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\mathbf{A}^\top &= \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r \mathbf{U}_r^\top \\ &= \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r^2 \mathbf{U}_r^\top.\end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r^2 \mathbf{U}_r^\top,$$

com dimensão  $q \times q$ .

Na forma completa, as decomposições são

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{V} \operatorname{diag} \left( d_1^2, \dots, d_r^2, \underbrace{0, \dots, 0}_{p-r} \right) \mathbf{V}^\top$$

e

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^\top = \mathbf{U} \operatorname{diag} \left( d_1^2, \dots, d_r^2, \underbrace{0, \dots, 0}_{q-r} \right) \mathbf{U}^\top.$$

Essas expressões deixam explícito que:

- $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$  possui  $p - r$  autovalores nulos;
- $\mathbf{A} \mathbf{A}^\top$  possui  $q - r$  autovalores nulos;
- as duas matrizes possuem os mesmos  $r$  autovalores positivos.

Para cada  $j = 1, \dots, r$ ,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_j = d_j^2 \mathbf{v}_j$$

e

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^\top \mathbf{u}_j = d_j^2 \mathbf{u}_j.$$

Assim, os valores singulares podem ser obtidos por

$$d_j = \sqrt{\lambda_j},$$

em que  $\lambda_j$  é um autovalor positivo de qualquer uma das duas matrizes de Gram.

As duas decomposições também identificam os espaços aos quais pertencem os vetores singulares:

$$\mathbf{v}_j \in \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) \subseteq \mathbb{R}^p$$

e

$$\mathbf{u}_j \in \mathcal{C}(\mathbf{A}) \subseteq \mathbb{R}^q.$$

Portanto,  $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$  descreve a estrutura espectral relevante no domínio, enquanto  $\mathbf{A} \mathbf{A}^\top$  descreve a estrutura correspondente no contradomínio. Os valores singulares positivos realizam a ligação entre esses dois espaços.

### 6.2.5 Exemplo de construção da SVD

**Exemplo 6.1** (Construção da SVD de uma matriz retangular). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

A matriz possui dimensão  $3 \times 2$ . Inicialmente,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^\top \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Essa é a mesma matriz utilizada como exemplo condutor no capítulo anterior. Seus autovalores são

$$\lambda_1 = 4 \quad \text{e} \quad \lambda_2 = 2.$$

Os valores singulares são as raízes quadradas não negativas:

$$d_1 = 2 \quad \text{e} \quad d_2 = \sqrt{2}.$$

Autovetores unitários associados são

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$\mathbf{V}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

O primeiro vetor singular à esquerda é



$$\begin{aligned}
\mathbf{u}_1 &= \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}_1}{d_1} \\
&= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

O segundo é

$$\begin{aligned}
\mathbf{u}_2 &= \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}_2}{d_2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbf{U}_2 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \\ 1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{D}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

A SVD compacta é

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_2 \mathbf{D}_2 \mathbf{V}_2^\top.$$

Como os dois valores singulares são positivos,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = 2.$$

Para construir a SVD completa, é necessário completar as colunas de  $\mathbf{U}_2$  com um vetor unitário ortogonal a  $\mathbf{u}_1$  e  $\mathbf{u}_2$ . Pode-se escolher

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Assim,

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Como  $\mathbf{V}_2$  já é uma matriz  $2 \times 2$  ortogonal,

$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_2.$$

A SVD completa é

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^\top.$$

Por outro lado,

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Seus autovalores são

$$4, \quad 2, \quad 0,$$

com autovetores unitários

$$\mathbf{u}_1, \quad \mathbf{u}_2, \quad \mathbf{u}_3,$$

respectivamente.

O exemplo mostra que:

- $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$  determina as direções singulares no espaço de origem  $\mathbb{R}^2$ ;
- $\mathbf{A} \mathbf{A}^\top$  determina as direções singulares no espaço de chegada  $\mathbb{R}^3$ ;
- os dois espaços são relacionados pelos mesmos valores singulares positivos.

### 6.2.6 Relação com a decomposição espectral de matrizes simétricas

Se  $\mathbf{A}$  é quadrada e simétrica, sua decomposição espectral é

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top.$$

Quando

$$\mathbf{A} \succeq 0,$$

todos os autovalores são não negativos. Nesse caso, pode-se escolher uma SVD na qual, após ordenar os autovalores,

$$\mathbf{U} = \mathbf{V} = \mathbf{Q}_\mathbf{A}$$

e

$$\mathbf{D} = \Lambda_\mathbf{A}.$$

Portanto, a SVD coincide com a decomposição espectral:

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top.$$

Se  $\mathbf{A}$  é simétrica, mas indefinida, os valores singulares são os módulos dos autovalores:

$$d_j = |\lambda_j|.$$

Para tornar essa relação explícita, defina

$$\text{sgn}_0(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ -1, & t < 0. \end{cases}$$

Então,

$$\lambda_j = \text{sgn}_0(\lambda_j)|\lambda_j|.$$

Após ordenar os autovalores por seus módulos, uma possível SVD é obtida tomando

$$\mathbf{V} = \mathbf{Q}_\mathbf{A},$$

$$\mathbf{D} = \text{diag}(|\lambda_1|, \dots, |\lambda_p|)$$

e

$$\mathbf{U} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \text{diag}(\text{sgn}_0(\lambda_1), \dots, \text{sgn}_0(\lambda_p)).$$

Dessa forma,

$$\mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^\top = \mathbf{Q}_\mathbf{A}\mathbf{\Lambda}_\mathbf{A}\mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top = \mathbf{A}.$$

A decomposição espectral preserva o sinal dos autovalores na matriz diagonal. A SVD mantém valores singulares não negativos e transfere as mudanças de orientação para uma das matrizes ortogonais.

Para matrizes não simétricas, autovalores e valores singulares representam objetos diferentes. Os autovalores descrevem direções invariantes de um operador quadrado. Os valores singulares descrevem fatores de escalonamento entre direções ortonormais do domínio e do contradomínio e permanecem definidos para matrizes retangulares.

### Construção teórica e cálculo numérico

A decomposição espectral de

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$$

fornece uma demonstração da existência da SVD e permite realizar cálculos manuais em exemplos pequenos.

Em aplicações numéricas, a SVD não costuma ser calculada formando explicitamente

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}.$$

Esse produto pode ampliar diferenças entre as magnitudes dos valores singulares e aumentar os efeitos de erros de arredondamento. Programas numéricos utilizam procedimentos específicos para calcular a SVD diretamente, com maior estabilidade.

A construção algébrica identifica os pares de direções associados pelos valores singulares. A interpretação geométrica mostra como a transformação leva a bola unitária do domínio a um elipsoide contido na imagem de  $\mathbf{A}$ , cujos semieixos são determinados pelos valores e vetores singulares. O comportamento da esfera unitária dependerá da existência ou não de direções pertencentes ao núcleo.

### 6.3 Interpretação geométrica da SVD

A SVD descreve uma transformação linear por meio de duas bases ortonormais e de um escalonamento entre elas. Para

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^\top,$$

a matriz  $\mathbf{V}^\top$  expressa os vetores nas coordenadas dos vetores singulares à direita,  $\mathbf{D}$  altera separadamente essas coordenadas e  $\mathbf{U}$  expressa o resultado nas direções singulares à esquerda.

Considere um vetor

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p.$$

Como as colunas de  $\mathbf{V}$  formam uma base ortonormal, ele pode ser escrito como

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \alpha_j \mathbf{v}_j,$$

em que

$$\alpha_j = \mathbf{v}_j^\top \mathbf{x}.$$

Aplicando  $\mathbf{A}$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{x} &= \sum_{j=1}^p \alpha_j \mathbf{A}\mathbf{v}_j \\ &= \sum_{j=1}^r d_j \alpha_j \mathbf{u}_j. \end{aligned}$$

As parcelas associadas aos vetores

$$\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_p$$

desaparecem porque pertencem ao núcleo de  $\mathbf{A}$ .

A transformação pode, portanto, ser interpretada por meio das correspondências

$$\mathbf{v}_j \mapsto d_j \mathbf{u}_j, \quad j = 1, \dots, r.$$

Cada vetor singular à direita determina uma direção no domínio. O valor singular correspondente determina o fator de escala, enquanto o vetor singular à esquerda determina a direção resultante no contradomínio.

### 6.3.1 Imagem da bola unitária

Considere a bola unitária de  $\mathbb{R}^p$ :

$$\mathcal{B}_p = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p : \|\mathbf{x}\| \leq 1\}.$$

A SVD permite descrever geometricamente sua imagem pela transformação  $\mathbf{A}$ .

**Proposição 6.1** (Imagem da bola unitária pela SVD). *Seja*

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top$$

*a SVD compacta de uma matriz de posto  $r \geq 1$ . A imagem da bola unitária por  $\mathbf{A}$  é o elipsoide sólido de dimensão  $r$ , contido em  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ ,*

$$\mathbf{A}(\mathcal{B}_p) = \left\{ \sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{u}_j : \sum_{j=1}^r \frac{\beta_j^2}{d_j^2} \leq 1 \right\}.$$

*As direções principais desse elipsoide são*

$$\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r,$$

*e os comprimentos de seus semieixos são*

$$d_1, \dots, d_r.$$

*Em particular,*

$$\mathbf{A}(\mathcal{B}_p) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

e a dimensão desse elipsoide é

$$\dim(\mathcal{C}(\mathbf{A})) = r.$$

No caso extremo  $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ , a imagem da bola unitária reduz-se ao conjunto  $\{\mathbf{0}\}$ .

*Comprovação.* Escreva

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^r \alpha_j \mathbf{v}_j + \mathbf{x}_0,$$

em que

$$\mathbf{x}_0 \in \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Como os vetores singulares à direita e o núcleo formam subespaços ortogonais,

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{j=1}^r \alpha_j^2 + \|\mathbf{x}_0\|^2.$$

Se  $\mathbf{x} \in \mathcal{B}_p$ , então

$$\sum_{j=1}^r \alpha_j^2 \leq 1.$$

Aplicando a transformação,

$$\mathbf{Ax} = \sum_{j=1}^r d_j \alpha_j \mathbf{u}_j.$$

Definindo

$$\beta_j = d_j \alpha_j,$$

obtém-se

$$\sum_{j=1}^r \frac{\beta_j^2}{d_j^2} = \sum_{j=1}^r \alpha_j^2 \leq 1.$$

Portanto, toda imagem de um vetor da bola unitária pertence ao elipsoide apresentado.

Reciprocamente, considere um vetor

$$\mathbf{y} = \sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{u}_j$$

que satisfaz

$$\sum_{j=1}^r \frac{\beta_j^2}{d_j^2} \leq 1.$$

Defina

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^r \frac{\beta_j}{d_j} \mathbf{v}_j.$$

Então,

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{j=1}^r \frac{\beta_j^2}{d_j^2} \leq 1,$$

de modo que  $\mathbf{x} \in \mathcal{B}_p$ . Além disso,

$$\mathbf{Ax} = \sum_{j=1}^r \beta_j \mathbf{u}_j = \mathbf{y}.$$

Logo, o conjunto apresentado coincide com a imagem da bola unitária. □

O comportamento da esfera unitária depende da existência de um núcleo não trivial.

Se  $\mathbf{A}$  possui posto coluna completo,

$$r = p,$$

então

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}.$$

Nesse caso, a imagem da esfera unitária



$$\mathcal{S}_{p-1} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p : \|\mathbf{x}\| = 1\}$$

é a fronteira relativa do elipsoide

$$\mathbf{A}(\mathcal{B}_p)$$

no subespaço  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ .

Por outro lado, se

$$r < p,$$

então

$$\dim(\mathcal{N}(\mathbf{A})) = p - r > 0.$$

Nesse caso, a imagem da esfera unitária coincide com a imagem da bola unitária:

$$\mathbf{A}(\mathcal{S}_{p-1}) = \mathbf{A}(\mathcal{B}_p).$$

De fato, para qualquer ponto do elipsoide cuja componente nas direções  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$  tenha norma menor que 1, pode-se acrescentar uma componente pertencente ao núcleo até obter um vetor de norma 1, sem alterar sua imagem por  $\mathbf{A}$ .

Finalmente, se

$$r < q,$$

o elipsoide não ocupa todo o espaço de chegada. Ele está contido no subespaço de dimensão  $r$

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\} \subset \mathbb{R}^q.$$

Assim, a geometria da imagem da bola revela simultaneamente os fatores de escala da transformação e a dimensão de sua imagem.

### 6.3.2 Alteração dos comprimentos

A expansão de  $\mathbf{x}$  na base dos vetores singulares fornece

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{j=1}^p \alpha_j^2.$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned}\|\mathbf{Ax}\|^2 &= \left\| \sum_{j=1}^r d_j \alpha_j \mathbf{u}_j \right\|^2 \\ &= \sum_{j=1}^r d_j^2 \alpha_j^2,\end{aligned}$$

pois os vetores

$$\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$$

são ortonormais.

Como

$$d_1 \geq d_j$$

para todo  $j$ ,

$$\begin{aligned}\|\mathbf{Ax}\|^2 &= \sum_{j=1}^r d_j^2 \alpha_j^2 \\ &\leq d_1^2 \sum_{j=1}^p \alpha_j^2 \\ &= d_1^2 \|\mathbf{x}\|^2.\end{aligned}$$

Portanto,

$$\|\mathbf{Ax}\| \leq d_1 \|\mathbf{x}\|.$$

A igualdade é atingida quando  $\mathbf{x}$  pertence ao subespaço singular à direita associado ao maior valor singular.

Em particular,

$$\max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\| = d_1.$$

O maior valor singular é o maior fator de ampliação produzido pela transformação.

Se  $\mathbf{A}$  possui posto coluna completo, então

$$r = p$$

e

$$d_p > 0.$$

Nesse caso,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{Ax}\|^2 &= \sum_{j=1}^p d_j^2 \alpha_j^2 \\ &\geq d_p^2 \sum_{j=1}^p \alpha_j^2 \\ &= d_p^2 \|\mathbf{x}\|^2. \end{aligned}$$

Logo,

$$\|\mathbf{Ax}\| \geq d_p \|\mathbf{x}\|$$

e

$$\min_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\| = d_p.$$

Se  $\mathbf{A}$  não possui posto coluna completo, existe um vetor unitário no núcleo. Nesse caso,

$$\min_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\| = 0.$$

Esses extremos serão retomados na definição da norma espectral e do número de condição.

### 6.3.3 Exemplo geométrico no plano

**Exemplo 6.2** (Transformação da circunferência unitária em uma elipse). Considere a matriz não simétrica

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Sua SVD pode ser escrita como

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^\top,$$

com valores singulares aproximadamente iguais a

$$d_1 \approx 2,288$$

e

$$d_2 \approx 0,874.$$

A circunferência unitária pode ser parametrizada por

$$\mathbf{x}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Sua imagem é

$$\mathbf{y}(\theta) = \mathbf{A}\mathbf{x}(\theta).$$

A SVD mostra que essa imagem é uma elipse com:

- semieixo maior de comprimento  $d_1$  na direção  $\mathbf{u}_1$ ;
- semieixo menor de comprimento  $d_2$  na direção  $\mathbf{u}_2$ .

No domínio, as direções correspondentes são  $\mathbf{v}_1$  e  $\mathbf{v}_2$ .




Figura 6.1: A SVD transforma as direções singulares à direita nos semieixos da elipse orientados pelos vetores singulares à esquerda.

A Figura 6.1 mostra as direções singulares no domínio e no contradomínio. No primeiro painel,  $\mathbf{v}_1$  e  $\mathbf{v}_2$  formam uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^2$  e identificam duas direções sobre a circunferência unitária. No segundo, essas direções são transformadas em  $d_1\mathbf{u}_1$  e  $d_2\mathbf{u}_2$ , que determinam os semieixos da elipse.

Neste exemplo, as bases singulares do domínio e do contradomínio são distintas. A matriz  $\mathbf{V}^\top$  expressa os pontos da circunferência nas coordenadas da base formada por  $\mathbf{v}_1$  e  $\mathbf{v}_2$ . Como essa transformação é ortogonal, a circunferência permanece uma circunferência. Em seguida,  $\mathbf{D}$  realiza a deformação, multiplicando os comprimentos nas duas direções por  $d_1$  e  $d_2$ . Finalmente,  $\mathbf{U}$  orienta os semieixos da elipse nas direções  $\mathbf{u}_1$  e  $\mathbf{u}_2$  no espaço de chegada.

### 6.3.4 Transformações com núcleo não trivial

Quando

$$r < p,$$

a transformação possui núcleo não trivial e elimina  $p - r$  direções linearmente independentes do domínio.

Por exemplo, considere

$$\mathbf{A}_0 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Seus valores singulares são

$$d_1 = 2 \quad \text{e} \quad d_2 = 0.$$

A bola unitária é transformada no segmento

$$\left\{ \begin{bmatrix} y_1 \\ 0 \end{bmatrix} : -2 \leq y_1 \leq 2 \right\}.$$

A direção correspondente ao valor singular nulo pertence ao núcleo. O elipsoide resultante é degenerado e possui dimensão inferior à dimensão do domínio.

De modo geral:

- cada valor singular positivo produz um semieixo não nulo da imagem;
- existem exatamente  $r$  semieixos não nulos;
- o núcleo possui dimensão  $p - r$  e reúne as direções eliminadas pela transformação;
- a dimensão do elipsoide resultante é  $r$ ;
- o elipsoide está contido em  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ .

A descrição geométrica da SVD também identifica bases ortonormais dos quatro espaços fundamentais associados à matriz. Essas relações permitem interpretar posto, núcleo, projetores, normas e condicionamento diretamente a partir dos vetores e valores singulares.

## 6.4 Espaços fundamentais, posto, normas e condicionamento

A SVD fornece bases ortonormais para os quatro espaços fundamentais associados a uma matriz. Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

com posto

$$r = \text{posto}(\mathbf{A})$$

e SVD compacta

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top.$$

As colunas de

$$\mathbf{U}_r \in \mathbb{R}^{q \times r}$$

são os vetores singulares à esquerda associados aos valores singulares positivos. As colunas de

$$\mathbf{V}_r \in \mathbb{R}^{p \times r}$$

são os vetores singulares à direita correspondentes.

Complete essas matrizes com bases ortonormais dos respectivos complementos:

$$\mathbf{U} = [\mathbf{U}_r \quad \mathbf{U}_0]$$

e

$$\mathbf{V} = [\mathbf{V}_r \quad \mathbf{V}_0],$$

em que

$$\mathbf{U}_0 \in \mathbb{R}^{q \times (q-r)}$$

e

$$\mathbf{V}_0 \in \mathbb{R}^{p \times (p-r)}.$$

Quando  $r = q$ , a matriz  $\mathbf{U}_0$  não possui colunas. Quando  $r = p$ , o mesmo ocorre com  $\mathbf{V}_0$ .

### 6.4.1 Espaço coluna e espaço linha

**Proposição 6.2** (Espaços fundamentais determinados pela SVD). *Se*

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top$$

*é a SVD compacta de uma matriz de posto  $r$ , então*

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\} = \mathcal{C}(\mathbf{U}_r),$$

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\} = \mathcal{C}(\mathbf{V}_r),$$

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \text{span}\{\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_p\} = \mathcal{C}(\mathbf{V}_0),$$

*e*

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \text{span}\{\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_q\} = \mathcal{C}(\mathbf{U}_0).$$

(Golub; Van Loan, 2013)

*Comprovação.* Pela SVD compacta,

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top \mathbf{x}$$

para todo  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ . Logo, toda imagem de  $\mathbf{A}$  é uma combinação linear das colunas de  $\mathbf{U}_r$ :

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{U}_r).$$

Reciprocamente, para cada  $j = 1, \dots, r$ ,

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_j = d_j \mathbf{u}_j.$$

Como  $d_j > 0$ ,

$$\mathbf{u}_j = \mathbf{A} \left( \frac{1}{d_j} \mathbf{v}_j \right).$$

Portanto,



$$\mathbf{u}_j \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

e

$$\mathcal{C}(\mathbf{U}_r) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Assim,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{U}_r).$$

Aplicando o mesmo argumento a

$$\mathbf{A}^\top = \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r \mathbf{U}_r^\top,$$

obtém-se

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{V}_r).$$

Considere agora a base ortonormal completa

$$\mathbf{V} = [\mathbf{V}_r \quad \mathbf{V}_0].$$

Todo vetor  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$  possui uma decomposição única da forma

$$\mathbf{x} = \mathbf{V}_r \alpha + \mathbf{V}_0 \beta.$$

Aplicando  $\mathbf{A}$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{Ax} &= \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top (\mathbf{V}_r \alpha + \mathbf{V}_0 \beta) \\ &= \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \alpha, \end{aligned}$$

pois

$$\mathbf{V}_r^\top \mathbf{V}_r = \mathbf{I}_r$$

e

$$\mathbf{V}_r^\top \mathbf{V}_0 = \mathbf{0}.$$

Como  $\mathbf{D}_r$  é invertível,

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

se, e somente se,

$$\alpha = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

se, e somente se,

$$\mathbf{x} = \mathbf{V}_0\beta.$$

Portanto,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathcal{C}(\mathbf{V}_0).$$

Aplicando o mesmo raciocínio a  $\mathbf{A}^\top$ ,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{U}_0).$$

Assim, a SVD completa fornece bases ortonormais simultaneamente para os quatro espaços fundamentais de  $\mathbf{A}$ .  $\square$

As quatro bases fornecidas pela SVD podem ser organizadas como na Tabela 6.3.

Tabela 6.3: Espaços fundamentais e bases ortonormais fornecidas pela SVD.

| Espaço                                              | Subespaço de   | Base ortonormal<br>fornecida pela SVD | Dimensão |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|
| Espaço coluna $\mathcal{C}(\mathbf{A})$             | $\mathbb{R}^q$ | Colunas de $\mathbf{U}_r$             | $r$      |
| Núcleo à esquerda<br>$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ | $\mathbb{R}^q$ | Colunas de $\mathbf{U}_0$             | $q - r$  |
| Espaço linha $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$         | $\mathbb{R}^p$ | Colunas de $\mathbf{V}_r$             | $r$      |
| Núcleo $\mathcal{N}(\mathbf{A})$                    | $\mathbb{R}^p$ | Colunas de $\mathbf{V}_0$             | $p - r$  |

A SVD torna explícitas as decomposições ortogonais

$$\mathbb{R}^q = \mathcal{C}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$$

e

$$\mathbb{R}^p = \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

O símbolo  $\oplus$  indica uma soma direta ortogonal.

Todo vetor

$$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^q$$

pode ser escrito de maneira única como

$$\mathbf{y} = \mathbf{y}_{\mathcal{C}} + \mathbf{y}_{\mathcal{N}},$$

com

$$\mathbf{y}_{\mathcal{C}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$$

e

$$\mathbf{y}_{\mathcal{N}} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

De modo análogo, todo vetor

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$$

se decompõe em uma parcela no espaço linha e outra no núcleo de  $\mathbf{A}$ .

### 6.4.2 Projetores ortogonais

No Capítulo 3, vimos que uma matriz com colunas ortonormais determina o projetor ortogonal sobre o subespaço gerado por essas colunas. Aplicando esse resultado às bases fornecidas pela SVD, obtêm-se diretamente os projetores dos quatro espaços fundamentais.

Como as colunas de  $\mathbf{U}_r$  são ortonormais, a matriz

$$\mathbf{P}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})} = \mathbf{U}_r \mathbf{U}_r^\top$$

é o projetor ortogonal sobre o espaço coluna de  $\mathbf{A}$ .

O projetor sobre o núcleo à esquerda é

$$\mathbf{P}_{\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)} = \mathbf{U}_0 \mathbf{U}_0^\top.$$

Como

$$\mathbf{U} = [\mathbf{U}_r \quad \mathbf{U}_0]$$

é ortogonal,

$$\mathbf{U}_r \mathbf{U}_r^\top + \mathbf{U}_0 \mathbf{U}_0^\top = \mathbf{I}_q.$$

Portanto,

$$\mathbf{P}_{\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)} = \mathbf{I}_q - \mathbf{U}_r \mathbf{U}_r^\top.$$

No espaço de origem,

$$\mathbf{P}_{\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)} = \mathbf{V}_r \mathbf{V}_r^\top$$

é o projetor sobre o espaço linha, enquanto

$$\mathbf{P}_{\mathcal{N}(\mathbf{A})} = \mathbf{V}_0 \mathbf{V}_0^\top = \mathbf{I}_p - \mathbf{V}_r \mathbf{V}_r^\top$$

projeta sobre o núcleo.

As matrizes

$$\mathbf{U}_r \mathbf{U}_r^\top$$

e

$$\mathbf{V}_r \mathbf{V}_r^\top$$

são simétricas e idempotentes, conforme as propriedades dos projetores ortogonais estudadas anteriormente.

**Exemplo 6.3** (Espaços fundamentais do exemplo condutor). Considere novamente

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Sua SVD completa foi construída com

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Os vetores singulares à direita são

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Como os dois valores singulares são positivos,

$$r = 2.$$

Assim,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\},$$

e

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \text{span}\{\mathbf{u}_3\}.$$

A matriz possui posto coluna completo, pois

$$r = p = 2.$$

Consequentemente,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$$

e

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) = \mathbb{R}^2.$$

O projetor sobre o espaço coluna é

$$\begin{aligned}\mathbf{U}_2\mathbf{U}_2^\top &= \mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^\top + \mathbf{u}_2\mathbf{u}_2^\top \\ &= \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

O projetor sobre o núcleo à esquerda é

$$\mathbf{u}_3\mathbf{u}_3^\top = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

A soma dos dois projetores é

$$\mathbf{U}_2\mathbf{U}_2^\top + \mathbf{u}_3\mathbf{u}_3^\top = \mathbf{I}_3.$$

### 6.4.3 Posto e nulidades

A quantidade de valores singulares positivos é igual ao posto:

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = r.$$

Essa igualdade também pode ser observada a partir da SVD compacta. As matrizes

$$\mathbf{U}_r \quad \text{e} \quad \mathbf{V}_r$$

possuem posto coluna  $r$ , e

$$\mathbf{D}_r$$

é diagonal e invertível. Portanto,

$$\text{posto}(\mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top) = r.$$

Pelo Teorema Posto–Nulidade,

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = p - r$$

e

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = q - r.$$

A SVD completa também explicita as direções que não participam da ação não nula da transformação.

No domínio,

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = p - r,$$

de modo que existem  $p - r$  direções linearmente independentes eliminadas por  $\mathbf{A}$ .

No contradomínio,

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = q - r,$$

de modo que existem  $q - r$  direções ortogonais à imagem de  $\mathbf{A}$ .

Quando essas direções aparecem como posições diagonais adicionais na SVD completa, elas estão associadas a entradas nulas de  $\mathbf{D}$ . Para matrizes retangulares, porém, a dimensão dos núcleos deve ser interpretada a partir de  $p - r$  e  $q - r$ , e não apenas pela contagem dos valores singulares positivos usualmente listados.

#### 6.4.4 Produto interno de Frobenius

O estudo das aproximações matriciais exige uma geometria para o espaço das matrizes.

**Definição 6.4** (Produto interno de Frobenius). Para matrizes

$$\mathbf{A}, \tilde{\mathbf{A}} \in \mathbb{R}^{q \times p},$$

o **produto interno de Frobenius** é

$$\langle \mathbf{A}, \tilde{\mathbf{A}} \rangle_F = \text{tr} \left( \mathbf{A}^\top \tilde{\mathbf{A}} \right).$$

Equivalentemente,

$$\langle \mathbf{A}, \tilde{\mathbf{A}} \rangle_F = \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^p a_{ij} \tilde{a}_{ij}.$$

O produto interno de Frobenius trata uma matriz como um vetor formado por todos os seus elementos. Duas matrizes são ortogonais segundo esse produto quando

$$\langle \mathbf{A}, \tilde{\mathbf{A}} \rangle_F = 0.$$

A norma induzida por esse produto interno é a norma de Frobenius.

**Definição 6.5** (Norma de Frobenius). A **norma de Frobenius** de

$$\mathbf{A} = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

é

$$\|\mathbf{A}\|_F = \sqrt{\langle \mathbf{A}, \mathbf{A} \rangle_F}.$$

Equivalentemente,



$$\|\mathbf{A}\|_F = \sqrt{\text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})}$$

ou

$$\|\mathbf{A}\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^p a_{ij}^2}.$$

A norma de Frobenius mede a magnitude quadrática total dos elementos da matriz.

### 6.4.5 Normas e valores singulares

**Definição 6.6** (Norma espectral). A **norma espectral**, ou norma matricial induzida pela norma euclidiana, é

$$\|\mathbf{A}\|_2 = \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|}.$$

Equivalentemente,

$$\|\mathbf{A}\|_2 = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|.$$

A interpretação geométrica anterior mostra que a norma espectral é o maior fator de ampliação produzido pela transformação.

**Proposição 6.3** (Normas matriciais e valores singulares). *Se*

$$d_1 \geq \dots \geq d_r > 0$$

*são os valores singulares positivos de  $\mathbf{A}$ , então*

$$\|\mathbf{A}\|_2 = d_1$$

*e*

$$\|\mathbf{A}\|_F^2 = \sum_{j=1}^r d_j^2.$$

(Golub; Van Loan, 2013)

*Comprovação.* Para a norma espectral, escreva

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \alpha_j \mathbf{v}_j.$$

Então,

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{j=1}^p \alpha_j^2$$

e

$$\|\mathbf{Ax}\|^2 = \sum_{j=1}^r d_j^2 \alpha_j^2.$$

Como  $d_j \leq d_1$ ,

$$\|\mathbf{Ax}\|^2 \leq d_1^2 \|\mathbf{x}\|^2.$$

Logo,

$$\frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq d_1.$$

Tomando

$$\mathbf{x} = \mathbf{v}_1,$$

obtém-se

$$\|\mathbf{Av}_1\| = d_1.$$

Portanto,

$$\|\mathbf{A}\|_2 = d_1.$$

Para a norma de Frobenius,

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{A}\|_F^2 &= \text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) \\
&= \text{tr}(\mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^2 \mathbf{V}_r^\top) \\
&= \text{tr}(\mathbf{D}_r^2 \mathbf{V}_r^\top \mathbf{V}_r) \\
&= \text{tr}(\mathbf{D}_r^2) \\
&= \sum_{j=1}^r d_j^2.
\end{aligned}$$

□

Se  $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ , então não há valores singulares positivos e, diretamente pelas definições,

$$\|\mathbf{A}\|_2 = \|\mathbf{A}\|_F = 0.$$

As duas normas medem aspectos diferentes:

- $\|\mathbf{A}\|_2$  depende somente do maior valor singular e representa o maior fator de ampliação;
- $\|\mathbf{A}\|_F$  reúne as contribuições quadráticas de todos os valores singulares.

Para qualquer matriz,

$$\|\mathbf{A}\|_2 \leq \|\mathbf{A}\|_F \leq \sqrt{r} \|\mathbf{A}\|_2.$$

A primeira desigualdade decorre de

$$d_1^2 \leq \sum_{j=1}^r d_j^2.$$

A segunda decorre de

$$\sum_{j=1}^r d_j^2 \leq r d_1^2.$$

### 6.4.6 Invariância ortogonal

As normas espectral e de Frobenius são preservadas por multiplicações ortogonais.

**Proposição 6.4** (Invariância ortogonal das normas). *Se  $\mathbf{Q}_1$  e  $\mathbf{Q}_2$  são matrizes ortogonais de dimensões compatíveis, então*

$$\|\mathbf{Q}_1 \mathbf{A} \mathbf{Q}_2\|_2 = \|\mathbf{A}\|_2$$

e

$$\|\mathbf{Q}_1 \mathbf{A} \mathbf{Q}_2\|_F = \|\mathbf{A}\|_F.$$

(Golub; Van Loan, 2013)

*Comprovação.* Para a norma espectral, como  $\mathbf{Q}_1$  preserva normas,

$$\|\mathbf{Q}_1 \mathbf{A} \mathbf{Q}_2 \mathbf{x}\| = \|\mathbf{A} \mathbf{Q}_2 \mathbf{x}\|.$$

Como  $\mathbf{Q}_2$  é ortogonal, a transformação

$$\mathbf{z} = \mathbf{Q}_2 \mathbf{x}$$

preserva a norma e percorre todos os vetores unitários quando  $\mathbf{x}$  percorre a esfera unitária. Portanto,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{Q}_1 \mathbf{A} \mathbf{Q}_2\|_2 &= \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{A} \mathbf{Q}_2 \mathbf{x}\| \\ &= \max_{\|\mathbf{z}\|=1} \|\mathbf{A} \mathbf{z}\| \\ &= \|\mathbf{A}\|_2. \end{aligned}$$

Para a norma de Frobenius,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{Q}_1 \mathbf{A} \mathbf{Q}_2\|_F^2 &= \text{tr} \left[ (\mathbf{Q}_1 \mathbf{A} \mathbf{Q}_2)^\top (\mathbf{Q}_1 \mathbf{A} \mathbf{Q}_2) \right] \\ &= \text{tr} (\mathbf{Q}_2^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{Q}_2) \\ &= \text{tr} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{Q}_2 \mathbf{Q}_2^\top) \\ &= \text{tr} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) \\ &= \|\mathbf{A}\|_F^2. \end{aligned}$$

Logo, ambas as normas são invariantes sob multiplicações ortogonais. □

A SVD pode, portanto, ser interpretada como uma representação que remove fatores ortogonais sem alterar essas normas:

$$\|\mathbf{A}\|_2 = \|\mathbf{D}\|_2$$

e

$$\|\mathbf{A}\|_F = \|\mathbf{D}\|_F.$$

### 6.4.7 Determinante e invertibilidade

Quando

$$q = p,$$

a matriz  $\mathbf{A}$  é quadrada. Pela SVD,

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{U}) \det(\mathbf{D}) \det(\mathbf{V}^\top).$$

Como  $\mathbf{U}$  e  $\mathbf{V}$  são ortogonais,

$$|\det(\mathbf{U})| = |\det(\mathbf{V})| = 1.$$

Portanto,

$$|\det(\mathbf{A})| = \prod_{j=1}^p d_j.$$

O módulo do determinante é o produto dos valores singulares.

Além disso,

$$\mathbf{A} \text{ é invertível} \iff d_j > 0 \text{ para todo } j.$$

Nesse caso,

$$r = p$$

e a SVD compacta coincide, em dimensão, com a SVD completa.

### 6.4.8 Menor valor singular

Se  $\mathbf{A}$  possui posto coluna completo, isto é,

$$r = p \leq q,$$

seu menor valor singular é

$$d_p > 0.$$

Ele possui a caracterização

$$d_p = \min_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|.$$

Portanto,  $d_p$  mede o menor fator de alteração do comprimento entre os vetores unitários do domínio.

Se

$$d_p$$

é pequeno, existe uma direção unitária cuja imagem possui comprimento pequeno. Nessa direção, a transformação aproxima-se de um colapso.

Se a matriz não possui posto coluna completo, existe um vetor unitário no núcleo e

$$\min_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\| = 0.$$

### 6.4.9 Número de condição

Defina

$$s = \min(q, p).$$

**Definição 6.7** (Número de condição na norma espectral). Se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) = s,$$

o número de condição espectral é

$$\kappa_2(\mathbf{A}) = \frac{d_1}{d_s}.$$

Se

$$\text{posto}(\mathbf{A}) < s,$$

define-se

$$\kappa_2(\mathbf{A}) = \infty.$$

É importante distinguir **núcleo não trivial**, **deficiência de posto** e **mau condicionamento**.

Uma matriz possui núcleo não trivial quando

$$r < p.$$

Isso ocorre necessariamente, por exemplo, em qualquer matriz larga de posto linha completo,

$$q < p \quad \text{e} \quad r = q.$$

Nesse caso, a matriz possui o maior posto possível para suas dimensões e, portanto, não é deficiente em posto segundo o critério

$$r < \min(q, p).$$

Ainda assim, ela possui um núcleo de dimensão

$$p - q.$$

Por outro lado, uma matriz de posto máximo pode ser mal condicionada quando seu menor valor singular positivo é muito pequeno em relação ao maior. Assim,

$$r = \min(q, p)$$

não implica necessariamente bom condicionamento.

A deficiência de posto corresponde a

$$r < \min(q, p),$$

enquanto o mau condicionamento, no caso de posto máximo, corresponde a uma razão

$$\frac{d_1}{d_s}$$

elevada.

Quando  $\mathbf{A}$  possui posto máximo,  $d_s$  é o menor valor singular positivo.

Se

$$q \geq p$$

e

$$r = p,$$

a matriz possui posto coluna completo. Nesse caso,

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\},$$

e

$$d_p = \min_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\|.$$

O número de condição compara diretamente os fatores máximo e mínimo de alteração dos comprimentos no domínio inteiro.

Se

$$q < p$$

e



$$r = q,$$

a matriz possui posto linha completo, mas

$$\dim \mathcal{N}(\mathbf{A}) = p - q.$$

Existem, portanto, direções eliminadas pela transformação.

Nesse caso, a transformação não possui inversa no domínio inteiro, pois há direções pertencentes ao núcleo. Entretanto, sua restrição ao espaço linha

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{N}(\mathbf{A})^\perp$$

é injetiva. O número de condição finito descreve a variação dos fatores de escala nessa parte ativa do domínio. Nesse subespaço,

$$d_q = \min_{\substack{\|\mathbf{x}\|=1 \\ \mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)}} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|.$$

Para uma matriz quadrada invertível,

$$r = p = q$$

e

$$\kappa_2(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|_2 \|\mathbf{A}^{-1}\|_2.$$

De fato,

$$\|\mathbf{A}\|_2 = d_1,$$

e os valores singulares de  $\mathbf{A}^{-1}$  são

$$\frac{1}{d_p}, \dots, \frac{1}{d_1}.$$

Logo,

$$\|\mathbf{A}^{-1}\|_2 = \frac{1}{d_p}$$

e

$$\kappa_2(\mathbf{A}) = \frac{d_1}{d_p}.$$

A interpretação do número de condição deve considerar somente as direções associadas aos valores singulares positivos.

- Quando  $\kappa_2(\mathbf{A}) \approx 1$ , essas direções são transformadas por fatores semelhantes.
- Quando  $\kappa_2(\mathbf{A})$  é elevado, algumas direções ativas são preservadas ou ampliadas, enquanto outras são fortemente contraídas.
- Quando  $\kappa_2(\mathbf{A}) = \infty$ , a matriz não possui posto máximo, isto é,  $r < \min(q, p)$ .

Nesse caso, pelo menos uma direção que poderia participar da ação não nula da matriz é também eliminada.

Uma matriz de posto máximo com número de condição elevado é denominada **mal condicionada**. Ela pode possuir o maior posto possível para suas dimensões e, ainda assim, apresentar forte sensibilidade à solução de problemas inversos ou de sistemas lineares associados.

Valores singulares positivos muito pequenos amplificam erros quando se tenta inverter a transformação em seu subespaço ativo. Esse efeito será retomado na seção sobre pseudoinversa e mínimos quadrados.

**Exemplo 6.4** (Comparação entre duas transformações). Considere

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0,02 \end{bmatrix}.$$

Os valores singulares de  $\mathbf{A}_1$  são

$$2 \quad \text{e} \quad 2.$$

Portanto,

$$\kappa_2(\mathbf{A}_1) = 1.$$

A matriz amplia todas as direções pelo mesmo fator.

Para  $\mathbf{A}_2$ , os valores singulares são

$$2 \quad \text{e} \quad 0,02.$$

Logo,

$$\kappa_2(\mathbf{A}_2) = \frac{2}{0,02} = 100.$$

A primeira direção é ampliada por 2, enquanto a segunda é contraída por 0,02. A inversão exigiria multiplicar essa segunda componente por

$$\frac{1}{0,02} = 50.$$

Consequentemente, pequenas perturbações nessa direção podem produzir alterações acentuadas na solução invertida.

#### 6.4.10 Posto exato e posto numérico

Matematicamente, o posto é o número de valores singulares estritamente positivos:

$$r = \# \{j : d_j > 0\}.$$

Em cálculos numéricos, resultados teoricamente nulos podem aparecer como números positivos muito pequenos devido a arredondamentos, ruído ou aproximações computacionais.

Por isso, programas numéricos utilizam uma tolerância  $\tau$  e tratam como efetivamente nulos os valores singulares que satisfazem

$$d_j \leq \tau.$$

O número de valores singulares acima da tolerância é denominado **posto numérico**.

A tolerância não é uma propriedade puramente algébrica da matriz. Ela depende de:

- precisão numérica;
- escala dos dados;
- dimensões da matriz;
- finalidade da análise;
- nível de ruído considerado relevante.

Essa distinção será útil nas aproximações de posto reduzido. Nessas aproximações, valores singulares pequenos podem ser descartados deliberadamente, mesmo quando são matematicamente positivos.

A SVD fornece, assim, uma descrição integrada da estrutura da matriz:

$$\begin{aligned}
 \text{posto} &\leftrightarrow \text{número de valores singulares positivos,} \\
 \text{imagem} &\leftrightarrow \text{vetores singulares à esquerda associados a } d_j > 0, \\
 \text{espaço linha} &\leftrightarrow \text{vetores singulares à direita associados a } d_j > 0, \\
 \text{núcleo} &\leftrightarrow \text{direções do domínio eliminadas por } \mathbf{A}, \\
 \text{ampliação máxima} &\leftrightarrow d_1, \\
 \text{menor fator positivo de escala} &\leftrightarrow d_r, \\
 \text{condicionamento, se } r = s &\leftrightarrow d_1/d_s, \quad s = \min(q, p).
 \end{aligned}$$

Se  $r < p$ , a menor norma de  $\mathbf{A}\mathbf{x}$  entre todos os vetores unitários do domínio é zero, pois existem vetores unitários no núcleo. O valor  $d_r$  descreve o menor fator **positivo** de escala, isto é, a menor ação da transformação quando restrita ao espaço linha  $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ .

Quando a matriz representa um conjunto de dados, as bases à esquerda e à direita descrevem, respectivamente, estruturas nos espaços das observações e das variáveis.

## 6.5 SVD de uma matriz de dados

Considere uma matriz de dados

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

em que as linhas representam  $n$  observações e as colunas representam  $p$  variáveis.

Se

$$r = \text{posto}(\mathbf{X}),$$

a SVD compacta é

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top,$$

com

$$\mathbf{U}_r \in \mathbb{R}^{n \times r}, \quad \mathbf{D}_r \in \mathbb{R}^{r \times r}$$

e

$$\mathbf{V}_r \in \mathbb{R}^{p \times r}.$$

Nesse contexto, a SVD recupera a dupla representação da matriz de dados introduzida no Capítulo 1:

- as colunas de  $\mathbf{V}_r$  pertencem a  $\mathbb{R}^p$  e determinam direções no espaço em que as observações são representadas;
- as colunas de  $\mathbf{U}_r$  pertencem a  $\mathbb{R}^n$  e determinam direções no espaço em que as variáveis são representadas.

Os mesmos valores singulares conectam essas duas representações.

### 6.5.1 Coordenadas das observações nas direções singulares à direita

Multiplicando a SVD à direita por  $\mathbf{V}_r$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{XV}_r &= \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top \mathbf{V}_r \\ &= \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r. \end{aligned}$$

Defina

$$\mathbf{Z} = \mathbf{XV}_r.$$

Então,

$$\mathbf{Z} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r.$$

A matriz

$$\mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{n \times r}$$

contém as coordenadas das observações na base ortonormal

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$$

do espaço linha

$$\mathcal{C}(\mathbf{X}^\top) \subseteq \mathbb{R}^p.$$

Como cada vetor associado a uma linha de  $\mathbf{X}$  pertence a esse subespaço, essas  $r$  coordenadas são suficientes para representar exatamente todas as observações.

Sua  $j$ -ésima coluna é

$$\mathbf{z}_j = \mathbf{X}\mathbf{v}_j = d_j\mathbf{u}_j.$$

Portanto, para cada direção  $\mathbf{v}_j$  no espaço das variáveis, a multiplicação

$$\mathbf{X}\mathbf{v}_j$$

produz um vetor de  $n$  coordenadas, uma para cada observação.

Se a linha  $i$  de  $\mathbf{X}$  é

$$\mathbf{x}_i^\top,$$

então o elemento  $z_{ij}$  é

$$z_{ij} = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{v}_j.$$

Assim,  $z_{ij}$  é a projeção da observação  $i$  sobre a direção  $\mathbf{v}_j$ .

Como

$$\mathbf{z}_j = d_j\mathbf{u}_j,$$

o vetor singular à esquerda fornece a direção das coordenadas entre as observações, enquanto o valor singular determina sua magnitude.

### 6.5.2 Coordenadas das variáveis nas direções singulares à esquerda

A relação dual pode ser escrita transpondo a identidade anterior:

$$\mathbf{U}_r^\top \mathbf{X} = \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top.$$

Defina

$$\mathbf{W} = \mathbf{U}_r^\top \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{r \times p}.$$

A  $j$ -ésima coluna de  $\mathbf{W}$  contém as coordenadas da variável

$$\mathbf{x}_{\cdot j} \in \mathbb{R}^n$$

na base ortonormal

$$\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$$

do espaço coluna

$$\mathcal{C}(\mathbf{X}) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Para a direção singular  $\ell$ ,

$$\mathbf{u}_\ell^\top \mathbf{x}_{\cdot j} = d_\ell v_{j\ell}.$$

Assim, os elementos de  $\mathbf{V}_r$ , após o escalonamento pelos valores singulares, também descrevem as coordenadas das variáveis na base singular à esquerda.

Equivalentemente, transpondo a relação,

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{U}_r = \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r.$$

As duas relações

$$\mathbf{X} \mathbf{V}_r = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r$$

e

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{U}_r = \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r$$

expressam a dualidade entre os espaços das observações e das variáveis.

**Proposição 6.5** (Dualidade entre observações e variáveis). *Se*

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top$$

*é a SVD compacta de uma matriz de dados, então, para cada  $j = 1, \dots, r$ ,*

$$\mathbf{X} \mathbf{v}_j = d_j \mathbf{u}_j$$

*e*

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{u}_j = d_j \mathbf{v}_j.$$

*Portanto, o mesmo valor singular  $d_j$  relaciona uma direção  $\mathbf{v}_j$  no espaço das variáveis a uma direção  $\mathbf{u}_j$  no espaço das representações das variáveis em  $\mathbb{R}^n$ . Essa correspondência constitui a dualidade singular entre os espaços associados às linhas e às colunas da matriz de dados.*

### 6.5.3 Matrizes de Gram

As duas matrizes de Gram associadas a  $\mathbf{X}$  descrevem produtos internos entre objetos diferentes:

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

reúne os produtos internos entre as colunas, isto é, entre as variáveis representadas como vetores de  $\mathbb{R}^n$ , enquanto

$$\mathbf{X} \mathbf{X}^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

reúne os produtos internos entre as linhas, isto é, entre as observações representadas como vetores de  $\mathbb{R}^p$ .

A matriz

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

é a matriz de produtos cruzados entre as variáveis. Pela SVD,



$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} = \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^2 \mathbf{V}_r^\top.$$

A matriz

$$\mathbf{X}\mathbf{X}^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

é a matriz de Gram entre as observações:

$$\mathbf{X}\mathbf{X}^\top = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r^2 \mathbf{U}_r^\top.$$

As duas matrizes possuem os mesmos autovalores positivos:

$$d_1^2, \dots, d_r^2.$$

Entretanto, seus autovetores pertencem a espaços diferentes:

- $\mathbf{v}_j \in \mathbb{R}^p$  descreve uma direção entre as variáveis;
- $\mathbf{u}_j \in \mathbb{R}^n$  descreve uma direção entre as observações.

Essa relação permite escolher a menor das duas matrizes para determinadas análises teóricas. Quando

$$n \gg p,$$

a matriz

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$$

possui ordem menor. Quando

$$p \gg n,$$

a matriz

$$\mathbf{X}\mathbf{X}^\top$$

pode fornecer uma representação de menor dimensão.

Essa observação não altera a SVD: as duas matrizes compartilham os mesmos valores singulares positivos e representam lados complementares da mesma estrutura.

#### 6.5.4 Reconstrução das observações

A SVD compacta pode ser escrita como

$$\mathbf{X} = (\mathbf{X}\mathbf{V}_r) \mathbf{V}_r^\top.$$

Como

$$\mathbf{Z} = \mathbf{X}\mathbf{V}_r,$$

tem-se

$$\mathbf{X} = \mathbf{Z}\mathbf{V}_r^\top.$$

A matriz  $\mathbf{Z}$  contém as coordenadas das observações na base ortonormal formada pelas colunas de  $\mathbf{V}_r$  para o espaço linha de  $\mathbf{X}$ . A multiplicação por  $\mathbf{V}_r^\top$  reconstrói exatamente as observações em  $\mathbb{R}^p$ .

Para a observação  $i$ ,

$$\mathbf{x}_i = \sum_{j=1}^r z_{ij} \mathbf{V}_j.$$

Portanto, todas as observações pertencem ao subespaço

$$\mathcal{C}(\mathbf{V}_r) \subseteq \mathbb{R}^p.$$

Se

$$r < p,$$

a nuvem de observações está contida em um subespaço próprio de  $\mathbb{R}^p$ . Equivalentemente, as  $p$  colunas da matriz de dados são linearmente dependentes, de modo que a matriz observada possui uma representação exata utilizando apenas  $r$  direções.

### 6.5.5 Preservação de produtos internos

Como

$$\mathbf{Z} = \mathbf{X}\mathbf{V}_r,$$

tem-se

$$\mathbf{Z}\mathbf{Z}^\top = \mathbf{X}\mathbf{V}_r\mathbf{V}_r^\top\mathbf{X}^\top.$$

Como todas as linhas de  $\mathbf{X}$  pertencem ao espaço linha

$$\mathcal{C}(\mathbf{V}_r),$$

vale

$$\mathbf{X}\mathbf{V}_r\mathbf{V}_r^\top = \mathbf{X}.$$

Logo,

$$\mathbf{Z}\mathbf{Z}^\top = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top.$$

Portanto, a representação pelas  $r$  coordenadas singulares positivas preserva exatamente os produtos internos entre as observações.

Para duas observações  $\mathbf{x}_i$  e  $\mathbf{x}_\ell$ , com coordenadas correspondentes  $\mathbf{z}_i$  e  $\mathbf{z}_\ell$ ,

$$\mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_\ell = \mathbf{z}_i^\top \mathbf{z}_\ell.$$

Consequentemente,

$$\|\mathbf{x}_i\| = \|\mathbf{z}_i\|$$

e

$$\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_\ell\| = \|\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_\ell\|.$$

Quando

$$r < p,$$

a representação compacta reduz exatamente o número de coordenadas necessárias para descrever as observações, de  $p$  para  $r$ , sem alterar a geometria euclidiana da nuvem.

Essa redução não exige que  $\mathbf{X}$  seja deficiente em posto relativamente às suas dimensões; basta que seu espaço linha seja um subespaço próprio de  $\mathbb{R}^p$ .

Essa redução é exata porque são mantidas todas as direções associadas a valores singulares positivos.

### 6.5.6 Centralização da matriz de dados

A posição da nuvem de observações depende do vetor de médias. Para estudar sua estrutura em torno do centro, utiliza-se a matriz centralizada

$$\mathbf{X}_c = \mathbf{H}_n \mathbf{X},$$

em que

$$\mathbf{H}_n = \mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top$$

é a matriz de centralização.

A SVD compacta de  $\mathbf{X}_c$  é

$$\mathbf{X}_c = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top.$$

Como as colunas de  $\mathbf{X}_c$  possuem média zero,

$$\mathbf{1}_n^\top \mathbf{X}_c = \mathbf{0}^\top.$$

Substituindo a SVD,

$$\mathbf{1}_n^\top \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top = \mathbf{0}^\top.$$

Para  $r \geq 1$ , como  $\mathbf{D}_r$  é invertível e  $\mathbf{V}_r$  possui colunas ortonormais,

$$\mathbf{1}_n^\top \mathbf{U}_r = \mathbf{0}^\top.$$

Portanto, cada vetor singular à esquerda associado a um valor singular positivo é ortogonal ao vetor de uns:

$$\mathbf{1}_n^\top \mathbf{u}_j = 0, \quad j = 1, \dots, r.$$

Isso significa que as coordenadas

$$\mathbf{z}_j = d_j \mathbf{u}_j$$

também possuem média zero.

### 6.5.7 Antecipação: relação com a matriz de covariâncias amostral

A definição e as propriedades estatísticas da matriz de covariâncias serão desenvolvidas posteriormente. Neste ponto, interessa apenas observar a relação algébrica entre a SVD da matriz centralizada e a decomposição espectral da matriz de produtos cruzados normalizada.

A matriz de covariâncias amostral pode ser escrita como

$$\mathbf{S} = \frac{1}{n-1} \mathbf{X}_c^\top \mathbf{X}_c.$$

Substituindo a SVD compacta,

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \frac{1}{n-1} \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r \mathbf{U}_r^\top \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top \\ &= \mathbf{V}_r \left( \frac{\mathbf{D}_r^2}{n-1} \right) \mathbf{V}_r^\top. \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbf{S} = \mathbf{V}_r \frac{\mathbf{D}_r^2}{n-1} \mathbf{V}_r^\top.$$

Essa expressão mostra que:

- os vetores singulares à direita de  $\mathbf{X}_c$  são autovetores de  $\mathbf{S}$ ;
- os autovalores positivos de  $\mathbf{S}$  são

$$\frac{d_j^2}{n-1};$$

- o posto de  $\mathbf{S}$  é igual ao posto de  $\mathbf{X}_c$ .

Como

$$\text{posto}(\mathbf{H}_n) = n - 1,$$

tem-se

$$\text{posto}(\mathbf{X}_c) \leq \min(n - 1, p).$$

Consequentemente,

$$\text{posto}(\mathbf{S}) \leq \min(n - 1, p).$$

Se

$$p \geq n,$$

a matriz de covariâncias amostral é necessariamente singular, pois

$$\text{posto}(\mathbf{S}) \leq n - 1 < p.$$

Esse resultado será retomado no capítulo de covariâncias. Neste ponto, ele mostra que a SVD da matriz centralizada descreve diretamente a estrutura espectral da covariância amostral.

### 6.5.8 Magnitude quadrática da matriz centralizada

A norma de Frobenius da matriz centralizada é

$$\begin{aligned} \|\mathbf{X}_c\|_F^2 &= \text{tr}(\mathbf{X}_c^\top \mathbf{X}_c) \\ &= \sum_{j=1}^r d_j^2. \end{aligned}$$

Como

$$\mathbf{X}_c^\top \mathbf{X}_c = (n - 1)\mathbf{S},$$

tem-se

$$\|\mathbf{X}_c\|_F^2 = (n-1) \operatorname{tr}(\mathbf{S}).$$

Portanto,

$$\sum_{j=1}^r d_j^2 = (n-1) \operatorname{tr}(\mathbf{S}).$$

A soma dos quadrados dos valores singulares de  $\mathbf{X}_c$  é igual à magnitude quadrática total da nuvem em torno da média:

$$\sum_{j=1}^r d_j^2 = \|\mathbf{X}_c\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}\|^2.$$

Equivalentemente, como

$$\mathbf{S} = \frac{1}{n-1} \mathbf{X}_c^\top \mathbf{X}_c,$$

essa quantidade é igual a

$$(n-1) \operatorname{tr}(\mathbf{S}).$$

Assim,  $\operatorname{tr}(\mathbf{S})$  representa a dispersão média por grau de liberdade, enquanto  $\|\mathbf{X}_c\|_F^2$  representa a soma quadrática total em torno do centro da nuvem.

Essa interpretação depende da centralização. Para uma matriz de dados não centralizada,

$$\|\mathbf{X}\|_F^2$$

mede a soma dos quadrados em relação à origem, e não a dispersão em relação ao vetor de médias.

**Exemplo 6.5** (Coordenadas singulares de uma matriz de dados). Considere a matriz

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

cujas SVD compacta é

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}_2 \mathbf{D}_2 \mathbf{V}_2^\top,$$

com

$$\mathbf{U}_2 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \\ 1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{D}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{V}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

As coordenadas das observações nas direções singulares à direita são

$$\begin{aligned} \mathbf{Z} &= \mathbf{X} \mathbf{V}_2 \\ &= \mathbf{U}_2 \mathbf{D}_2 \\ &= \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

A primeira e a terceira observações possuem as mesmas coordenadas, pois suas linhas originais são iguais.

Além disso,

$$\mathbf{Z} \mathbf{Z}^\top = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \mathbf{X} \mathbf{X}^\top.$$

Portanto, os produtos internos e as distâncias entre as observações são preservados pela representação nas duas direções singulares positivas.

Nesse exemplo,

$$r = p = 2.$$



Por isso, a transformação por  $\mathbf{V}_2$  representa apenas uma mudança ortogonal de coordenadas no espaço das variáveis. Não ocorre redução exata da dimensão.

Se o posto fosse menor que  $p$ , a representação por  $\mathbf{Z}$  utilizaria menos colunas que a matriz original e ainda preservaria exatamente a geometria da nuvem.

### 6.5.9 Representação exata e aproximação

A SVD compacta produz a representação exata

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top.$$

Quando todas as  $r$  direções associadas a valores singulares positivos são mantidas:

- a matriz é reconstruída exatamente;
- os produtos internos entre observações são preservados;
- as distâncias euclidianas entre observações são preservadas;
- nenhuma parcela da norma de Frobenius é descartada.

Uma representação de dimensão ainda menor utiliza somente os primeiros  $k$  pares singulares, com

$$k < r.$$

Nesse caso, algumas direções associadas a valores singulares positivos são deliberadamente descartadas e a reconstrução deixa de ser exata. Surge, então, uma distinção fundamental:

- a SVD compacta remove apenas direções que já pertencem ao núcleo e preserva exatamente a matriz;
- a SVD truncada remove também direções de ação não nula e produz uma aproximação.

A forma expandida da SVD permitirá identificar a contribuição de cada direção preservada ou descartada e quantificar o erro produzido pelo truncamento.

## 6.6 Forma expandida e aproximações de posto reduzido

A SVD compacta pode ser desenvolvida como uma soma de matrizes de posto 1. Se

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top,$$

então

$$\mathbf{U}_r = [\mathbf{u}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{u}_r],$$

$$\mathbf{D}_r = \text{diag}(d_1, \dots, d_r)$$

e

$$\mathbf{V}_r = [\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_r].$$

Efetuando o produto,

$$\mathbf{A} = \sum_{j=1}^r d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top.$$

Essa expressão é denominada **forma expandida da SVD**.

Cada parcela

$$d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top$$

representa uma transformação de posto 1 associada ao  $j$ -ésimo par de direções singulares: a componente do vetor de entrada na direção  $\mathbf{v}_j$  é multiplicada por  $d_j$  e enviada para a direção  $\mathbf{u}_j$ .

### 6.6.1 Parcelas de posto 1

Considere a matriz

$$\mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top.$$

Suas colunas são múltiplos de  $\mathbf{u}_j$ :

$$\mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top = [v_{1j} \mathbf{u}_j \quad \cdots \quad v_{pj} \mathbf{u}_j].$$

Como  $\mathbf{u}_j$  e  $\mathbf{v}_j$  são não nulos,

$$\text{posto}(\mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top) = 1.$$

A matriz original é, portanto, construída pela soma de  $r$  estruturas de posto 1:

$$\mathbf{A} = d_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^\top + \cdots + d_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^\top.$$

Os valores singulares determinam a magnitude das parcelas de posto 1. Como

$$d_1 \geq \cdots \geq d_r > 0,$$

essas parcelas aparecem ordenadas da maior para a menor magnitude. De fato, para cada  $j$ ,

$$\|d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top\|_2 = \|d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top\|_F = d_j.$$

### 6.6.2 Ortogonalidade das parcelas

**Proposição 6.6** (Ortogonalidade das parcelas singulares). *Para  $i \neq j$ , as parcelas*

$$\mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\top$$

*e*

$$\mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top$$

*são ortogonais segundo o produto interno de Frobenius:*

$$\left\langle \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\top, \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top \right\rangle_F = 0.$$

Além disso,

$$\left\| \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top \right\|_F = 1$$

e, portanto,

$$\left\| d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top \right\|_F = d_j.$$

*Comprovação.* Pelo produto interno de Frobenius,

$$\begin{aligned} \left\langle \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\top, \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top \right\rangle_F &= \text{tr} \left[ (\mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\top)^\top (\mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top) \right] \\ &= \text{tr} (\mathbf{v}_i \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top) \\ &= (\mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j) (\mathbf{v}_j^\top \mathbf{v}_i). \end{aligned}$$

Como os vetores singulares são ortonormais, para  $i \neq j$ ,

$$\mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j = 0$$

e

$$\mathbf{v}_j^\top \mathbf{v}_i = 0.$$

Logo,

$$\left\langle \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\top, \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top \right\rangle_F = 0.$$

Para  $i = j$ ,

$$\begin{aligned} \left\| \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top \right\|_F^2 &= (\mathbf{u}_j^\top \mathbf{u}_j) (\mathbf{v}_j^\top \mathbf{v}_j) \\ &= 1. \end{aligned}$$

Consequentemente,

$$\left\| d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top \right\|_F = d_j.$$

□

Como as parcelas da forma expandida são ortogonais segundo o produto interno de Frobenius,

$$\|\mathbf{A}\|_F^2 = \sum_{j=1}^r d_j^2.$$

Essa igualdade é uma decomposição pitagórica da magnitude quadrática total da matriz entre as parcelas singulares.

### 6.6.3 SVD truncada

A forma expandida permite construir aproximações conservando somente as primeiras parcelas.

**Definição 6.8** (SVD truncada). Seja

$$\mathbf{A} = \sum_{j=1}^r d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top$$

a SVD compacta expandida de uma matriz de posto  $r$ .

Para

$$1 \leq k < r,$$

a **SVD truncada de posto  $k$**  é

$$\mathbf{A}_k = \sum_{j=1}^k d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top.$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{A}_k = \mathbf{U}_k \mathbf{D}_k \mathbf{V}_k^\top.$$

A SVD truncada difere da SVD compacta porque

$$k < r.$$

Portanto, ela descarta parcelas associadas a valores singulares positivos e, em geral,

$$\mathbf{A}_k \neq \mathbf{A}.$$

Como as colunas de  $\mathbf{U}_k$  e  $\mathbf{V}_k$  são linearmente independentes e os elementos diagonais de  $\mathbf{D}_k$  são positivos,

$$\text{posto}(\mathbf{A}_k) = k.$$

A diferença entre a matriz original e sua aproximação é

$$\mathbf{A} - \mathbf{A}_k = \sum_{j=k+1}^r d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top.$$

A matriz  $\mathbf{A}_k$  conserva as direções associadas aos  $k$  maiores valores singulares. A diferença reúne as direções descartadas.

### 6.6.4 Ortogonalidade entre aproximação e diferença

Como as parcelas singulares são ortogonais segundo o produto interno de Frobenius,

$$\langle \mathbf{A}_k, \mathbf{A} - \mathbf{A}_k \rangle_F = 0.$$

Consequentemente,

$$\|\mathbf{A}\|_F^2 = \|\mathbf{A}_k\|_F^2 + \|\mathbf{A} - \mathbf{A}_k\|_F^2.$$

As duas parcelas são

$$\|\mathbf{A}_k\|_F^2 = \sum_{j=1}^k d_j^2$$

e

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{A}_k\|_F^2 = \sum_{j=k+1}^r d_j^2.$$

A razão

$$\frac{\|\mathbf{A}_k\|_F^2}{\|\mathbf{A}\|_F^2} = \frac{\sum_{j=1}^k d_j^2}{\sum_{j=1}^r d_j^2}$$

mede a proporção da magnitude quadrática da matriz preservada pela aproximação.

A parcela descartada é

$$\frac{\|\mathbf{A} - \mathbf{A}_k\|_F^2}{\|\mathbf{A}\|_F^2} = \frac{\sum_{j=k+1}^r d_j^2}{\sum_{j=1}^r d_j^2}.$$

As duas proporções somam 1.

Para uma matriz genérica, essas razões medem exclusivamente a distribuição da magnitude quadrática segundo a norma de Frobenius. Elas não devem ser interpretadas automaticamente como proporções de variância ou de informação estatística.

Quando  $\mathbf{A}$  é uma matriz de dados centralizada, porém,

$$\|\mathbf{A}\|_F^2$$

corresponde à dispersão quadrática total da nuvem em torno da média. Nesse contexto específico, a razão

$$\frac{\sum_{j=1}^k d_j^2}{\sum_{j=1}^r d_j^2}$$

pode ser interpretada como a proporção dessa dispersão preservada pela aproximação de posto  $k$ .

Para uma matriz genérica, essas quantidades devem ser interpretadas em termos da norma de Frobenius. Quando  $\mathbf{A}$  é uma matriz de dados centralizada, elas também podem ser relacionadas à dispersão total da nuvem de observações.

### 6.6.5 Erro na norma espectral

O maior valor singular da diferença

$$\mathbf{A} - \mathbf{A}_k = \sum_{j=k+1}^r d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top$$

é

$$d_{k+1}.$$

Portanto,

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{A}_k\|_2 = d_{k+1}.$$

Esse erro mede a maior diferença entre a ação de  $\mathbf{A}$  e a ação de  $\mathbf{A}_k$  sobre um vetor unitário:

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{A}_k\|_2 = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|(\mathbf{A} - \mathbf{A}_k) \mathbf{x}\|.$$

A direção em que o erro máximo é atingido é

$$\mathbf{v}_{k+1},$$

pois

$$(\mathbf{A} - \mathbf{A}_k) \mathbf{v}_{k+1} = d_{k+1} \mathbf{u}_{k+1}.$$

Assim, a norma espectral mede um erro de **pior caso**: entre todas as direções unitárias do domínio,  $d_{k+1}$  é a maior magnitude que pode permanecer na parte descartada da transformação.

Em contraste, a norma de Frobenius agrega quadraticamente os erros associados a todas as direções singulares descartadas:

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{A}_k\|_F^2 = \sum_{j=k+1}^r d_j^2.$$



### 6.6.6 Teorema de Eckart–Young–Mirsky

A SVD truncada não é somente uma forma conveniente de produzir uma matriz de posto menor. Ela fornece uma aproximação ótima.

**Teorema 6.3** (Teorema de Eckart–Young–Mirsky). *Seja*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

*uma matriz de posto  $r$ , com valores singulares*

$$d_1 \geq \dots \geq d_r > 0.$$

*Para*

$$1 \leq k < r,$$

*defina*

$$\mathbf{A}_k = \sum_{j=1}^k d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top.$$

*Então  $\mathbf{A}_k$  é uma solução dos problemas*

$$\min_{\text{posto}(\tilde{\mathbf{A}}) \leq k} \|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|_2$$

*e*

$$\min_{\text{posto}(\tilde{\mathbf{A}}) \leq k} \|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|_F.$$

*Os erros mínimos são*

$$\min_{\text{posto}(\tilde{\mathbf{A}}) \leq k} \|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|_2 = d_{k+1}$$

*e*

$$\min_{\text{posto}(\widetilde{\mathbf{A}}) \leq k} \|\mathbf{A} - \widetilde{\mathbf{A}}\|_F = \sqrt{\sum_{j=k+1}^r d_j^2}.$$

(Golub; Van Loan, 2013)

*Comprovação.* Considere inicialmente a norma espectral e uma matriz arbitrária

$$\widetilde{\mathbf{A}}$$

com

$$\text{posto}(\widetilde{\mathbf{A}}) \leq k.$$

Defina o subespaço

$$\mathcal{S}_{k+1} = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k+1}\}.$$

Como

$$\dim(\mathcal{S}_{k+1}) = k + 1$$

e a restrição de  $\widetilde{\mathbf{A}}$  a esse subespaço possui imagem de dimensão no máximo  $k$ , existe um vetor unitário

$$\mathbf{x} \in \mathcal{S}_{k+1}$$

tal que

$$\widetilde{\mathbf{A}}\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Escreva

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^{k+1} \alpha_j \mathbf{v}_j,$$

com

$$\sum_{j=1}^{k+1} \alpha_j^2 = 1.$$

Então,

$$\begin{aligned} \left\| (\mathbf{A} - \widetilde{\mathbf{A}}) \mathbf{x} \right\|^2 &= \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2 \\ &= \sum_{j=1}^{k+1} d_j^2 \alpha_j^2 \\ &\geq d_{k+1}^2 \sum_{j=1}^{k+1} \alpha_j^2 \\ &= d_{k+1}^2. \end{aligned}$$

Logo,

$$\left\| \mathbf{A} - \widetilde{\mathbf{A}} \right\|_2 \geq d_{k+1}.$$

Para a SVD truncada,

$$\left\| \mathbf{A} - \mathbf{A}_k \right\|_2 = d_{k+1}.$$

Portanto,  $\mathbf{A}_k$  atinge o limite inferior e é uma solução ótima na norma espectral.

Para a norma de Frobenius, considere o projetor ortogonal

$$\mathbf{P}$$

sobre o espaço coluna de  $\widetilde{\mathbf{A}}$ . Como

$$\text{posto}(\widetilde{\mathbf{A}}) \leq k,$$

tem-se

$$\text{posto}(\mathbf{P}) \leq k.$$

Além disso,

$$\mathbf{P}\widetilde{\mathbf{A}} = \widetilde{\mathbf{A}}.$$

A diferença pode ser decomposta como

$$\mathbf{A} - \widetilde{\mathbf{A}} = (\mathbf{I}_q - \mathbf{P}) \mathbf{A} + (\mathbf{P}\mathbf{A} - \widetilde{\mathbf{A}}).$$

As duas parcelas são ortogonais segundo o produto interno de Frobenius, pois a primeira possui colunas no complemento ortogonal de  $\mathcal{C}(\mathbf{P})$ , enquanto a segunda possui colunas em  $\mathcal{C}(\mathbf{P})$ .

Assim,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{A} - \widetilde{\mathbf{A}}\|_F^2 &= \|(\mathbf{I}_q - \mathbf{P}) \mathbf{A}\|_F^2 \\ &\quad + \|\mathbf{P}\mathbf{A} - \widetilde{\mathbf{A}}\|_F^2 \\ &\geq \|(\mathbf{I}_q - \mathbf{P}) \mathbf{A}\|_F^2. \end{aligned}$$

A primeira parcela pode ser escrita como

$$\|(\mathbf{I}_q - \mathbf{P}) \mathbf{A}\|_F^2 = \|\mathbf{A}\|_F^2 - \|\mathbf{P}\mathbf{A}\|_F^2.$$

Considere uma base ortonormal

$$\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s, \quad s \leq k,$$

do espaço projetado por  $\mathbf{P}$ . Então,

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^s \mathbf{w}_i \mathbf{w}_i^\top$$

e

$$\begin{aligned} \|\mathbf{P}\mathbf{A}\|_F^2 &= \text{tr}(\mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{A}^\top) \\ &= \sum_{i=1}^s \mathbf{w}_i^\top \mathbf{A}\mathbf{A}^\top \mathbf{w}_i. \end{aligned}$$

Usando a decomposição espectral

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top = \sum_{j=1}^r d_j^2 \mathbf{u}_j \mathbf{u}_j^\top,$$

tem-se

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{PA}\|_F^2 &= \text{tr}(\mathbf{PAA}^\top) \\
&= \sum_{j=1}^r d_j^2 \text{tr}(\mathbf{Pu}_j \mathbf{u}_j^\top) \\
&= \sum_{j=1}^r d_j^2 \mathbf{u}_j^\top \mathbf{Pu}_j.
\end{aligned}$$

Defina

$$c_j = \mathbf{u}_j^\top \mathbf{Pu}_j = \|\mathbf{Pu}_j\|^2.$$

Como  $\mathbf{P}$  é um projetor ortogonal,

$$0 \leq c_j \leq 1.$$

Além disso,

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^r c_j &= \sum_{j=1}^r \mathbf{u}_j^\top \mathbf{Pu}_j \\
&\leq \text{tr}(\mathbf{P}) \\
&= \text{posto}(\mathbf{P}) \\
&\leq k.
\end{aligned}$$

Portanto,

$$\|\mathbf{PA}\|_F^2 = \sum_{j=1}^r c_j d_j^2,$$

com

$$0 \leq c_j \leq 1$$

e

$$\sum_{j=1}^r c_j \leq k.$$

Como os valores singulares estão ordenados, sob as restrições,

$$0 \leq c_j \leq 1 \quad \text{e} \quad \sum_j c_j \leq k,$$

a soma ponderada é maximizada atribuindo peso 1 aos  $k$  maiores valores  $d_j^2$  e peso 0 aos demais. Como

$$d_1^2 \geq \dots \geq d_r^2,$$

segue que

$$\|\mathbf{P}\mathbf{A}\|_F^2 \leq \sum_{j=1}^k d_j^2.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{A} - \widetilde{\mathbf{A}}\|_F^2 &\geq \|\mathbf{A}\|_F^2 - \sum_{j=1}^k d_j^2 \\ &= \sum_{j=k+1}^r d_j^2. \end{aligned}$$

Para

$$\mathbf{P} = \mathbf{U}_k \mathbf{U}_k^\top,$$

tem-se

$$\mathbf{P}\mathbf{A} = \mathbf{A}_k.$$

Além disso,

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{A}_k\|_F^2 = \sum_{j=k+1}^r d_j^2.$$

Logo,  $\mathbf{A}_k$  também atinge o limite inferior na norma de Frobenius. □

O teorema mostra que nenhuma matriz de posto no máximo  $k$  pode apresentar erro menor que  $\mathbf{A}_k$  nas duas normas consideradas.

Na norma espectral, o erro ótimo é determinado exclusivamente pelo primeiro valor singular descartado,

$$d_{k+1}.$$

Na norma de Frobenius, o erro ótimo depende de toda a parcela espectral descartada,

$$\sqrt{\sum_{j=k+1}^r d_j^2}.$$

### 6.6.7 Unicidade da aproximação

A optimalidade estabelecida pelo Teorema 6.3 não implica, em geral, unicidade da matriz aproximante. A situação também depende da norma considerada.

Na norma de Frobenius, a aproximação de posto  $k$  é única quando

$$d_k > d_{k+1}.$$

Se

$$d_k = d_{k+1},$$

o limite de truncamento atravessa um subespaço singular associado a um valor repetido. Nesse caso, diferentes escolhas de bases e subespaços dentro desse bloco podem produzir aproximações ótimas distintas.

Na norma espectral,  $\mathbf{A}_k$  é uma aproximação ótima, mas outras matrizes de posto no máximo  $k$  também podem atingir o mesmo erro. A unicidade não deve ser presumida apenas pela existência de uma separação entre valores singulares.

Quando

$$k \geq r,$$

a aproximação exata é

$$\mathbf{A}_k = \mathbf{A},$$

e o erro é zero.

### 6.6.8 Exemplo de aproximação de posto 1

**Exemplo 6.6** (Aproximação de posto 1 do exemplo condutor). Considere novamente

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Sua forma expandida é

$$\mathbf{A} = 2\mathbf{u}_1\mathbf{v}_1^\top + \sqrt{2}\mathbf{u}_2\mathbf{v}_2^\top,$$

em que

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

e

$$\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

A aproximação de posto 1 é

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_1 &= 2\mathbf{u}_1\mathbf{v}_1^\top \\ &= 2 \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

A diferença entre a matriz original e a aproximação é

$$\mathbf{A} - \mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$



Como

$$d_1 = 2$$

e

$$d_2 = \sqrt{2},$$

o erro espectral é

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{A}_1\|_2 = \sqrt{2}.$$

O erro de Frobenius também é

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{A}_1\|_F = \sqrt{2},$$

pois somente um valor singular foi descartado.

A magnitude quadrática total é

$$\|\mathbf{A}\|_F^2 = 2^2 + (\sqrt{2})^2 = 6.$$

A aproximação preserva

$$\|\mathbf{A}_1\|_F^2 = 2^2 = 4.$$

Portanto, a proporção preservada é

$$\frac{\|\mathbf{A}_1\|_F^2}{\|\mathbf{A}\|_F^2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

A primeira parcela reproduz exatamente a primeira e a terceira linhas da matriz. A segunda linha está inteiramente associada à direção singular descartada.

### 6.6.9 Aproximação de uma matriz de dados

Se

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top$$

é uma matriz de dados, sua aproximação de posto  $k$  é

$$\mathbf{X}_k = \mathbf{U}_k \mathbf{D}_k \mathbf{V}_k^\top.$$

Definindo

$$\mathbf{Z}_k = \mathbf{X} \mathbf{V}_k,$$

tem-se

$$\mathbf{Z}_k = \mathbf{U}_k \mathbf{D}_k$$

e

$$\mathbf{X}_k = \mathbf{Z}_k \mathbf{V}_k^\top.$$

Como

$$\mathbf{Z}_k = \mathbf{X} \mathbf{V}_k,$$

também se pode escrever

$$\mathbf{X}_k = \mathbf{X} \mathbf{V}_k \mathbf{V}_k^\top.$$

A matriz

$$\mathbf{P}_k = \mathbf{V}_k \mathbf{V}_k^\top$$

é o projetor ortogonal sobre o subespaço

$$\mathcal{S}_k = \text{span} \{ \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \}.$$

Portanto, cada observação é aproximada por sua projeção ortogonal sobre esse subespaço.

A matriz  $\mathbf{Z}_k$  fornece uma representação das observações em  $k$  coordenadas. A multiplicação por  $\mathbf{V}_k^\top$  reconstrói aproximações das observações no espaço original das  $p$  variáveis.

Para a observação  $i$ ,

$$\hat{\mathbf{x}}_{i,k} = \sum_{j=1}^k z_{ij} \mathbf{v}_j.$$

O vetor residual é

$$\mathbf{x}_i - \hat{\mathbf{x}}_{i,k} = \sum_{j=k+1}^r z_{ij} \mathbf{v}_j.$$

Pelo Teorema 6.3, entre todos os subespaços lineares de dimensão no máximo  $k$ , o subespaço gerado pelos primeiros vetores singulares à direita fornece uma reconstrução com soma mínima dos erros quadráticos:

$$\|\mathbf{X} - \mathbf{X}_k\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}_i - \hat{\mathbf{x}}_{i,k}\|^2.$$

Quando  $\mathbf{X}$  está centralizada,

$$\frac{\sum_{j=1}^k d_j^2}{\sum_{j=1}^r d_j^2}$$

representa a parcela da dispersão quadrática total preservada pelas primeiras  $k$  direções singulares.

Essa estrutura será retomada posteriormente na formulação de técnicas de redução de dimensionalidade. Neste capítulo, o resultado deve ser interpretado como uma propriedade geral da aproximação matricial de posto reduzido.

A SVD truncada e a pseudoinversa utilizam os mesmos componentes singulares para resolver problemas diferentes.

Na aproximação de posto reduzido, algumas parcelas associadas a valores singulares positivos são deliberadamente descartadas:

$$\mathbf{A} \longrightarrow \mathbf{A}_k.$$

Na pseudoinversa, todas as direções associadas a valores singulares positivos são mantidas, mas seus fatores de escala são invertidos:

$$d_j \longrightarrow \frac{1}{d_j}.$$

As direções pertencentes aos núcleos permanecem sem inversão. Essa construção conduz à pseudoinversa de Moore–Penrose e às soluções de mínimos quadrados.

## 6.7 Pseudoinversa e soluções de mínimos quadrados

A inversa usual é definida somente para matrizes quadradas e invertíveis. A SVD permite construir uma transformação inversa generalizada para qualquer matriz real, inclusive matrizes:

- retangulares;
- singulares;
- deficientes em posto.

Essa transformação é a **pseudoinversa de Moore–Penrose**.

Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

com posto

$$r = \text{posto}(\mathbf{A})$$

e SVD compacta

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top.$$

Se  $r \geq 1$ , todos os elementos diagonais de

$$\mathbf{D}_r = \text{diag}(d_1, \dots, d_r)$$

são positivos. Portanto,

$$\mathbf{D}_r^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{d_1}, \dots, \frac{1}{d_r}\right)$$

está bem definida.

Se  $r = 0$ , então  $\mathbf{A} = \mathbf{0}$  e sua pseudoinversa será definida como a matriz nula de dimensão  $p \times q$ .

**Definição 6.9** (Pseudoinversa de Moore–Penrose). A **pseudoinversa de Moore–Penrose** de

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top$$

é a matriz

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^{-1} \mathbf{U}_r^\top.$$

Sua dimensão é

$$\mathbf{A}^+ \in \mathbb{R}^{p \times q}.$$

No caso  $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ , define-se

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{0}_{p \times q}.$$

A pseudoinversa inverte os escalonamentos associados aos valores singulares positivos:

$$\mathbf{A}^+ \mathbf{u}_j = \frac{1}{d_j} \mathbf{v}_j, \quad j = 1, \dots, r.$$

As componentes pertencentes ao núcleo de  $\mathbf{A}^\top$  são anuladas. Se

$$\mathbf{u} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top),$$

então

$$\mathbf{A}^+ \mathbf{u} = \mathbf{0}.$$

Portanto, a pseudoinversa desfaz os escalonamentos de  $\mathbf{A}$  nas direções associadas aos valores singulares positivos e anula as componentes pertencentes a

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Assim, ela atua como uma inversão entre os subespaços

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) \subseteq \mathbb{R}^p$$

e

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) \subseteq \mathbb{R}^q,$$

nos quais a ação de  $\mathbf{A}$  é não nula.

### 6.7.1 Relação com a pseudoinversa espectral

No capítulo anterior, a pseudoinversa de uma matriz simétrica foi definida por meio da decomposição espectral.

Se

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A} \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top$$

é simétrica, a definição espectral produz

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{Q}_\mathbf{A} \Lambda_\mathbf{A}^+ \mathbf{Q}_\mathbf{A}^\top,$$

em que cada autovalor não nulo é substituído por seu inverso.

A definição pela SVD coincide com essa construção, mas permanece válida quando  $\mathbf{A}$  não é simétrica ou é retangular.

No caso simétrico indefinido, os valores singulares são os módulos dos autovalores,

$$d_j = |\lambda_j|,$$

enquanto seus sinais são incorporados à relação entre os vetores singulares à esquerda e à direita. Por isso, a inversão espectral

$$\lambda_j \mapsto \frac{1}{\lambda_j}$$

para  $\lambda_j \neq 0$  é recuperada corretamente pela fórmula da pseudoinversa baseada na SVD.

Se  $\mathbf{A}$  é quadrada e invertível, todos os valores singulares são positivos e

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^{-1}.$$

Assim, a pseudoinversa generaliza a inversa usual.

### 6.7.2 Condições de Moore–Penrose

A pseudoinversa é caracterizada por quatro identidades.

**Teorema 6.4** (Condições de Moore–Penrose). *Para toda matriz real  $\mathbf{A}$ , existe uma única matriz  $\mathbf{A}^+$  que satisfaz*

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^+\mathbf{A} = \mathbf{A},$$

$$\mathbf{A}^+\mathbf{A}\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^+,$$

$$(\mathbf{A}\mathbf{A}^+)^{\top} = \mathbf{A}\mathbf{A}^+,$$

e

$$(\mathbf{A}^+\mathbf{A})^{\top} = \mathbf{A}^+\mathbf{A}.$$

(Golub; Van Loan, 2013)

*Comprovação.* Pela SVD compacta,

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^{\top}$$

e

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^{-1} \mathbf{U}_r^{\top}.$$

Então,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{A}^+\mathbf{A} &= \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^{\top} \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^{-1} \mathbf{U}_r^{\top} \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^{\top} \\ &= \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^{\top} \\ &= \mathbf{A}. \end{aligned}$$

De modo semelhante,

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}^+ \mathbf{A} \mathbf{A}^+ &= \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^{-1} \mathbf{U}_r^\top \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^{-1} \mathbf{U}_r^\top \\
&= \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^{-1} \mathbf{U}_r^\top \\
&= \mathbf{A}^+.
\end{aligned}$$

Além disso,

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^+ = \mathbf{U}_r \mathbf{U}_r^\top$$

e

$$\mathbf{A}^+ \mathbf{A} = \mathbf{V}_r \mathbf{V}_r^\top,$$

que são matrizes simétricas. Portanto, a matriz definida pela SVD satisfaz as quatro condições de Moore–Penrose.

Para demonstrar a unicidade, suponha que

$$\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{p \times q}$$

também satisfaça as quatro condições.

A matriz  $\mathbf{A} \mathbf{G}$  é simétrica e

$$\begin{aligned}
(\mathbf{A} \mathbf{G})^2 &= \mathbf{A} \mathbf{G} \mathbf{A} \mathbf{G} \\
&= (\mathbf{A} \mathbf{G} \mathbf{A}) \mathbf{G} \\
&= \mathbf{A} \mathbf{G}.
\end{aligned}$$

Logo,  $\mathbf{A} \mathbf{G}$  é um projetor ortogonal.

Sua imagem está contida em  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ . Além disso, se

$$\mathbf{y} = \mathbf{A} \mathbf{x} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

então

$$\mathbf{A} \mathbf{G} \mathbf{y} = \mathbf{A} \mathbf{G} \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{y}.$$

Portanto,

$$\mathbf{A} \mathbf{G} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})} = \mathbf{U}_r \mathbf{U}_r^\top.$$



De maneira análoga,  $\mathbf{GA}$  é simétrica e idempotente.

Se

$$\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

então

$$\mathbf{GAx} = \mathbf{0}.$$

Reciprocamente, se

$$\mathbf{GAx} = \mathbf{0},$$

então

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{AGAx} = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{GA}) = \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Como  $\mathbf{GA}$  é um projetor ortogonal,

$$\mathbf{GA} = \mathbf{P}_{\mathcal{N}(\mathbf{A})^\perp} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)} = \mathbf{V}_r \mathbf{V}_r^\top.$$

Da condição

$$\mathbf{GAG} = \mathbf{G},$$

segue que

$$\mathcal{C}(\mathbf{G}) \subseteq \mathcal{C}(\mathbf{GA}) = \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top).$$

Considere agora um vetor singular à esquerda  $\mathbf{u}_j$ , com  $j \leq r$ . Como

$$\mathbf{u}_j \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

tem-se

$$\mathbf{A}\mathbf{G}\mathbf{u}_j = \mathbf{u}_j.$$

Como

$$\mathbf{G}\mathbf{u}_j \in \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top),$$

esse vetor pode ser escrito como

$$\mathbf{G}\mathbf{u}_j = \sum_{\ell=1}^r c_\ell \mathbf{v}_\ell.$$

Aplicando  $\mathbf{A}$ ,

$$\mathbf{u}_j = \sum_{\ell=1}^r c_\ell d_\ell \mathbf{u}_\ell.$$

Pela unicidade das coordenadas na base ortonormal,

$$c_\ell = \begin{cases} 1/d_j, & \ell = j, \\ 0, & \ell \neq j. \end{cases}$$

Portanto,

$$\mathbf{G}\mathbf{u}_j = \frac{1}{d_j} \mathbf{v}_j.$$

Considere, por fim,

$$\mathbf{u} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Como  $\mathbf{A}\mathbf{G}$  projeta sobre  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ ,

$$\mathbf{A}\mathbf{G}\mathbf{u} = \mathbf{0}.$$

Além disso,

$$\mathbf{G}\mathbf{u} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top).$$

Como

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) \cap \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\},$$

segue que

$$\mathbf{G}\mathbf{u} = \mathbf{0}.$$

Assim,  $\mathbf{G}$  atua sobre a base ortonormal formada pelas colunas de  $\mathbf{U}_r$  e de  $\mathbf{U}_0$  exatamente como

$$\mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^{-1} \mathbf{U}_r^\top.$$

Logo,

$$\mathbf{G} = \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^{-1} \mathbf{U}_r^\top = \mathbf{A}^+.$$

Portanto, a pseudoinversa de Moore–Penrose existe e é única. □

### 6.7.3 Pseudoinversa e projetores

Os produtos

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^+$$

e

$$\mathbf{A}^+\mathbf{A}$$

possuem interpretações geométricas distintas.

Pela SVD,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{A}^+ &= \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^{-1} \mathbf{U}_r^\top \\ &= \mathbf{U}_r \mathbf{U}_r^\top. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^+ = \mathbf{P}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})},$$

o projetor ortogonal sobre o espaço coluna de  $\mathbf{A}$ .

De modo semelhante,

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^+\mathbf{A} &= \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^{-1} \mathbf{U}_r^\top \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top \\ &= \mathbf{V}_r \mathbf{V}_r^\top.\end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbf{A}^+\mathbf{A} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)},$$

o projetor ortogonal sobre o espaço linha de  $\mathbf{A}$ .

Os complementos são

$$\mathbf{I}_q - \mathbf{A}\mathbf{A}^+ = \mathbf{P}_{\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)}$$

e

$$\mathbf{I}_p - \mathbf{A}^+\mathbf{A} = \mathbf{P}_{\mathcal{N}(\mathbf{A})}.$$

A Tabela 6.4 resume essas relações.

Tabela 6.4: Projetores ortogonais determinados pela pseudoinversa.

| Matriz                                  | Espaço projetado               |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| $\mathbf{A}\mathbf{A}^+$                | $\mathcal{C}(\mathbf{A})$      |
| $\mathbf{I}_q - \mathbf{A}\mathbf{A}^+$ | $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ |
| $\mathbf{A}^+\mathbf{A}$                | $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ |
| $\mathbf{I}_p - \mathbf{A}^+\mathbf{A}$ | $\mathcal{N}(\mathbf{A})$      |

Observe que os dois produtos possuem dimensões e papéis distintos:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^+ \in \mathbb{R}^{q \times q}$$

atua no contradomínio e seleciona a parcela que pode ser produzida por  $\mathbf{A}$ , enquanto

$$\mathbf{A}^+\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

atua no domínio e seleciona a parcela ortogonal ao núcleo da transformação.

### 6.7.4 Sistemas lineares compatíveis

Considere o sistema

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b},$$

em que

$$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^q.$$

O sistema é compatível quando

$$\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Como

$$\mathbf{AA}^+$$

é o projetor sobre esse espaço,

$$\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}) \iff \mathbf{AA}^+\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

Se o sistema é compatível, então

$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{A}^+\mathbf{b}$$

é uma solução, pois

$$\mathbf{Ax}_0 = \mathbf{AA}^+\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

As demais soluções são obtidas acrescentando qualquer vetor do núcleo:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^+\mathbf{b} + \mathbf{x}_{\mathcal{N}},$$

com

$$\mathbf{x}_{\mathcal{N}} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Utilizando a base fornecida pela SVD,

$$\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = \mathbf{V}_0 \gamma,$$

em que

$$\gamma \in \mathbb{R}^{p-r}.$$

Portanto, o conjunto de soluções pode ser escrito como

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b} + \mathbf{V}_0 \gamma.$$

As duas parcelas pertencem a subespaços ortogonais:

$$\mathbf{A}^+ \mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$$

e

$$\mathbf{V}_0 \gamma \in \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Portanto, a pseudoinversa fornece a componente da solução no espaço linha, enquanto toda a não unicidade do sistema compatível é representada pelas componentes pertencentes ao núcleo.

Se

$$r = p,$$

então

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\},$$

e a solução é única:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}.$$

### 6.7.5 Solução de menor norma

Quando um sistema compatível possui várias soluções, a pseudoinversa seleciona a solução de menor norma euclidiana.

**Proposição 6.7** (Solução compatível de menor norma). *Se*

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

*é compatível, então*

$$\mathbf{x}^* = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}$$

*é a única solução de menor norma euclidiana. (Golub; Van Loan, 2013)*

*Comprovação.* Toda solução possui a forma

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b} + \mathbf{x}_{\mathcal{N}},$$

com

$$\mathbf{x}_{\mathcal{N}} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

A pseudoinversa produz um vetor no espaço linha:

$$\mathbf{A}^+ \mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}^\top).$$

Como

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

tem-se

$$(\mathbf{A}^+ \mathbf{b})^\top \mathbf{x}_{\mathcal{N}} = 0.$$

Pelo Teorema de Pitágoras,

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \|\mathbf{A}^+ \mathbf{b}\|^2 + \|\mathbf{x}_{\mathcal{N}}\|^2.$$

Logo,

$$\|\mathbf{x}\| \geq \|\mathbf{A}^+\mathbf{b}\|,$$

com igualdade somente quando

$$\mathbf{x}_{\mathcal{N}} = \mathbf{0}.$$

Portanto,

$$\mathbf{x}^* = \mathbf{A}^+\mathbf{b}$$

é a única solução de menor norma. □

### 6.7.6 Sistemas incompatíveis e mínimos quadrados

Quando

$$\mathbf{b} \notin \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

o sistema

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

não possui solução exata.

Nesse caso, procura-se um vetor  $\mathbf{x}$  que minimize a distância entre  $\mathbf{Ax}$  e  $\mathbf{b}$ :

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p} \|\mathbf{b} - \mathbf{Ax}\|^2.$$

Como a função  $t \mapsto t^2$  é estritamente crescente para  $t \geq 0$ , minimizar a norma do resíduo ou seu quadrado produz exatamente o mesmo conjunto de soluções.

Esse é o problema de **mínimos quadrados**. Embora esteja sendo introduzido a partir do caso incompatível, sua definição também se aplica a sistemas compatíveis; nesse caso, o erro mínimo é igual a zero.



**Definição 6.10** (Solução de mínimos quadrados). Um vetor

$$\hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^p$$

é uma solução de mínimos quadrados do sistema

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

quando

$$\|\mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}\| = \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p} \|\mathbf{b} - \mathbf{Ax}\|.$$

O vetor ajustado é a projeção ortogonal de  $\mathbf{b}$  sobre o espaço coluna:

$$\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})} \mathbf{b}.$$

Pela pseudoinversa,

$$\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{AA}^+ \mathbf{b}.$$

Uma solução de mínimos quadrados é

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b},$$

pois

$$\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{AA}^+ \mathbf{b} = \hat{\mathbf{b}}.$$

### 6.7.7 Resíduo de mínimos quadrados

O vetor residual é

$$\mathbf{r} = \mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}}.$$

Substituindo a expressão do vetor ajustado,

$$\mathbf{r} = (\mathbf{I}_q - \mathbf{A}\mathbf{A}^+) \mathbf{b}.$$

Como

$$\mathbf{I}_q - \mathbf{A}\mathbf{A}^+$$

projeta sobre

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top),$$

tem-se

$$\mathbf{r} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Portanto,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = \mathbf{0}.$$

Como

$$\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}},$$

segue que

$$\mathbf{A}^\top (\mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}.$$

Reorganizando,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}.$$

Essas são as **equações normais** do problema de mínimos quadrados.

Reciprocamente, se um vetor  $\hat{\mathbf{x}}$  satisfaz

$$\mathbf{A}^\top (\mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0},$$

então seu resíduo pertence a

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp.$$

Logo,

$$\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}$$

é a projeção ortogonal de  $\mathbf{b}$  sobre  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ , e  $\hat{\mathbf{x}}$  é uma solução de mínimos quadrados.

Portanto,

$$\hat{\mathbf{x}} \text{ é solução de mínimos quadrados } \iff \mathbf{A}^\top (\mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}.$$

A interpretação geométrica é:

$$\mathbf{b} = \hat{\mathbf{b}} + \mathbf{r},$$

com

$$\hat{\mathbf{b}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$$

e

$$\mathbf{r} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

As duas parcelas são ortogonais:

$$\hat{\mathbf{b}}^\top \mathbf{r} = 0.$$

Assim,

$$\|\mathbf{b}\|^2 = \|\hat{\mathbf{b}}\|^2 + \|\mathbf{r}\|^2.$$

### 6.7.8 Conjunto das soluções de mínimos quadrados

As equações normais possuem uma solução única quando  $\mathbf{A}$  possui posto coluna completo,

$$r = p.$$

Quando

$$r < p,$$

existem direções pertencentes a  $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ , e todas as soluções de mínimos quadrados podem ser modificadas nessas direções sem alterar o vetor ajustado.

**Teorema 6.5** (Soluções de mínimos quadrados pela SVD). *O conjunto de todas as soluções do problema*

$$\min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{b} - \mathbf{Ax}\|^2$$

é

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^+\mathbf{b} + \mathbf{V}_0\gamma,$$

em que

$$\gamma \in \mathbb{R}^{p-r}.$$

Entre essas soluções,

$$\hat{\mathbf{x}}^\star = \mathbf{A}^+\mathbf{b}$$

é a única de menor norma. (Golub; Van Loan, 2013)

*Comprovação.* Todos os vetores da forma

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^+\mathbf{b} + \mathbf{V}_0\gamma$$

produzem o mesmo vetor ajustado, pois

$$\mathbf{AV}_0 = \mathbf{0}.$$

Assim,

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{A}^+\mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{V}_0\gamma \\ &= \mathbf{A}\mathbf{A}^+\mathbf{b}.\end{aligned}$$

Logo, todos esses vetores minimizam o mesmo resíduo.

Reciprocamente, toda solução de mínimos quadrados produz o mesmo vetor ajustado, pois a projeção ortogonal de  $\mathbf{b}$  sobre  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$  é única. Portanto, se  $\hat{\mathbf{x}}_1$  e  $\hat{\mathbf{x}}_2$  são duas soluções,

$$\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}_1 = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}_2.$$

Consequentemente, a diferença entre elas pertence ao núcleo de  $\mathbf{A}$  e pode ser escrita como

$$\mathbf{V}_0\gamma.$$

A propriedade de menor norma segue da ortogonalidade entre

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$$

e

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

pelo mesmo argumento utilizado no caso compatível. □

Quando

$$r = p,$$

a matriz possui posto coluna completo e a solução de mínimos quadrados é única:

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^+\mathbf{b}.$$

Nesse caso,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$$

é positiva definida e invertível. A pseudoinversa assume a forma

$$\mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top.$$

Logo,

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b}.$$

Se  $\mathbf{A}$  possui posto linha completo,

$$r = q \leq p,$$

então

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top$$

é invertível e

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^\top (\mathbf{A}\mathbf{A}^\top)^{-1}.$$

Essa expressão fornece a solução de menor norma dos sistemas compatíveis subdeterminados.

### 6.7.9 Expressão espectral da solução

A pseudoinversa permite decompor a solução nas direções singulares.

Como

$$\mathbf{A}^+ = \sum_{j=1}^r \frac{1}{d_j} \mathbf{v}_j \mathbf{u}_j^\top,$$

tem-se

$$\hat{\mathbf{x}}^* = \mathbf{A}^+ \mathbf{b} = \sum_{j=1}^r \frac{\mathbf{u}_j^\top \mathbf{b}}{d_j} \mathbf{v}_j.$$

A solução é construída em três etapas:

1. calcula-se a componente de  $\mathbf{b}$  na direção  $\mathbf{u}_j$ :

$$\mathbf{u}_j^\top \mathbf{b};$$

2. divide-se essa componente pelo valor singular:

$$\frac{\mathbf{u}_j^\top \mathbf{b}}{d_j};$$

3. expressa-se o resultado na direção  $\mathbf{v}_j$ .

A componente de  $\mathbf{b}$  no núcleo de  $\mathbf{A}^\top$  não aparece na solução, pois não pode ser reproduzida por nenhum vetor da forma  $\mathbf{Ax}$ .

O vetor ajustado é

$$\hat{\mathbf{b}} = \sum_{j=1}^r (\mathbf{u}_j^\top \mathbf{b}) \mathbf{u}_j,$$

enquanto o resíduo é

$$\mathbf{r} = \sum_{j=r+1}^q (\mathbf{u}_j^\top \mathbf{b}) \mathbf{u}_j.$$

### 6.7.10 Valores singulares pequenos e instabilidade

A expressão

$$\hat{\mathbf{x}}^\star = \sum_{j=1}^r \frac{\mathbf{u}_j^\top \mathbf{b}}{d_j} \mathbf{v}_j$$

mostra que valores singulares pequenos podem produzir coeficientes elevados.

Considere uma perturbação

$$\mathbf{b} \mapsto \mathbf{b} + \varepsilon.$$

A alteração na solução de menor norma é

$$\begin{aligned} \Delta \hat{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}^+ \varepsilon \\ &= \sum_{j=1}^r \frac{\mathbf{u}_j^\top \varepsilon}{d_j} \mathbf{v}_j. \end{aligned}$$

Se  $d_j$  é pequeno, uma pequena componente de  $\varepsilon$  na direção  $\mathbf{u}_j$  pode ser ampliada por

$$\frac{1}{d_j}.$$

Como os valores singulares positivos de  $\mathbf{A}^+$  são

$$\frac{1}{d_r} \geq \dots \geq \frac{1}{d_1},$$

tem-se, para  $r \geq 1$ ,

$$\|\mathbf{A}^+\|_2 = \frac{1}{d_r}.$$

Consequentemente,

$$\|\Delta \hat{\mathbf{x}}\| \leq \frac{1}{d_r} \|\varepsilon\|.$$

O menor valor singular positivo controla, portanto, a maior amplificação possível de uma perturbação pela pseudoinversa.

Esse comportamento relaciona:

- valores singulares positivos pequenos;
- forte amplificação nas direções correspondentes da pseudoinversa;
- sensibilidade a perturbações;
- instabilidade de problemas inversos.

Quando  $\mathbf{A}$  possui posto máximo, um menor valor singular muito pequeno em relação a  $d_1$  corresponde também a um número de condição elevado. Se a matriz não possui posto máximo, o número de condição definido anteriormente é infinito, enquanto a pseudoinversa continua invertendo somente os valores singulares positivos.

Descartar ou modificar a inversão de valores singulares pequenos pode reduzir essa instabilidade. Esses procedimentos pertencem ao estudo da regularização e não serão desenvolvidos neste capítulo.



### 6.7.11 Pseudoinversa truncada

Considere a aproximação truncada

$$\mathbf{A}_k = \mathbf{U}_k \mathbf{D}_k \mathbf{V}_k^\top.$$

Sua pseudoinversa de Moore–Penrose é

$$\mathbf{A}_k^+ = \mathbf{V}_k \mathbf{D}_k^{-1} \mathbf{U}_k^\top.$$

Ela pode ser utilizada como uma inversão truncada de  $\mathbf{A}$ , conservando somente os  $k$  maiores valores singulares.

A solução correspondente é

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \mathbf{A}_k^+ \mathbf{b} = \sum_{j=1}^k \frac{\mathbf{u}_j^\top \mathbf{b}}{d_j} \mathbf{v}_j.$$

Essa expressão elimina as contribuições associadas às direções singulares descartadas.

A pseudoinversa truncada pode produzir uma solução menos sensível a componentes ligadas a valores singulares pequenos, mas também introduz erro por omitir parte da estrutura da matriz. A escolha de  $k$  depende do problema e não será tratada como um procedimento geral neste módulo.

### 6.7.12 Exemplo com o sistema condutor

**Exemplo 6.7** (Pseudoinversa e mínimos quadrados no exemplo condutor). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A SVD compacta de  $\mathbf{A}$  possui

$$\mathbf{U}_2 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \\ 1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{D}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{V}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

A pseudoinversa é

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}_2 \mathbf{D}_2^{-1} \mathbf{U}_2^\top.$$

Efetuada os produtos,

$$\mathbf{A}^+ = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & -1/2 & 1/4 \end{bmatrix}.$$

A solução de mínimos quadrados é

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}^+ \mathbf{b} \\ &= \begin{bmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & -1/2 & 1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5/4 \\ -3/4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

O vetor ajustado é

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{b}} &= \mathbf{A} \hat{\mathbf{x}} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5/4 \\ -3/4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1/2 \\ 2 \\ 1/2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

O resíduo é

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= \mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}} \\ &= \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ -1/2 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

O vetor

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

forma uma base do núcleo de  $\mathbf{A}^\top$ . De fato,

$$\mathbf{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{u}_3.$$

Consequentemente,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = \mathbf{0}.$$

O sistema original é incompatível porque a primeira e a terceira equações exigiriam simultaneamente

$$x_1 + x_2 = 1$$

e

$$x_1 + x_2 = 0.$$

A solução de mínimos quadrados substitui esses dois valores pela projeção comum

$$x_1 + x_2 = \frac{1}{2}.$$

Como  $\mathbf{A}$  possui posto coluna completo, a solução de mínimos quadrados é única.

A pseudoinversa reúne, em uma única construção:

- inversão dos fatores de escala associados aos valores singulares positivos;

- anulação das componentes pertencentes a  $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ ;
- construção dos projetores sobre  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$  e  $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$ ;
- solução de sistemas lineares compatíveis;
- seleção da solução exata de menor norma quando há não unicidade;
- solução de problemas de mínimos quadrados;
- seleção da solução de mínimos quadrados de menor norma quando há vários minimizadores.

Essas relações encerram a estrutura algébrica da SVD. A síntese do capítulo organiza as formas da decomposição, suas interpretações e suas principais consequências.

## 6.8 Síntese do capítulo

A Decomposição em Valores Singulares estende a ideia de decomposição espectral a qualquer matriz real. Para

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p},$$

existe uma decomposição

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^\top,$$

em que  $\mathbf{U}$  e  $\mathbf{V}$  são matrizes ortogonais e  $\mathbf{D}$  contém os valores singulares não negativos.

Para cada valor singular positivo  $d_j$ ,

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_j = d_j\mathbf{u}_j$$

e

$$\mathbf{A}^\top\mathbf{u}_j = d_j\mathbf{v}_j.$$

Assim,  $\mathbf{v}_j$  determina uma direção no domínio,  $d_j$  determina o fator de escala e  $\mathbf{u}_j$  determina a direção correspondente no contradomínio.

Se

$$r = \text{posto}(\mathbf{A}),$$

a SVD compacta é

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top,$$

com

$$\mathbf{D}_r = \text{diag}(d_1, \dots, d_r), \quad d_1 \geq \dots \geq d_r > 0.$$

A SVD compacta é uma representação exata. A SVD truncada,

$$\mathbf{A}_k = \mathbf{U}_k \mathbf{D}_k \mathbf{V}_k^\top, \quad k < r,$$

descarta parcelas associadas a valores singulares positivos e produz uma aproximação de posto reduzido.

A construção da SVD decorre das decomposições espectrais das duas matrizes de Gram:

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^2 \mathbf{V}_r^\top$$

e

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^\top = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r^2 \mathbf{U}_r^\top.$$

Seus autovalores positivos são

$$d_1^2, \dots, d_r^2.$$

Assim,  $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$  descreve a estrutura espectral relevante no domínio, enquanto  $\mathbf{A} \mathbf{A}^\top$  descreve a estrutura correspondente no contradomínio.

Geometricamente, a imagem da bola unitária é um elipsoide de dimensão  $r$  contido em

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

com semieixos

$$d_1 \mathbf{u}_1, \dots, d_r \mathbf{u}_r.$$

Os valores singulares medem, portanto, os fatores de escala nas direções singulares. Em particular,

$$\|\mathbf{A}\|_2 = d_1,$$

de modo que o maior valor singular é o maior fator de ampliação produzido pela transformação.

A SVD também fornece bases ortonormais para os quatro espaços fundamentais:

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}) = \text{span} \{ \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r \},$$

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \text{span} \{ \mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_q \},$$

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top) = \text{span} \{ \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r \},$$

e

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \text{span} \{ \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_p \}.$$

Consequentemente,

$$\dim(\mathcal{N}(\mathbf{A})) = p - r$$

e

$$\dim(\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)) = q - r.$$

As normas espectral e de Frobenius possuem representações simples em termos dos valores singulares:

$$\|\mathbf{A}\|_2 = d_1$$

e

$$\|\mathbf{A}\|_F^2 = \sum_{j=1}^r d_j^2.$$

Se

$$s = \min(q, p)$$

e

$$r = s,$$

o número de condição espectral é

$$\kappa_2(\mathbf{A}) = \frac{d_1}{d_s}.$$

Quando

$$r < s,$$

adota-se

$$\kappa_2(\mathbf{A}) = \infty.$$

Essa definição deve ser distinguida da existência de um núcleo não trivial. Uma matriz larga pode possuir

$$r = q < p,$$

ter posto máximo para suas dimensões e ainda apresentar

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) \neq \{\mathbf{0}\}.$$

Para uma matriz de dados

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p},$$

a SVD compacta fornece

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top.$$

As coordenadas das observações nas direções singulares à direita são

$$\mathbf{Z} = \mathbf{X} \mathbf{V}_r = \mathbf{U}_r \mathbf{D}_r.$$

Analogamente,

$$\mathbf{U}_r^\top \mathbf{X} = \mathbf{D}_r \mathbf{V}_r^\top$$

fornece as coordenadas das variáveis nas direções singulares à esquerda.

Quando a matriz de dados está centralizada, a relação

$$\mathbf{X}_c^\top \mathbf{X}_c = \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^2 \mathbf{V}_r^\top$$

antecipa a conexão entre a SVD e a estrutura de covariâncias, que será desenvolvida posteriormente.

A forma expandida,

$$\mathbf{A} = \sum_{j=1}^r d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top,$$

representa a matriz como uma soma de parcelas ortogonais de posto 1. Na norma de Frobenius,

$$\|\mathbf{A}\|_F^2 = \sum_{j=1}^r d_j^2$$

é uma decomposição pitagórica da magnitude quadrática total da matriz.

O Teorema de Eckart–Young–Mirsky estabelece que

$$\mathbf{A}_k = \sum_{j=1}^k d_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top$$

é uma aproximação ótima entre todas as matrizes de posto no máximo  $k$ . Os erros mínimos são

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{A}_k\|_2 = d_{k+1}$$

e

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{A}_k\|_F^2 = \sum_{j=k+1}^r d_j^2.$$

A norma espectral mede o maior erro remanescente em uma direção unitária, enquanto a norma de Frobenius agrega quadraticamente todas as parcelas descartadas.



A pseudoinversa de Moore–Penrose é

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}_r \mathbf{D}_r^{-1} \mathbf{U}_r^\top,$$

com  $\mathbf{A}^+ = \mathbf{0}$  quando  $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ .

Ela determina os projetores

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^+ = \mathbf{U}_r \mathbf{U}_r^\top = \mathbf{P}_{\mathcal{C}(\mathbf{A})}$$

e

$$\mathbf{A}^+\mathbf{A} = \mathbf{V}_r \mathbf{V}_r^\top = \mathbf{P}_{\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)}.$$

Para qualquer

$$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^q,$$

o vetor

$$\hat{\mathbf{x}}^\star = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}$$

é a solução de mínimos quadrados de menor norma. O vetor ajustado é

$$\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{A}\mathbf{A}^+ \mathbf{b},$$

isto é, a projeção ortogonal de  $\mathbf{b}$  sobre  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ , enquanto o resíduo

$$\mathbf{r} = (\mathbf{I}_q - \mathbf{A}\mathbf{A}^+) \mathbf{b}$$

pertence a

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

A Tabela 6.5 reúne as relações principais.

Tabela 6.5: Síntese das principais relações da Decomposição em Valores Singulares.

| Objeto                    | Expressão                                                       | Interpretação                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| SVD completa              | $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^\top$              | Bases ortonormais completas no domínio e no contradomínio  |
| SVD compacta              | $\mathbf{A} = \mathbf{U}_r\mathbf{D}_r\mathbf{V}_r^\top$        | Representação exata usando os valores singulares positivos |
| Pares singulares          | $\mathbf{A}\mathbf{v}_j = d_j\mathbf{u}_j$                      | Associa direções do domínio e do contradomínio             |
| Matrizes de Gram          | $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}\mathbf{A}^\top$       | Determinam $d_j^2$ e os vetores singulares                 |
| Posto                     | $r = \#\{j : d_j > 0\}$                                         | Dimensão da imagem da transformação                        |
| Norma espectral           | $\ \mathbf{A}\ _2 = d_1$                                        | Maior fator de ampliação                                   |
| Norma de Frobenius        | $\ \mathbf{A}\ _F^2 = \sum_j d_j^2$                             | Magnitude quadrática total                                 |
| SVD truncada              | $\mathbf{A}_k = \mathbf{U}_k\mathbf{D}_k\mathbf{V}_k^\top$      | Aproximação de posto reduzido                              |
| Erro espectral            | $\ \mathbf{A} - \mathbf{A}_k\ _2 = d_{k+1}$                     | Maior ação remanescente na parcela descartada              |
| Erro de Frobenius         | $\ \mathbf{A} - \mathbf{A}_k\ _F^2 = \sum_{j>k} d_j^2$          | Magnitude quadrática total descartada                      |
| Pseudoinversa             | $\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}_r\mathbf{D}_r^{-1}\mathbf{U}_r^\top$ | Inverte os fatores de escala positivos                     |
| Projeter no espaço coluna | $\mathbf{A}\mathbf{A}^+$                                        | Projeta sobre $\mathcal{C}(\mathbf{A})$                    |
| Projeter no espaço linha  | $\mathbf{A}^+\mathbf{A}$                                        | Projeta sobre $\mathcal{C}(\mathbf{A}^\top)$               |
| Mínimos quadrados         | $\hat{\mathbf{x}}^* = \mathbf{A}^+\mathbf{b}$                   | Solução de mínimos quadrados de menor norma                |

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- distinguir as formas completa, compacta e truncada da SVD;
- relacionar a SVD às decomposições espectrais de  $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$  e  $\mathbf{A}\mathbf{A}^\top$ ;
- interpretar valores e vetores singulares geometricamente;
- identificar os quatro espaços fundamentais por meio da SVD;
- relacionar valores singulares a posto, normas, núcleo e condicionamento;
- interpretar a dualidade entre linhas e colunas de uma matriz de dados;
- representar uma matriz como soma de parcelas ortogonais de posto 1;
- construir e interpretar aproximações ótimas de posto reduzido;
- aplicar o Teorema de Eckart–Young–Mirsky;
- construir e interpretar a pseudoinversa de Moore–Penrose;
- distinguir solução exata, solução de mínimos quadrados e solução de menor norma;

- interpretar mínimos quadrados como projeção ortogonal.

A SVD encerra o percurso do módulo dedicado às principais estruturas de álgebra linear utilizadas no livro. O próximo capítulo desenvolve **Cálculo Diferencial, Integral e Matricial Aplicado à Estatística Multivariada**. Gradientes, Hessianas, multiplicadores de Lagrange, diferenciais matriciais, traços, determinantes e integrais fornecerão as ferramentas necessárias para formular problemas de otimização, estimação e transformação de variáveis nos capítulos seguintes.

## 7 Cálculo Diferencial, Integral e Matricial Aplicado à Estatística Multivariada

Os capítulos anteriores desenvolveram a representação vetorial dos dados, a álgebra matricial, os espaços vetoriais, as transformações lineares e as principais decomposições matriciais. Este capítulo estuda funções cujos argumentos e resultados podem ser escalares, vetores ou matrizes.

O cálculo diferencial descreve como essas funções variam localmente. Gradientes, Jacobianas e Hessianas permitem construir aproximações, identificar direções de variação e formular condições de otimização. O cálculo matricial permite diferenciar expressões que envolvem traços, produtos, inversas e determinantes.

O cálculo integral será utilizado para representar probabilidades, esperanças, distribuições marginais e transformações de vetores aleatórios. Nessas transformações, o determinante Jacobiano descreve a alteração local de volume.

O objetivo é reunir as ferramentas de cálculo utilizadas nos capítulos probabilísticos e inferenciais, sem desenvolver antecipadamente os modelos e procedimentos específicos desses capítulos.

### 7.1 Funções, variações e diferenciais

#### 7.1.1 Tipos de funções

Uma função real de uma variável real possui a forma

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Em problemas multivariados, o domínio ou o contradomínio pode ter dimensão maior que um. A natureza desses espaços determina a forma da derivada.

Uma função escalar de um vetor é representada por

$$f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Para

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix},$$

escreve-se

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_p).$$

São exemplos:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{x},$$

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{x},$$

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$$

e

$$f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{b} - \mathbf{A} \mathbf{x}\|^2.$$

Essas funções associam um escalar a cada vetor do domínio.

Uma função vetorial de um vetor possui a forma

$$\mathbf{g} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q.$$

Ela pode ser escrita como

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} g_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ g_q(\mathbf{x}) \end{bmatrix},$$

em que cada componente

$$g_i : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$$

é uma função escalar.

Uma transformação linear é um caso particular:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}.$$

Também são utilizadas funções escalares de matrizes:

$$\phi : \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

São exemplos:

$$\phi(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{X})$$

e

$$\phi(\mathbf{X}) = \|\mathbf{X}\|_F^2.$$

Uma função matricial de uma matriz possui a forma

$$\mathcal{G} : \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R}^{r \times s}.$$

São exemplos:

$$\mathcal{G}(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^\top \mathbf{X},$$

$$\mathcal{G}(\mathbf{X}) = \mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}$$

e, para matrizes quadradas invertíveis,

$$\mathcal{G}(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^{-1}.$$

A Tabela 7.1 resume os tipos de funções utilizados no capítulo.

Tabela 7.1: Tipos de funções e objetos diferenciais correspondentes.

| Função                   | Domínio                   | Contradomínio  | Representação de primeira ordem |
|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| $f(x)$                   | $\mathbb{R}$              | $\mathbb{R}$   | Derivada escalar                |
| $f(\mathbf{x})$          | $\mathbb{R}^p$            | $\mathbb{R}$   | Gradiente                       |
| $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ | $\mathbb{R}^p$            | $\mathbb{R}^q$ | Jacobiana                       |
| $\phi(\mathbf{X})$       | $\mathbb{R}^{m \times n}$ | $\mathbb{R}$   | Gradiente matricial             |

| Função                    | Domínio                   | Contradomínio             | Representação de primeira ordem |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| $\mathcal{G}(\mathbf{X})$ | $\mathbb{R}^{m \times n}$ | $\mathbb{R}^{r \times s}$ | Operador diferencial            |

As dimensões do domínio e do contradomínio devem ser identificadas antes da diferenciação. Elas determinam a forma da transformação linear que representa localmente a variação da função e, conseqüentemente, a dimensão do gradiente, da Jacobiana ou do operador diferencial utilizado para representá-la.

### 7.1.2 Convenções de derivação

Neste capítulo, o gradiente de uma função escalar de um vetor será um vetor-coluna:

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_p} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p.$$

Para uma função vetorial

$$\mathbf{g} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q,$$

a Jacobiana será definida por

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_q}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_q}{\partial x_p} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{q \times p}.$$

A Hessiana de uma função escalar será representada por

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

Para uma função escalar de uma matriz,

$$\phi : \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R},$$

o gradiente matricial terá a mesma dimensão do argumento:

$$\nabla_{\mathbf{X}}\phi(\mathbf{X}) \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Ele será identificado pela relação

$$d\phi = \text{tr} \left[ (\nabla_{\mathbf{X}}\phi)^\top d\mathbf{X} \right].$$

Essa convenção utiliza o produto interno de Frobenius entre o gradiente e a perturbação da matriz.

### 7.1.3 Variação de uma função

Considere uma função

$$f : \mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R},$$

um ponto interior

$$\mathbf{x} \in \mathcal{U}$$

e uma perturbação

$$\mathbf{h} \in \mathbb{R}^p$$

tal que  $\mathbf{x} + \mathbf{h} \in \mathcal{U}$ .

A variação exata da função é

$$\Delta f = f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}).$$

Essa diferença mede a alteração total no valor da função. Para perturbações pequenas, procura-se representar sua parcela dominante por uma função linear de  $\mathbf{h}$ .



**Definição 7.1** (Diferenciabilidade de uma função escalar). A função

$$f : \mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$$

é diferenciável em  $\mathbf{x}$  quando existe uma transformação linear

$$L_{\mathbf{x}} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$$

tal que

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) = L_{\mathbf{x}}(\mathbf{h}) + r_{\mathbf{x}}(\mathbf{h}),$$

com

$$\frac{r_{\mathbf{x}}(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} \longrightarrow 0 \quad \text{quando} \quad \|\mathbf{h}\| \longrightarrow 0.$$

A função linear  $L_{\mathbf{x}}$  fornece a aproximação de primeira ordem da variação. No espaço euclidiano, existe um único vetor

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^p$$

tal que

$$L_{\mathbf{x}}(\mathbf{h}) = \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^{\top} \mathbf{h}.$$

Portanto,

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^{\top} \mathbf{h} + r_{\mathbf{x}}(\mathbf{h}),$$

em que o termo residual é pequeno em relação a  $\|\mathbf{h}\|$ .

Utilizando a notação de ordem,

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^{\top} \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|).$$

A aproximação linear é

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) \approx f(\mathbf{x}) + \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^{\top} \mathbf{h}.$$

### 7.1.4 Diferencial

O diferencial de  $f$  em  $\mathbf{x}$  é a parte linear de sua variação:

$$df = \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^\top d\mathbf{x}.$$

Em coordenadas,

$$df = \sum_{j=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j.$$

O vetor

$$d\mathbf{x} = \begin{bmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_p \end{bmatrix}$$

representa o incremento utilizado como argumento da transformação linear que define o diferencial. Assim,

$$df = \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^\top d\mathbf{x}$$

é linear em  $d\mathbf{x}$ .

A notação diferencial é frequentemente interpretada de maneira informal como uma variação infinitesimal. Formalmente, porém, o diferencial é a aplicação linear que fornece a parte de primeira ordem da variação da função.

**Exemplo 7.1** (Diferencial de uma função linear). Considere

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{x},$$

em que  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$  é constante.

A variação é

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) &= \mathbf{a}^\top (\mathbf{x} + \mathbf{h}) - \mathbf{a}^\top \mathbf{x} \\ &= \mathbf{a}^\top \mathbf{h}. \end{aligned}$$

Logo,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}$$

e

$$df = \mathbf{a}^\top d\mathbf{x}.$$

Como a função é linear, a aproximação de primeira ordem coincide com a variação exata.

**Exemplo 7.2** (Diferencial do quadrado da norma). Considere

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2.$$

A variação exata é

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) &= (\mathbf{x} + \mathbf{h})^\top (\mathbf{x} + \mathbf{h}) - \mathbf{x}^\top \mathbf{x} \\ &= 2\mathbf{x}^\top \mathbf{h} + \mathbf{h}^\top \mathbf{h}. \end{aligned}$$

O termo

$$2\mathbf{x}^\top \mathbf{h}$$

é linear em  $\mathbf{h}$ , enquanto

$$\mathbf{h}^\top \mathbf{h} = \|\mathbf{h}\|^2$$

é de segunda ordem.

Portanto,

$$df = 2\mathbf{x}^\top d\mathbf{x}$$

e

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{x}.$$

### 7.1.5 Aproximação ao longo de uma direção

Considere

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2,$$

o ponto

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

e o vetor unitário

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} -4/5 \\ 3/5 \end{bmatrix}.$$

A restrição da função à reta que passa por  $\mathbf{x}_0$  na direção  $\mathbf{h}$  é

$$\varphi(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}).$$

Em torno de  $t = 0$ ,

$$\varphi(t) \approx \varphi(0) + \varphi'(0)t.$$

A Figura 7.1 compara a função exata ao longo dessa reta com sua aproximação linear.

No ponto  $t = 0$ , a função e sua aproximação linear possuem o mesmo valor e a mesma inclinação. À medida que  $|t|$  aumenta, os termos de segunda ordem passam a contribuir mais para a variação.

### 7.1.6 Diferenciabilidade de funções vetoriais

Para uma função

$$\mathbf{g} : \mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q,$$

a aproximação de primeira ordem é uma transformação linear de  $\mathbb{R}^p$  em  $\mathbb{R}^q$ .




Figura 7.1: Função exata ao longo de uma direção e aproximação linear no ponto  $t = 0$ .

**Definição 7.2** (Diferenciabilidade de uma função vetorial). A função  $\mathbf{g}$  é diferenciável em  $\mathbf{x}$  quando existe uma matriz

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{q \times p}$$

tal que

$$\mathbf{g}(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})\mathbf{h} + \mathbf{r}_{\mathbf{x}}(\mathbf{h}),$$

com

$$\frac{\|\mathbf{r}_{\mathbf{x}}(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0 \quad \text{quando} \quad \|\mathbf{h}\| \rightarrow 0.$$

Assim,

$$\mathbf{g}(\mathbf{x} + \mathbf{h}) \approx \mathbf{g}(\mathbf{x}) + \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})\mathbf{h},$$

e o diferencial é

$$d\mathbf{g} = \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})d\mathbf{x}.$$

Para a transformação linear

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x},$$

tem-se

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}$$

em todos os pontos. Portanto,

$$d\mathbf{g} = \mathbf{A} d\mathbf{x},$$

e a aproximação linear é exata.

Gradiente e Jacobiana estão associados à mesma ideia de aproximação linear local, mas correspondem a contradomínios diferentes. Para uma função escalar, o gradiente fornece a representação vetorial da aplicação linear que define o diferencial. Para uma função vetorial, a Jacobiana fornece a representação matricial dessa aplicação linear.

## 7.2 Gradiente, derivada direcional, Jacobiana e Hessiana

### 7.2.1 Gradiente e derivada direcional

Para uma função diferenciável

$$f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R},$$

o gradiente reúne as derivadas parciais:

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_p} \end{bmatrix}.$$

A derivada parcial em relação a  $x_j$  mede a variação da função na direção do vetor canônico  $\mathbf{e}_j$ . A variação em uma direção arbitrária é descrita pela derivada direcional.

**Definição 7.3** (Derivada direcional). Seja

$$\mathbf{u} \in \mathbb{R}^p.$$

A derivada direcional de  $f$  no ponto  $\mathbf{x}$  na direção de  $\mathbf{u}$  é

$$D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + t\mathbf{u}) - f(\mathbf{x})}{t},$$

quando esse limite existe.

Considere a função de uma variável

$$\varphi(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{u}).$$

Pela regra da cadeia,

$$\begin{aligned} \varphi'(0) &= \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^\top \frac{d}{dt} (\mathbf{x} + t\mathbf{u}) \Big|_{t=0} \\ &= \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^\top \mathbf{u}. \end{aligned}$$

Portanto, se  $f$  é diferenciável,

$$D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}) = \nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})^{\top} \mathbf{u}.$$

Quando  $\mathbf{u}$  é unitário, a derivada direcional mede a taxa de variação por unidade de deslocamento.

Se  $\theta$  é o ângulo entre  $\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})$  e  $\mathbf{u}$ , então

$$D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}) = \|\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})\| \|\mathbf{u}\| \cos \theta.$$

Para  $\|\mathbf{u}\| = 1$ ,

$$D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}) = \|\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})\| \cos \theta.$$

**Proposição 7.1** (Direções de maior crescimento e redução). *Se*

$$\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0},$$

*então, entre todas as direções unitárias,*

$$\max_{\|\mathbf{u}\|=1} D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}) = \|\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})\|,$$

*e o máximo é atingido na direção*

$$\mathbf{u}_{\max} = \frac{\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})}{\|\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})\|}.$$

*A maior taxa de redução de primeira ordem ocorre na direção oposta:*

$$\mathbf{u}_{\min} = -\frac{\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})}{\|\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})\|},$$

*com*

$$\min_{\|\mathbf{u}\|=1} D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}) = -\|\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})\|.$$

(Apostol, 1969)



*Comprovação.* Pela desigualdade de Cauchy–Schwarz,

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}) &= \nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})^{\top} \mathbf{u} \\ &\leq \|\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})\| \|\mathbf{u}\|. \end{aligned}$$

Para  $\|\mathbf{u}\| = 1$ ,

$$D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}) \leq \|\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x})\|.$$

A igualdade ocorre quando  $\mathbf{u}$  possui a mesma direção e o mesmo sentido do gradiente. Aplicando o mesmo argumento à direção oposta, obtém-se o resultado para a maior taxa de redução de primeira ordem.  $\square$

Se

$$\nabla_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x}) = \mathbf{0},$$

todas as derivadas direcionais de primeira ordem são nulas. Nesse caso, a aproximação de primeira ordem não distingue direções de crescimento ou redução, e o comportamento local passa a depender de termos de ordem superior.

### 7.2.2 Gradiente e conjuntos de nível

Um conjunto de nível de  $f$  é definido por

$$\mathcal{S}_c = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p : f(\mathbf{x}) = c\},$$

em que  $c$  é constante.

Considere uma curva diferenciável

$$\gamma(t)$$

contida em  $\mathcal{S}_c$ . Então,

$$f(\gamma(t)) = c.$$

Derivando,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\gamma(t))^{\top} \gamma'(t) = 0.$$

O vetor  $\gamma'(t)$  é tangente ao conjunto de nível. Portanto, o gradiente é ortogonal a todas as direções tangentes.

Quando

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0},$$

o gradiente é um vetor normal ao conjunto de nível no ponto  $\mathbf{x}$ .

**Exemplo 7.3** (Gradiente de uma função quadrática). Considere

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2.$$

O gradiente é

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 4x_2 \end{bmatrix}.$$

No ponto

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

e

$$\|\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}_0)\| = 2\sqrt{2}.$$

A direção de maior crescimento é

$$\mathbf{u}_{\max} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Uma direção tangente à curva de nível é

$$\mathbf{u}_{\text{tan}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}_0)^\top \mathbf{u}_{\text{tan}} = 0,$$

a derivada direcional nessa direção é nula.

A Figura 7.2 representa as curvas de nível da função, o gradiente e uma direção tangente no ponto  $\mathbf{x}_0$ .

A direção do gradiente depende do ponto. Para a função considerada, as curvas de nível são elipses e o gradiente aponta para fora, perpendicularmente à curva correspondente.

### 7.2.3 Jacobiana

A derivada de uma função vetorial é representada por sua matriz Jacobiana.

**Definição 7.4** (Matriz Jacobiana). Seja

$$\mathbf{g} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q,$$

com

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} g_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ g_q(\mathbf{x}) \end{bmatrix}.$$

A matriz Jacobiana é

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_q}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_q}{\partial x_p} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{q \times p}.$$




Figura 7.2: O gradiente é perpendicular à curva de nível e aponta na direção de maior crescimento local.

Cada linha da Jacobiana é o gradiente transposto de uma componente:

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \nabla_{\mathbf{x}} g_1(\mathbf{x})^\top \\ \vdots \\ \nabla_{\mathbf{x}} g_q(\mathbf{x})^\top \end{bmatrix}.$$

A aproximação de primeira ordem é

$$\mathbf{g}(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = \mathbf{g}(\mathbf{x}) + \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})\mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|).$$

A Jacobiana transforma uma pequena variação no domínio em uma aproximação da variação correspondente no contradomínio.

**Exemplo 7.4** (Jacobiana de uma função de  $\mathbb{R}^2$  em  $\mathbb{R}^2$ ). Considere

$$\mathbf{g}(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} x_1^2 + x_2 \\ x_1 x_2 \end{bmatrix}.$$

Os gradientes das componentes são

$$\nabla_{\mathbf{x}} g_1 = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e

$$\nabla_{\mathbf{x}} g_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 2x_1 & 1 \\ x_2 & x_1 \end{bmatrix}.$$

No ponto

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Para uma pequena perturbação

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix},$$

a alteração é aproximada por

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - \mathbf{g}(\mathbf{x}_0) \approx \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}.$$

Para uma transformação afim

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b},$$

a Jacobiana é constante:

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}.$$

Assim, a parte linear local de uma transformação afim é exatamente a matriz  $\mathbf{A}$ , enquanto o termo de translação desaparece na diferenciação.

#### 7.2.4 Regra da cadeia

A composição de funções exige a composição de suas aproximações lineares.

**Teorema 7.1** (Regra da cadeia para funções vetoriais). *Considere funções diferenciáveis*

$$\mathbf{g} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$$

e

$$\mathbf{h} : \mathbb{R}^q \longrightarrow \mathbb{R}^r.$$

Para

$$\mathbf{f} = \mathbf{h} \circ \mathbf{g},$$

a Jacobiana é

$$\mathbf{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) = \mathbf{J}_{\mathbf{h}}(\mathbf{g}(\mathbf{x})) \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}).$$

(Apostol, 1969)

As dimensões do produto são

$$(r \times q)(q \times p) = r \times p.$$

A ordem do produto reflete a composição das aplicações lineares: sobre uma perturbação  $\mathbf{h}_{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^p$ , atua primeiro  $\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})$  e, sobre o resultado, atua  $\mathbf{J}_{\mathbf{h}}(\mathbf{g}(\mathbf{x}))$ . Por isso, na representação matricial, a Jacobiana de  $\mathbf{h}$  aparece à esquerda.

No caso de uma composição escalar

$$f(\mathbf{x}) = h(\mathbf{g}(\mathbf{x})),$$

em que

$$h : \mathbb{R}^q \longrightarrow \mathbb{R},$$

a regra da cadeia assume a forma

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})^{\top} \nabla_{\mathbf{y}} h(\mathbf{y}) \Big|_{\mathbf{y}=\mathbf{g}(\mathbf{x})}.$$

**Exemplo 7.5** (Gradiente de uma função composta). Considere

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}$$

e

$$h(\mathbf{y}) = \mathbf{y}^{\top} \mathbf{y}.$$

A função composta é

$$f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2.$$

Como

$$\mathbf{J}_g(\mathbf{x}) = \mathbf{A}$$

e

$$\nabla_{\mathbf{y}} h(\mathbf{y}) = 2\mathbf{y},$$

segue que

$$\begin{aligned}\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) &= \mathbf{A}^\top [2(\mathbf{Ax} - \mathbf{b})] \\ &= 2\mathbf{A}^\top (\mathbf{Ax} - \mathbf{b}).\end{aligned}$$

Essa expressão será retomada no estudo das funções de mínimos quadrados.

### 7.2.5 Hessiana

A Hessiana descreve a variação local do gradiente.

**Definição 7.5** (Matriz Hessiana). Seja

$$f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$$

uma função com derivadas parciais de segunda ordem no ponto considerado. Sua matriz Hessiana é

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_p \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_p^2} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$



A Hessiana é a Jacobiana do gradiente:

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) = \mathbf{J}_{\nabla f}(\mathbf{x}).$$

Se as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas em uma vizinhança do ponto, então

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i},$$

e a Hessiana é simétrica:

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) = \nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x})^\top.$$

O segundo diferencial é

$$d^2 f = d\mathbf{x}^\top \nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

O segundo diferencial é uma forma quadrática no incremento  $d\mathbf{x}$  e descreve a contribuição local de segunda ordem da função.

Para uma direção  $\mathbf{u}$ , considere novamente

$$\varphi(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{u}).$$

A primeira derivada é

$$\varphi'(0) = \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^\top \mathbf{u}.$$

A segunda derivada é

$$\varphi''(0) = \mathbf{u}^\top \nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) \mathbf{u}.$$

Essa forma quadrática representa a segunda taxa de variação de  $f$  ao longo da reta que passa por  $\mathbf{x}$  na direção  $\mathbf{u}$  e fornece a medida de curvatura direcional utilizada neste capítulo.

**Exemplo 7.6** (Hessiana de uma função quadrática). Considere

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2.$$

O gradiente é

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 4x_2 \end{bmatrix}.$$

A Hessiana é

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Para

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix},$$

a curvatura direcional é

$$\begin{aligned} \mathbf{u}^\top \nabla_{\mathbf{x}}^2 f \mathbf{u} &= \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ &= 2u_1^2 + 4u_2^2. \end{aligned}$$

Ela é positiva para todo vetor não nulo. Para vetores unitários, a segunda taxa de variação é maior nas direções com maior componente em módulo no segundo eixo.

Para a função quadrática

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{b}^\top \mathbf{x} + c,$$

com  $\mathbf{A}$  simétrica,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{b}$$

e

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}.$$

A curvatura da função é determinada pela matriz  $\mathbf{A}$ . A relação entre a Hessiana, a aproximação de segunda ordem, a convexidade e a classificação de pontos estacionários será desenvolvida na próxima seção.

## 7.3 Aproximações de Taylor e classificação local

### 7.3.1 Aproximação de Taylor de primeira ordem

A diferenciabilidade fornece uma aproximação linear da função em uma vizinhança de um ponto.

Para

$$f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R},$$

diferenciável em  $\mathbf{x}_0$ ,

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}_0)^{\top} \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|).$$

Tomando

$$\mathbf{h} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0,$$

obtém-se

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{x}_0) + \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}_0)^{\top} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0).$$

Essa é a aproximação de Taylor de primeira ordem.

Para funções de uma variável, ela corresponde à reta tangente. Para funções de duas variáveis, corresponde ao plano tangente. Em dimensão geral, corresponde a uma função afim que aproxima localmente  $f$ .

**Exemplo 7.7** (Aproximação linear de uma função quadrática). Considere

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$$

e o ponto

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \end{bmatrix}.$$

Tem-se

$$f(\mathbf{x}_0) = 1^2 + 2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 = \frac{3}{2}$$

e

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

A aproximação de primeira ordem é

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &\approx \frac{3}{2} + [2 \quad 2] \left[ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \end{bmatrix} \right] \\ &= \frac{3}{2} + 2(x_1 - 1) + 2 \left( x_2 - \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

A aproximação linear descreve a variação determinada pelo gradiente. Ela não representa a curvatura da função.

### 7.3.2 Aproximação de Taylor de segunda ordem

Quando  $f$  é duas vezes diferenciável, a Hessiana permite incorporar a curvatura local.

**Teorema 7.2** (Expansão de Taylor de segunda ordem). *Se*

$$f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$$

*possui derivadas de segunda ordem contínuas em uma vizinhança de  $\mathbf{x}_0$ , então*

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) &= f(\mathbf{x}_0) + \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}_0)^\top \mathbf{h} \\ &\quad + \frac{1}{2} \mathbf{h}^\top \nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2). \end{aligned}$$

(Apostol, 1969)

Em termos de  $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ ,

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{x}_0) + \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}_0)^\top (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}_0) (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0).$$

Os três termos possuem funções distintas:

- $f(\mathbf{x}_0)$  determina o nível da aproximação;
- o gradiente determina a variação local de primeira ordem;
- a Hessiana determina a variação local de segunda ordem.

Quando

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0},$$

o termo linear desaparece. Se a forma quadrática associada à Hessiana é não degenerada, ela fornece o termo dominante da variação local. Quando essa forma se anula em alguma direção, termos de ordem superior podem ser necessários para determinar o comportamento da função.

**Exemplo 7.8** (Expansão de uma função quadrática). Considere

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{b}^\top \mathbf{x} + c,$$

com  $\mathbf{A}$  simétrica.

O gradiente é

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{b},$$

e a Hessiana é

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}.$$

Como a função é quadrática, a expansão de Taylor de segunda ordem é exata:

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + (\mathbf{A} \mathbf{x}_0 - \mathbf{b})^\top \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^\top \mathbf{A} \mathbf{h}.$$

Não existe termo residual de ordem superior.

### 7.3.3 Pontos estacionários

**Definição 7.6** (Ponto estacionário). Um ponto

$$\mathbf{x}^*$$

é estacionário para uma função diferenciável  $f$  quando

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}.$$

Em um ponto estacionário, todas as derivadas direcionais de primeira ordem são nulas:

$$D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}^*) = 0$$

para toda direção  $\mathbf{u}$ .

**Proposição 7.2** (Condição necessária de primeira ordem). *Se  $f$  é diferenciável em um ponto interior  $\mathbf{x}^*$  de seu domínio e possui nesse ponto um máximo ou mínimo local, então*

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}.$$

*Comprovação.* Se

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) \neq \mathbf{0},$$

considere a direção unitária

$$\mathbf{u} = \frac{\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*)}{\|\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*)\|}.$$

Então,

$$D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}^*) = \|\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*)\| > 0,$$

enquanto

$$D_{-\mathbf{u}} f(\mathbf{x}^*) = -\|\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*)\| < 0.$$

Assim, existem direções locais de aumento e de redução, o que contradiz a existência de um extremo local interior. Portanto,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}.$$

□

A recíproca não é necessariamente verdadeira: um ponto estacionário pode ser mínimo, máximo ou ponto de sela.

$$D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}^*) = 0$$

para toda direção  $\mathbf{u}$ .

Todo ponto interior em que uma função diferenciável possui máximo ou mínimo local é estacionário. A recíproca não é necessariamente verdadeira: um ponto estacionário pode ser mínimo, máximo ou ponto de sela.

### 7.3.4 Classificação pela Hessiana

**Teorema 7.3** (Teste da Hessiana em um ponto estacionário). *Considere uma função duas vezes continuamente diferenciável em uma vizinhança de um ponto estacionário  $\mathbf{x}^*$ .*

*Se*

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}^*) \succ \mathbf{0},$$

*então  $\mathbf{x}^*$  é um mínimo local estrito.*

*Se*

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}^*) \prec \mathbf{0},$$

*então  $\mathbf{x}^*$  é um máximo local estrito.*

*Se*

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}^*)$$

*é indefinida, então  $\mathbf{x}^*$  é um ponto de sela.*

*Se a Hessiana é apenas semidefinida positiva ou semidefinida negativa, o teste pode ser inconclusivo. (Apostol, 1969)*

*Comprovação.* Como

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0},$$

a expansão de Taylor fornece

$$f(\mathbf{x}^* + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}^*) = \frac{1}{2} \mathbf{h}^\top \nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}^*) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2).$$

Considere inicialmente

$$\mathbf{H} = \nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}^*) \succ \mathbf{0}.$$

Como  $\mathbf{H}$  é simétrica e positiva definida, seu menor autovalor satisfaz

$$\lambda_{\min}(\mathbf{H}) > 0.$$

Portanto,

$$\mathbf{h}^\top \mathbf{H} \mathbf{h} \geq \lambda_{\min}(\mathbf{H}) \|\mathbf{h}\|^2.$$

Além disso,

$$o(\|\mathbf{h}\|^2) = \varepsilon(\mathbf{h}) \|\mathbf{h}\|^2,$$

com

$$\varepsilon(\mathbf{h}) \longrightarrow 0$$

quando  $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ .

Logo, para  $\mathbf{h}$  suficientemente pequeno,

$$|\varepsilon(\mathbf{h})| < \frac{1}{4} \lambda_{\min}(\mathbf{H}).$$

Assim,



$$\begin{aligned}
f(\mathbf{x}^* + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}^*) &\geq \frac{1}{2}\lambda_{\min}(\mathbf{H})\|\mathbf{h}\|^2 - \frac{1}{4}\lambda_{\min}(\mathbf{H})\|\mathbf{h}\|^2 \\
&= \frac{1}{4}\lambda_{\min}(\mathbf{H})\|\mathbf{h}\|^2 \\
&> 0
\end{aligned}$$

para todo  $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$  suficientemente pequeno. Portanto,  $\mathbf{x}^*$  é um mínimo local estrito.

O caso de Hessiana negativa definida é obtido aplicando o mesmo argumento a  $-f$ , produzindo um máximo local estrito.

Se a Hessiana é indefinida, existem vetores unitários  $\mathbf{u}_1$  e  $\mathbf{u}_2$  tais que

$$\mathbf{u}_1^\top \mathbf{H} \mathbf{u}_1 > 0$$

e

$$\mathbf{u}_2^\top \mathbf{H} \mathbf{u}_2 < 0.$$

Considere perturbações da forma

$$\mathbf{h} = t\mathbf{u}_j.$$

Então,

$$f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{u}_j) - f(\mathbf{x}^*) = \frac{1}{2}t^2\mathbf{u}_j^\top \mathbf{H} \mathbf{u}_j + o(t^2).$$

Para  $|t|$  suficientemente pequeno, o sinal dessa diferença coincide com o sinal da forma quadrática. Assim, a função assume valores maiores que

$$f(\mathbf{x}^*)$$

em uma direção e menores em outra, arbitrariamente próximos de  $\mathbf{x}^*$ . Portanto,  $\mathbf{x}^*$  é um ponto de sela.  $\square$

**Exemplo 7.9** (Mínimo, máximo e ponto de sela). Considere as funções

$$f_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2,$$

$$f_2(x_1, x_2) = -x_1^2 - x_2^2$$

e

$$f_3(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2.$$

As três possuem ponto estacionário na origem.

Para  $f_1$ ,

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \succ \mathbf{0}.$$

Logo, a origem é um mínimo estrito.

Para  $f_2$ ,

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f_2 = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \prec \mathbf{0}.$$

Logo, a origem é um máximo estrito.

Para  $f_3$ ,

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f_3 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

A Hessiana possui um autovalor positivo e outro negativo. Portanto, a origem é um ponto de sela.

A Figura 7.3 compara as curvas de nível dos três casos.




Figura 7.3: Curvas de nível associadas a um mínimo, um máximo e um ponto de sela.

### 7.3.5 Caso inconclusivo

Considere

$$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4.$$

A origem é um ponto estacionário e

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A Hessiana é semidefinida positiva, mas não positiva definida. Ainda assim,

$$f(x_1, x_2) \geq 0$$

para todos os pontos, com igualdade somente na origem. Portanto, a origem é um mínimo estrito.

Considere agora

$$g(x_1, x_2) = x_1^4 - x_2^4.$$

A Hessiana na origem também é nula. Entretanto, a função assume valores positivos e negativos em qualquer vizinhança da origem. O ponto é de sela.

Esses exemplos mostram que, quando o termo quadrático se anula em determinadas direções, é necessário examinar termos de ordem superior ou utilizar outro argumento.

## 7.4 Convexidade e concavidade

### 7.4.1 Conjuntos convexos

**Definição 7.7** (Conjunto convexo). Um conjunto

$$\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^p$$

é convexo quando, para quaisquer

$$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{C}$$

e

$$t \in [0, 1],$$

tem-se

$$t\mathbf{x} + (1 - t)\mathbf{y} \in \mathcal{C}.$$

O vetor

$$t\mathbf{x} + (1 - t)\mathbf{y}$$

percorre o segmento de reta entre  $\mathbf{x}$  e  $\mathbf{y}$ . Assim, um conjunto é convexo quando contém todos os segmentos que ligam seus pontos.

Subespaços, conjuntos afins como hiperplanos, bolas e regiões elipsoidais da forma

$$\left\{ \mathbf{x} : (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \mathbf{A} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \leq c \right\},$$

com  $\mathbf{A} \succ \mathbf{0}$  e  $c > 0$ , e o cone das matrizes positivas definidas são exemplos de conjuntos convexos.

### 7.4.2 Funções convexas

**Definição 7.8** (Função convexa). Uma função

$$f : \mathcal{C} \longrightarrow \mathbb{R},$$

definida em um conjunto convexo  $\mathcal{C}$ , é convexa quando

$$f(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y}) \leq tf(\mathbf{x}) + (1-t)f(\mathbf{y})$$

para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{C}$  e  $t \in [0, 1]$ .

A função é estritamente convexa quando a desigualdade é estrita para  $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$  e  $t \in (0, 1)$ .

Uma função é côncava quando  $-f$  é convexa.

Geometricamente, o gráfico de uma função convexa permanece abaixo das cordas que ligam dois pontos de seu gráfico.

### 7.4.3 Caracterização de primeira ordem

**Teorema 7.4** (Critério de primeira ordem para convexidade). *Se  $f$  é diferenciável em um conjunto convexo aberto  $\mathcal{C}$ , então  $f$  é convexa se, e somente se,*

$$f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}) + \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{C}$ . (Boyd; Vandenberghe, 2004)

A expressão

$$f(\mathbf{x}) + \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

é a aproximação afim determinada pelo plano tangente em  $\mathbf{x}$ . Para uma função convexa, essa aproximação é um limite inferior global.

#### 7.4.4 Caracterização pela Hessiana

**Teorema 7.5** (Critério da Hessiana para convexidade). *Considere uma função duas vezes continuamente diferenciável em um conjunto convexo aberto  $\mathcal{C}$ .*

*Se*

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) \succeq \mathbf{0}$$

*para todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{C}$ , então  $f$  é convexa.*

*Se*

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) \succ \mathbf{0}$$

*para todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{C}$ , então  $f$  é estritamente convexa.*

*Se*

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) \preceq \mathbf{0}$$

*para todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{C}$ , então  $f$  é côncava.*

*Se*

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) \prec \mathbf{0}$$

*para todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{C}$ , então  $f$  é estritamente côncava. (Boyd; Vandenberghe, 2004)*

A positividade da Hessiana deve ser verificada para todos os pontos do domínio considerado, e não somente em um ponto estacionário.

A condição

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) \succ \mathbf{0}$$

em todo o domínio é suficiente para convexidade estrita, mas não é necessária. Uma função estritamente convexa pode possuir Hessiana singular em pontos isolados. Por exemplo,

$$f(x) = x^4$$

é estritamente convexa em  $\mathbb{R}$ , embora

$$f''(0) = 0.$$

### 7.4.5 Consequências para otimização

**Proposição 7.3** (Pontos estacionários de funções convexas). *Se  $f$  é diferenciável e convexa em um conjunto convexo, qualquer ponto*

$$\mathbf{x}^*$$

*que satisfaça*

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

*é um mínimo global.*

*Se  $f$  é estritamente convexa e existe um ponto estacionário  $\mathbf{x}^*$ , então esse ponto é o único minimizador global. (Boyd; Vandenberghe, 2004)*

*Comprovação.* Pela caracterização de primeira ordem,

$$f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}^*) + \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*)^\top (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*).$$

Como o gradiente é nulo,

$$f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}^*)$$

para todo  $\mathbf{x}$  do domínio.

Se a função é estritamente convexa, a igualdade só pode ocorrer em  $\mathbf{x} = \mathbf{x}^*$ . □

Essa propriedade diferencia a otimização convexa da otimização geral. Para uma função convexa, não existem mínimos locais que deixem de ser globais.

### 7.4.6 Funções quadráticas

Considere

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{b}^\top \mathbf{x} + c,$$

com  $\mathbf{A}$  simétrica.

Como

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) = \mathbf{A},$$

tem-se:

- $f$  é convexa se  $\mathbf{A} \succeq \mathbf{0}$ ;
- $f$  é estritamente convexa se  $\mathbf{A} \succ \mathbf{0}$ ;
- $f$  é côncava se  $\mathbf{A} \preceq \mathbf{0}$ ;
- $f$  é estritamente côncava se  $\mathbf{A} \prec \mathbf{0}$ .

Se

$$\mathbf{A} \succ \mathbf{0},$$

o ponto estacionário satisfaz

$$\mathbf{A} \mathbf{x}^* = \mathbf{b},$$

e

$$\mathbf{x}^* = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}.$$

Esse ponto é o único mínimo global.

Se

$$\mathbf{A} \succeq \mathbf{0}$$

é singular, a existência de minimizadores depende de  $\mathbf{b}$ .

Quando



$$\mathbf{b} \in \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

o sistema

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

possui solução. Nesse caso, os minimizadores formam o conjunto afim

$$\mathbf{x}_0 + \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

em que  $\mathbf{x}_0$  é uma solução particular.

Quando

$$\mathbf{b} \notin \mathcal{C}(\mathbf{A}),$$

a função é ilimitada inferiormente e não possui minimizador.

De fato, como  $\mathbf{A}$  é simétrica,

$$\mathcal{C}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}).$$

Assim, existe

$$\mathbf{z} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$$

tal que

$$\mathbf{b}^\top \mathbf{z} \neq 0.$$

Ao longo da reta

$$\mathbf{x} = t\mathbf{z},$$

o termo quadrático é nulo e

$$f(t\mathbf{z}) = -t\mathbf{b}^\top \mathbf{z} + c,$$

que pode tender a  $-\infty$  escolhendo o sinal apropriado de  $t$ .

## 7.5 Otimização sem restrições

Um problema de minimização sem restrições possui a forma

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p} f(\mathbf{x}).$$

Quando  $f$  é diferenciável, a condição de primeira ordem para um mínimo interior é

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}.$$

Essa condição é necessária, mas não suficiente no caso geral.

Uma condição suficiente de segunda ordem é

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}^*) \succ \mathbf{0}.$$

Para funções convexas, a condição de gradiente nulo já é suficiente para um mínimo global (Boyd; Vandenberghe, 2004).

### 7.5.1 Método de Newton

O método de Newton utiliza a aproximação quadrática local de  $f$ .

Em torno de um ponto  $\mathbf{x}^{(t)}$ ,

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &\approx f(\mathbf{x}^{(t)}) + \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^{(t)})^\top (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(t)}) \\ &\quad + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(t)})^\top \nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}^{(t)}) (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(t)}). \end{aligned}$$

Defina

$$\mathbf{g}^{(t)} = \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^{(t)})$$

e

$$\mathbf{H}^{(t)} = \nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}^{(t)}).$$

Escrevendo

$$\mathbf{d} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^{(t)},$$

o modelo quadrático local pode ser representado por

$$m_t(\mathbf{d}) = f(\mathbf{x}^{(t)}) + (\mathbf{g}^{(t)})^\top \mathbf{d} + \frac{1}{2} \mathbf{d}^\top \mathbf{H}^{(t)} \mathbf{d}.$$

Seu gradiente em relação a  $\mathbf{d}$  é

$$\nabla_{\mathbf{d}} m_t(\mathbf{d}) = \mathbf{g}^{(t)} + \mathbf{H}^{(t)} \mathbf{d}.$$

Se

$$\mathbf{H}^{(t)} \succ \mathbf{0},$$

o modelo quadrático é estritamente convexo e possui um único minimizador. Esse minimizador, denominado **direção de Newton**, satisfaz

$$\mathbf{H}^{(t)} \mathbf{d}^{(t)} = -\mathbf{g}^{(t)}.$$

Quando  $\mathbf{H}^{(t)}$  é invertível,

$$\mathbf{d}^{(t)} = -(\mathbf{H}^{(t)})^{-1} \mathbf{g}^{(t)}.$$

A atualização de Newton com passo completo é

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \mathbf{x}^{(t)} + \mathbf{d}^{(t)},$$

ou, equivalentemente,

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \mathbf{x}^{(t)} - [\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}^{(t)})]^{-1} \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^{(t)}).$$

Na implementação computacional, é preferível resolver o sistema linear

$$\mathbf{H}^{(t)} \mathbf{d}^{(t)} = -\mathbf{g}^{(t)}$$

sem calcular explicitamente a inversa da Hessiana.

Se a Hessiana é apenas invertível, mas não positiva definida, a solução desse sistema é um ponto estacionário do modelo quadrático, mas pode não ser seu minimizador. Nesse caso, a direção de Newton também pode deixar de ser uma direção de descida para a função original.

**Proposição 7.4** (Direção de Newton como direção de descida). *Suponha que*

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^{(t)}) \neq \mathbf{0}$$

e

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}^{(t)}) \succ \mathbf{0}.$$

Então a direção de Newton  $\mathbf{d}^{(t)}$  é uma direção de descida para  $f$  em  $\mathbf{x}^{(t)}$ , isto é,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^{(t)})^\top \mathbf{d}^{(t)} < 0.$$

*Comprovação.* Como

$$\mathbf{d}^{(t)} = -(\mathbf{H}^{(t)})^{-1} \mathbf{g}^{(t)},$$

tem-se

$$(\mathbf{g}^{(t)})^\top \mathbf{d}^{(t)} = -(\mathbf{g}^{(t)})^\top (\mathbf{H}^{(t)})^{-1} \mathbf{g}^{(t)}.$$

Como  $\mathbf{H}^{(t)} \succ \mathbf{0}$ , também

$$(\mathbf{H}^{(t)})^{-1} \succ \mathbf{0}.$$

Logo, para  $\mathbf{g}^{(t)} \neq \mathbf{0}$ ,

$$(\mathbf{g}^{(t)})^\top (\mathbf{H}^{(t)})^{-1} \mathbf{g}^{(t)} > 0,$$

e, portanto,

$$(\mathbf{g}^{(t)})^\top \mathbf{d}^{(t)} < 0.$$

□

O passo completo corresponde a

$$\alpha_t = 1.$$

Uma forma mais geral da atualização é

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \mathbf{x}^{(t)} + \alpha_t \mathbf{d}^{(t)}, \quad 0 < \alpha_t \leq 1.$$

A escolha de  $\alpha_t < 1$  produz um passo de Newton amortecido. Esse recurso pode ser utilizado quando o modelo quadrático local ainda não representa adequadamente a função ao longo de um passo completo.

Assim, a construção da direção e a escolha do comprimento da etapa são operações distintas. Métodos numéricos de otimização costumam combinar a direção de Newton com procedimentos de controle da etapa (Boyd; Vandenberghe, 2004).

**Exemplo 7.10** (Newton para uma função quadrática). Considere

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{b}^\top \mathbf{x},$$

com  $\mathbf{A} \succ \mathbf{0}$ .

O gradiente é

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{b},$$

e a Hessiana é

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}.$$

A atualização de Newton é

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(t+1)} &= \mathbf{x}^{(t)} - \mathbf{A}^{-1} (\mathbf{A} \mathbf{x}^{(t)} - \mathbf{b}) \\ &= \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}. \end{aligned}$$

Assim, para uma função quadrática com Hessiana constante e positiva definida, uma etapa completa de Newton conduz exatamente ao único minimizador,

$$\mathbf{x}^* = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b},$$

independentemente do ponto inicial.

## 7.6 Otimização com restrições de igualdade

Considere o problema

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p} f(\mathbf{x})$$

sujeito a

$$\mathbf{c}(\mathbf{x}) = \mathbf{0},$$

em que

$$\mathbf{c} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

é uma função vetorial de restrições:

$$\mathbf{c}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} c_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ c_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix}.$$

O conjunto viável é

$$\mathcal{F} = \{\mathbf{x} : \mathbf{c}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}.$$

Em um ponto regular, as linhas da Jacobiana das restrições são linearmente independentes. O espaço tangente ao conjunto viável é então

$$\mathcal{T}_{\mathbf{x}} = \mathcal{N}(\mathbf{J}_{\mathbf{c}}(\mathbf{x})).$$

Portanto, uma direção tangente  $\mathbf{d}$  satisfaz

$$\mathbf{J}_{\mathbf{c}}(\mathbf{x})\mathbf{d} = \mathbf{0}.$$

O espaço normal correspondente é

$$\mathcal{T}_{\mathbf{x}}^{\perp} = \mathcal{C}(\mathbf{J}_{\mathbf{c}}(\mathbf{x})^{\top}),$$

isto é, o espaço gerado pelos gradientes das restrições.

Em um ótimo local regular  $\mathbf{x}^*$ , a derivada direcional de  $f$  deve ser nula em todas as direções tangentes:

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} = 0$$

para todo

$$\mathbf{d} \in \mathcal{T}_{\mathbf{x}^*}.$$

Consequentemente,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) \in \mathcal{T}_{\mathbf{x}^*}^\perp = \mathcal{C} \left[ \mathbf{J}_{\mathbf{c}}(\mathbf{x}^*)^\top \right].$$

### 7.6.1 Multiplicadores de Lagrange

**Teorema 7.6** (Condição de Lagrange). *Considere funções continuamente diferenciáveis*

$$f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$$

e

$$\mathbf{c} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^m.$$

Seja  $\mathbf{x}^*$  um ótimo local do problema

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})$$

sujeito a

$$\mathbf{c}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Suponha que as linhas da Jacobiana

$$\mathbf{J}_{\mathbf{c}}(\mathbf{x}^*)$$

sejam linearmente independentes.

Essa condição equivale a

$$\text{posto} [\mathbf{J}_{\mathbf{c}} (\mathbf{x}^*)] = m.$$

Então existe um vetor

$$\lambda^* \in \mathbb{R}^m$$

tal que

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) + \mathbf{J}_{\mathbf{c}} (\mathbf{x}^*)^\top \lambda^* = \mathbf{0}.$$

(Apostol, 1969)

*Comprovação.* Como  $\mathbf{x}^*$  é um ótimo local regular, a derivada direcional da função objetivo é nula em todas as direções tangentes ao conjunto viável. Portanto,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} = 0$$

para todo

$$\mathbf{d} \in \mathcal{N} [\mathbf{J}_{\mathbf{c}} (\mathbf{x}^*)].$$

Logo,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) \in \mathcal{N} [\mathbf{J}_{\mathbf{c}} (\mathbf{x}^*)]^\perp.$$

Pela relação entre núcleo e espaço linha,

$$\mathcal{N} [\mathbf{J}_{\mathbf{c}} (\mathbf{x}^*)]^\perp = \mathcal{C} [\mathbf{J}_{\mathbf{c}} (\mathbf{x}^*)^\top].$$

Assim, existe um vetor

$$\mu^* \in \mathbb{R}^m$$

tal que

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{J}_{\mathbf{c}} (\mathbf{x}^*)^\top \mu^*.$$

Definindo



$$\lambda^* = -\mu^*,$$

obtém-se

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) + \mathbf{J}_{\mathbf{c}}(\mathbf{x}^*)^\top \lambda^* = \mathbf{0}.$$

□

A função lagrangiana é

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda^\top \mathbf{c}(\mathbf{x}).$$

Sob a condição de regularidade do teorema, as condições necessárias de primeira ordem podem ser escritas como

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = \mathbf{0}$$

e

$$\nabla_{\lambda} \mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = \mathbf{c}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Essas condições identificam candidatos a ótimo restrito. No caso geral, elas não são suficientes para garantir mínimo ou máximo. A classificação exige condições adicionais sobre a função objetivo, as restrições e a variação de segunda ordem nas direções tangentes.

Os multiplicadores ajustam a condição de gradiente nulo para levar em conta as direções que não estão disponíveis devido às restrições.

**Exemplo 7.11** (Otimização com restrição de norma). Considere

$$\max_{\mathbf{x}} \mathbf{a}^\top \mathbf{x},$$

com

$$\mathbf{a} \neq \mathbf{0},$$

sujeito a

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{x} = 1.$$

Escreva a restrição como

$$c(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{x} - 1 = 0.$$

A lagrangiana pode ser definida por

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = -\mathbf{a}^\top \mathbf{x} + \lambda (\mathbf{x}^\top \mathbf{x} - 1),$$

convertendo a maximização em minimização.

A condição em relação a  $\mathbf{x}$  é

$$-\mathbf{a} + 2\lambda \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathbf{x} = \frac{1}{2\lambda} \mathbf{a}.$$

A restrição implica

$$\frac{\|\mathbf{a}\|^2}{4\lambda^2} = 1.$$

Para maximizar  $\mathbf{a}^\top \mathbf{x}$ , escolhe-se

$$\mathbf{x}^\star = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}.$$

O valor máximo é

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{x}^\star = \|\mathbf{a}\|.$$

Esse resultado coincide com a igualdade na desigualdade de Cauchy–Schwarz.

Se  $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ , a função objetivo é constante e todo vetor unitário é uma solução ótima.

### 7.6.2 Relação com problemas de autovalores

Considere o problema

$$\max_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$$

sujeito a

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{x} = 1,$$

com  $\mathbf{A}$  simétrica.

A lagrangiana é

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} - \lambda (\mathbf{x}^\top \mathbf{x} - 1).$$

A condição de primeira ordem é

$$2\mathbf{A}\mathbf{x} - 2\lambda\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

ou

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}.$$

Portanto, todo ponto regular estacionário do problema restrito é um autovetor de  $\mathbf{A}$ , e o valor da função objetivo nesse ponto é o autovalor correspondente.

Pelo Teorema 5.6, desenvolvido no capítulo de decomposição espectral,

$$\max_{\|\mathbf{x}\|=1} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \lambda_{\max}(\mathbf{A}),$$

e

$$\min_{\|\mathbf{x}\|=1} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \lambda_{\min}(\mathbf{A}).$$

Assim, os multiplicadores de Lagrange produzem a equação de autovalores como condição de estacionariedade, enquanto o resultado espectral identifica quais desses pontos realizam os extremos globais.

### 7.6.3 Restrições lineares

Considere o problema quadrático

$$\min_{\mathbf{x}} \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{b}^\top \mathbf{x}$$

sujeito a

$$\mathbf{C} \mathbf{x} = \mathbf{d},$$

em que

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

é simétrica,

$$\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times p}$$

e

$$\mathbf{d} \in \mathbb{R}^m.$$

A lagrangiana é

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{b}^\top \mathbf{x} + \lambda^\top (\mathbf{C} \mathbf{x} - \mathbf{d}).$$

As condições de primeira ordem são

$$\mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{b} + \mathbf{C}^\top \lambda = \mathbf{0}$$

e

$$\mathbf{C} \mathbf{x} = \mathbf{d}.$$

Essas condições podem ser organizadas no sistema em blocos

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C}^\top \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ \mathbf{d} \end{bmatrix}.$$

Esse sistema em blocos reúne as condições de primeira ordem do problema restrito.

Se

$$\mathbf{A} \succ \mathbf{0}$$

e  $\mathbf{C}$  possui posto linha completo, a função objetivo é estritamente convexa e o conjunto definido por

$$\mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{d}$$

é afim. Quando esse conjunto é não vazio, as condições de primeira ordem identificam o único minimizador global.

Mais geralmente, para uma matriz  $\mathbf{A}$  semidefinida positiva, a unicidade depende de a forma quadrática ser positiva nas direções viáveis não nulas, isto é,

$$\mathbf{z}^\top \mathbf{A} \mathbf{z} > 0$$

para todo

$$\mathbf{z} \neq \mathbf{0}$$

tal que

$$\mathbf{C}\mathbf{z} = \mathbf{0}.$$

Sem condições desse tipo, a resolução do sistema fornece apenas candidatos que satisfazem as condições de primeira ordem.

As ferramentas desta seção serão aplicadas a funções de resíduos, critérios quadráticos e funções de parâmetros matriciais.

## 7.7 Derivadas de formas lineares, quadráticas e funções de resíduos

### 7.7.1 Formas lineares e bilineares

Considere

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{x},$$

em que  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$  é constante. Como

$$df = \mathbf{a}^\top d\mathbf{x},$$

tem-se

$$\nabla_{\mathbf{x}} f = \mathbf{a}$$

e

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f = \mathbf{0}.$$

Para a forma bilinear

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y},$$

com

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times q},$$

o diferencial é

$$df = d\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y} + \mathbf{x}^\top \mathbf{A} d\mathbf{y}.$$

Reescrevendo o primeiro termo,

$$d\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y} = (\mathbf{A} \mathbf{y})^\top d\mathbf{x},$$

e o segundo,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} d\mathbf{y} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{x})^\top d\mathbf{y}.$$

Logo,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f = \mathbf{A} \mathbf{y}$$

e

$$\nabla_{\mathbf{y}} f = \mathbf{A}^\top \mathbf{x}.$$

### 7.7.2 Formas quadráticas

Considere

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x},$$

com

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

O diferencial é

$$\begin{aligned} df &= d\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{A} d\mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top d\mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{A} d\mathbf{x} \\ &= [(\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top) \mathbf{x}]^\top d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top) \mathbf{x}$$

e

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) = \mathbf{A} + \mathbf{A}^\top.$$

A forma quadrática depende somente da parte simétrica da matriz:

$$\mathbf{A}_s = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top}{2}.$$

Assim,

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_s \mathbf{x},$$

e

$$\nabla_{\mathbf{x}} (\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}) = 2\mathbf{A}_s \mathbf{x}.$$

Quando  $\mathbf{A}$  é simétrica,

$$\nabla_{\mathbf{x}} (\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}) = 2\mathbf{A} \mathbf{x}$$

e

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 (\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}) = 2\mathbf{A}.$$

**Proposição 7.5** (Derivadas de uma forma quadrática deslocada). *Se  $\mathbf{A}$  é simétrica e*

$$f(\mathbf{x}) = (\mathbf{x} - \mu)^\top \mathbf{A} (\mathbf{x} - \mu),$$

*então*

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{A} (\mathbf{x} - \mu)$$

*e*

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{A}.$$

*Comprovação.* Defina

$$\mathbf{z} = \mathbf{x} - \mu.$$

Como

$$d\mathbf{z} = d\mathbf{x},$$

tem-se



$$\begin{aligned} df &= d\mathbf{z}^\top \mathbf{A} \mathbf{z} + \mathbf{z}^\top \mathbf{A} d\mathbf{z} \\ &= 2\mathbf{z}^\top \mathbf{A} d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

pois  $\mathbf{A}$  é simétrica. Portanto,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f = 2\mathbf{A} \mathbf{z} = 2\mathbf{A} (\mathbf{x} - \mu).$$

A diferenciação do gradiente fornece a Hessiana. □

Se

$$\mathbf{A} \succeq \mathbf{0},$$

a forma quadrática deslocada é convexa. Se

$$\mathbf{A} \succ \mathbf{0},$$

ela é estritamente convexa e possui mínimo único em

$$\mathbf{x} = \mu.$$

Se

$$\mathbf{A} \succeq \mathbf{0}$$

é singular, todos os vetores da forma

$$\mathbf{x} = \mu + \mathbf{z}, \quad \mathbf{z} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}),$$

também minimizam a função. Portanto, a unicidade ocorre quando

$$\mathbf{A} \succ \mathbf{0}.$$

### 7.7.3 Norma euclidiana

Como

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \mathbf{x}^\top \mathbf{x},$$

segue que

$$\nabla_{\mathbf{x}} \|\mathbf{x}\|^2 = 2\mathbf{x}$$

e

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 \|\mathbf{x}\|^2 = 2\mathbf{I}_p.$$

Para  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ,

$$\|\mathbf{x}\| = (\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{1/2}.$$

Pela regra da cadeia,

$$\nabla_{\mathbf{x}} \|\mathbf{x}\| = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}.$$

A norma euclidiana não é diferenciável em  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .

### 7.7.4 Funções de resíduos lineares

Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{q \times p}, \quad \mathbf{b} \in \mathbb{R}^q,$$

e defina o vetor de resíduos

$$\mathbf{r}(\mathbf{x}) = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}.$$

Sua Jacobiana é

$$\mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x}) = -\mathbf{A}.$$

A soma de quadrados dos resíduos é

$$f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{r}(\mathbf{x})\|^2 = (\mathbf{b} - \mathbf{Ax})^\top (\mathbf{b} - \mathbf{Ax}).$$

Pela regra da cadeia,

$$\begin{aligned}\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) &= 2\mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})^\top \mathbf{r}(\mathbf{x}) \\ &= -2\mathbf{A}^\top (\mathbf{b} - \mathbf{Ax}).\end{aligned}$$

Equivalentemente,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{A}^\top (\mathbf{Ax} - \mathbf{b}).$$

A Hessiana é

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{A}^\top \mathbf{A}.$$

A Hessiana é constante e não depende de  $\mathbf{x}$ . Além disso,

$$\mathbf{z}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{z} = \|\mathbf{Az}\|^2 \geq 0,$$

para todo

$$\mathbf{z} \in \mathbb{R}^p.$$

Portanto,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \succeq \mathbf{0}.$$

Como

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \succeq \mathbf{0},$$

a função é convexa.

Se  $\mathbf{A}$  possui posto coluna completo,

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \succ \mathbf{0},$$

e a função é estritamente convexa.

### 7.7.5 Equações normais

Uma solução de mínimos quadrados deve satisfazer

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathbf{A}^\top (\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) = \mathbf{0},$$

ou

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}.$$

Essas são as equações normais.

A condição também pode ser escrita como

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{r}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Portanto, no ponto de mínimo, o vetor residual é ortogonal ao espaço coluna de  $\mathbf{A}$ .

Equivalentemente,

$$\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}$$

é a projeção ortogonal de  $\mathbf{b}$  sobre

$$\mathcal{C}(\mathbf{A}).$$

Assim,

$$\mathbf{b} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{r}},$$

com

$$\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} \in \mathcal{C}(\mathbf{A})$$

e

$$\hat{\mathbf{r}} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top).$$

Quando  $\mathbf{A}$  possui posto coluna completo, a solução é única:

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b}.$$

Quando  $\mathbf{A}$  não possui posto coluna completo,

$$\text{posto}(\mathbf{A}) < p,$$

as equações normais possuem mais de uma solução de mínimos quadrados. A pseudoinversa seleciona a solução de menor norma:

$$\hat{\mathbf{x}}^\star = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}.$$

A geometria das soluções de mínimos quadrados e a construção pela SVD foram desenvolvidas no capítulo anterior.

**Exemplo 7.12** (Média como solução de mínimos quadrados). Considere valores

$$z_1, \dots, z_n$$

e a função

$$f(m) = \sum_{i=1}^n (z_i - m)^2.$$

A derivada é

$$\begin{aligned} f'(m) &= -2 \sum_{i=1}^n (z_i - m) \\ &= 2nm - 2 \sum_{i=1}^n z_i. \end{aligned}$$

A condição

$$f'(m) = 0$$

fornece

$$m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i.$$

Como

$$f''(m) = 2n > 0,$$

a média aritmética é o único minimizador da soma dos quadrados dos desvios.

### 7.7.6 Mínimos quadrados ponderados

Considere pesos não negativos

$$\omega_1, \dots, \omega_q \geq 0$$

e a matriz diagonal

$$\Omega = \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_q).$$

A função de mínimos quadrados ponderados é

$$f_\omega(\mathbf{x}) = (\mathbf{b} - \mathbf{Ax})^\top \Omega (\mathbf{b} - \mathbf{Ax}).$$

Como  $\Omega$  é diagonal e, portanto, simétrica,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f_\omega(\mathbf{x}) = -2\mathbf{A}^\top \Omega (\mathbf{b} - \mathbf{Ax})$$

e

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f_\omega(\mathbf{x}) = 2\mathbf{A}^\top \Omega \mathbf{A}.$$

Se

$$\Omega \succeq \mathbf{0},$$

a função é convexa.

As equações normais ponderadas são

$$\mathbf{A}^\top \Omega \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{A}^\top \Omega \mathbf{b}.$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{A}^\top \Omega \mathbf{r}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Portanto, em qualquer minimizador, o resíduo satisfaz a condição de ortogonalidade ponderada

$$\mathbf{A}^\top \Omega \mathbf{r}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Quando

$$\Omega \succ \mathbf{0},$$

a forma

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_\Omega = \mathbf{u}^\top \Omega \mathbf{v}$$

define um produto interno, e a condição anterior corresponde à ortogonalidade do resíduo ao espaço coluna de  $\mathbf{A}$  nessa geometria ponderada.

Se  $\Omega$  é singular, a mesma condição algébrica permanece válida, mas a forma ponderada é apenas semidefinida positiva e não define um produto interno em todo o espaço.

Se

$$\Omega \succ \mathbf{0}$$

e  $\mathbf{A}$  possui posto coluna completo, então

$$\mathbf{A}^\top \Omega \mathbf{A} \succ \mathbf{0},$$

e o minimizador é único:

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^\top \Omega \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \Omega \mathbf{b}.$$

A matriz  $\Omega$  modifica a importância relativa dos resíduos. Para uma matriz diagonal, cada observação recebe um peso próprio.

Quando

$$\Omega \succ \mathbf{0},$$

o critério pode ser escrito como

$$f_{\omega}(\mathbf{x}) = \|\mathbf{b} - \mathbf{Ax}\|_{\Omega}^2,$$

em que

$$\|\mathbf{z}\|_{\Omega}^2 = \mathbf{z}^{\top} \Omega \mathbf{z}.$$

Assim, os mínimos quadrados ponderados correspondem a uma projeção segundo a geometria induzida por  $\Omega$ .

### 7.7.7 Funções compostas de resíduos

Considere uma função diferenciável

$$\rho : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

e resíduos escalares

$$r_i(\mathbf{x}), \quad i = 1, \dots, q.$$

Uma classe ampla de funções de ajuste pode ser escrita como

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^q \rho(r_i(\mathbf{x})).$$

Pela regra da cadeia,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^q \rho'(r_i(\mathbf{x})) \nabla_{\mathbf{x}} r_i(\mathbf{x}).$$

Se

$$\rho(t) = t^2,$$



então

$$\rho'(t) = 2t,$$

e recupera-se a soma de quadrados.

Essa formulação mostra que diferentes funções de perda modificam a contribuição de cada resíduo no gradiente.

### 7.7.8 Mínimos quadrados não lineares

Considere uma função residual duas vezes diferenciável

$$\mathbf{r} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q$$

e o critério

$$f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{r}(\mathbf{x})\|^2.$$

A Jacobiana dos resíduos é

$$\mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{q \times p}.$$

**Proposição 7.6** (Derivadas de uma soma de quadrados não linear). *Para*

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^q r_i(\mathbf{x})^2,$$

*tem-se*

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})^\top \mathbf{r}(\mathbf{x})$$

*e*

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})^\top \mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x}) + 2 \sum_{i=1}^q r_i(\mathbf{x}) \nabla_{\mathbf{x}}^2 r_i(\mathbf{x}).$$

*Comprovação.* Pela regra da cadeia,

$$\begin{aligned}\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^q 2r_i(\mathbf{x}) \nabla_{\mathbf{x}} r_i(\mathbf{x}) \\ &= 2\mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})^{\top} \mathbf{r}(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

Diferenciando novamente cada parcela,

$$\nabla_{\mathbf{x}} [r_i(\mathbf{x}) \nabla_{\mathbf{x}} r_i(\mathbf{x})] = \nabla_{\mathbf{x}} r_i(\mathbf{x}) \nabla_{\mathbf{x}} r_i(\mathbf{x})^{\top} + r_i(\mathbf{x}) \nabla_{\mathbf{x}}^2 r_i(\mathbf{x}).$$

Somando sobre  $i$ , obtém-se a expressão da Hessiana. □

A Hessiana possui, portanto, duas parcelas com papéis distintos:

$$\underbrace{2\mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})^{\top} \mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})}_{\text{parcela de primeira ordem dos resíduos}} + 2 \underbrace{\sum_{i=1}^q r_i(\mathbf{x}) \nabla_{\mathbf{x}}^2 r_i(\mathbf{x})}_{\text{correção de não linearidade}}.$$

O primeiro termo da Hessiana,

$$2\mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})^{\top} \mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x}),$$

é semidefinido positivo. Isso não implica, porém, que a função de mínimos quadrados não linear seja convexa, pois a segunda parcela da Hessiana pode ser indefinida.

O segundo termo depende:

- dos valores dos resíduos;
- das Hessianas das funções residuais;
- da não linearidade do modelo.

Quando os resíduos são pequenos ou quando as Hessianas das funções residuais têm contribuição reduzida na região considerada, a segunda parcela pode ser desprezada aproximadamente. Nesse caso,

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) \approx 2\mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})^{\top} \mathbf{J}_{\mathbf{r}}(\mathbf{x}).$$

No caso linear,

$$\mathbf{r}(\mathbf{x}) = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x},$$

tem-se

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 r_i(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

para todo  $i$ . Portanto, a segunda parcela desaparece exatamente e

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{A}^\top \mathbf{A}.$$

Essa aproximação conduz ao método de Gauss–Newton. Seu desenvolvimento computacional não será necessário neste capítulo.

As mesmas ideias serão estendidas a funções cujos argumentos são matrizes. Nesse caso, os diferenciais e as identidades de traço permitem organizar as derivadas sem decompor a matriz em todos os seus elementos.

## 7.8 Diferenciais matriciais e cálculo por traços

Uma função escalar pode depender de todos os elementos de uma matriz. A diferenciação elemento a elemento é possível, mas se torna extensa quando a dimensão aumenta. Os diferenciais matriciais e as identidades de traço permitem organizar essas derivadas preservando a estrutura dos produtos.

Considere uma função

$$\phi : \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R},$$

cujos argumentos são

$$\mathbf{X} = (x_{ij}).$$

O diferencial total pode ser escrito como

$$d\phi = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{\partial \phi}{\partial x_{ij}} dx_{ij}.$$

Retomando a convenção estabelecida no início do capítulo, o gradiente matricial é

$$\nabla_{\mathbf{X}} \phi = \left( \frac{\partial \phi}{\partial x_{ij}} \right) \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Utilizando o produto interno de Frobenius,

$$\langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle_F = \text{tr} (\mathbf{A}^\top \mathbf{B}),$$

o diferencial assume a forma

$$d\phi = \langle \nabla_{\mathbf{X}} \phi, d\mathbf{X} \rangle_F.$$

Portanto,

$$d\phi = \text{tr} \left[ (\nabla_{\mathbf{X}} \phi)^\top d\mathbf{X} \right].$$

Essa identidade será utilizada para reconhecer o gradiente após reorganizar o diferencial.

Assim como o gradiente de uma função escalar de vetor representa o diferencial segundo o produto interno euclidiano, o gradiente matricial representa o diferencial segundo o produto interno de Frobenius.

### 7.8.1 Regras básicas do diferencial matricial

Se  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{B}$  são matrizes constantes e  $\mathbf{X}$  é variável, então

$$d\mathbf{A} = \mathbf{0}$$

e

$$d\mathbf{B} = \mathbf{0}.$$

O diferencial é linear:

$$d(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) = d\mathbf{X} + d\mathbf{Y},$$

e, para escalares constantes  $\alpha$  e  $\beta$ ,

$$d(\alpha \mathbf{X} + \beta \mathbf{Y}) = \alpha d\mathbf{X} + \beta d\mathbf{Y}.$$

Para um produto de matrizes variáveis,

$$d(\mathbf{X}\mathbf{Y}) = d\mathbf{X} \mathbf{Y} + \mathbf{X} d\mathbf{Y}.$$

Para três fatores,

$$\begin{aligned} d(\mathbf{XYZ}) &= d\mathbf{X} \mathbf{YZ} \\ &\quad + \mathbf{X} d\mathbf{Y} \mathbf{Z} \\ &\quad + \mathbf{XY} d\mathbf{Z}. \end{aligned}$$

A transposição comuta com o diferencial:

$$d(\mathbf{X}^\top) = (d\mathbf{X})^\top.$$

Quando  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{B}$  são constantes,

$$d(\mathbf{AXB}) = \mathbf{A} d\mathbf{X} \mathbf{B}.$$

Para o produto cruzado,

$$d(\mathbf{X}^\top \mathbf{X}) = d\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \mathbf{X}^\top d\mathbf{X}.$$

Essas regras mantêm a ordem dos fatores. Em geral, os produtos matriciais não podem ser reorganizados por comutatividade.

### 7.8.2 Identidades de traço

O traço transforma expressões matriciais quadradas em escalares e permite realizar permutações cíclicas dos fatores:

$$\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA}),$$

quando os produtos são definidos.

Para três fatores,

$$\text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{BCA}) = \text{tr}(\mathbf{CAB}).$$

A ordem cíclica pode ser alterada, mas não uma ordem arbitrária. Em geral,

$$\text{tr}(\mathbf{ABC}) \neq \text{tr}(\mathbf{ACB}).$$

Também são válidas as identidades

$$\text{tr}(\mathbf{A}^\top) = \text{tr}(\mathbf{A})$$

e

$$\text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{B}^\top \mathbf{A}).$$

Para reorganizar diferenciais, será utilizada a relação

$$\text{tr}(\mathbf{A} d\mathbf{X}^\top) = \text{tr}(\mathbf{A}^\top d\mathbf{X}).$$

De modo semelhante,

$$\text{tr}(d\mathbf{X}^\top \mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{A}^\top d\mathbf{X}).$$

O objetivo dessas transformações é escrever o diferencial na forma

$$d\phi = \text{tr}(\mathbf{G}^\top d\mathbf{X}).$$

Nesse caso,

$$\nabla_{\mathbf{X}} \phi = \mathbf{G}.$$

### 7.8.3 Função linear de uma matriz

**Proposição 7.7** (Gradiente de uma função matricial linear). *Se*

$$\phi(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{X}),$$

*em que  $\mathbf{A}$  é constante e possui a mesma dimensão de  $\mathbf{X}$ , então*

$$\nabla_{\mathbf{X}} \phi = \mathbf{A}.$$

(Magnus; Neudecker, 2019)

*Comprovação.* O diferencial é

$$\begin{aligned} d\phi &= d \operatorname{tr} (\mathbf{A}^\top \mathbf{X}) \\ &= \operatorname{tr} (\mathbf{A}^\top d\mathbf{X}). \end{aligned}$$

Comparando com

$$d\phi = \operatorname{tr} \left[ (\nabla_{\mathbf{X}} \phi)^\top d\mathbf{X} \right],$$

obtém-se

$$\nabla_{\mathbf{X}} \phi = \mathbf{A}.$$

□

Como

$$\operatorname{tr} (\mathbf{A}^\top \mathbf{X}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} x_{ij},$$

essa função é o equivalente matricial da forma linear  $\mathbf{a}^\top \mathbf{x}$ .

#### 7.8.4 Norma de Frobenius

A norma de Frobenius satisfaz

$$\|\mathbf{X}\|_F^2 = \operatorname{tr} (\mathbf{X}^\top \mathbf{X}).$$

Seu diferencial é

$$\begin{aligned} d\|\mathbf{X}\|_F^2 &= d \operatorname{tr} (\mathbf{X}^\top \mathbf{X}) \\ &= \operatorname{tr} (d\mathbf{X}^\top \mathbf{X}) + \operatorname{tr} (\mathbf{X}^\top d\mathbf{X}). \end{aligned}$$

Como

$$\operatorname{tr} (d\mathbf{X}^\top \mathbf{X}) = \operatorname{tr} (\mathbf{X}^\top d\mathbf{X}),$$

segue que

$$d\|\mathbf{X}\|_F^2 = 2 \operatorname{tr}(\mathbf{X}^\top d\mathbf{X}).$$

Portanto,

$$\nabla_{\mathbf{X}}\|\mathbf{X}\|_F^2 = 2\mathbf{X}.$$

Para uma matriz constante  $\mathbf{M}$ ,

$$\phi(\mathbf{X}) = \|\mathbf{X} - \mathbf{M}\|_F^2$$

possui gradiente

$$\nabla_{\mathbf{X}}\phi = 2(\mathbf{X} - \mathbf{M}).$$

O único minimizador é

$$\mathbf{X} = \mathbf{M}.$$

De fato, essa função é estritamente convexa em  $\mathbf{X}$ , pois sua segunda variação em uma perturbação não nula  $d\mathbf{X}$  é

$$d^2\phi = 2\|d\mathbf{X}\|_F^2 > 0.$$

### 7.8.5 Funções quadráticas de uma matriz

Considere

$$\phi(\mathbf{X}) = \operatorname{tr}(\mathbf{X}^\top \mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{\Gamma}),$$

com

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$$

e

$$\mathbf{\Gamma} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$



O diferencial é

$$d\phi = \text{tr}(d\mathbf{X}^\top \mathbf{A} \mathbf{X} \Gamma) + \text{tr}(\mathbf{X}^\top \mathbf{A} d\mathbf{X} \Gamma).$$

O primeiro termo pode ser escrito como

$$\text{tr}(d\mathbf{X}^\top \mathbf{A} \mathbf{X} \Gamma) = \text{tr}[(\mathbf{A} \mathbf{X} \Gamma)^\top d\mathbf{X}].$$

No segundo termo, pela propriedade cíclica,

$$\begin{aligned} \text{tr}(\mathbf{X}^\top \mathbf{A} d\mathbf{X} \Gamma) &= \text{tr}(\Gamma \mathbf{X}^\top \mathbf{A} d\mathbf{X}) \\ &= \text{tr}[(\mathbf{A}^\top \mathbf{X} \Gamma^\top)^\top d\mathbf{X}]. \end{aligned}$$

Logo,

$$\nabla_{\mathbf{X}} \phi = \mathbf{A} \mathbf{X} \Gamma + \mathbf{A}^\top \mathbf{X} \Gamma^\top.$$

Se  $\mathbf{A}$  e  $\Gamma$  são simétricas,

$$\nabla_{\mathbf{X}} \phi = 2\mathbf{A} \mathbf{X} \Gamma.$$

A dimensão do gradiente coincide com a dimensão do argumento:

$$\nabla_{\mathbf{X}} \phi \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

**Exemplo 7.13** (Soma ponderada de produtos quadráticos). Considere

$$\phi(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{X}^\top \mathbf{A} \mathbf{X}),$$

com  $\mathbf{A}$  simétrica.

Esse é o caso particular

$$\Gamma = \mathbf{I}_n.$$

Portanto,

$$\nabla_{\mathbf{X}} \phi = 2\mathbf{A} \mathbf{X}.$$

Se as colunas de  $\mathbf{X}$  são

$$\mathbf{x}_{\cdot 1}, \dots, \mathbf{x}_{\cdot n},$$

então

$$\phi(\mathbf{X}) = \sum_{j=1}^n \mathbf{x}_{\cdot j}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{x}_{\cdot j}.$$

O gradiente reúne, em suas colunas, os gradientes das formas quadráticas individuais:

$$2\mathbf{A}\mathbf{x}_{\cdot 1}, \dots, 2\mathbf{A}\mathbf{x}_{\cdot n}.$$

### 7.8.6 Funções matriciais de resíduos

Considere o modelo matricial

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{B} + \mathcal{E},$$

em que

$$\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{n \times p}, \quad \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times k}$$

e

$$\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{k \times p}.$$

Para um valor genérico de  $\mathbf{B}$ , defina a matriz de resíduos

$$\mathcal{E}(\mathbf{B}) = \mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{B}.$$

A função de soma de quadrados é

$$Q(\mathbf{B}) = \|\mathcal{E}(\mathbf{B})\|_F^2.$$

Equivalentemente,

$$Q(\mathbf{B}) = \text{tr} [\mathcal{E}(\mathbf{B})^{\top} \mathcal{E}(\mathbf{B})].$$

Como

$$d\mathcal{E} = -\mathbf{X} d\mathbf{B},$$

tem-se

$$\begin{aligned} dQ &= 2 \operatorname{tr} \left( \mathcal{E}^\top d\mathcal{E} \right) \\ &= -2 \operatorname{tr} \left( \mathcal{E}^\top \mathbf{X} d\mathbf{B} \right) \\ &= -2 \operatorname{tr} \left[ (\mathbf{X}^\top \mathcal{E})^\top d\mathbf{B} \right]. \end{aligned}$$

Logo,

$$\nabla_{\mathbf{B}} Q(\mathbf{B}) = -2\mathbf{X}^\top \mathcal{E}(\mathbf{B}).$$

Substituindo a matriz de resíduos,

$$\nabla_{\mathbf{B}} Q(\mathbf{B}) = 2\mathbf{X}^\top (\mathbf{X}\mathbf{B} - \mathbf{Y}).$$

A condição de primeira ordem é

$$\mathbf{X}^\top (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{B}) = \mathbf{0},$$

ou

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X}\mathbf{B} = \mathbf{X}^\top \mathbf{Y}.$$

Essas são as equações normais matriciais.

Se  $\mathbf{X}$  possui posto coluna completo,

$$\widehat{\mathbf{B}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{Y}.$$

Se  $\mathbf{X}$  não possui posto coluna completo, os minimizadores não são únicos. A solução de mínimos quadrados de menor norma de Frobenius é

$$\widehat{\mathbf{B}}^\star = \mathbf{X}^+ \mathbf{Y}.$$

Mais geralmente, todos os minimizadores podem ser escritos como

$$\widehat{\mathbf{B}} = \mathbf{X}^+ \mathbf{Y} + (\mathbf{I}_k - \mathbf{X}^+ \mathbf{X}) \mathbf{C},$$

em que

$$\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{k \times p}$$

é arbitrária.

A parcela adicional pertence ao núcleo da transformação

$$\mathbf{B} \mapsto \mathbf{X}\mathbf{B}$$

e, portanto, não altera os valores ajustados.

Assim, quando o critério utilizado é simplesmente a norma de Frobenius dos resíduos, o problema matricial pode ser interpretado como  $p$  problemas de mínimos quadrados que compartilham a mesma matriz de delineamento.

**Proposição 7.8** (Convexidade dos mínimos quadrados matriciais). *A função*

$$Q(\mathbf{B}) = \|\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{B}\|_F^2$$

*é convexa em  $\mathbf{B}$ .*

*Ela é estritamente convexa se, e somente se,  $\mathbf{X}$  possui posto coluna completo.*

*Comprovação.* Considere uma perturbação

$$d\mathbf{B}.$$

A segunda variação de  $Q$  é

$$d^2Q = 2 \operatorname{tr} (d\mathbf{B}^\top \mathbf{X}^\top \mathbf{X} d\mathbf{B}).$$

Equivalentemente,

$$d^2Q = 2 \|\mathbf{X} d\mathbf{B}\|_F^2 \geq 0.$$

Portanto, a função é convexa.

Se  $\mathbf{X}$  possui posto coluna completo, então

$$\mathbf{X} d\mathbf{B} = \mathbf{0}$$

implica

$$d\mathbf{B} = \mathbf{0}.$$

Assim, a segunda variação é positiva para toda perturbação não nula, e a função é estritamente convexa.

Reciprocamente, se  $\mathbf{X}$  não possui posto coluna completo, existe

$$\mathbf{z} \neq \mathbf{0}$$

tal que

$$\mathbf{X}\mathbf{z} = \mathbf{0}.$$

Escolha qualquer vetor não nulo

$$\mathbf{c} \in \mathbb{R}^p$$

e defina

$$d\mathbf{B} = \mathbf{z}\mathbf{c}^\top.$$

Então

$$d\mathbf{B} \neq \mathbf{0},$$

mas

$$\mathbf{X} d\mathbf{B} = \mathbf{0}.$$

Portanto,

$$d^2Q = 0$$

em uma direção não nula, e a função não é estritamente convexa. □

### 7.8.7 Ponderação de observações e respostas

Considere uma matriz diagonal de pesos das observações

$$\Omega = \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_n) \succeq \mathbf{0}$$

e uma matriz simétrica positiva definida

$$\Sigma \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

O critério ponderado é

$$Q_{\Omega, \Sigma}(\mathbf{B}) = \text{tr} [\Sigma^{-1} \mathcal{E}(\mathbf{B})^\top \Omega \mathcal{E}(\mathbf{B})].$$

Como

$$\Omega \succeq \mathbf{0}$$

e

$$\Sigma \succ \mathbf{0},$$

o critério também pode ser escrito como

$$Q_{\Omega, \Sigma}(\mathbf{B}) = \left\| \Omega^{1/2} \mathcal{E}(\mathbf{B}) \Sigma^{-1/2} \right\|_F^2.$$

Essa forma mostra que a ponderação atua simultaneamente nas duas dimensões da matriz residual.

A matriz  $\Omega$  atua no espaço das observações e pondera as linhas da matriz de resíduos. A matriz  $\Sigma^{-1}$  atua no espaço das respostas e define a geometria utilizada para combinar as colunas da matriz de resíduos.

Como  $\Omega$  e  $\Sigma^{-1}$  são simétricas,

$$\begin{aligned} dQ_{\Omega, \Sigma} &= 2 \text{tr} [\Sigma^{-1} \mathcal{E}^\top \Omega d\mathcal{E}] \\ &= -2 \text{tr} [\Sigma^{-1} \mathcal{E}^\top \Omega \mathbf{X} d\mathbf{B}]. \end{aligned}$$

Pela propriedade cíclica,

$$dQ_{\Omega, \Sigma} = -2 \operatorname{tr} \left[ (\mathbf{X}^\top \Omega \mathcal{E} \Sigma^{-1})^\top d\mathbf{B} \right].$$

Portanto,

$$\nabla_{\mathbf{B}} Q_{\Omega, \Sigma}(\mathbf{B}) = -2 \mathbf{X}^\top \Omega \mathcal{E}(\mathbf{B}) \Sigma^{-1}.$$

A condição de primeira ordem é

$$\mathbf{X}^\top \Omega (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{B}) \Sigma^{-1} = \mathbf{0}.$$

Como  $\Sigma^{-1}$  é invertível,

$$\mathbf{X}^\top \Omega (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{B}) = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\mathbf{X}^\top \Omega \mathbf{X} \mathbf{B} = \mathbf{X}^\top \Omega \mathbf{Y}.$$

Se

$$\mathbf{X}^\top \Omega \mathbf{X}$$

é invertível.

Essa condição equivale a exigir que as colunas de

$$\Omega^{1/2} \mathbf{X}$$

sejam linearmente independentes.

O minimizador é

$$\widehat{\mathbf{B}} = (\mathbf{X}^\top \Omega \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \Omega \mathbf{Y}.$$

Para  $\Sigma$  fixa e positiva definida, a ponderação invertível no espaço das respostas altera o valor do critério e sua geometria, mas não altera o conjunto de minimizadores em relação a  $\mathbf{B}$ .

Isso ocorre porque

$$\Sigma^{-1}$$

é invertível e pode ser eliminada da condição de primeira ordem.

A ponderação das observações por  $\Omega$ , por outro lado, permanece nas equações normais e pode modificar o estimador.

Os diferenciais matriciais e as identidades de traço permitem agora tratar funções em que a própria matriz variável aparece no interior de uma inversa ou de um determinante. Essas estruturas são particularmente importantes quando o parâmetro pertence ao conjunto das matrizes positivas definidas.

## 7.9 Derivadas de inversas, determinantes e log-determinantes

As matrizes inversas e os determinantes aparecem em transformações de coordenadas, funções de densidade e critérios de estimação. Suas derivadas exigem condições de invertibilidade e, em aplicações com matrizes de covariâncias, definição positiva.

### 7.9.1 Diferencial da matriz inversa

Considere uma matriz invertível

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

A identidade

$$\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{I}_p$$

permite obter o diferencial da inversa.

**Proposição 7.9** (Diferencial da matriz inversa). *Se  $\mathbf{X}$  é invertível, então*

$$d(\mathbf{X}^{-1}) = -\mathbf{X}^{-1} (d\mathbf{X}) \mathbf{X}^{-1}.$$

(Magnus; Neudecker, 2019)



*Comprovação.* Diferenciando

$$\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{I}_p,$$

obtém-se

$$d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1} + \mathbf{X}d(\mathbf{X}^{-1}) = \mathbf{0}.$$

Multiplicando à esquerda por  $\mathbf{X}^{-1}$ ,

$$\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1} + d(\mathbf{X}^{-1}) = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$d(\mathbf{X}^{-1}) = -\mathbf{X}^{-1}(d\mathbf{X})\mathbf{X}^{-1}.$$

□

Quando  $\mathbf{X} \succ \mathbf{0}$  e a perturbação

$$d\mathbf{X} \succeq \mathbf{0},$$

tem-se

$$\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1} \succeq \mathbf{0},$$

e, portanto,

$$d(\mathbf{X}^{-1}) = -\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1} \preceq \mathbf{0}.$$

Assim, a inversão reverte a ordem de Loewner: aumentos semidefinidos positivos da matriz produzem variações semidefinidas negativas de sua inversa.

Para uma perturbação  $d\mathbf{X}$ ,

$$(\mathbf{X} + d\mathbf{X})^{-1} \approx \mathbf{X}^{-1} - \mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1}.$$

Essa aproximação é válida para perturbações suficientemente pequenas que preservem a invertibilidade.

**Exemplo 7.14** (Caso escalar). Para

$$x \neq 0,$$

a função inversa é

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

A fórmula matricial reduz-se a

$$d(x^{-1}) = -x^{-1}(dx)x^{-1} = -\frac{1}{x^2}dx.$$

Portanto,

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

### 7.9.2 Diferencial do determinante

O determinante é uma função escalar definida sobre matrizes quadradas:

$$\det : \mathbb{R}^{p \times p} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Sua derivada é descrita pela fórmula de Jacobi.

**Teorema 7.7** (Fórmula de Jacobi). *Se  $\mathbf{X}$  é invertível, então*

$$d \det(\mathbf{X}) = \det(\mathbf{X}) \operatorname{tr}(\mathbf{X}^{-1} d\mathbf{X}).$$

(Magnus; Neudecker, 2019)

*Comprovação.* Considere uma perturbação  $\mathbf{H}$  e a função

$$g(t) = \det(\mathbf{X} + t\mathbf{H}).$$

Como  $\mathbf{X}$  é invertível,

$$g(t) = \det(\mathbf{X}) \det(\mathbf{I}_p + t\mathbf{X}^{-1}\mathbf{H}).$$

Pela multilinearidade do determinante,

$$\det(\mathbf{I}_p + t\mathbf{M}) = 1 + t \operatorname{tr}(\mathbf{M}) + o(t).$$

Aplicando essa expansão com

$$\mathbf{M} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{H},$$

obtém-se

$$g(t) = \det(\mathbf{X}) [1 + t \operatorname{tr}(\mathbf{X}^{-1}\mathbf{H}) + o(t)].$$

Logo,

$$g'(0) = \det(\mathbf{X}) \operatorname{tr}(\mathbf{X}^{-1}\mathbf{H}).$$

Como  $\mathbf{H}$  representa uma perturbação arbitrária,

$$d \det(\mathbf{X}) = \det(\mathbf{X}) \operatorname{tr}(\mathbf{X}^{-1} d\mathbf{X}).$$

□

Como

$$d \det(\mathbf{X}) = \operatorname{tr} [(\nabla_{\mathbf{X}} \det(\mathbf{X}))^{\top} d\mathbf{X}],$$

segue que

$$\nabla_{\mathbf{X}} \det(\mathbf{X}) = \det(\mathbf{X}) \mathbf{X}^{-\top}.$$

Se  $\mathbf{X}$  é simétrica,

$$\mathbf{X}^{-\top} = \mathbf{X}^{-1},$$

e

$$\nabla_{\mathbf{X}} \det(\mathbf{X}) = \det(\mathbf{X}) \mathbf{X}^{-1}.$$

A fórmula pode ser estendida a matrizes singulares por meio da matriz adjunta, mas a forma envolvendo  $\mathbf{X}^{-1}$  exige invertibilidade.

### 7.9.3 Diferencial do log-determinante

Para matrizes positivas definidas,

$$\mathbf{X} \succ \mathbf{0},$$

o determinante é positivo e a função

$$\phi(\mathbf{X}) = \log \det(\mathbf{X})$$

está bem definida.

A restrição

$$\mathbf{X} \succ \mathbf{0}$$

garante simultaneamente que  $\mathbf{X}$  é invertível e que

$$\det(\mathbf{X}) > 0,$$

de modo que o logaritmo real do determinante está bem definido.

**Proposição 7.10** (Diferencial do log-determinante). *Se  $\mathbf{X} \succ \mathbf{0}$ , então*

$$d \log \det(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{X}^{-1} d\mathbf{X}).$$

*Consequentemente,*

$$\nabla_{\mathbf{X}} \log \det(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^{-1}.$$

*Comprovação.* Pela regra da cadeia,

$$d \log \det(\mathbf{X}) = \frac{1}{\det(\mathbf{X})} d \det(\mathbf{X}).$$

Aplicando a fórmula de Jacobi,

$$\begin{aligned} d \log \det(\mathbf{X}) &= \frac{1}{\det(\mathbf{X})} \det(\mathbf{X}) \text{tr}(\mathbf{X}^{-1} d\mathbf{X}) \\ &= \text{tr}(\mathbf{X}^{-1} d\mathbf{X}). \end{aligned}$$

Como  $\mathbf{X}$  é simétrica,

$$\mathbf{X}^{-\top} = \mathbf{X}^{-1},$$

o que fornece o gradiente. □

Para uma matriz real invertível, não necessariamente simétrica, pode-se considerar

$$\phi(\mathbf{X}) = \log |\det(\mathbf{X})|.$$

Como o determinante não se anula no conjunto das matrizes invertíveis, seu sinal permanece constante em uma vizinhança suficientemente pequena de cada matriz invertível. Nesse domínio,

$$d \log |\det(\mathbf{X})| = \text{tr}(\mathbf{X}^{-1} d\mathbf{X}),$$

e, portanto,

$$\nabla_{\mathbf{X}} \log |\det(\mathbf{X})| = \mathbf{X}^{-\top}.$$

#### 7.9.4 Segunda variação do log-determinante

Considere uma matriz positiva definida  $\mathbf{X}$  e uma perturbação simétrica  $d\mathbf{X}$ .

A primeira variação é

$$d\phi = \text{tr}(\mathbf{X}^{-1} d\mathbf{X}).$$

Utilizando o diferencial da inversa,

$$d(\mathbf{X}^{-1}) = -\mathbf{X}^{-1} d\mathbf{X} \mathbf{X}^{-1},$$

a segunda variação na mesma direção é

$$d^2\phi = -\text{tr}(\mathbf{X}^{-1} d\mathbf{X} \mathbf{X}^{-1} d\mathbf{X}).$$

Logo,

$$d^2\phi \leq 0.$$

**Teorema 7.8** (Concavidade do log-determinante). *A função*

$$\phi(\mathbf{X}) = \log \det(\mathbf{X})$$

*é estritamente côncava no conjunto das matrizes simétricas positivas definidas. (Boyd; Vandenberghe, 2004)*

*Comprovação.* O conjunto das matrizes simétricas positivas definidas é convexo. Para toda matriz

$$\mathbf{X} \succ \mathbf{0}$$

e toda direção simétrica não nula  $\mathbf{H}$ ,

$$d^2\phi[\mathbf{H}, \mathbf{H}] = -\|\mathbf{X}^{-1/2}\mathbf{H}\mathbf{X}^{-1/2}\|_F^2 < 0.$$

Logo, a restrição de  $\phi$  a qualquer segmento não degenerado do cone positivo definido possui segunda derivada negativa. Portanto,

$$\phi(\mathbf{X}) = \log \det(\mathbf{X})$$

é estritamente côncava nesse domínio. □

Consequentemente,

$$-\log \det(\mathbf{X})$$

é estritamente convexa nesse domínio.

### 7.9.5 Traço envolvendo uma matriz inversa

Considere

$$\phi(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}),$$

em que  $\mathbf{A}$  é constante e  $\mathbf{X}$  é invertível.

O diferencial é

$$\begin{aligned} d\phi &= \text{tr}[\mathbf{A} d(\mathbf{X}^{-1})] \\ &= -\text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1}). \end{aligned}$$

Pela propriedade cíclica,

$$d\phi = -\text{tr}(\mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}d\mathbf{X}).$$

Portanto,

$$\nabla_{\mathbf{X}}\phi = -\mathbf{X}^{-\top}\mathbf{A}^{\top}\mathbf{X}^{-\top}.$$

Observe que o gradiente possui a mesma dimensão de  $\mathbf{X}$ ,

$$\nabla_{\mathbf{X}}\phi \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

Se  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{X}$  são simétricas,

$$\nabla_{\mathbf{X}}\phi = -\mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}^{-1}.$$

**Exemplo 7.15** (Traço da inversa). Para

$$\phi(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{X}^{-1}),$$

tem-se  $\mathbf{A} = \mathbf{I}_p$ . Logo,

$$\nabla_{\mathbf{X}}\phi = -\mathbf{X}^{-\top}\mathbf{X}^{-\top}.$$

Se  $\mathbf{X}$  é simétrica positiva definida,

$$\nabla_{\mathbf{X}}\phi = -\mathbf{X}^{-2}.$$

### 7.9.6 Forma quadrática com matriz inversa

Considere

$$\phi(\mathbf{X}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{X}^{-1} \mathbf{a},$$

em que  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$  é constante e  $\mathbf{X} \succ \mathbf{0}$ .

A função pode ser escrita como

$$\phi(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{X}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{a}^\top).$$

Aplicando o resultado anterior,

$$\nabla_{\mathbf{X}} \phi = -\mathbf{X}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{a}^\top \mathbf{X}^{-1}.$$

Equivalentemente,

$$\nabla_{\mathbf{X}} \phi = -(\mathbf{X}^{-1} \mathbf{a})(\mathbf{X}^{-1} \mathbf{a})^\top.$$

Essa matriz é semidefinida negativa.

Consequentemente, para uma perturbação

$$\mathbf{H} \succeq \mathbf{0},$$

tem-se

$$d\phi[\mathbf{H}] = \text{tr}[(\nabla_{\mathbf{X}} \phi)^\top \mathbf{H}] \leq 0.$$

Assim, aumentar  $\mathbf{X}$  segundo a ordem de Loewner não aumenta a forma quadrática inversa.

Se o vetor também varia, considere

$$\phi(\mathbf{x}, \mathbf{X}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{X}^{-1} \mathbf{x}.$$

Em relação ao vetor,

$$\nabla_{\mathbf{x}} \phi = 2\mathbf{X}^{-1} \mathbf{x},$$



enquanto, em relação à matriz,

$$\nabla_{\mathbf{X}}\phi = -\mathbf{X}^{-1}\mathbf{xx}^{\top}\mathbf{X}^{-1}.$$

### 7.9.7 Critério com log-determinante e traço

Considere  $n > 0$  e

$$L(\Sigma) = \frac{n}{2} \log \det(\Sigma) + \frac{1}{2} \text{tr}(\Sigma^{-1}\mathbf{G}),$$

em que

$$\Sigma \succ \mathbf{0}$$

é variável e

$$\mathbf{G} \succeq \mathbf{0}$$

é constante e simétrica.

O diferencial é

$$\begin{aligned} dL &= \frac{n}{2} \text{tr}(\Sigma^{-1}d\Sigma) \\ &\quad - \frac{1}{2} \text{tr}(\Sigma^{-1}\mathbf{G}\Sigma^{-1}d\Sigma). \end{aligned}$$

Logo,

$$\nabla_{\Sigma}L = \frac{n}{2}\Sigma^{-1} - \frac{1}{2}\Sigma^{-1}\mathbf{G}\Sigma^{-1}.$$

A condição de primeira ordem é

$$n\Sigma^{-1} = \Sigma^{-1}\mathbf{G}\Sigma^{-1}.$$

Multiplicando à esquerda e à direita por  $\Sigma$ ,

$$n\Sigma = \mathbf{G}.$$

Portanto, o ponto estacionário é

$$\widehat{\Sigma} = \frac{1}{n} \mathbf{G}.$$

Para que esse ponto pertença ao domínio

$$\Sigma \succ \mathbf{0},$$

é necessário que

$$\mathbf{G} \succ \mathbf{0}.$$

**Proposição 7.11** (Minimização do critério de covariância). *Se*

$$\mathbf{G} \succ \mathbf{0},$$

*a função*

$$L(\Sigma) = \frac{n}{2} \log \det(\Sigma) + \frac{1}{2} \operatorname{tr}(\Sigma^{-1} \mathbf{G})$$

*possui minimizador único no conjunto das matrizes positivas definidas:*

$$\widehat{\Sigma} = \frac{1}{n} \mathbf{G}.$$

*Comprovação.* Defina

$$\mathbf{Z} = \mathbf{G}^{1/2} \Sigma^{-1} \mathbf{G}^{1/2}.$$

Como  $\mathbf{G}$  e  $\Sigma$  são positivas definidas,

$$\mathbf{Z} \succ \mathbf{0}.$$

Além disso,

$$\operatorname{tr}(\Sigma^{-1} \mathbf{G}) = \operatorname{tr}(\mathbf{Z})$$

e

$$\log \det(\Sigma) = \log \det(\mathbf{G}) - \log \det(\mathbf{Z}).$$

Assim, a menos de uma constante,

$$L(\Sigma) = \frac{1}{2} [\text{tr}(\mathbf{Z}) - n \log \det(\mathbf{Z})].$$

Se

$$z_1, \dots, z_p$$

são os autovalores positivos de  $\mathbf{Z}$ , então

$$L(\Sigma) = \text{constante} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^p (z_j - n \log z_j).$$

Para cada  $z_j > 0$ , a função

$$h(z) = z - n \log z$$

possui derivada

$$h'(z) = 1 - \frac{n}{z}$$

e segunda derivada

$$h''(z) = \frac{n}{z^2} > 0.$$

Seu único mínimo ocorre em

$$z = n.$$

Como cada parcela

$$z_j - n \log z_j$$

possui mínimo único em  $z_j = n$ , o mínimo global exige

$$z_1 = \cdots = z_p = n.$$

Portanto,

$$\mathbf{Z} = n\mathbf{I}_p.$$

Essa igualdade equivale a

$$\Sigma = \frac{1}{n}\mathbf{G}.$$

□

Se  $\mathbf{G}$  é singular, o candidato

$$\frac{1}{n}\mathbf{G}$$

não pertence ao domínio positivo definido.

Além disso, o critério é ilimitado inferiormente. De fato, escolhendo uma direção unitária

$$\mathbf{u} \in \mathcal{N}(\mathbf{G}),$$

pode-se fazer o autovalor de  $\Sigma$  associado a essa direção tender a zero. Nessa direção, o termo

$$\mathrm{tr}(\Sigma^{-1}\mathbf{G})$$

não recebe contribuição, enquanto

$$\log \det(\Sigma) \longrightarrow -\infty.$$

Portanto,

$$L(\Sigma) \longrightarrow -\infty,$$

e o problema não possui minimizador no cone positivo definido.

### 7.9.8 Parâmetros matriciais simétricos

As fórmulas anteriores foram escritas utilizando matrizes completas. Entretanto, uma matriz simétrica

$$\Sigma = \Sigma^\top$$

possui apenas

$$\frac{p(p+1)}{2}$$

elementos distintos.

Quando o argumento é restrito ao espaço das matrizes simétricas, as perturbações admissíveis também devem ser simétricas:

$$d\Sigma = d\Sigma^\top.$$

Para uma função escalar  $\phi(\Sigma)$ , somente a parte simétrica do gradiente contribui para o diferencial:

$$\text{tr} \left[ (\nabla_\Sigma \phi)^\top d\Sigma \right] = \text{tr} \left[ \left( \frac{\nabla_\Sigma \phi + \nabla_\Sigma \phi^\top}{2} \right)^\top d\Sigma \right].$$

Nos resultados anteriores, os gradientes obtidos para argumentos positivos definidos já são simétricos quando as matrizes constantes envolvidas também são simétricas.

Uma parametrização explícita dos elementos distintos será desenvolvida com os operadores de vetorização e meia vetorização.

## 7.10 Vetorização, produto de Kronecker e parâmetros matriciais

A vetorização transforma uma matriz em um vetor. Essa operação permite representar transformações matriciais por matrizes usuais e aplicar resultados de cálculo vetorial a parâmetros matriciais.

Nesta seção, o núcleo necessário para os capítulos seguintes é formado por três ideias:

- o operador  $\text{vec}$ ;
- o produto de Kronecker;
- a identidade que relaciona  $\text{vec}$  e produtos matriciais.

As subseções posteriores sobre Hessianas vetorizadas, matriz de comutação, meia vetorização, matrizes de duplicação e eliminação e Jacobianas de transformações matriciais serão apresentadas como aprofundamento. Elas são úteis em desenvolvimentos mais avançados de cálculo matricial e inferência, mas não são necessárias para uma primeira leitura do restante do livro.

### 7.10.1 Operador de vetorização

**Definição 7.9** (Operador de vetorização). Para

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

o vetor

$$\text{vec}(\mathbf{X}) \in \mathbb{R}^{mn}$$

é obtido pelo empilhamento das colunas de  $\mathbf{X}$ :

$$\text{vec}(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} x_{11} \\ \vdots \\ x_{m1} \\ x_{12} \\ \vdots \\ x_{m2} \\ \vdots \\ x_{1n} \\ \vdots \\ x_{mn} \end{bmatrix}.$$

**Exemplo 7.16** (Vetorização de uma matriz). Considere

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

Então,

$$\text{vec}(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ 5 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

A vetorização é linear:

$$\text{vec}(\alpha \mathbf{X} + \beta \mathbf{Y}) = \alpha \text{vec}(\mathbf{X}) + \beta \text{vec}(\mathbf{Y}).$$

Além disso,

$$\|\mathbf{X}\|_F = \|\text{vec}(\mathbf{X})\|.$$

Isso ocorre porque os dois lados reúnem os mesmos elementos ao quadrado:

$$\|\mathbf{X}\|_F^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}^2.$$

### 7.10.2 Produto de Kronecker

**Definição 7.10** (Produto de Kronecker). Considere

$$\mathbf{A} = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

e

$$\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{r \times s}.$$

O produto de Kronecker é a matriz

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{C} = \begin{bmatrix} a_{11} \mathbf{C} & \cdots & a_{1n} \mathbf{C} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} \mathbf{C} & \cdots & a_{mn} \mathbf{C} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{mr \times ns}.$$

**Exemplo 7.17** (Produto de Kronecker). Considere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Então,

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \otimes \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} 1\mathbf{C} & 2\mathbf{C} \\ 3\mathbf{C} & 4\mathbf{C} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(Magnus; Neudecker, 2019)

O produto de Kronecker satisfaz:

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{C})^\top = \mathbf{A}^\top \otimes \mathbf{C}^\top,$$

e, para produtos de dimensões compatíveis,

$$(\mathbf{A}_1 \otimes \mathbf{C}_1)(\mathbf{A}_2 \otimes \mathbf{C}_2) = (\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2) \otimes (\mathbf{C}_1 \mathbf{C}_2).$$

Se  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{C}$  são invertíveis,

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{C})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{C}^{-1}.$$

Se  $\mathbf{A}$  e  $\mathbf{C}$  são simétricas positivas definidas, então

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{C} \succ \mathbf{0}.$$



### 7.10.3 Identidade de vetorização

A relação entre vetorização e produto de Kronecker permite representar um produto matricial como uma transformação linear do vetor de elementos da matriz.

**Proposição 7.12** (Identidade fundamental da vetorização). *Considere*

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{r \times m}, \quad \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

e

$$\Gamma \in \mathbb{R}^{n \times s}.$$

Então,

$$\text{vec}(\mathbf{A}\mathbf{X}\Gamma) = (\Gamma^\top \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X}).$$

(Magnus; Neudecker, 2019)

O lado esquerdo possui dimensão  $rs$ . No lado direito,

$$\Gamma^\top \otimes \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{rs \times mn},$$

e

$$\text{vec}(\mathbf{X}) \in \mathbb{R}^{mn}.$$

Casos particulares importantes são

$$\text{vec}(\mathbf{A}\mathbf{X}) = (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X})$$

e

$$\text{vec}(\mathbf{X}\Gamma) = (\Gamma^\top \otimes \mathbf{I}_m) \text{vec}(\mathbf{X}).$$

A identidade mostra que uma transformação que atua simultaneamente à esquerda e à direita de uma matriz pode ser representada como uma transformação linear usual sobre o vetor formado por seus elementos.

Assim,

$$\mathbf{X} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{\Gamma}$$

corresponde, após vetorização, a

$$\text{vec}(\mathbf{X}) \mapsto (\mathbf{\Gamma}^\top \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X}).$$

**Exemplo 7.18** (Vetorização de um produto matricial). Considere

$$\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{\Gamma}.$$

Uma pequena perturbação de  $\mathbf{X}$  produz

$$d\mathbf{Y} = \mathbf{A} d\mathbf{X} \mathbf{\Gamma}.$$

Vetorizando,

$$d \text{vec}(\mathbf{Y}) = (\mathbf{\Gamma}^\top \otimes \mathbf{A}) d \text{vec}(\mathbf{X}).$$

Portanto, a Jacobiana da transformação vetorizada é

$$\frac{\partial \text{vec}(\mathbf{Y})}{\partial \text{vec}(\mathbf{X})^\top} = \mathbf{\Gamma}^\top \otimes \mathbf{A}.$$

#### 7.10.4 Aprofundamento: derivadas vetorizadas e parâmetros matriciais

##### Leitura de aprofundamento

As subseções seguintes desenvolvem ferramentas úteis quando parâmetros matriciais precisam ser tratados explicitamente como vetores. Elas permitem representar Hessianas, transposições, parâmetros simétricos e Jacobianas matriciais por meio de  $\text{vec}$ , produto de Kronecker e matrizes especiais.

Esses resultados são importantes em desenvolvimentos avançados de inferência multivariada e cálculo matricial, mas podem ser omitidos em uma primeira leitura sem comprometer a continuidade dos capítulos seguintes.

#### 7.10.4.1 Gradiente matricial e gradiente vetorizado

Considere

$$\phi : \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Pela definição do gradiente matricial,

$$d\phi = \text{tr} \left[ (\nabla_{\mathbf{X}} \phi)^\top d\mathbf{X} \right].$$

Como

$$\text{tr} (\mathbf{A}^\top \Gamma) = \text{vec}(\mathbf{A})^\top \text{vec}(\Gamma),$$

tem-se

$$d\phi = \text{vec} (\nabla_{\mathbf{X}} \phi)^\top d \text{vec}(\mathbf{X}).$$

Logo,

$$\nabla_{\text{vec}(\mathbf{X})} \phi = \text{vec} (\nabla_{\mathbf{X}} \phi).$$

A forma matricial e a forma vetorizada representam a mesma derivada, organizadas em estruturas diferentes.

#### 7.10.4.2 Hessiana de uma função matricial

Para uma função escalar de matriz, a Hessiana vetorizada é definida por

$$\nabla_{\text{vec}(\mathbf{X})}^2 \phi = \frac{\partial \text{vec} (\nabla_{\mathbf{X}} \phi)}{\partial \text{vec}(\mathbf{X})^\top}.$$

Considere

$$\phi(\mathbf{X}) = \text{tr} (\mathbf{X}^\top \mathbf{A} \mathbf{X} \Gamma),$$

com  $\mathbf{A}$  e  $\Gamma$  simétricas.

Foi obtido que

$$\nabla_{\mathbf{X}}\phi = 2\mathbf{A}\mathbf{X}\Gamma.$$

Vetorizando,

$$\begin{aligned}\text{vec}\left(\nabla_{\mathbf{X}}\phi\right) &= 2\text{vec}\left(\mathbf{A}\mathbf{X}\Gamma\right) \\ &= 2\left(\Gamma\otimes\mathbf{A}\right)\text{vec}(\mathbf{X}).\end{aligned}$$

Portanto,

$$\nabla_{\text{vec}(\mathbf{X})}^2\phi = 2\left(\Gamma\otimes\mathbf{A}\right).$$

Se

$$\mathbf{A} \succeq \mathbf{0}$$

e

$$\Gamma \succeq \mathbf{0},$$

Se

$$\mathbf{A} \succ \mathbf{0}$$

e

$$\Gamma \succ \mathbf{0},$$

então

$$\Gamma\otimes\mathbf{A} \succ \mathbf{0},$$

e a função é estritamente convexa.

#### 7.10.4.3 Matriz de comutação

A vetorização de uma matriz e de sua transposta possui ordenações diferentes.

**Definição 7.11** (Matriz de comutação). A matriz de comutação

$$\mathbf{K}_{m,n} \in \mathbb{R}^{mn \times mn}$$

é a matriz de permutação que satisfaz

$$\mathbf{K}_{m,n} \text{vec}(\mathbf{X}) = \text{vec}(\mathbf{X}^\top)$$

para toda

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

A transposição pode ser desfeita:

$$\mathbf{K}_{n,m} \mathbf{K}_{m,n} = \mathbf{I}_{mn}.$$

Logo,

$$\mathbf{K}_{m,n}^{-1} = \mathbf{K}_{n,m} = \mathbf{K}_{m,n}^\top.$$

Para matrizes quadradas,

$$\mathbf{K}_{p,p} = \mathbf{K}_{p,p}^\top$$

e

$$\mathbf{K}_{p,p}^2 = \mathbf{I}_{p^2}.$$

Considere

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

e

$$\Gamma \in \mathbb{R}^{r \times s}.$$

A matriz de comutação satisfaz

$$\mathbf{K}_{m,r}(\mathbf{A} \otimes \Gamma) = (\Gamma \otimes \mathbf{A}) \mathbf{K}_{n,s}.$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{K}_{m,r}(\mathbf{A} \otimes \Gamma) \mathbf{K}_{s,n} = \Gamma \otimes \mathbf{A}.$$

#### 7.10.4.4 Meia vetorização de matrizes simétricas

Uma matriz simétrica possui elementos repetidos acima e abaixo da diagonal. O operador  $\text{vech}$  conserva somente os elementos da parte triangular inferior.

**Definição 7.12** (Operador de meia vetorização). Para uma matriz simétrica

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}^\top \in \mathbb{R}^{p \times p},$$

o vetor

$$\text{vech}(\mathbf{S}) \in \mathbb{R}^{p(p+1)/2}$$

é obtido pelo empilhamento, por colunas, dos elementos da parte triangular inferior, incluindo a diagonal.

**Exemplo 7.19** (Meia vetorização de uma matriz simétrica). Considere

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} \\ s_{12} & s_{22} & s_{23} \\ s_{13} & s_{23} & s_{33} \end{bmatrix}.$$

Então,

$$\text{vech}(\mathbf{S}) = \begin{bmatrix} s_{11} \\ s_{12} \\ s_{13} \\ s_{22} \\ s_{23} \\ s_{33} \end{bmatrix}.$$

A ordem acompanha as colunas da parte triangular inferior:

- primeira coluna:  $s_{11}, s_{12}, s_{13}$ ;
- segunda coluna:  $s_{22}, s_{23}$ ;
- terceira coluna:  $s_{33}$ .

O operador vech elimina a duplicação dos elementos simétricos. Enquanto

$$\text{vec}(\mathbf{S})$$

possui  $p^2$  elementos,

$$\text{vech}(\mathbf{S})$$

possui

$$\frac{p(p+1)}{2}$$

elementos. A redução ocorre porque uma matriz simétrica possui apenas

$$\frac{p(p+1)}{2}$$

elementos distintos. Assim, vech fornece uma parametrização sem redundância do espaço das matrizes simétricas.

#### 7.10.4.5 Matriz de duplicação

**Definição 7.13** (Matriz de duplicação). A matriz de duplicação

$$\mathbf{D}_p^{\text{dup}} \in \mathbb{R}^{p^2 \times p(p+1)/2}$$

é definida pela identidade

$$\text{vec}(\mathbf{S}) = \mathbf{D}_p^{\text{dup}} \text{vech}(\mathbf{S})$$

para toda matriz simétrica

$$\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{p \times p}.$$

A matriz de duplicação repete os elementos fora da diagonal nas posições correspondentes de  $\text{vec}(\mathbf{S})$ .

Para  $p = 2$ ,

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{12} & s_{22} \end{bmatrix},$$

e

$$\text{vech}(\mathbf{S}) = \begin{bmatrix} s_{11} \\ s_{12} \\ s_{22} \end{bmatrix}.$$

Como

$$\text{vec}(\mathbf{S}) = \begin{bmatrix} s_{11} \\ s_{12} \\ s_{12} \\ s_{22} \end{bmatrix},$$

tem-se

$$\mathbf{D}_2^{\text{dup}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$



#### 7.10.4.6 Matriz de eliminação

**Definição 7.14** (Matriz de eliminação). A matriz de eliminação

$$\mathbf{L}_p^{\text{elim}} \in \mathbb{R}^{p(p+1)/2 \times p^2}$$

é definida por

$$\text{vech}(\mathbf{S}) = \mathbf{L}_p^{\text{elim}} \text{vec}(\mathbf{S})$$

para toda matriz simétrica  $\mathbf{S}$ .

A matriz de eliminação seleciona da vetorização completa os elementos pertencentes à parte triangular inferior.

As duas matrizes satisfazem

$$\mathbf{L}_p^{\text{elim}} \mathbf{D}_p^{\text{dup}} = \mathbf{I}_{p(p+1)/2}.$$

Em geral,

$$\mathbf{D}_p^{\text{dup}} \mathbf{L}_p^{\text{elim}} \neq \mathbf{I}_{p^2}.$$

A matriz  $\mathbf{L}_p^{\text{elim}}$  conserva apenas os elementos correspondentes à parte triangular inferior, enquanto  $\mathbf{D}_p^{\text{dup}}$  reconstrói uma matriz impondo simetria. Portanto, esse produto não recupera arbitrariamente uma matriz não simétrica.

Para uma matriz simétrica  $\mathbf{S}$ , entretanto,

$$\mathbf{D}_p^{\text{dup}} \mathbf{L}_p^{\text{elim}} \text{vec}(\mathbf{S}) = \text{vec}(\mathbf{S}).$$

#### 7.10.4.7 Diferenciais de parâmetros simétricos

Se

$$\Sigma = \Sigma^\top$$

é um parâmetro matricial simétrico, então

$$d \operatorname{vec}(\Sigma) = \mathbf{D}_p^{\text{dup}} d \operatorname{vech}(\Sigma).$$

Considere uma função escalar

$$\phi(\Sigma)$$

com gradiente matricial

$$\nabla_\Sigma \phi.$$

Seu diferencial é

$$d\phi = \operatorname{vec}(\nabla_\Sigma \phi)^\top d \operatorname{vec}(\Sigma).$$

Substituindo a matriz de duplicação,

$$d\phi = \operatorname{vec}(\nabla_\Sigma \phi)^\top \mathbf{D}_p^{\text{dup}} d \operatorname{vech}(\Sigma).$$

Portanto,

$$\nabla_{\operatorname{vech}(\Sigma)} \phi = (\mathbf{D}_p^{\text{dup}})^\top \operatorname{vec}(\nabla_\Sigma \phi).$$

Como as perturbações admissíveis de um parâmetro simétrico também devem ser simétricas, os  $p^2$  elementos de  $\operatorname{vec}(\Sigma)$  não representam graus de liberdade independentes. A parametrização por  $\operatorname{vech}(\Sigma)$  remove essa redundância.

Essa expressão transforma o gradiente matricial em um gradiente relativo somente aos elementos distintos do parâmetro simétrico.

#### 7.10.4.8 Jacobiana de transformações matriciais

Considere uma transformação

$$\mathcal{G} : \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R}^{r \times s}.$$

Sua representação vetorizada é

$$\mathbf{g}(\text{vec}(\mathbf{X})) = \text{vec}(\mathcal{G}(\mathbf{X})).$$

A Jacobiana vetorizada é

$$\mathbf{J}_{\mathcal{G}}(\mathbf{X}) = \frac{\partial \text{vec}(\mathcal{G}(\mathbf{X}))}{\partial \text{vec}(\mathbf{X})^{\top}}.$$

Ela satisfaz

$$d \text{vec}(\mathcal{G}(\mathbf{X})) = \mathbf{J}_{\mathcal{G}}(\mathbf{X}) d \text{vec}(\mathbf{X}).$$

**Exemplo 7.20** (Jacobiana de  $\mathbf{X}^{\top} \mathbf{X}$ ). Considere

$$\mathcal{G}(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^{\top} \mathbf{X},$$

com

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

O diferencial é

$$d\mathcal{G} = d\mathbf{X}^{\top} \mathbf{X} + \mathbf{X}^{\top} d\mathbf{X}.$$

Vetorizando o primeiro termo,

$$\begin{aligned} \text{vec}(d\mathbf{X}^{\top} \mathbf{X}) &= (\mathbf{X}^{\top} \otimes \mathbf{I}_n) \text{vec}(d\mathbf{X}^{\top}) \\ &= (\mathbf{X}^{\top} \otimes \mathbf{I}_n) \mathbf{K}_{m,n} \text{vec}(d\mathbf{X}). \end{aligned}$$

Para o segundo termo,

$$\text{vec}(\mathbf{X}^{\top} d\mathbf{X}) = (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{X}^{\top}) \text{vec}(d\mathbf{X}).$$

Logo,

$$d \operatorname{vec}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X}) = [(\mathbf{X}^\top \otimes \mathbf{I}_n) \mathbf{K}_{m,n} + \mathbf{I}_n \otimes \mathbf{X}^\top] \\ \times d \operatorname{vec}(\mathbf{X}).$$

Portanto, a Jacobiana vetorizada é

$$\mathbf{J}_{\mathcal{G}}(\mathbf{X}) = (\mathbf{X}^\top \otimes \mathbf{I}_n) \mathbf{K}_{m,n} + \mathbf{I}_n \otimes \mathbf{X}^\top.$$

A vetorização e o produto de Kronecker permitem representar derivadas matriciais por matrizes usuais. Essa representação será útil para covariâncias de vetores matriciais, Hessianas e aproximações de funções de parâmetros matriciais.

## 7.11 Integração múltipla e mudança de variáveis

O cálculo integral permite obter probabilidades, esperanças, momentos e distribuições marginais de vetores aleatórios contínuos. A mudança de variáveis permite, adicionalmente, transformar regiões de integração e determinar densidades após transformações do vetor aleatório.

Para vetores aleatórios contínuos, as integrais são realizadas sobre subconjuntos de  $\mathbb{R}^p$ . Nesta seção, integrais múltiplas, marginalização, esperanças e mudança de variáveis constituem o núcleo necessário para os capítulos probabilísticos seguintes. A diferenciação sob o sinal de integração será apresentada posteriormente como aprofundamento.

O bloco de aprofundamento mostrou como  $\operatorname{vec}$  e o produto de Kronecker podem ser estendidos para representar derivadas de ordem superior e parâmetros matriciais com restrições estruturais.

Para a continuidade do livro, as ideias essenciais a reter desta seção são

$$\operatorname{vec}(\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{\Gamma}) = (\mathbf{\Gamma}^\top \otimes \mathbf{A}) \operatorname{vec}(\mathbf{X})$$

e o fato de que matrizes simétricas possuem apenas

$$\frac{p(p+1)}{2}$$

elementos distintos.

### 7.11.1 Integrais múltiplas

Considere uma função

$$f : \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Sua integral sobre  $\mathcal{D}$  é representada por

$$\int_{\mathcal{D}} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x},$$

em que

$$d\mathbf{x} = dx_1 \cdots dx_p.$$

Em duas dimensões,

$$\int_{\mathcal{D}} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

representa a acumulação dos valores da função sobre uma região do plano.

Quando

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}_1 \times \cdots \times \mathcal{D}_p$$

é um produto cartesiano, a integral pode ser escrita como integral iterada:

$$\int_{\mathcal{D}} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\mathcal{D}_p} \cdots \int_{\mathcal{D}_1} f(x_1, \dots, x_p) dx_1 \cdots dx_p,$$

desde que sejam satisfeitas as condições que permitem a integração sucessiva.

O produto cartesiano corresponde ao caso mais simples. Para regiões mais gerais, os limites de uma integral podem depender das demais variáveis. Em duas dimensões, por exemplo, uma região da forma

$$\mathcal{D} = \{(x_1, x_2) : a < x_1 < b, c(x_1) < x_2 < d(x_1)\}$$

conduz a

$$\int_{\mathcal{D}} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \int_a^b \int_{c(x_1)}^{d(x_1)} f(x_1, x_2) dx_2 dx_1,$$

quando as condições de integração correspondentes são satisfeitas.

### 7.11.2 Teoremas de Tonelli e Fubini

**Teorema 7.9** (Teorema de Tonelli). *Se*

$$f : \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2 \longrightarrow [0, \infty]$$

*é mensurável e não negativa, então*

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 &= \int_{\mathcal{D}_1} \left[ \int_{\mathcal{D}_2} f(x_1, x_2) dx_2 \right] dx_1 \\ &= \int_{\mathcal{D}_2} \left[ \int_{\mathcal{D}_1} f(x_1, x_2) dx_1 \right] dx_2, \end{aligned}$$

*permitindo valores infinitos. (Axler, 2020)*

Para funções não negativas, a ordem de integração pode ser alterada mesmo quando a integral total não é finita.

**Teorema 7.10** (Teorema de Fubini). *Se*

$$\int_{\mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2} |f(x_1, x_2)| dx_1 dx_2 < \infty,$$

*então as integrais iteradas existem, são finitas e satisfazem*

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 &= \int_{\mathcal{D}_1} \left[ \int_{\mathcal{D}_2} f(x_1, x_2) dx_2 \right] dx_1 \\ &= \int_{\mathcal{D}_2} \left[ \int_{\mathcal{D}_1} f(x_1, x_2) dx_1 \right] dx_2. \end{aligned}$$

A integrabilidade absoluta é uma condição suficiente para trocar a ordem de integração.

### 7.11.3 Densidades multivariadas

Considere um vetor aleatório contínuo

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p.$$

**Definição 7.15** (Densidade conjunta). Uma função

$$f_{\mathbf{X}} : \mathbb{R}^p \longrightarrow [0, \infty)$$

é uma densidade conjunta de  $\mathbf{X}$  quando

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \geq 0$$

e

$$\int_{\mathbb{R}^p} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1,$$

e as probabilidades de conjuntos mensuráveis são obtidas pela integração dessa função.

Para um conjunto mensurável

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}^p,$$

a probabilidade é

$$P(\mathbf{X} \in \mathcal{A}) = \int_{\mathcal{A}} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

Em duas dimensões,

$$P[(X_1, X_2) \in \mathcal{A}] = \iint_{\mathcal{A}} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2.$$

### 7.11.4 Distribuições marginais

Considere a partição

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{bmatrix},$$

com

$$\mathbf{X}_1 \in \mathbb{R}^{p_1}, \quad \mathbf{X}_2 \in \mathbb{R}^{p_2}$$

e

$$p_1 + p_2 = p.$$

A densidade marginal de  $\mathbf{X}_1$  é obtida integrando a densidade conjunta em relação às componentes de  $\mathbf{X}_2$ :

$$f_{\mathbf{X}_1}(\mathbf{x}_1) = \int_{\mathbb{R}^{p_2}} f_{\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) d\mathbf{x}_2.$$

De modo semelhante,

$$f_{\mathbf{X}_2}(\mathbf{x}_2) = \int_{\mathbb{R}^{p_1}} f_{\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) d\mathbf{x}_1.$$

A marginalização elimina as variáveis que não aparecem no resultado, acumulando a densidade conjunta sobre todos os seus valores possíveis.

**Exemplo 7.21** (Densidade marginal em uma região triangular). Considere a densidade conjunta

$$f_{\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2}(x_1, x_2) = 2,$$

para

$$0 < x_2 < x_1 < 1,$$

e zero fora dessa região.

A densidade marginal de  $\mathbf{X}_1$  é



$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}_1}(x_1) &= \int_0^{x_1} 2 \, dx_2 \\ &= 2x_1, \quad 0 < x_1 < 1. \end{aligned}$$

A densidade marginal de  $\mathbf{X}_2$  é

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}_2}(x_2) &= \int_{x_2}^1 2 \, dx_1 \\ &= 2(1 - x_2), \quad 0 < x_2 < 1. \end{aligned}$$

As duas densidades integram 1 em seus respectivos domínios.

### 7.11.5 Esperanças de funções escalares, vetoriais e matriciais

Se

$$h : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$$

é uma função integrável, sua esperança é

$$E[h(\mathbf{X})] = \int_{\mathbb{R}^p} h(\mathbf{x}) f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}.$$

Para uma função vetorial

$$\mathbf{g} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q,$$

com

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} g_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ g_q(\mathbf{x}) \end{bmatrix},$$

a esperança é definida componente a componente:

$$E[\mathbf{g}(\mathbf{X})] = \begin{bmatrix} E[g_1(\mathbf{X})] \\ \vdots \\ E[g_q(\mathbf{X})] \end{bmatrix}.$$

Equivalentemente,

$$E[\mathbf{g}(\mathbf{X})] = \int_{\mathbb{R}^p} \mathbf{g}(\mathbf{x}) f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

Para uma função matricial

$$\mathcal{G} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^{m \times n},$$

a esperança também é calculada elemento a elemento:

$$E[\mathcal{G}(\mathbf{X})] = \int_{\mathbb{R}^p} \mathcal{G}(\mathbf{x}) f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

Em particular,

$$E[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top] = \int_{\mathbb{R}^p} \mathbf{x}\mathbf{x}^\top f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

A existência da esperança vetorial ou matricial exige integrabilidade dos elementos correspondentes.

### 7.11.6 Mudança de variáveis

Uma transformação diferenciável altera a posição dos pontos e o volume dos elementos infinitesimais. O determinante da Jacobiana mede essa alteração local de volume.

Considere uma transformação

$$\mathbf{g} : \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^p$$

e defina

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}).$$

A aproximação local é

$$d\mathbf{y} = \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

O fator local de alteração de volume é

$$|\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})|.$$

O valor absoluto é necessário porque o determinante pode ser negativo quando a transformação altera a orientação do espaço.

**Teorema 7.11** (Teorema da Mudança de Variáveis). *Considere conjuntos abertos*

$$\mathcal{D}, \mathcal{G} \subseteq \mathbb{R}^p$$

*e uma transformação bijetiva*

$$\mathbf{g} : \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{G}$$

*continuamente diferenciável, com inversa continuamente diferenciável e*

$$\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}) \neq 0$$

*para todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{D}$ .*

*Então, para uma função integrável  $h$ ,*

$$\int_{\mathcal{G}} h(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = \int_{\mathcal{D}} h(\mathbf{g}(\mathbf{x})) |\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})| \, d\mathbf{x}.$$

*(Apostol, 1969)*

Utilizando a transformação inversa

$$\mathbf{x} = \mathbf{g}^{-1}(\mathbf{y}),$$

o elemento de volume transforma-se segundo

$$d\mathbf{x} = |\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}^{-1}}(\mathbf{y})| \, d\mathbf{y}.$$

Como

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}^{-1}}(\mathbf{y}) = [\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})]^{-1},$$

segue que

$$|\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}^{-1}}(\mathbf{y})| = \frac{1}{|\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})|}.$$

### 7.11.7 Transformação de densidades

**Proposição 7.13** (Densidade de uma transformação invertível). *Considere um vetor aleatório contínuo  $\mathbf{X}$  com densidade  $f_{\mathbf{X}}$  e a transformação*

$$\mathbf{Y} = \mathbf{g}(\mathbf{X}),$$

*satisfazendo as condições do Teorema da Mudança de Variáveis.*

*Então,*

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = f_{\mathbf{X}}(\mathbf{g}^{-1}(\mathbf{y})) |\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}^{-1}}(\mathbf{y})|.$$

*A expressão vale para*

$$\mathbf{y} \in \mathcal{G} = \mathbf{g}(\mathcal{D}).$$

*Fora da imagem da transformação,*

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = 0.$$

Equivalentemente, com

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}),$$

tem-se

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{g}(\mathbf{x})) = \frac{f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})}{|\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})|}.$$

A densidade é reduzida em regiões expandidas pela transformação e aumentada em regiões contraídas, de modo que a probabilidade total permaneça igual a 1.

Quando a transformação não é globalmente injetiva, a fórmula anterior não pode ser aplicada diretamente com uma única inversa. Sob condições de regularidade, pode-se particionar o domínio em regiões nas quais a transformação seja injetiva e somar as contribuições correspondentes às diferentes pré-imagens.

Esse caso não será desenvolvido em detalhe neste capítulo.

### 7.11.8 Transformações afins

Considere

$$\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b},$$

em que

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

é invertível e

$$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^p.$$

A transformação inversa é

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} (\mathbf{Y} - \mathbf{b}).$$

A Jacobiana da transformação é constante:

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}.$$

A Jacobiana da inversa é

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}^{-1}}(\mathbf{y}) = \mathbf{A}^{-1}.$$

Logo,

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = f_{\mathbf{X}}[\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{b})] \frac{1}{|\det(\mathbf{A})|}.$$

A translação  $\mathbf{b}$  altera a posição da distribuição, mas não altera o fator de volume. Esse fator depende apenas da parte linear.

**Exemplo 7.22** (Transformação afim em uma dimensão). Considere

$$Y = aX + b,$$

com  $a \neq 0$ .

A transformação inversa é

$$X = \frac{Y - b}{a},$$

e

$$\left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{1}{|a|}.$$

Portanto,

$$f_Y(y) = f_X\left(\frac{y - b}{a}\right) \frac{1}{|a|}.$$

### 7.11.9 Interpretação geométrica do determinante Jacobiano

Considere a transformação não linear

$$\mathbf{g}(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} x_1 + 0.35x_1x_2 \\ x_2 + 0.20x_1^2 \end{bmatrix}.$$

Sua Jacobiana é

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 1 + 0.35x_2 & 0.35x_1 \\ 0.40x_1 & 1 \end{bmatrix}.$$

O determinante é

$$\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(x_1, x_2) = 1 + 0.35x_2 - 0.14x_1^2.$$

O fator de alteração de área varia de acordo com o ponto. A Figura 7.4 mostra uma grade no domínio e sua imagem pela transformação.

Uma pequena região em torno de  $\mathbf{x}$  tem sua área multiplicada aproximadamente por




Figura 7.4: Transformação de uma grade e alteração local de área determinada pelo Jacobiano.

$$|\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})|.$$

A imagem da grade apresenta expansão e contração diferentes ao longo do domínio porque o determinante Jacobiano não é constante.

### 7.11.10 Coordenadas polares

Em duas dimensões, defina

$$x_1 = r \cos \theta$$

e

$$x_2 = r \sin \theta,$$

com

$$r > 0$$

e

$$0 \leq \theta < 2\pi.$$

A transformação é

$$\mathbf{g}(r, \theta) = \begin{bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{bmatrix}.$$

Sua Jacobiana é

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(r, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{bmatrix}.$$

O determinante é

$$\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(r, \theta) = r.$$

Portanto,

$$dx_1 dx_2 = r dr d\theta.$$

Assim,

$$\iint_{\mathbb{R}^2} h(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty h(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta,$$

quando a função é integrável.

A parametrização polar não é uma transformação globalmente bijetiva em todas as escolhas possíveis de domínio: a origem possui representação angular não única e o ângulo é periódico. Para a aplicação da fórmula de mudança de variáveis, trabalha-se em regiões adequadas de injetividade; as fronteiras envolvidas possuem medida nula e não alteram o valor das integrais usuais.



### 7.11.11 Transformações elipsoidais

Considere uma matriz positiva definida

$$\Sigma \in \mathbb{R}^{p \times p}$$

e sua raiz quadrada principal simétrica positiva definida

$$\Sigma^{1/2}.$$

Considere a transformação

$$\mathbf{x} = \mu + \Sigma^{1/2} \mathbf{z}.$$

A Jacobiana é

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{z}) = \Sigma^{1/2}.$$

Logo,

$$|\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{z})| = \det(\Sigma^{1/2}) = \det(\Sigma)^{1/2}.$$

A transformação inversa é

$$\mathbf{z} = \Sigma^{-1/2} (\mathbf{x} - \mu),$$

com fator

$$|\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}^{-1}}(\mathbf{x})| = \det(\Sigma)^{-1/2}.$$

Além disso,

$$\begin{aligned} \mathbf{z}^{\top} \mathbf{z} &= (\mathbf{x} - \mu)^{\top} \Sigma^{-1/2} \Sigma^{-1/2} (\mathbf{x} - \mu) \\ &= (\mathbf{x} - \mu)^{\top} \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu). \end{aligned}$$

A transformação converte esferas no espaço de  $\mathbf{z}$  em elipsoides no espaço de  $\mathbf{x}$ . Essa relação será utilizada na construção de densidades multivariadas.

### 7.11.12 Aprofundamento: diferenciação sob o sinal de integração

#### Leitura de aprofundamento

A diferenciação sob o sinal de integração é utilizada para justificar formalmente identidades envolvendo funções de verossimilhança, vetor escore e informação de Fisher.

Esse conteúdo é importante para desenvolvimentos inferenciais mais formais, mas pode ser omitido em uma primeira leitura. Para a continuidade imediata dos capítulos probabilísticos, basta reter que a troca entre derivação e integração exige condições de regularidade e não pode ser realizada automaticamente.

Considere um conjunto mensurável

$$\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^p,$$

uma região aberta

$$\mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^k$$

e uma função

$$h : \mathcal{D} \times \mathcal{V} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

A função depende da variável de integração  $\mathbf{x}$  e do parâmetro

$$\theta \in \mathcal{V}.$$

Defina

$$F(\theta) = \int_{\mathcal{D}} h(\mathbf{x}, \theta) d\mathbf{x}.$$

A troca entre diferenciação e integração pode ser justificada pelo Teorema da Convergência Dominada.

**Teorema 7.12** (Teorema da Convergência Dominada). *Considere uma sequência de funções mensuráveis*

$$g_1, g_2, \dots$$

*definidas em  $\mathcal{D}$  e suponha que*

$$g_m(\mathbf{x}) \longrightarrow g(\mathbf{x})$$

para quase todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{D}$ .

Se existe uma função integrável

$$M : \mathcal{D} \longrightarrow [0, \infty)$$

tal que

$$|g_m(\mathbf{x})| \leq M(\mathbf{x})$$

para todo  $m$  e quase todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{D}$ , então  $g$  é integrável e

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathcal{D}} g_m(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\mathcal{D}} g(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

(Axler, 2020)

O teorema permite trocar um limite e uma integral quando todas as funções da sequência são dominadas por uma mesma função integrável. A diferenciação sob o sinal de integração decorre da aplicação desse resultado aos quocientes de diferenças.

**Teorema 7.13** (Diferenciação sob o sinal de integração). *Considere um ponto*

$$\theta_0 \in \mathcal{V}$$

e uma componente

$$j \in \{1, \dots, k\}.$$

Suponha que:

1. para todo  $\theta \in \mathcal{V}$ , a função

$$\mathbf{x} \longmapsto h(\mathbf{x}, \theta)$$

seja mensurável e integrável em  $\mathcal{D}$ ;

2. exista  $\delta > 0$  tal que

$$\theta_0 + t\mathbf{e}_j \in \mathcal{V}$$

para todo  $t$  com  $|t| < \delta$ , em que  $\mathbf{e}_j$  é o  $j$ -ésimo vetor da base canônica de  $\mathbb{R}^k$ ;

3. para quase todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{D}$ , a função

$$t \mapsto h(\mathbf{x}, \theta_0 + t\mathbf{e}_j)$$

seja diferenciável em  $(-\delta, \delta)$ ;

4. exista uma função integrável

$$M_j : \mathcal{D} \rightarrow [0, \infty)$$

tal que

$$\left| \frac{\partial h(\mathbf{x}, \theta_0 + t\mathbf{e}_j)}{\partial \theta_j} \right| \leq M_j(\mathbf{x})$$

para todo  $t$  com  $|t| < \delta$  e quase todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{D}$ ;

5. a função

$$\mathbf{x} \mapsto \frac{\partial h(\mathbf{x}, \theta_0)}{\partial \theta_j}$$

seja mensurável.

Então,  $F$  é parcialmente diferenciável em relação a  $\theta_j$  no ponto  $\theta_0$  e

$$\frac{\partial F(\theta_0)}{\partial \theta_j} = \int_{\mathcal{D}} \frac{\partial h(\mathbf{x}, \theta_0)}{\partial \theta_j} d\mathbf{x}.$$

*Comprovação.* Considere uma sequência arbitrária de números não nulos

$$t_1, t_2, \dots$$

tal que

$$t_m \longrightarrow 0$$

e

$$|t_m| < \delta.$$

Defina o quociente de diferenças

$$q_m(\mathbf{x}) = \frac{h(\mathbf{x}, \theta_0 + t_m \mathbf{e}_j) - h(\mathbf{x}, \theta_0)}{t_m}.$$

Para quase todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{D}$ , a diferenciabilidade em relação a  $\theta_j$  implica

$$q_m(\mathbf{x}) \longrightarrow \frac{\partial h(\mathbf{x}, \theta_0)}{\partial \theta_j}.$$

Pelo Teorema do Valor Médio aplicado à função

$$t \longmapsto h(\mathbf{x}, \theta_0 + t \mathbf{e}_j),$$

existe um número  $\xi_m(\mathbf{x})$  situado entre 0 e  $t_m$  tal que

$$q_m(\mathbf{x}) = \frac{\partial h(\mathbf{x}, \theta_0 + \xi_m(\mathbf{x}) \mathbf{e}_j)}{\partial \theta_j}.$$

Como

$$|\xi_m(\mathbf{x})| < \delta,$$

a hipótese de dominação fornece

$$|q_m(\mathbf{x})| \leq M_j(\mathbf{x})$$

para quase todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{D}$ .

O Teorema da Convergência Dominada implica

$$\begin{aligned}\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathcal{D}} q_m(\mathbf{x}) d\mathbf{x} &= \int_{\mathcal{D}} \lim_{m \rightarrow \infty} q_m(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathcal{D}} \frac{\partial h(\mathbf{x}, \theta_0)}{\partial \theta_j} d\mathbf{x}.\end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned}\int_{\mathcal{D}} q_m(\mathbf{x}) d\mathbf{x} &= \frac{\int_{\mathcal{D}} h(\mathbf{x}, \theta_0 + t_m \mathbf{e}_j) d\mathbf{x} - \int_{\mathcal{D}} h(\mathbf{x}, \theta_0) d\mathbf{x}}{t_m} \\ &= \frac{F(\theta_0 + t_m \mathbf{e}_j) - F(\theta_0)}{t_m}.\end{aligned}$$

Logo,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{F(\theta_0 + t_m \mathbf{e}_j) - F(\theta_0)}{t_m} = \int_{\mathcal{D}} \frac{\partial h(\mathbf{x}, \theta_0)}{\partial \theta_j} d\mathbf{x}.$$

Como a sequência  $t_m \rightarrow 0$  foi escolhida arbitrariamente, a derivada parcial existe e satisfaz a igualdade enunciada.  $\square$

Quando as condições do Teorema 7.13 são satisfeitas para todas as componentes do parâmetro,

$$\nabla_{\theta} F(\theta_0) = \int_{\mathcal{D}} \nabla_{\theta} h(\mathbf{x}, \theta_0) d\mathbf{x}.$$

A função dominante pode ser diferente para cada componente do gradiente, desde que cada uma seja integrável.

O resultado pressupõe que o domínio  $\mathcal{D}$  não depende de  $\theta$ . Quando o domínio ou a fronteira da região de integração varia com o parâmetro, a derivação pode produzir termos adicionais. Esse caso não será desenvolvido neste capítulo.

**Exemplo 7.23** (Derivação de uma identidade de normalização). Considere uma família de densidades

$$f(\mathbf{x}; \theta),$$

definida sobre um suporte comum

$$\mathcal{D}$$

que não depende de  $\theta$ .

Para todo  $\theta$ ,

$$\int_{\mathcal{D}} f(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = 1.$$

Suponha que as condições do Teorema 7.13 sejam satisfeitas para todas as componentes de  $\theta$ . Então,

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \nabla_{\theta} 1 \\ &= \nabla_{\theta} \int_{\mathcal{D}} f(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathcal{D}} \nabla_{\theta} f(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Se

$$f(\mathbf{x}; \theta) > 0$$

para quase todo  $\mathbf{x} \in \mathcal{D}$ , então

$$\nabla_{\theta} f(\mathbf{x}; \theta) = f(\mathbf{x}; \theta) \nabla_{\theta} \log f(\mathbf{x}; \theta).$$

Portanto,

$$\int_{\mathcal{D}} f(\mathbf{x}; \theta) \nabla_{\theta} \log f(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Se

$$\mathbf{X}$$

possui densidade  $f(\mathbf{x}; \theta)$ , segue que

$$E_{\theta} [\nabla_{\theta} \log f(\mathbf{X}; \theta)] = \mathbf{0}.$$

Essa é a identidade de média nula do escore para uma observação. Sua validade depende do suporte comum e das condições de dominação que justificam a troca entre diferenciação e integração.

As integrais múltiplas, a marginalização e a mudança de variáveis fornecem a base para o estudo das distribuições multivariadas. A parte de aprofundamento mostrou, adicionalmente, como condições de dominação podem justificar a diferenciação de integrais parametrizadas e identidades utilizadas posteriormente em inferência.

Para a continuidade do livro, as ideias centrais a reter são:

- probabilidades são obtidas por integração da densidade conjunta;
- densidades marginais são obtidas integrando as componentes que se deseja eliminar;
- esperanças de vetores e matrizes são calculadas componente a componente;
- mudanças de variáveis exigem o determinante absoluto da Jacobiana;
- transformações afins produzem fatores de volume constantes;
- transformações elipsoidais convertem geometria esférica e elipsoidal.

## 7.12 Aprofundamento: aplicações à estimação e à inferência

### Leitura de aprofundamento

As subseções seguintes mostram como as ferramentas de cálculo desenvolvidas neste capítulo aparecem em problemas de estimação e inferência.

O objetivo é apresentar apenas a estrutura matemática dessas aplicações. As propriedades probabilísticas dos estimadores, as condições de regularidade, as distribuições assintóticas e os procedimentos inferenciais serão desenvolvidos nos capítulos específicos do Módulo 2. Este bloco pode ser omitido em uma primeira leitura sem comprometer a continuidade imediata do livro.

As aplicações seguintes envolvem gradientes, Hessianas, expansões de Taylor, diferenciação sob o sinal de integração e cálculo matricial. Elas antecipam, em nível matemático, conceitos que serão retomados posteriormente.

### 7.12.1 Log-verossimilhança e vetor escore

Considere observações independentes

$$\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$$

provenientes de um mesmo modelo paramétrico com função de densidade ou de probabilidade



$$f(\mathbf{x}; \theta),$$

$$\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^k$$

é o vetor de parâmetros.

Nessas condições, a função de verossimilhança é

$$L_n(\theta) = \prod_{i=1}^n f(\mathbf{x}_i; \theta).$$

A log-verossimilhança é

$$\ell_n(\theta) = \log L_n(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f(\mathbf{x}_i; \theta).$$

Como o logaritmo é estritamente crescente, maximizar  $L_n$  equivale a maximizar  $\ell_n$ .

**Definição 7.16** (Vetor escore). O vetor escore é o gradiente da log-verossimilhança:

$$\mathbf{s}_n(\theta) = \nabla_{\theta} \ell_n(\theta) \in \mathbb{R}^k.$$

Em coordenadas,

$$\mathbf{s}_n(\theta) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \ell_n}{\partial \theta_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \ell_n}{\partial \theta_k} \end{bmatrix}.$$

Se um estimador de máxima verossimilhança é um ponto interior do espaço paramétrico e a log-verossimilhança é diferenciável nesse ponto, então deve satisfazer

$$\mathbf{s}_n(\hat{\theta}) = \mathbf{0}.$$

Essa condição é necessária, mas pode não ser suficiente para identificar um máximo. Também devem ser examinados:

- a curvatura da log-verossimilhança;
- a existência e a unicidade da solução;
- os limites do espaço paramétrico;
- possíveis máximos na fronteira.

### 7.12.2 Informação observada e informação de Fisher

**Definição 7.17** (Informação observada). A matriz de informação observada é

$$\mathcal{J}_n(\theta) = -\nabla_{\theta}^2 \ell_n(\theta).$$

Se

$$\mathbf{s}_n(\hat{\theta}) = \mathbf{0}$$

e

$$\mathcal{J}_n(\hat{\theta}) \succ \mathbf{0},$$

então

$$\nabla_{\theta}^2 \ell_n(\hat{\theta}) \prec \mathbf{0},$$

e o teste da Hessiana fornece uma condição suficiente para que  $\hat{\theta}$  seja um máximo local estrito da log-verossimilhança.

A informação observada pode ser singular ou apenas semidefinida quando:

- há parâmetros não identificados;
- existem redundâncias na parametrização;
- o máximo ocorre na fronteira;
- a log-verossimilhança apresenta pouca curvatura em determinadas direções.

**Definição 7.18** (Informação de Fisher). A informação de Fisher é definida por

$$\mathcal{J}_n(\theta) = E_{\theta} [\mathcal{J}_n(\theta)],$$

quando essa esperança existe. (Casella; Berger, 2002)

Sob condições de regularidade que permitem diferenciar a densidade sob o sinal de integração,

$$E_{\theta} [\mathbf{s}_n(\theta)] = \mathbf{0}.$$

Sob condições adicionais que permitem relacionar a primeira e a segunda derivadas da log-verossimilhança,

$$\mathcal{J}_n(\theta) = E_\theta [\mathbf{s}_n(\theta)\mathbf{s}_n(\theta)^\top].$$

Como o escore possui esperança nula nessas condições, essa segunda expressão também corresponde à matriz de covariâncias do vetor escore.

Essas identidades não devem ser utilizadas automaticamente. Sua validade depende das condições de regularidade, incluindo a possibilidade de intercambiar derivação e integração e o comportamento do suporte em relação ao parâmetro.

### 7.12.3 Newton–Raphson

A estimação por máxima verossimilhança pode exigir a solução numérica de

$$\mathbf{s}_n(\theta) = \mathbf{0}.$$

A expansão de primeira ordem do escore em torno de um valor atual  $\theta^{(t)}$  é

$$\mathbf{s}_n(\theta) \approx \mathbf{s}_n(\theta^{(t)}) + \nabla_\theta^2 \ell_n(\theta^{(t)}) (\theta - \theta^{(t)}).$$

Igualando a aproximação a zero,

$$\begin{aligned} \theta^{(t+1)} &= \theta^{(t)} - [\nabla_\theta^2 \ell_n(\theta^{(t)})]^{-1} \mathbf{s}_n(\theta^{(t)}) \\ &= \theta^{(t)} + \mathcal{J}_n(\theta^{(t)})^{-1} \mathbf{s}_n(\theta^{(t)}). \end{aligned}$$

Na implementação, a atualização deve ser obtida pela solução do sistema

$$\mathcal{J}_n(\theta^{(t)}) \mathbf{d}^{(t)} = \mathbf{s}_n(\theta^{(t)}),$$

seguida de

$$\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} + \mathbf{d}^{(t)}.$$

Isso evita calcular explicitamente a inversa da informação observada.

Essa é a aplicação do método de Newton à equação

$$\mathbf{s}_n(\theta) = \mathbf{0}.$$

Quando

$$\mathcal{J}_n(\theta^{(t)}) \succ \mathbf{0},$$

a direção

$$\mathbf{d}^{(t)} = \mathcal{J}_n(\theta^{(t)})^{-1} \mathbf{s}_n(\theta^{(t)})$$

é uma direção local de aumento da log-verossimilhança, pois

$$\mathbf{s}_n(\theta^{(t)})^\top \mathbf{d}^{(t)} > 0$$

quando o escore é não nulo.

Ainda assim, um passo completo pode não aumentar a log-verossimilhança quando o ponto atual está distante da solução. Em aplicações numéricas, podem ser utilizados controles do comprimento da etapa.

#### 7.12.4 Método do escore de Fisher

O método do escore de Fisher substitui a informação observada pela informação esperada. Quando

$$\mathcal{J}_n(\theta^{(t)})$$

é invertível, a direção  $\mathbf{d}^{(t)}$  é obtida pela solução de

$$\mathcal{J}_n(\theta^{(t)}) \mathbf{d}^{(t)} = \mathbf{s}_n(\theta^{(t)}),$$

seguida da atualização

$$\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} + \mathbf{d}^{(t)}.$$

Newton–Raphson utiliza a curvatura observada da log-verossimilhança,

$$\mathcal{J}_n(\theta),$$

enquanto o escore de Fisher utiliza sua curvatura esperada,

$$\mathcal{J}_n(\theta).$$

As atualizações coincidem quando as duas matrizes são iguais no ponto considerado ou, mais geralmente, quando produzem a mesma solução para a equação que determina a direção da etapa.

### 7.12.5 Expansão local de uma raiz do escore

Suponha que um estimador

$$\hat{\theta}$$

satisfaça a equação

$$\mathbf{s}_n(\hat{\theta}) = \mathbf{0}.$$

Expandindo o escore em torno do parâmetro verdadeiro  $\theta_0$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \mathbf{s}_n(\hat{\theta}) \\ &\approx \mathbf{s}_n(\theta_0) + \nabla_{\theta}^2 \ell_n(\theta_0) (\hat{\theta} - \theta_0). \end{aligned}$$

Como

$$\nabla_{\theta}^2 \ell_n(\theta_0) = -\mathcal{J}_n(\theta_0),$$

obtém-se a aproximação

$$\hat{\theta} - \theta_0 \approx \mathcal{J}_n(\theta_0)^{-1} \mathbf{s}_n(\theta_0).$$

Essa expressão é uma aproximação local de primeira ordem. A obtenção de uma representação assintótica rigorosa exige controlar o termo restante da expansão e substituir a informação observada por um limite apropriado.

Essa relação mostra que o erro do estimador pode ser aproximado pelo produto entre:

- a inversa da curvatura da log-verossimilhança;
- o escore calculado no parâmetro verdadeiro.

A obtenção de uma distribuição assintótica exige resultados probabilísticos adicionais sobre consistência, convergência da informação e distribuição limite do escore.

### 7.12.6 Método delta

O método delta utiliza a aproximação de Taylor para obter a distribuição aproximada de uma transformação de um estimador.

**Teorema 7.14** (Método delta multivariado). *Suponha que*

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{d} N_k(\mathbf{0}, \Xi),$$

em que

$$\Xi \in \mathbb{R}^{k \times k}.$$

Considere uma função diferenciável

$$\mathbf{g} : \mathbb{R}^k \longrightarrow \mathbb{R}^q.$$

Então,

$$\sqrt{n}[\mathbf{g}(\hat{\theta}) - \mathbf{g}(\theta)] \xrightarrow{d} N_q(\mathbf{0}, \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\theta)\Xi\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\theta)^\top).$$

(Vaart, 1998)

A demonstração formal utiliza a aproximação de Taylor de primeira ordem juntamente com resultados probabilísticos sobre convergência em distribuição. Esses resultados serão desenvolvidos no módulo inferencial; neste capítulo interessa principalmente a origem diferencial da matriz

$$\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\theta)\Xi\mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\theta)^\top.$$

A aproximação de primeira ordem é

$$\mathbf{g}(\hat{\theta}) - \mathbf{g}(\theta) \approx \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\theta)(\hat{\theta} - \theta).$$

Quando a aproximação assintótica é utilizada para amostras grandes, a matriz de covariâncias de

$$\mathbf{g}(\hat{\theta})$$

é aproximada por

$$\text{Cov} \left[ \mathbf{g} \left( \hat{\theta} \right) \right] \approx \frac{1}{n} \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\theta) \Xi \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\theta)^{\top}.$$

Para uma função escalar

$$g : \mathbb{R}^k \longrightarrow \mathbb{R},$$

a variância aproximada é

$$\text{Var} \left[ g \left( \hat{\theta} \right) \right] \approx \frac{1}{n} \nabla_{\theta} g(\theta)^{\top} \Xi \nabla_{\theta} g(\theta).$$

**Exemplo 7.24** (Método delta para uma razão). Considere

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}, \quad \theta_2 \neq 0,$$

e

$$g(\theta) = \frac{\theta_1}{\theta_2}.$$

O gradiente é

$$\nabla_{\theta} g = \begin{bmatrix} \frac{1}{\theta_2} \\ \frac{\theta_1}{\theta_2^2} \\ -\frac{1}{\theta_2^2} \end{bmatrix}.$$

Se

$$\sqrt{n} \left( \hat{\theta} - \theta \right) \xrightarrow{d} N_2 \left( \mathbf{0}, \Xi \right),$$

então

$$\sqrt{n} \left( \frac{\hat{\theta}_1}{\hat{\theta}_2} - \frac{\theta_1}{\theta_2} \right)$$

converge em distribuição para uma normal com variância assintótica

$$\nabla_{\theta} g(\theta)^{\top} \Xi \nabla_{\theta} g(\theta).$$

### 7.12.7 Aplicação de referência: estimação de um vetor de médias

Considere observações

$$\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^p$$

e uma matriz positiva definida conhecida

$$\Sigma.$$

Considere o critério

$$Q(\mu) = \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \mu)^\top \Sigma^{-1} (\mathbf{x}_i - \mu).$$

O gradiente é

$$\nabla_\mu Q = -2\Sigma^{-1} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \mu).$$

A condição de primeira ordem é

$$\sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \mu) = \mathbf{0}.$$

Logo,

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i.$$

A Hessiana é

$$\nabla_\mu^2 Q = 2n\Sigma^{-1} \succ \mathbf{0}.$$

Portanto, o vetor de médias amostrais é o único minimizador do critério.



### 7.12.8 Aplicação de referência: critério do modelo linear multivariado

Considere

$$\mathbf{Y} = \mathbf{XB} + \mathcal{E},$$

com

$$\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{n \times p}, \quad \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times k}, \quad \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{k \times p}.$$

Para

$$\Sigma \succ \mathbf{0},$$

considere

$$\begin{aligned} L(\mathbf{B}, \Sigma) &= \frac{n}{2} \log \det(\Sigma) \\ &\quad + \frac{1}{2} \operatorname{tr} \left[ \Sigma^{-1} (\mathbf{Y} - \mathbf{XB})^\top (\mathbf{Y} - \mathbf{XB}) \right]. \end{aligned}$$

Para  $\Sigma$  fixada,

$$\nabla_{\mathbf{B}} L = -\mathbf{X}^\top (\mathbf{Y} - \mathbf{XB}) \Sigma^{-1}.$$

A condição de primeira ordem é

$$\mathbf{X}^\top (\mathbf{Y} - \mathbf{XB}) = \mathbf{0}.$$

Se  $\mathbf{X}$  possui posto coluna completo,

$$\widehat{\mathbf{B}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{Y}.$$

Observe que, para  $\Sigma$  fixa e positiva definida, o minimizador em relação a  $\mathbf{B}$  não depende de  $\Sigma$ . Isso decorre do fato de que  $\Sigma^{-1}$  é invertível e desaparece da condição de primeira ordem.

Defina a matriz de Gram dos resíduos

$$\mathbf{G}_{\mathcal{E}} = (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\widehat{\mathbf{B}})^\top (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\widehat{\mathbf{B}}).$$

Para  $\mathbf{B} = \widehat{\mathbf{B}}$ , o critério em relação a  $\Sigma$  é

$$L(\Sigma) = \frac{n}{2} \log \det(\Sigma) + \frac{1}{2} \text{tr}(\Sigma^{-1} \mathbf{G}_{\mathcal{E}}).$$

Se

$$\mathbf{G}_{\mathcal{E}} \succ \mathbf{0},$$

o minimizador interior é

$$\widehat{\Sigma} = \frac{1}{n} \mathbf{G}_{\mathcal{E}}.$$

A condição

$$\mathbf{G}_{\mathcal{E}} \succ \mathbf{0}$$

exige que a matriz residual possua posto coluna completo. Quando  $\mathbf{G}_{\mathcal{E}}$  é singular, o critério é ilimitado inferiormente no cone das matrizes positivas definidas. Em particular, pode-se fazer um autovalor de  $\Sigma$  tender a zero em uma direção pertencente ao núcleo de  $\mathbf{G}_{\mathcal{E}}$  sem produzir aumento compensatório no termo de traço.

Aqui o modelo foi utilizado apenas como uma aplicação conjunta de gradientes matriciais, log-determinante e diferenciação de funções envolvendo matrizes inversas.

A interpretação probabilística do critério, as propriedades dos estimadores, suas distribuições e a formulação de hipóteses serão desenvolvidas posteriormente nos capítulos de estimação, modelo linear multivariado e inferência.

O bloco de aprofundamento mostrou como as ferramentas de cálculo deste capítulo aparecem em problemas inferenciais:

gradiente  $\longrightarrow$  escore,

Hessiana  $\longrightarrow$  informação observada,

esperança da curvatura  $\longrightarrow$  informação de Fisher,

Taylor  $\longrightarrow$  aproximações locais e método delta,

e

cálculo matricial  $\longrightarrow$  estimação de parâmetros vetoriais e matriciais.

Essas relações devem ser entendidas neste capítulo como aplicações das ferramentas matemáticas. Sua interpretação estatística completa será retomada no Módulo 2.

## 7.13 Síntese do capítulo

Este capítulo reuniu as principais ferramentas de cálculo utilizadas na formulação matemática da Estatística Multivariada.

Para uma função escalar

$$f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R},$$

o diferencial fornece a parte linear de sua variação:

$$df = \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^\top d\mathbf{x}.$$

Para uma função vetorial

$$\mathbf{g} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q,$$

a transformação linear local é representada pela Jacobiana:

$$d\mathbf{g} = \mathbf{J}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x})d\mathbf{x}.$$

A Hessiana descreve a variação de segunda ordem de uma função escalar. A expansão de Taylor,

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + \nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})^\top \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^\top \nabla_{\mathbf{x}}^2 f(\mathbf{x}) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2),$$

relaciona gradiente e Hessiana às aproximações locais utilizadas na otimização.

Em um ponto estacionário,

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0},$$

a definitude da Hessiana permite classificar mínimos locais estritos, máximos locais estritos e pontos de sela quando o teste de segunda ordem é conclusivo.

Para funções convexas, a condição

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

é suficiente para que  $\mathbf{x}^*$  seja um minimizador global. Se a função é estritamente convexa, esse minimizador, quando existe, é único.

Problemas de otimização com restrições de igualdade conduzem às condições de Lagrange. Para

$$\mathbf{c}(\mathbf{x}) = \mathbf{0},$$

a condição de primeira ordem em um ponto regular pode ser escrita como

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^*) + \mathbf{J}_{\mathbf{c}}(\mathbf{x}^*)^\top \lambda^* = \mathbf{0}.$$

Geometricamente, o gradiente da função objetivo pertence ao espaço normal ao conjunto viável.

Funções de resíduos constituem uma aplicação central dessas ferramentas. Para

$$f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{b} - \mathbf{Ax}\|^2,$$

tem-se

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = -2\mathbf{A}^\top (\mathbf{b} - \mathbf{Ax}),$$

e a condição de primeira ordem produz as equações normais

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}.$$

No minimizador, o resíduo pertence a

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top),$$

de modo que o vetor ajustado corresponde à projeção de  $\mathbf{b}$  sobre  $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ .

O cálculo matricial estende essas ideias a funções cujos argumentos são matrizes. Para

$$\phi : \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R},$$

o gradiente matricial é identificado por

$$d\phi = \text{tr} \left[ (\nabla_{\mathbf{X}} \phi)^\top d\mathbf{X} \right].$$

Essa representação permite utilizar propriedades do traço para diferenciar normas de Frobenius, formas quadráticas matriciais, funções de resíduos e critérios envolvendo parâmetros matriciais.

Entre as identidades fundamentais envolvendo inversas e determinantes estão

$$d(\mathbf{X}^{-1}) = -\mathbf{X}^{-1}(d\mathbf{X})\mathbf{X}^{-1}$$

e

$$d \log \det(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{X}^{-1} d\mathbf{X}), \quad \mathbf{X} \succ \mathbf{0}.$$

Além disso,

$$\log \det(\mathbf{X})$$

é estritamente côncava no conjunto das matrizes simétricas positivas definidas.

A vetorização e o produto de Kronecker permitem representar transformações matriciais como transformações lineares usuais. A identidade central é

$$\text{vec}(\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{\Gamma}) = (\mathbf{\Gamma}^\top \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X}).$$

Essa relação constitui o núcleo necessário para utilizar vetorização nos capítulos posteriores.

O cálculo integral completa o conjunto de ferramentas do capítulo. Para um vetor aleatório contínuo

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^p,$$

probabilidades, momentos e distribuições marginais são obtidos por integrais múltiplas.

Em uma transformação invertível

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}),$$

a densidade transformada envolve o determinante absoluto da Jacobiana da transformação inversa:

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = f_{\mathbf{X}}(\mathbf{g}^{-1}(\mathbf{y})) |\det \mathbf{J}_{\mathbf{g}^{-1}}(\mathbf{y})|.$$

No caso afim,

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b},$$

o determinante de  $\mathbf{A}$  determina a alteração de volume produzida pela transformação.

Uma aplicação particularmente importante ocorre nas transformações elipsoidais:

$$\mathbf{x} = \mu + \Sigma^{1/2}\mathbf{z},$$

para as quais

$$(\mathbf{x} - \mu)^\top \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu) = \mathbf{z}^\top \mathbf{z}.$$

Essa identidade conecta formas quadráticas, raízes matriciais, determinantes e mudança de variáveis e será fundamental no estudo das distribuições multivariadas.

### 7.13.1 Identidades principais

A Tabela 7.2 reúne algumas das identidades de uso recorrente.

Tabela 7.2: Identidades selecionadas de cálculo vetorial e matricial.

| Função ou transformação                                                      | Derivada ou diferencial                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{x}$                                 | $\nabla_{\mathbf{x}} f = \mathbf{a}$                                                               |
| $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$                      | $\nabla_{\mathbf{x}} f = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top) \mathbf{x}$                                |
| $f(\mathbf{x}) = \ \mathbf{b} - \mathbf{A} \mathbf{x}\ ^2$                   | $\nabla_{\mathbf{x}} f = -2\mathbf{A}^\top (\mathbf{b} - \mathbf{A} \mathbf{x})$                   |
| $\phi(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{X})$                   | $\nabla_{\mathbf{X}} \phi = \mathbf{A}$                                                            |
| $\phi(\mathbf{X}) = \ \mathbf{X}\ _F^2$                                      | $\nabla_{\mathbf{X}} \phi = 2\mathbf{X}$                                                           |
| $\phi(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{X}^\top \mathbf{A} \mathbf{X} \Gamma)$ | $\nabla_{\mathbf{X}} \phi = \mathbf{A} \mathbf{X} \Gamma + \mathbf{A}^\top \mathbf{X} \Gamma^\top$ |
| $\mathbf{X} \mapsto \mathbf{X}^{-1}$                                         | $d(\mathbf{X}^{-1}) = -\mathbf{X}^{-1} (d\mathbf{X}) \mathbf{X}^{-1}$                              |
| $\phi(\mathbf{X}) = \log \det(\mathbf{X}), \mathbf{X} \succ \mathbf{0}$      | $d\phi = \text{tr}(\mathbf{X}^{-1} d\mathbf{X})$                                                   |
| $\phi(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{A} \mathbf{X}^{-1})$                   | $\nabla_{\mathbf{X}} \phi = -\mathbf{X}^{-\top} \mathbf{A}^\top \mathbf{X}^{-\top}$                |
| $\mathbf{Y} = \mathbf{A} \mathbf{X} \Gamma$                                  | $\text{vec}(\mathbf{Y}) = (\Gamma^\top \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X})$                 |

### 7.13.2 Aprofundamentos

O capítulo também apresentou três blocos de aprofundamento.

O primeiro desenvolveu ferramentas para parâmetros matriciais vetorizados, incluindo:

- gradientes e Hessianas vetorizados;
- matriz de comutação;
- operador vech;
- matrizes de duplicação e eliminação;
- diferenciação de parâmetros simétricos;
- Jacobianas de transformações matriciais.

O segundo tratou da diferenciação sob o sinal de integração e das condições necessárias para justificar formalmente a troca entre derivação e integração.

O terceiro mostrou aplicações das ferramentas de cálculo à estimação e à inferência, incluindo vetor escore, informação observada, informação de Fisher, método de Newton–Raphson, escore de Fisher e método delta.

Esses aprofundamentos funcionam como material de referência. Sua compreensão integral não é necessária para a primeira leitura dos capítulos seguintes.

### 7.13.3 Competências

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- distinguir diferencial, gradiente, Jacobiana, Hessiana e gradiente matricial;
- interpretar gradientes e Hessianas em termos de variação local;
- construir aproximações de Taylor de primeira e segunda ordens;
- classificar pontos estacionários quando o teste da Hessiana é conclusivo;
- reconhecer condições de convexidade e concavidade;
- formular condições de primeira ordem em problemas com e sem restrições;
- compreender a construção da direção de Newton;
- diferenciar formas lineares, quadráticas e funções de resíduos;
- interpretar as equações normais como condições de projeção;
- utilizar diferenciais e propriedades do traço em funções matriciais;
- diferenciar funções envolvendo inversas, determinantes e log-determinantes;
- utilizar vec, produto de Kronecker e sua identidade fundamental;
- calcular probabilidades, marginais e esperanças por integração múltipla;
- aplicar o Teorema da Mudança de Variáveis;
- interpretar o determinante Jacobiano como fator local de alteração de volume;
- reconhecer o papel das transformações afins e elipsoidais na Estatística Multivariada.

O Capítulo 7 encerra o **Módulo I — Fundamentos Matemáticos e Geométricos da Análise Multivariada**.

O próximo capítulo inicia o **Módulo II — Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada** com o estudo das matrizes de covariâncias e correlações. Esses objetos combinam produtos cruzados, expectativas, formas quadráticas, transformações lineares e estruturas espectrais, estabelecendo a passagem dos fundamentos matemáticos para a descrição probabilística dos dados multivariados.



## **Parte II**

# **Módulo II — Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada**

## **8 Módulo II — Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada**

**8.1 Matrizes de covariâncias e correlações**

**8.2 Distribuição Normal Multivariada**

**8.3 Estatísticas Amostrais e Estimação**

**8.4 Modelo Linear Multivariado e Hipóteses Lineares**

**8.5 Inferência Multivariada**

## **Parte III**

# **Módulo III — Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas**

## **9 Módulo III — Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas**

**9.1 Problemas e estruturas das técnicas multivariadas**

**9.2 Formulação da Análise de Componentes Principais**

**9.3 Formulação da Análise Fatorial**

**9.4 Formulação da Análise de Agrupamentos**

**9.5 Formulação do Escalonamento Multidimensional**

**9.6 Formulação da Análise de Correspondência**

**9.7 Formulação da MANOVA**

**9.8 Formulação da Análise Discriminante**

**9.9 Formulação da Correlação Canônica**

**9.10 Formulação da Análise Conjunta**

# Referências

ANDERSON, Theodore W. **An Introduction to Multivariate Statistical Analysis**. 3. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003. p. 752

APOSTOL, Tom M. **Calculus, Volume II: Multi-Variable Calculus and Linear Algebra, with Applications to Differential Equations and Probability**. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 1969.

ARTES, Rinaldo; BARROSO, Lúcia Pereira. **Métodos multivariados de análise estatística**. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2023. p. 534

AXLER, Sheldon. **Measure, Integration & Real Analysis**. Cham: Springer, 2020. v. 282

BOYD, Stephen; VANDENBERGHE, Lieven. **Convex Optimization**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

CASELLA, George; BERGER, Roger L. **Statistical Inference**. 2. ed. Pacific Grove, CA: Duxbury, 2002.

GOLUB, Gene H.; VAN LOAN, Charles F. **Matrix Computations**. 4. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.

HAIR, Jr., Joseph F. *et al.* **Multivariate Data Analysis**. 8. ed. Andover: Cengage Learning, 2018.

HARVILLE, David A. **Matrix Algebra From a Statistician's Perspective**. New York: Springer, 1997. p. 634

HORN, Roger A.; JOHNSON, Charles R. **Topics in Matrix Analysis**. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

HORN, Roger A.; JOHNSON, Charles R. **Matrix Analysis**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

JOHNSON, Richard A.; WICHERN, Dean W. **Applied Multivariate Statistical Analysis**. 6. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007.

MAGNUS, Jan R.; NEUDECKER, Heinz. **Matrix Differential Calculus with Applications in Statistics and Econometrics**. 3. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2019. p. 504

MANLY, Bryan F. J.; NAVARRO ALBERTO, Jorge A. **Métodos Estatísticos Multivariados: Uma Introdução**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. p. 254

MARDIA, Kanti V.; KENT, John T.; TAYLOR, Charles C. **Multivariate Analysis**. 2. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2024. p. 592

MEYER, Carl D. **Matrix Analysis and Applied Linear Algebra**. 2. ed. Philadelphia: Society for Industrial; Applied Mathematics, 2023. p. 991

MINGOTI, Sueli Aparecida. **Análise de Dados Através de Métodos de Estatística Multivariada: Uma Abordagem Aplicada**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.

RENCER, Alvin C.; CHRISTENSEN, William F. **Methods of Multivariate Analysis**. 3. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012.

VAART, A. W. van der. **Asymptotic Statistics**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. p. 462