1 Лекция 15.11.2018

1.1 One way MANOVA. Модель, запись через мат. ожидания по группам и условные мат.ожидания. Разложение ковариационной матрицы. Критерия Лямбда Уилкса.

Этот раздел во многом аналогичен тексту про ANOVA. Основная разница заключается лишь в том, что здесь η является многомерным вектором.

Общая постановка задачи. Пусть есть k групп и p признаков, мы пытаемся проверить, что группы друг от друга не отличаются. Формально есть k (многомерных) случайных векторов $\boldsymbol{\eta}_1, \ldots, \boldsymbol{\eta}_k \in \mathbb{R}^p$ и гипотеза формулируется так:

$$\mathrm{H}_0 : \mathcal{P}(\boldsymbol{\eta}_1) = \mathcal{P}(\boldsymbol{\eta}_2) = \ldots = P(\boldsymbol{\eta}_k). \tag{1}$$

Эту задачу можно переформулировать следующим образом. Пусть есть дискретный (м.б. качественный) признак ξ, принимающий ровно k значений: $A_1, A_2, \ldots, A_k$. Рассмотрим случайный вектор $(\boldsymbol{\eta}, \xi)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^k \times \{A_1, A_2, \ldots, A_k\}$, такой что $\mathcal{P}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi = A_i) = \mathcal{P}(\eta_i)$ для всех $i \in 1 : k$. Тогда гипотеза (1) переписывается в виде:

$$\mathrm{H}_0^* : \mathcal{P}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi = A_i) = \mathcal{P}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi = A_j) \text{ для всех } i, j. \tag{2}$$

В MANOVA рассматривается частный случай (модель), когда $\mathcal{P}(\boldsymbol{\eta}_i) = \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_i, \Sigma)$. В рамках этой модели гипотезам (1) и (2) соответствуют следующие две равносильные гипотезы:

$$\begin{gathered} \mathrm{H}_0 : \boldsymbol{\mu}_1 = \boldsymbol{\mu}_2 = \ldots = \boldsymbol{\mu}_k. \\ \mathrm{H}_0^* : \mathbb{E}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi = A_1) = \ldots = \mathbb{E}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi = A_k). \end{gathered} \tag{3}$$

Прежде чем сформулировать гипотезу в рамках Основного Дисперсионного Тождества, запишем его на генеральном языке в текущей модели.

$$\mathrm{Cov}\boldsymbol{\eta} = \mathbb{E}\big[(\boldsymbol{\eta} - \mathbb{E}\boldsymbol{\eta})(\boldsymbol{\eta} - \mathbb{E}\boldsymbol{\eta})^{\mathrm{T}}\big] = \tag{4}$$

$$= \mathbb{E}\big[(\boldsymbol{\eta} - \mathbb{E}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi))(\boldsymbol{\eta} - \mathbb{E}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi))^{\mathrm{T}}\big] + \mathbb{E}\big[(\mathbb{E}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi) - \mathbb{E}\boldsymbol{\eta})(\mathbb{E}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi) - \mathbb{E}\boldsymbol{\eta})^{\mathrm{T}}\big]. \tag{5}$$

Теперь уже можно легко заметить, что в рамках Основного Дисперсионного Тождества гипотезу можно сформулировать следующим образом:

$$\mathrm{H}_0 : \mathbb{E}\big[(\mathbb{E}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi) - \mathbb{E}\boldsymbol{\eta})(\mathbb{E}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi) - \mathbb{E}\boldsymbol{\eta})^{\mathrm{T}}\big] = 0. \tag{6}$$

Эта запись является многомерным обобщением одномерной формулировки задачи ANOVA и также означает, что средние внутри групп не отличаются от общего среднего.

Выборка задается так же, как в ANOVA, но теперь индивиды многомерные. Имеется n_i индивидов из i-той группы ($i \in 1 : k$). Обозначим $\mathbf{y}_{ij} \in \mathbb{R}^p$— j-того индивида из i-той группы ($i \in 1 : k$ и $j \in 1 : n_i$). Обозначим $\overline{\mathbf{y}}$ — выборочное среднее по всем индивидам, а $\overline{\mathbf{y}_i}$ — выборочное среднее индивидов i-той группы.

Запишем (4) на выборочном языке:

$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}(\mathbf{y}_{ij} - \overline{\mathbf{y}})(\mathbf{y}_{ij} - \overline{\mathbf{y}})^{\mathrm{T}} = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}(\mathbf{y}_{ij} - \overline{\mathbf{y}_i})(\mathbf{y}_{ij} - \overline{\mathbf{y}_i})^{\mathrm{T}} + \sum_{i=1}^{k} n_i(\overline{\mathbf{y}_i} - \overline{\mathbf{y}})(\overline{\mathbf{y}_i} - \overline{\mathbf{y}})^{\mathrm{T}}. \tag{7}$$

Должно быть ясно, что это лишь многомерное обобщение разложения суммы квадратов.

Следуя обобщенным обозначениям, предложенным в предварительных материалах про ANOVA и регрессию, можно ввести следующие:

$$\mathbf{E} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{E}\big[\widehat{(\boldsymbol{\eta} - \mathbb{E}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi))}(\boldsymbol{\eta} - \mathbb{E}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi))^{\mathrm{T}}\big] = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_i} (\mathbf{y}_{ij} - \overline{\mathbf{y}_i})(\mathbf{y}_{ij} - \overline{\mathbf{y}_i})^{\mathrm{T}};$$

$$\mathbf{H} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{E}\big[\widehat{(\mathbb{E}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi) - \mathbb{E}\boldsymbol{\eta})}(\mathbb{E}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi) - \mathbb{E}\boldsymbol{\eta})^{\mathrm{T}}\big] = \sum_{i=1}^{k} n_i (\overline{\mathbf{y}_i} - \overline{\mathbf{y}})(\overline{\mathbf{y}_i} - \overline{\mathbf{y}})^{\mathrm{T}}.$$

Стоит сразу отметить, что, когда в дальнейшем мы будем строить критерии для проверки значимости, мы всегда будем их строить, как некие преобразования над парой матриц $(\mathbf{H}, \mathbf{E})$.

Теорема. *Пусть матрица* $\mathbf{H} \sim \mathcal{W}_p(\Sigma, \nu_{\mathbf{H}})$ *и* $\mathbf{E} \sim \mathcal{W}_p(\Sigma, \nu_{\mathbf{E}})$, *причем* $\mathbf{H}$ *и* $\mathbf{E}$ *независимы. Потребуем также, чтобы* $\nu_{\mathbf{H}} < \nu_{\mathbf{E}}$ *и* $\nu_{\mathbf{E}} > p$. *Обозначим* λ_i — *i-тое по упорядоченности по невозрастанию собственное число матрицы* $\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H}$. *Тогда*

$$t = \frac{|\mathbf{E}|}{|\mathbf{H} + \mathbf{E}|} = \frac{1}{|1 + \mathbf{E}^{-1}\mathbf{H}|} = \prod_{i=1}^{s} \frac{1}{1 + \lambda_i} \sim \Lambda_p(\nu_{\mathbf{H}}, \nu_{\mathbf{E}}), \tag{8}$$

где $s = \min(\nu_{\mathbf{H}}, p)$.

Таким образом, (8) дает нам статистику критерия, где в случае дискриминантного анализа $\nu_{\mathbf{H}} = k - 1$, $\nu_{\mathbf{E}} = n - k$. В случае многомерной множественной регрессии $\nu_{\mathbf{H}} = k$, $\nu_{\mathbf{E}} = n - k - 1$.

Значение s — это граница сверху для числа ненулевых чисел, которое определяется рангом матрицы $\mathbf{H}$. Во-первых, ранг не превосходит размерности p матрицы $\mathbf{H}$. Во-вторых, для дисперсионного анализа матрица $\mathbf{H}$ соответствует ковариационной матрице, построенной на основе k индивидов с весами, пропорциональными размерам групп. Поэтому ее ранг не может быть больше k. А так как данные исходно центрированы, то ранг не превосходит $k - 1$.

Заметим, что построенный критерий для проверки соответствующей гипотезы является далеко не единственным. О построении других критериев речь пойдет дальше.

1.2 Про дискриминантный анализ в целом

Постановка задачи, отличие от кластерного анализа.

Задачи — построить классифицирующее правило, объяснить его (интерпретация), feature selection, feature extraction.

Первый вопрос — а вообще группы отличаются?

Рассмотрим модель MANOVA, т.е. распределения в группах нормальные и отличаются только векторами средних. Тогда MANOVA используется для проверки значимости отличия. (гипотеза о том, что группы не отличаются.) В этом случае получаем модель линейного дискриминантного анализ (LDA).

Посмотрим на MANOVA с точки зрения отличия групп в LDA и того, как увидеть это отличие.

1.3 Канонические дискриминантные функции (коэффициенты) и переменные (feature extraction)

Напомним, что имеется p признаков и k групп: $\boldsymbol{\eta} \in \mathbb{R}^p$, причем $\mathcal{P}(\boldsymbol{\eta} \,|\, \xi = A_i) = \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_i, \Sigma)$. Попытаемся на основе имеющихся p признаках построить новые, по которым

группы «наиболее бы отличались», причем было бы удобно, чтобы эти новые признаки были ортогональны. Эта неформальная задача на самом деле очень просто формализуется, как мы увидем несколько далее.

Запишем на генеральном языке, что значит «новый признак». Есть $A \in \mathbb{R}^p$ и новый признак $\zeta = A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}$: $\mathcal{P}(\zeta \,|\, \xi = A_i) = \mathcal{N}(A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu}_i, A^{\mathrm{T}}\Sigma A)$. На выборочном языке — $Z = \mathbf{Y}A$ и выборочная ковариационная матрица (с точностью до коэффициента имеет вид): $A^{\mathrm{T}}\mathbf{Y}^{\mathrm{T}}\mathbf{Y}A = A^{\mathrm{T}}(\mathbf{H}+\mathbf{E})A$. Из этого следует,что «аналогом» $\mathbf{H}$ для нового признака является $A^{\mathrm{T}}\mathbf{H}A$, а аналогом $\mathbf{E}$ является $A^{\mathrm{T}}\mathbf{E}A$. [1]

Посмотрим теперь на F-статистику, следуя обобщенному определению статистики, данному в ANOVA:

$$F = F(A) = C\frac{\mathrm{SSH}_\zeta}{\mathrm{SSE}_\zeta} = C\frac{A^{\mathrm{T}}\mathbf{H}A}{A^{\mathrm{T}}\mathbf{E}A} \sim \mathrm{F}_{\nu_{\mathbf{H}},\nu_{\mathbf{E}}}.$$

где $C = \nu_{\mathbf{E}}/\nu_{\mathbf{H}}$ — коэффициент, не зависящий от A.

Исходно ставилась задача — найти такие признаки, по которым группы «наиболее бы отличались», причем желательно, чтобы признаки были ортогональны. В терминах максимизации статистики F — это означает, что решается обобщенная задача на собственные числа и собственные вектора.

$$\frac{A^{\mathrm{T}}\mathbf{H}A}{A^{\mathrm{T}}\mathbf{E}A} \to \max_A.$$

Обозначим собственные числа матрицы $\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H}$ в порядке невозрастания: $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \ldots \geqslant \lambda_s$, где $s = \min\{p, \nu_H\}$, и собственные вектора той же матрицы — A_i для $i \in 1:s$. Причем $A_i^{\mathrm{T}}\mathbf{E}A_j = 0$ для $j \neq i$. Вектора A_i — канонические коэффициенты (дискриминантные функции). Новые признаки $Z_i = \mathbf{Y}A_i$ — канонические переменные. Можно показать, новые признаки являются ортогональными: $Z_i^{\mathrm{T}}Z_j = 0$ для $j \neq i$.

Теорема.

$$\forall i \neq j \in 1:s \; Z_i \perp Z_j$$

Доказательство. $\langle Z_i, Z_j \rangle = \langle \mathbf{Y}A_i, \mathbf{Y}A_j \rangle = A_i^{\mathrm{T}}\mathbf{Y}^{\mathrm{T}}\mathbf{Y}A_j = A_i^{\mathrm{T}}(\mathbf{H}+\mathbf{E})A_j = A_i^{\mathrm{T}}\mathbf{E}(\mathbf{I}+\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H})A_j$. Так как $\forall \mathbf{C} \geq 0$ с с. ч. $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ с. ч. матрицы $\mathbf{I}+\mathbf{C}$ — это $1+\lambda_1, \ldots, 1+\lambda_s$, а собственные вектора те же самые, $(\mathbf{I}+\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H})A_j = (1+\lambda_j)A_j$ по определению собственного вектора. Так как собственные вектора разных с.ч. $\mathbf{E}$-ортогональны, $\langle Z_i, Z_j \rangle = (1+\lambda_j)A_i^{\mathrm{T}}\mathbf{E}A_j = 0$. □

Исходя из описания, смысл λ_i — степень различия групп по i-тому направлению, задаваемом i-той дискриминантной функцией. A_i — коэффициенты с которыми нужно взять исходные признаки, чтобы получить новый признак, соответствующий наибольшей разнице групп и ортогональный предыдущим. А сами канонические переменные тем самым — ортогональные новые признаки, по которым соответствующий наибольшее различие равен λ_i.

[1] Чтобы в этом убедиться, нужно написать оценкой чего является $\mathbf{H}$ и $\mathbf{E}$. Дальше домножить это на A нужным образом и ввести обозначение для нового признака. Дальше все станет ясно.

2 Лекция 22.11.2018

2.1 MANOVA и значимость LDA. Разные критерии, чем отличаются.

Использование MANOVA для проверки значимости дискриминантного анализа совершенно естественно. Один из критериев 1.1 уже был построен — это критерий Лямбда Уилкса.

На самом деле это далеко не единственный критерий, который может быть построен, в частности, для проверки значимости дискриминантного анализа. Как уже отмечалось, главными объектами, с которыми приходится работать, являются матрицы $\mathbf{H}$ и $\mathbf{E}$. На основе разных способов «совмещения» этих объектов могут получаться разные критерии. Рассмотрим несколько способов. Напомним, что $s = \min\{\nu_{\mathbf{H}}, p\}$.

Проверяется гипотеза о равенстве средних[2]

$$\mathrm{H}_0 : \mathbb{E}\boldsymbol{\eta}_1 = \mathbb{E}\boldsymbol{\eta}_2 = \ldots = \mathbb{E}\boldsymbol{\eta}_k.$$

1. Lambda Wilks's

$$\Lambda = \frac{|\mathbf{E}|}{|\mathbf{E}+\mathbf{H}|} = \frac{1}{|1+\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H}|} = \prod_{i=1}^{s}\frac{1}{1+\lambda_i} \sim \Lambda_p(\nu_{\mathbf{H}}, \nu_{\mathbf{E}}).$$

2. Roy's largest root

$$Q = \frac{\lambda_1}{1+\lambda_1} = r_1^2.$$

   Этот тест использует только первое собственное число матрицы $\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H}$. Напомним, что r_i^2 — называют i-тым каноническим корнем. На самом деле r_i — так называемые канонические корреляции [3]. Потому они на самом деле имеют интерпретируемый смысл.

3. Pillai's:

$$V^{(s)} = \mathrm{tr}\left(\mathbf{H}(\mathbf{E}+\mathbf{H})^{-1}\right) = \sum_{i=1}^{s} r_i^2.$$

4. Hotelling:

$$U^{(s)} = \mathrm{tr}\left(\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H}\right) = \sum_{i=1}^{s}\lambda_i.$$

Как всегда, когда мы видим много критериев для проверки одной гипотезы, нужно научиться их сравнивать. Сравнивают критерии по мощности. Но, чтобы говорить о мощности нужно фиксировать альтернативу. Таким образом, вопрос можно поставить следующим образом: «Для каких альтернатив предложенные критериев более мощные?».

Посмотрим на это на примере первых двух критериев. Первый критерий включает в статистику все (!) направления, по которым разброс максимален (иными словами, все λ_i).

[2]На самом деле о равенстве распределений в рамках нормальной модели при условии гомоскедастичности.

[3] Позднее, если успею, расскажу про то, между чем это корреляции.

Второй же критерий включает в себя лишь первое направление, с максимальной степенью разброса, измеряемой λ_1. Из этого становится ясно, что если у нас на самом деле лишь одно направление определяет разброс (например, k шариков лежат на одной прямой), то остальные λ_i при $i > 2$ уже не отображают различие между группами и потому в такой ситуации следует ожидать, что второй критерий окажется мощнее первого. В обратном случае, когда все направления описывают различие между группами, следует ожидать, что первый критерий окажется мощнее второго.

Про третий и четвертый критерий в литературе утверждается, что они «где-то по середине» между первым и вторым.

В заключение заметим, что у всех критериев кроме первого критическая область находится «слева» и около 0 (все статистики неотрицательны), у первого критерия все наоборот: носитель статистики от 0 до 1 и критическая область расположена около 1.

2.2 Частный случай — ошибки сферические

Пусть $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{n\times p}$ — матрица данных (строки $\mathbf{y}_k$, $k \in 1:n$ (или $\mathbf{y}_{ij}$ в другой нумерации по группам) – наблюдения, столбцы $Y_j, j \in 1:p$ – признаки), наблюдения принадлежат к одной из k групп, в каждой группе n_i наблюдений, $n = \sum_{i=1}^{k} n_i$. Матрица межгрупповых отклонений $\mathbf{H} = \sum_{i=1}^{k} n_i \left(\overline{\mathbf{y}}_i - \overline{\mathbf{y}}\right)\left(\overline{\mathbf{y}}_i - \overline{\mathbf{y}}\right)^{\mathrm{T}}$, матрица внутригрупповых отклонений $\mathbf{E} = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}\left(\mathbf{y}_{ij} - \overline{\mathbf{y}}_i\right)\left(\mathbf{y}_{ij} - \overline{\mathbf{y}}_i\right)^{\mathrm{T}}$.

В случае, если $\mathbf{E} = \sigma^2\mathbf{I}$ (все группы сферические и одинакового размера), дискриминантные функции данных, т.е. $A_1, \ldots, A_s$ – собственные вектора $\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H}$, становятся собственными векторами матрицы $\sigma^2\mathbf{H}$. То есть дискриминантные функции являются собственными векторами матрицы межгрупповых ковариаций. Так они совпадают с главными направлениями в терминах анализа главных компонент, если каждую группу рассматривать как одного индивида (в АГК главные направления — это собственные вектора ковариационной матрицы), а дискриминантные переменные $\mathbf{Y}A_i$ при такой постановке являются главными компонентами.

2.3 Значимое число дискриминантных функций (размерность пространства, где группы различаются).

Модель дискриминантного анализа (на генеральном языке): ξ – дискретная с.в., принимающая значения $\{A_i\}_{i=1}^{k}$, распределение $\boldsymbol{\eta}$ при условии $\xi = A_i$ совпадает с распределением $\boldsymbol{\eta}_i$. Определены матрицы

$$\mathbf{H}_{th} = \mathbb{E}\left(\left(\mathbb{E}\left(\boldsymbol{\eta}|\xi\right) - \mathbb{E}\boldsymbol{\eta}\right)\left(\mathbb{E}\left(\boldsymbol{\eta}|\xi\right) - \ E\boldsymbol{\eta}\right)^{\mathrm{T}}\right) \in \mathbb{R}^{p\times p},$$

$$\mathbf{E}_{th} = \mathbb{E}\left(\left(\boldsymbol{\eta} - \mathbb{E}\left(\boldsymbol{\eta}|\xi\right)\right)\left(\boldsymbol{\eta} - \mathbb{E}\left(\boldsymbol{\eta}|\xi\right)\right)^{\mathrm{T}}\right) \in \mathbb{R}^{p\times p}.$$

Дискриминантные функции $A_1, \ldots, A_s$ — это с.в. матрицы $\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H}$, $s = \min\{p, \nu_H\}$.

Для того, чтобы узнать, сколько функций являются значимыми (сколько новых признаков интерпретировать), мы последовательно проверяем гипотезы H_0: «дискриминантные функции с номерами $m, \ldots, s$ не описывают различия в данных» для возрастающих $m \in 1:s$. Формально, гипотеза эквивалентна тому, $\operatorname{rank}\mathbf{H}_{th} \leq m-1$, т.е. все собственные числа матрицы, начиная с m-го равны нулю. Мы можем позволить себе проверять её последовательно, так как знаем, что дискриминантные функции, будучи отсортированы по убыванию соответствующих собственных чисел, оказываются в порядке убывания качества объяснения различий.

Если H_0 верна, то может быть показано, что

$$\Lambda'_m = \prod_{i=m}^{s} \frac{1}{1+\lambda_i} \sim \Lambda_p \left(\nu_H + (m-1), \nu_E - (m-1)\right).$$

Здесь уже матрицы, полученные по выборке.

С помощью статистики Λ'_m (lambda prime) мы для каждого m можем проверить, незначимы ли эта и все последующие дискриминантные функции. Если они значимы, то все перед ними тоже значимы и m нужно увеличить.

2.4 Интерпретация разделения: стандартизованные дискриминантные функции и факторная структура

Пусть $\mathbf{Y}$ — матрица данных (строки $\mathbf{y}_i, i \in 1:n$ – наблюдения, столбцы $Y_j, j \in 1:p$ – признаки), наблюдения принадлежат к одной из k групп, в каждой группе n_i наблюдений, $n = \sum_{i=1}^{k} n_i$. Матрица межгрупповых отклонений $\mathbf{H} = \sum_{i=1}^{k} n_i \left(\overline{\mathbf{y}}_i - \overline{\mathbf{y}}\right)\left(\overline{\mathbf{y}}_i - \overline{\mathbf{y}}\right)^{\mathrm{T}}$, матрица внутригрупповых отклонений $\mathbf{E} = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_i} \left(\mathbf{y}_{ij} - \overline{\mathbf{y}}_i\right)\left(\mathbf{y}_{ij} - \overline{\mathbf{y}}_i^{\mathrm{T}}\right)$.

$A_1, \ldots, A_s$ — собственные вектора $\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H}$, называемые дискриминантными функциями, λ_i — упорядоченные по убыванию собственные числа. Канонические переменные — вектора данных в новых координатах $Z_i = \mathbf{Y}A_i$.

Задача: проинтепретировать канонические переменные (новые признаки).

2.4.1 Стандартизованные дискриминантные функции

Первый способ проинтерпретировать разложение по дискриминантным переменным — посмотреть на коэффициенты, с которыми исходные переменные входят в дискриминантные. Если исходные переменные измерены в различных шкалах, то коэффициенты в векторе A_i одновременно ещё и приводят показатели к нужной шкале. Чтобы избежать этого эффекта, можно посмотреть на стандартизованные дискриминантные функции.

Пусть $\mathbf{S}$ – матрица взвешенных ковариаций (pooled covariance matrix), $s_1^2, \ldots, s_p^2$ – элементы на её диагонали (взвешенные дисперсии признаков, pooled variance), $A_i = \begin{pmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{ip} \end{pmatrix}$.

Тогда

$$Z_i = \mathbf{Y}A_i = \sum_{j=1}^{p} Y_j a_{ij} = \sum_{j=1}^{p} \frac{Y_j}{s_j} \cdot s_j a_{ij} = \sum_{j=1}^{p} \frac{Y_j}{s_j} \cdot \widetilde{a}_{ij},$$

и $\widetilde{A}_i = \left(\operatorname{diag} \mathbf{S}\right)^{\frac{1}{2}} A_i$ — i-я стандартизованная дискриминантная функция (стд. д. ф.). Коэффициенты стд. д. ф. показывают вклады исходных признаков в канонические переменные (вернее, это коэффициенты линейной комбинации, по которой канонические переменные выражаются через исходные признаки). Как и в регрессии, стандартизация (pooled) не влияет на результат регрессии, только помогает интерпретации.

2.4.2 Факторная структура

Факторная структура — матрица pooled корреляций между исходными и каноническими переменными. Так как дискриминантные функции, вообще говоря, не ортогональны, то получатся другие числа. Что правильнее — сложный вопрос.

2.5 Уменьшение числа признаков (feature selection)

«Плохие» признаки, это признаки, которые:

1. Являются линейной комбинацией других признаков, т.е. имеют большой коэффициент множественной корреляции (pooled!) $R^2 = R^2\left(\eta^{(i)}; \left\{\eta^{(i)} \middle| j \in 1:p \ \{i\}\right\}\right)$. Соответствующая характеристика – tolerance $= 1 - R^2$ (чем больше, тем признак лучше с точки зрения этого критерия).

2. При удалении из модели не влияют на качество разделения. Соответствующая гипотеза H_0: «удаление признака i не влияет на качество разделения», т.е. от удаления i-го признака теоретическая Λ не меняется. Статистика:

$$(\text{Partial } \Lambda)_i = \frac{\Lambda\left(Y_1, \ldots, Y_p\right)}{\Lambda\left(Y_1, \ldots, Y_{i-1}, Y_{i+1}, \ldots, Y_p\right)} \sim \Lambda_1\left(\nu_H, \nu_E - p + 1\right) \tag{9}$$

   С точки зрения Partial Λ, чем она меньше, тем признак лучше (полезнее для разделения групп), а гипотеза у нас о его бесполезности. Преобразованная характеристика (так, чтобы из распределения Λ_1 получилось F-распределение), наоборот, чем больше, тем признак лучше. Отсюда сразу ясно, где критические области.

2.5.1 Пошаговый дискриминантный анализ

Пошаговый дискриминантный анализ подбирает тот набор признаков, который лучше всего будет разделять переменные (аналогично пошаговой множественной регрессии) жадным образом. На каждом шаге добавляется одна переменная, которая максимально увеличивает качество разделения групп (качество меряется статистикой partial lambda из (9), точнее, из-за наличия точного преобразования из распределения Λ_1 в F-распределение, эквивалентной статистикой с распределением Фишера). После этого набранная модель пересматривается на предмет наличия избыточных переменных. Процедура останавливается, когда максимальное значение F для вновь добавляемых переменных не превосходит наперёд заданного порога.

Первой переменной в модели становится та, для которой F-статистика из ANOVA оказалась наибольшей.

Выше описан вариант forward с добавлением признаков. Аналогично можно рассмотреть backward версию.

3 Лекция 29.11.2018

3.1 Общий подход к классификации через апостериорные вероятности

Общая подход к классификации: строятся классифицирующие функции f_i, такие что классификация проводится так: индивид с признаками x относится к группе с максимальным значением на нем классифицирующей функции: $\arg\max_i \mathrm{f}_i(x)$.

Откуда берутся эти классифицирующие функции? Естественная идея взять в качестве f_i вероятность (ее оценку) принадлежности к i-му классу. Пусть ξ – дискретная с.в., принимающая значения $\{A_i\}_{i=1}^k$, $\mathcal{P}(\eta \mid \xi = A_i) = \mathcal{P}_i$ и имеет плотность $p_i(x)$. Тогда было бы логично взять $f_i = p_i$. Для практического применения надо было бы оценить плотности, либо непараметрически (например, по числу точек, попавших в дельта-окрестность — типа метода ближайших соседей), либо параметрически (если известно, что распределение нормальное, тогда просто оцениваем векторы средних и ковариационные матрицы).

Более сложный подход — через апостериорные вероятности. Если у нас есть априорное знание вероятности того, что индивид из того или иного класса, то мы можем его учесть. Введем понятие класса $C_i = \{\xi = A_i\}$. Чтобы классифицировать наблюдение x, необходимо найти

$$\arg\max \mathrm{P}\left(\xi \in A_i | \eta = x\right) = \arg\max \mathrm{P}\left(C_i | x\right).$$

Пусть известны априорные вероятности принадлежности нового наблюдения к i-му классу $\pi_i = \mathrm{P}\left(C_i\right)$. Тогда апостериорные вероятности по формуле Байеса будут иметь вид

$$\mathrm{P}\left(C_i | x\right) = \frac{\mathrm{P}\left(x | C_i\right)\pi_i}{\sum_{j=1}^k \mathrm{P}\left(x | C_j\right)\pi_j}.$$

Поэтому в качестве классифицирующих функций берут

$$f_i\left(x\right) = \frac{p_i(x)\pi_i}{\sum_{j=1}^k p_j(x)\pi_j}.$$

Так как знаменатель у всех f_i одинаковый, его можно отбросить, и итоговые классифицирующие функции будут выглядеть как $f_i\left(x\right) = \mathrm{P}\left(x | C_i\right)\pi_i = p_i(x)\pi_i$.

Как выбрать априорные вероятности?

1. Равномерно, $\forall i \in 1 : k\ \pi_i = 1\ /\ k$.
2. По соотношениям в обучающей выборке: $\pi_i = n_i\ /\ \sum_{j=1}^k n_j$.
3. На основе другой дополнительной информации о данных (результаты предыдущих исследований, etc.)

Свойство. *Построенный метод классификации* $\mathrm{predict}(x) = \arg\max_i \pi_i p_i(x)$ *минимизирует среднюю апостериорную ошибку:*

$$\sum_{i=1}^k \pi_i P(\mathrm{predict}(x) != i \mid C_i).$$

Видно, что можно с помощью априорных вероятностей формально задавать важность ошибочных классификаций для разных классов.

3.2 Линейный и квадратичный дискриминантный анализ для классификации

3.2.1 LDA

Модель: ξ — дискретная с.в., принимающая значения $\{A_i\}_{i=1}^k$, $\mathcal{P}(\eta \mid \xi = A_i) = \mathcal{N}(\mu_i, \Sigma)$. Тогда плотность в точке x

$$p_i(x) = p(x|\xi = A_i) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}|\Sigma|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu_i)^{\mathrm{T}}\Sigma^{-1}(x-\mu_i)\right),$$

и классифицирующая функция $f_i(x) = \pi_i p(x|\xi = A_i)$, где π_i — априорная вероятность наблюдения попасть в i-ю группу. Для упрощения вычислений можно переписать классифицирующую функцию через возрастающее монотонное преобразование как

$$g_i(x) = \log f_i(x) = \log \pi_i - \frac{1}{2}\log|\Sigma| - \frac{1}{2}(x-\mu_i)^{\mathrm{T}}\Sigma^{-1}(x-\mu_i).$$

Сократив часть, не зависящую от номера класса, получаем линейные классифицирующие функции

$$h_i(x) = -\frac{1}{2}\mu_i^{\mathrm{T}}\Sigma^{-1}\mu_i + \mu_i^{\mathrm{T}}\Sigma^{-1}x + \log \pi_i.$$

3.2.2 QDA

Модель: ξ — дискретная с.в., принимающая значения $\{A_i\}_{i=1}^k$, $\mathcal{P}(\eta \mid \xi = A_i) = \mathcal{N}(\mu_i, \Sigma_i)$. Тогда плотность в точке x

$$p(x|\xi = A_i) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}|\Sigma_i|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu_i)^{\mathrm{T}}\Sigma_i^{-1}(x-\mu_i)\right),$$

и классифицирующая функция $f_i(x) = \pi_i p(x|\xi = A_i)$. Применяем возрастающее монотонное преобразование и оставляем в классифицирующей функции только члены, отличающиеся в разных группах:

$$g_i(x) = \log f_i(x) = \log \pi_i - \frac{1}{2}\log|\Sigma_i| - \frac{1}{2}(x-\mu_i)^{\mathrm{T}}\Sigma_i^{-1}(x-\mu_i),$$

получаем квадратично зависящую от x классифицирующую функцию.

3.3 Классификация в случае двух классов

Если всего два класса, то можно построить границу между классами, приравняв классифицирующие функции.

3.3.1 LDA

Приравняв $h_1(x) = h_2(x)$, получим разделяющую гиперплоскость. Разделяющая два класса гиперплоскость имеет вид

$$\{\mathbf{x} : h_1(\mathbf{x}) = h_2(\mathbf{x})\} = \\ = \{\mathbf{x} : -\frac{1}{2}(\mu_1-\mu_2)^{\mathrm{T}}\mathbf{\Sigma}^{-1}(\mu_1+\mu_2) + (\mu_1-\mu_2)^{\mathrm{T}}\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{x} + \log(\pi_1/\pi_2) = 0\}.$$


От соотношения между априорными вероятностями зависит положение границы относительно классов (к какому она ближе). Видно, что априорные вероятности влияют только на сдвиг разделяющей гиперплоскости.

Заметим, что классификацию можно записать как сравнение $-\frac{1}{2}(\mu_1 - \mu_2)^{\mathrm{T}}\mathbf{\Sigma}^{-1}(\mu_1 + \mu_2) + (\mu_1 - \mu_2)^{\mathrm{T}}\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{x}$ с некоторым порогом $(-\log(\pi_1/\pi_2))$, который зависит от априорных вероятностей (или весов ошибок для разных классов, смотря как на это смотреть).

3.3.2 QDA

В данном случае, разделяющая поверхность имеет вид квадратичной поверхности, может состоять из двух гиперболоидом, может иметь форму эллипса.

3.3.3 Картинки



Здесь мы обсуждали число параметров в моделях, возможный overfitting (переподгонку). Использовали слова — обобщающая способность алгоритма.

3.4 Качество классификации

3.4.1 Ошибки класификации

Качество классификации измеряется ошибками классификации (доля неправильно классифицированных объектов). n_{ij} — число объектов из класса i, отнесенных к классу j. В соответствующей матрице классификации на диагонали стоят правильно классифицированные объекты, вне диагонали — ошибки.

На самом деле, нельзя проверять качество предсказания на тех данных, на которых это предсказание строилось. Поэтому используют кросс-валидацию (скользящий контроль). Например, каждое наблюдение по очереди исключается из выборки, классифицирующее правило строится без него и с помощью этого правила индивид классифицируется. Строится аналогичная таблица из n_{ij}. В ней ошибок будет, вообще говоря, больше.

Здесь обсуждали, что имеет смысл смотреть на ошибки без кросс-валидации и с ней. Если разница существенная, то это говорит о переподгонке используемой модели. Вероятно, она не очень хорошая; например, слишком много параметров.

Замечание. Нельзя путать классификацию и различие групп. Группы могут значимо различаться, классификация может быть при этом бессмысленной (ошибок чуть меньше 50%).

3.4.2 ROC и AUC

wikipedia ROC-кривая (англ. receiver operating characteristic, рабочая характеристика приёмника) — график, позволяющий оценить качество бинарной классификации, отображает соотношение между долей объектов от общего количества носителей признака, верно классифицированных как несущих признак, (англ. true positive rate, TPR, называемой чувствительностью алгоритма классификации) и долей объектов от общего количества объектов, не несущих признака, ошибочно классифицированных как несущих признак (англ. false positive rate, FPR, величина 1-FPR называется специфичностью алгоритма классификации) при варьировании порога решающего правила.

Также известна как кривая ошибок. Анализ классификаций с применением ROC-кривых называется ROC-анализом.

Количественную интерпретацию ROC даёт показатель AUC (англ. area under ROC curve, площадь под ROC-кривой) — площадь, ограниченная ROC-кривой и осью доли ложных положительных классификаций. Чем выше показатель AUC, тем качественнее классификатор, при этом значение 0,5 демонстрирует непригодность выбранного метода классификации (соответствует случайному гаданию). Значение менее 0,5 говорит, что классификатор действует с точностью до наоборот: если положительные назвать отрицательными и наоборот, классификатор будет работать лучше.

мои комментарии Если кто-то хорошо представляет себе, как выглядит график зависимости мощности от ошибки первого рода, то это именно такой график. Меняется уровень значимости (как порог отвергнуть - не отвергнуть) и по оси x откладывается ошибка первого рода, она же false positive, а по оси y откладывается мощность, она же true positive (слово positive означает, что нулевая гипотеза отвергнута в пользу второй, альтернативной, гипотезы, а в случае классификации, что элемент классифицируется как относящийся ко второму классу).

Таким образом, меняем порог для метода классификации и по оси x откладываем долю неправильно классифицированных элементов из первого класса, а по оси y — долю правильно классифицированных элементов из второго класса.