

SEZIONE BONUS E RISORSE PRATICHE

Strumenti Applicativi per il Tuo Percorso



BONUS 1: Checklist Complete per Ogni Situazione

Checklist Pre-Sessione Completa

24 Ore Prima:

- ☐ Discutere aspettative con la partner: "Stasera ti va di esplorare insieme?"
- ☐ Assicurarsi che entrambi abbiate dormito bene (la stanchezza uccide l'eccitazione)
- ☐ Evitare pasti pesanti 2-3 ore prima (la digestione dirotta sangue dai genitali)
- ☐ Idratazione adeguata durante la giornata (le ghiandole di Skene necessitano fluidi)
- ☐ Gestire stress della giornata (meditazione, esercizio, conversazione rilassante)

2 Ore Prima:

- ☐ Riordinare camera da letto (ambiente pulito = mente rilassata)
- ☐ Cambiare lenzuola se necessario (sensazione di fresco aumenta comfort)
- ☐ Preparare protezioni per letto (asciugamani scuri, telo impermeabile)
- ☐ Controllare temperatura camera (20-22°C ideale)
- ☐ Preparare illuminazione (candele, dimmer, lampada soffusa)
- ☐ Scegliere musica di sottofondo se desiderata (playlist pronta)
- ☐ Mettere telefoni in modalità aereo

30 Minuti Prima:

- ☐ *Doccia rilassante per entrambi (non necessariamente insieme)*
- ☐ *Curare igiene personale (denti, alito, corpo)*
- ☐ *Controllare unghie (corte, limate, pulite)*
- ☐ *Lei: svuotare vescica completamente*
- ☐ *Tu: svuotare vescica*
- ☐ *Applicare crema mani se necessario (pelle morbida)*
- ☐ *Verificare disponibilità lubrificante*

10 Minuti Prima:

- ☐ *Reset mentale: 5 respiri profondi*
- ☐ *Ripetere mantra: "Nessuna pressione, solo esplorazione e piacere"*
- ☐ *Breve connessione emotiva (abbraccio, sguardo negli occhi)*
- ☐ *Conferma consenso: "Sei pronta? Ti va davvero?"*
- ☐ *Ultimo check protezioni letto*

Checklist Durante la Sessione

Fase Foreplay (0-20 minuti):

- ☐ *Iniziato con baci e carezze non-sessuali*
- ☐ *Focus su connessione emotiva oltre che fisica*
- ☐ *Esplorato zone erogene secondarie (collo, orecchie, schiena)*
- ☐ *Gradualmente aumentato intimità verso zone genitali*
- ☐ *Verificato eccitazione crescente (respiro, lubrificazione, feedback verbale)*

Fase Stimolazione Clitoridea (20-35 minuti):

- ☐ Applicato lubrificante se necessario
- ☐ Iniziato con tocchi leggeri, aumentato gradualmente pressione
- ☐ Variato ritmo e tecnica basandosi su sue reazioni
- ☐ Chiesto feedback: "Ti piace così? Più forte o più leggero?"
- ☐ Osservato segnali fisici (respiro accelerato, movimento bacino)
- ☐ Portato ad alto livello di eccitazione prima di passare oltre

Fase Stimolazione Punto G (35-60 minuti):

- ☐ Inserito dita gradualmente dopo conferma verbale/fisica
- ☐ Localizzato punto G (zona ruvida 4-6 cm dentro, parete anteriore)
- ☐ Usato tecnica "come hither" iniziando lentamente
- ☐ Mantenuto stimolazione clitoridea (manuale, orale, o lei stessa)
- ☐ Aumentato gradualmente ritmo e pressione
- ☐ Comunicato costantemente: "Va bene? Continuo così?"
- ☐ Notato segnali pre-squirting (gonfiore punto G, sensazione urinare)
- ☐ Incoraggiato verbalmente quando vicina: "Lasciati andare, va tutto bene"

Fase Post (Se Squirting È Avvenuto):

- ☐ Rallentato stimolazione gradualmente (non fermato bruscamente)
- ☐ Chiesto feedback immediato: "Come stai? È stato intenso?"
- ☐ Celebrato insieme l'esperienza

- ☐ Offerto coccole e vicinanza fisica
- ☐ Chiesto se vuole continuare o fermarsi

Fase Post (Se Squirting Non È Avvenuto):

- ☐ Evitato segni di delusione
- ☐ Celebrato comunque l'esperienza: "È stato bello esplorare insieme"
- ☐ Chiesto feedback: "Come ti sei sentita? Qualcosa da provare diversamente?"
- ☐ Transizione verso altro tipo di piacere se desiderato
- ☐ Coccole e connessione emotiva

Checklist Post-Sessione (Debriefing)

Immediatamente Dopo (0-30 minuti):

- ☐ Momento di vicinanza fisica (abbracci, carezze affettuose)
- ☐ Espressioni di apprezzamento reciproco
- ☐ Idratazione (bere acqua insieme)
- ☐ Pulizia delicata e comfort
- ☐ Riposo rilassato insieme

Il Giorno Dopo (Conversazione Riflessiva):

- ☐ Check-in emotivo: "Come ti senti oggi riguardo a ieri sera?"
- ☐ Condividere cosa è piaciuto specificamente
- ☐ Discutere cosa provare diversamente la prossima volta
- ☐ Annotare mentalmente o per iscritto progressi e apprendimenti

- ☐ Pianificare prossima esplorazione (se desiderata)
-

BONUS 2: FAQ Estese con Risposte Complete

Domande Tecniche

Q1: Le mie dita si stancano dopo 10 minuti. Come posso migliorare la resistenza?

Risposta completa: La stanchezza rapida delle dita deriva spesso da tecnica inefficiente piuttosto che da mancanza di forza. Ecco come migliorare:

Esercizi di resistenza (fare fuori dal contesto sessuale):

- Premi una pallina anti-stress per 30 secondi, rilassa 30 secondi, ripeti 10 volte
- Fai il gesto "come hither" con un peso leggero (500g-1kg) per 2 minuti al giorno
- Stretching delle dita e polsi prima e dopo pratica

Migliorare meccanica:

- Usa movimento della spalla, non solo dal polso
- Appoggia il peso del braccio sulla mano invece di "sostenere" il braccio in aria
- Alterna tra tecniche diverse (circoli vs come hither) per usare muscoli diversi

Strategie durante la sessione:

- Rallenta il ritmo per 1 minuto invece di fermarti (recupero attivo)
- Combina con stimolazione orale per dare riposo alle dita
- Cambia posizione tua o sua per trovare angolazione meno faticosa

Q2: Come faccio a sapere se il liquido è squirting o urina?

Risposta completa: La distinzione può essere difficile, ecco i criteri:

Caratteristiche dello squirting:

- Appare durante alta eccitazione sessuale, non prima
- Liquido chiaro o leggermente lattiginoso
- Odore neutro o leggermente dolce (NON forte ammoniacca)
- Volume variabile ma spesso abbondante
- Lei descrive sensazione di "rilascio" diversa dall'urinare
- Accompagnato da sensazioni di piacere intenso

Caratteristiche dell'urina:

- Liquido giallo (intensità varia con idratazione)
- Odore distintivo di ammoniacca
- Temperatura corporea calda
- Lei sente effettivamente che sta urinando (non ambiguità)

Test pratico (opzionale):

- Lei svuota vescica completamente 10 minuti prima
- Se durante stimolazione esce liquido abbondante, è molto probabilmente squirting (vescica vuota)
- Se ha dubbi persistenti, può consultare ginecologo

Importante: Anche se fosse urina diluita (può succedere), non è disgustoso o sbagliato. È parte normale dell'esplorazione sessuale e va accettato senza giudizio.

Q3: Mia moglie ha avuto bambini. Il parto ha cambiato qualcosa per lo squirting?

Risposta completa: Sì, il parto può influenzare lo squirting in vari modi:

Cambiamenti post-parto che possono facilitare:

- Maggiore consapevolezza del pavimento pelvico
- Muscoli pelvici più "allenati" dalla gravidanza
- Meno inibizioni corporee (dopo aver partorito, molte donne hanno meno imbarazzi)

Cambiamenti che possono ostacolare:

- Tono muscolare pelvico ridotto inizialmente (migliora con esercizi Kegel)
- Sensibilità alterata temporaneamente
- Spostamento anatomico di organi interni
- Cicatrici da episiotomia o cesareo che influenzano sensazioni

Timeline di recupero:

- 0-6 settimane: Astinenza (guarigione medica necessaria)
- 6-12 settimane: Ripresa graduale, sensibilità può essere diversa
- 3-6 mesi: Graduale ritorno alla normalità
- 6-12 mesi: La maggior parte delle donne torna a sensibilità pre-gravidanza

Raccomandazioni:

- Esercizi Kegel quotidiani (contrarre 5 sec, rilassare 5 sec, ripetere 10 volte, 3 volte/giorno)
- Pazienza durante riavvio vita sessuale

- Comunicazione aperta su cosa si sente diverso
- Consultare fisioterapista pelvico se ci sono problemi persistenti

Domande Psicologiche/Relazionali

Q4: Mia partner si sente sotto pressione anche se dico che non c'è pressione. Come gestire?

Risposta completa: Dire "non c'è pressione" spesso non basta se i tuoi comportamenti comunicano l'opposto. Ecco l'approccio completo:

Comunicazione verbale migliorata:

Invece di: "Non c'è pressione" (negazione che mette focus sulla pressione)

Prova: "Voglio solo che ci godiamo l'esplorazione insieme, qualsiasi cosa succeda va benissimo"

Allineamento comportamenti-parole:

- Se dici "nessuna pressione" ma poi sembri deluso quando non succede → lei percepisce pressione
- Se dici "va bene così" ma continui a provare ogni volta → lei percepisce pressione
- Se celebri SOLO quando squirta ma non quando organizza in altri modi → lei percepisce gerarchia

Intervento strategico:

1. **Pausa dichiarata:** "Facciamo 4 settimane di pausa completa dall'obiettivo squirting. Zero tentativi. Solo sesso normale e piacevole."
2. **Durante la pausa:** Se lei menziona squirting, rispondi: "Non ci sto pensando in questo periodo, mi sto godendo solo te"
3. **Dopo la pausa:** "Ti va di riprovare? Se no, va benissimo continuare come stiamo facendo"

Segnali che la pressione sta diminuendo:

- *Lei inizia lei stessa l'argomento squirting*
- *Scherza sul tema invece di essere seria/tesa*
- *Mostra curiosità invece che ansia*
- *Si rilassa durante le sessioni*

Q5: Ho fatto squirtare una ex facilmente, ma con la mia attuale partner non funziona. Perché?

Risposta completa: Ogni donna ha anatomia, sensibilità e risposta sessuale uniche. Le ragioni possono essere:

Differenze anatomiche:

- *L'ex aveva ghiandole di Skene molto sviluppate, l'attuale magari meno*
- *Posizione e sensibilità del punto G variano drasticamente*
- *Quello che funzionava per una non funziona automaticamente per l'altra*

Differenze psicologiche:

- *L'ex magari aveva meno inibizioni o imbarazzi*
- *L'attuale potrebbe avere blocchi mentali diversi*
- *La dinamica relazionale influenza il rilassamento*

Il pericolo del confronto:

- *Confrontare (anche solo mentalmente) crea pressione invisibile*
- *Lei potrebbe percepire aspettative basate sull'ex*
- *Questo crea prestazione ansiosa*

La soluzione:

- **Azzerare aspettative:** *Dimentica completamente l'ex. Ogni donna è un universo nuovo.*
- **Approccio da zero:** *Anche se sai tecnicamente cosa fare, esplora lei come fosse la prima volta*
- **MAI menzionare l'ex:** *Non dire mai "Con la mia ex facevo così..." (devastante)*
- **Celebra unicità:** *"Mi piace scoprire cosa funziona specificamente per te"*

Prospettiva utile: *Se cambiassi partner maschile, avresti pene di dimensione/curvatura diversa e lei dovrebbe adattarsi. Stesso principio: ogni corpo è diverso, serve adattamento.*

BONUS 3: Guida Rapida Risoluzione Problemi (Formato Decisionale)

ALBERO DECISIONALE: "NON RIESCO A TROVARE IL PUNTO G"

PROBLEMA: Non senti nulla di particolare quando esplori internamente

DOMANDA 1: Lei è già molto eccitata? (almeno 20 min foreplay)

- **NO** → Aggiungi 10-15 minuti stimolazione clitoridea, poi riprova
- **SÌ** → Vai a Domanda 2

DOMANDA 2: Le tue dita sono nella posizione corretta? (palmo su, curvate verso pancia)

- **NO o NON SICURO** → Correggi posizione, riprova
- **SÌ** → Vai a Domanda 3

DOMANDA 3: Hai esplorato a diverse profondità? (4cm, 5cm, 6cm)

- **NO** → Varia profondità lentamente, chiedi feedback
- **SÌ** → Vai a Domanda 4

DOMANDA 4: Lei può guidarti verbalmente su dove sente sensazioni?

- **SÌ** → Segui le sue indicazioni
- **NO, non sente niente di particolare** → Potrebbe avere punto G meno pronunciato. Continua stimolazione generale e osserva se emerge con più eccitazione

ALBERO DECISIONALE: "LEI DICE CHE FA MALE"

PROBLEMA: Dolore durante stimolazione interna

DOMANDA 1: Tipo di dolore?

- **BRUCIORE/TAGLIO** → Controlla unghie immediatamente. Se ok, aggiungi molto lubrificante
- **PRESSIONE DOLOROSA** → Vai a Domanda 2
- **DOLORE PROFONDO INTERNO** → Vai a Domanda 3

DOMANDA 2: Hai iniziato con troppa intensità troppo presto?

- **PROBABILMENTE SÌ** → Riduci pressione a livello 3-4, torna a foreplay per 5 min, riprova gradualmente
- **NO, ero leggero** → Potrebbe essere muscoli contratti. Chiedi di rilassarsi consciamente, respiri profondi

DOMANDA 3: Dolore profondo persistente?

- **Sì, anche con tocco leggero** → Ferma. Potrebbe essere condizione medica (endometriosi, cisti ovarica, infezione). Suggestisci visita ginecologica
- **NO, solo con pressione forte** → Evita pressione forte. Usa stimolazione più leggera

ALBERO DECISIONALE: "VEDO SEGNALI MA NON SQUIRTA"

PROBLEMA: Punto G gonfio, lei dice sensazione urinare, ma poi non succede nulla

DOMANDA 1: Quanto tempo hai mantenuto quella stimolazione?

- **MENO DI 5 MINUTI** → Continua per altri 5-10 minuti con stessa intensità
- **PIÙ DI 10 MINUTI** → Vai a Domanda 2

DOMANDA 2: Lei sta trattenendo consciamente?

- **Sì, ha paura di urinare** → Rassicura verbalmente, ricorda che vescica è vuota, incoraggia a lasciarsi andare

- **NO, sta cercando di rilassarsi** → Vai a Domanda 3

DOMANDA 3: *Stai combinando con stimolazione clitoridea?*

- **NO** → Aggiungi stimolazione clitoridea ora
- **Sì** → Vai a Domanda 4

DOMANDA 4: *Hai provato ad aumentare intensità nell'ultimo minuto?*

- **NO** → Aumenta ritmo a veloce/molto veloce per 60-90 secondi
 - **Sì, niente cambia** → Accetta che oggi potrebbe non succedere. Celebra comunque l'esperienza, riprova altra volta
-

BONUS 4: Esercizi Pratici per Lei (Da Fare Autonomamente)

Esercizio 1: Esplorazione Solitaria del Punto G

Obiettivo: Familiarizzare con la propria anatomia senza pressione di partner

Quando: Durante masturbazione in momento rilassato

Come:

1. *Eccitarsi con stimolazione clitoridea fino a lubrificazione abbondante (10-15 min)*
2. *Inserisci dito (indice o medio) con palmo verso su*
3. *Esplora la parete anteriore (verso pancia) a diverse profondità*
4. *Cerca zona con texture diversa (ruvida vs liscia)*
5. *Quando la trovi, applica pressione e fai movimento "vieni qui"*
6. *Nota cosa senti: piacevole? Strano? Stimolo a urinare? Nulla?*
7. *Non cercare di squirtare - solo esplorare e notare*

Benefici:

- *Conosci la tua risposta senza pressione di un partner*
- *Puoi poi guidarlo verbalmente con più sicurezza*
- *Riduce ansia performance*

Esercizio 2: Rilassamento Muscoli Pelvici

Obiettivo: Imparare a rilassare invece che contrarre quando senti stimolo

Quando: Anche fuori dal contesto sessuale

Come:

1. Sdraiati comodamente
2. Contrai muscoli pelvici (come trattenere pipì) per 5 secondi
3. Nota la sensazione di contrazione
4. Rilassa completamente per 10 secondi
5. Concentrati sulla differenza tra contratto e rilassato
6. Ripeti 10 volte
7. Pratica il "rilascio" - invece di trattenere, fai movimento come iniziare a urinare (senza effettivamente urinare)

Durante il sesso:

Quando senti lo stimolo a urinare durante stimolazione punto G, pratica consciamente il "rilascio" che hai allenato

Esercizio 3: Mindfulness Sessuale

Obiettivo: Stare nel momento presente invece che nella testa

Quando: Durante masturbazione o sesso con partner

Come:

1. Quando noti che la mente vaga ("Sto per squirtare?" "Funzionerà?" "Cosa pensa lui?")
2. Riporta consapevolezza al corpo
3. Nomina mentalmente 3 sensazioni fisiche: "Sento calore", "Sento pressione", "Sento pulsazione"
4. Respira profondamente 3 volte
5. Ritorna completamente alle sensazioni fisiche

Pratica quotidiana:

5 minuti al giorno di meditazione body-scan non sessuale costruisce questa capacità

BONUS 5: App Utili per Coppie

Spicer (Gratis con acquisti in-app)

- *Gioco di carte digitale per coppie*
- *Scoprire preferenze e fantasie reciproche*
- *Sfide intime progressive*
- **Utile per:** *Iniziare conversazioni su sessualità*

Desire (Gratis versione base)

- *Calendario condiviso per intimità*
- *Invio desideri privati*
- *Sfide e giochi per coppie*
- **Utile per:** *Mantenere viva anticipazione*

Flo/Clue (Tracking Ciclo - Gratis)

- *Traccia ciclo mestruale*
 - *Predice fase fertile e ovulazione*
 - *Nota sintomi e umore*
 - **Utile per:** *Capire quando lei è più sensibile (spesso ovulazione)*
-

BONUS 6: SCHEDA DI TRACKING PROGRESSI

Come Usare Questa Scheda

Scopo: Tenere traccia informale delle esplorazioni per identificare pattern e progressi senza diventare ossessivi.

Frequenza: Compilare dopo sessioni dedicate all'esplorazione (non dopo ogni rapporto sessuale normale)

Metodo: Voi due insieme dopo la sessione, 5-10 minuti di riflessione condivisa

SCHEDA PROGRESSI - SESSIONE #__

DATA: _____ **ORA INIZIO:** _____ **ORA FINE:** _____

DURATA TOTALE SESSIONE: _____ minuti

SEZIONE 1: PREPARAZIONE

Ambiente (Voto 1-10): ____

Note: _____

Livello di stress PRE-sessione:

- ☐ Entrambi rilassati
- ☐ Uno stressato (chi: _____)
- ☐ Entrambi stressati

Foreplay duration: _____ minuti

- ☐ Sufficiente
 - ☐ Troppo breve
 - ☐ Potrebbe essere più lungo
-

SEZIONE 2: TECNICHE UTILIZZATE

Posizione Principale:

- ☐ Lei sulla schiena (Posizione 1)

- ☐ *Lei a quattro zampe (Posizione 2)*
- ☐ *Lei seduta (Posizione 3)*
- ☐ *Spooning (Posizione 4)*
- ☐ *In piedi (Posizione 5)*
- ☐ *Altra: _____*

Tecnica Manuale Punto G:

- ☐ *"Come hither" (vieni qui)*
- ☐ *Pressione costante con circoli*
- ☐ *Pulsazione ritmica*
- ☐ *Combinazione: _____*

Ritmo:

- ☐ *Lento per maggior parte*
- ☐ *Medio per maggior parte*
- ☐ *Veloce per maggior parte*
- ☐ *Variabile/ondulatorio*

Stimolazione Clitoridea Simultanea:

- ☐ *Sì - da me con altra mano*
- ☐ *Sì - lei da sola*
- ☐ *Sì - orale da me*
- ☐ *Sì - con giocattolo vibrante*
- ☐ *No/minima*

SEZIONE 3: OSSERVAZIONI FISICHE

Livello Eccitazione Raggiunto (1-10): ____

Punto G:

- ☐ *Trovato facilmente*
- ☐ *Trovato con difficoltà*
- ☐ *Non localizzato chiaramente*

Gonfiore Punto G:

- ☐ *Molto evidente*
- ☐ *Moderato*
- ☐ *Leggero*
- ☐ *Non percettibile*

Lubrificazione:

- ☐ Abbondante naturalmente
- ☐ Moderata
- ☐ Scarsa - aggiunto lubrificante
- ☐ Lubrificante usato dal primo inserimento

Sensazione "bisogno urinare":

- ☐ Sì, forte - durata ____ minuti
 - ☐ Sì, leggera
 - ☐ No, mai avvertita
-

SEZIONE 4: SEGNALI PRE-SQUIRTING OSSERVATI

- ☐ Respiro accelerato e profondo
 - ☐ Movimenti bacino (spinta verso mano)
 - ☐ Contrazioni vaginali ritmiche
 - ☐ Vocalizzazioni aumentate
 - ☐ Irrigidimento corpo
 - ☐ Ha verbalizzato "sensazione strana"
 - ☐ Nessuno dei segnali sopra

Note aggiuntive sui segnali:

SEZIONE 5: RISULTATO

Squirting:

- ☐ Sì - abbondante
- ☐ Sì - moderato
- ☐ Sì - leggero (poche gocce)
- ☐ NO - ma vicino (descrizione: _____)
- ☐ NO - non vicino

Orgasmo:

- ☐ Sì, prima dello squirting
- ☐ Sì, durante lo squirting
- ☐ Sì, dopo lo squirting
- ☐ Sì, ma senza squirting
- ☐ No

Se squirting è avvenuto - caratteristiche:

Colore: ☐ Trasparente ☐ Leggermente latteo ☐ Altro: _____

Odore: ☐ Neutro ☐ Leggero ☐ Forte

SEZIONE 6: FEEDBACK EMOTIVO/PSICOLOGICO

Come si è sentita LEI (sue parole):

Livello di rilassamento mentale (1-10): ____

Ha sentito pressione? ☐ Sì ☐ No ☐ Un po'

Come ti sei sentito TU:

Livello di connessione emotiva percepita (1-10): ____

SEZIONE 7: COSA HA FUNZIONATO BENE

1. _____
 2. _____
 3. _____
-

SEZIONE 8: COSA PROVARE DIVERSAMENTE LA PROSSIMA VOLTA

1. _____
 2. _____
 3. _____
-

SEZIONE 9: NOTE LIBERE / INSIGHTS

SEZIONE 10: PROSSIMA SESSIONE

Data pianificata: _____ (dare almeno 3-7 giorni di intervallo)

Focus per prossima volta:

- ☐ Stessa tecnica (era promettente)
- ☐ Variare posizione
- ☐ Più foreplay
- ☐ Meno pressione psicologica
- ☐ Provare edging
- ☐ Combinare con penetrazione
- ☐ Pausa dall'obiettivo squirting
- ☐ Altro: _____

ANALISI PATTERN (Compilare Dopo 5+ Sessioni)

Dopo aver compilato 5-10 schede, rivedi insieme e cerca pattern:

Posizione che sembra funzionare meglio: _____

Tecnica più efficace: _____

Tempo medio necessario per alta eccitazione: _____ minuti

Fase ciclo mestruale quando più reattiva: _____

Fattori che sembrano facilitare:

1. _____
2. _____

Ostacoli ricorrenti:

1. _____
2. _____

Decisione dopo analisi:

- ☐ Continuare con strategia corrente
 - ☐ Modificare approccio (come: _____)
 - ☐ Pausa temporanea
 - ☐ Accettare che potrebbe non essere possibile per noi
-

VERSIONE SEMPLIFICATA (Se la completa è troppo)

Usa solo queste 5 domande dopo ogni sessione:

1. ***Cosa è andato particolarmente bene oggi?***

2. ***Cosa ha sentito lei di più piacevole?***

3. ***È successo qualcosa di nuovo o diverso?***

4. ***Come ci siamo sentiti emotivamente?***

5. ***Una cosa da provare la prossima volta?***

PROMEMORIA IMPORTANTE: Questa scheda è strumento, non obbligo. Se compilarla diventa stressante o toglie spontaneità, SMETTI. L'obiettivo è aiutarvi, non diventare "compito scolastico". Usala solo se vi è effettivamente utile.