Els enigmes de Dudeney

43 trencaclosques de Henry E. Dudeney, el gran inventor d'enigmes anglès, traduïts al català, de set tipus diferents. Un enigma per full, amb espai per pensar-hi. Les solucions són en un altre document. A la pantalla s'hi pot jugar a dudeney.step-quiz.net.


1	Una dissecció fàcil	Dissecció · 1/3
2	Un quadrat fàcil	Dissecció · 1/3
3	Els quadrats de brocat	Dissecció · 2/3
4	El problema del fuster	Dissecció · 2/3
5	Dues creus d'una	Dissecció · 3/3
6	La mitra	Dissecció · 3/3
7	El trencaclosques del mercer	Dissecció · 3/3
8	Les sis granotes	Fitxes · 2/3
9	Les granotes ensinistrades	Fitxes · 2/3
10	El trencaclosques de Twickenham	Fitxes · 2/3
11	Les lletres a la capsa	Fitxes · 2/3
12	Les quatre granotes	Fitxes · 2/3
13	Les vuit locomotores	Fitxes · 3/3
14	Els formatges de l'administrador	Fitxes · 3/3
15	Travessant el rierol	Mesures i travesses · 1/3
16	Un nou problema de mesures	Mesures i travesses · 2/3
17	El bol de la festa	Mesures i travesses · 2/3
18	El tresor del castell	Mesures i travesses · 2/3
19	Cinc entrenadors i una barca	Mesures i travesses · 3/3
20	Alfils sense protecció	Escacs · 1/3
21	Alfils protegits	Escacs · 2/3
22	Les vuit reines	Escacs · 2/3
23	Peons sense tres en línia	Escacs · 3/3
24	Els cavalls guardians	Escacs · 3/3
25	Visitant les ciutats	Camins · 1/3
26	L'inspector del metro	Camins · 2/3
27	Inspeccionant una mina	Camins · 2/3
28	El trencaclosques del mariner	Camins · 2/3
29	La volta de la torre	Camins · 2/3
30	La mosca a l'octàedre	Camins · 3/3
31	El vuit rebel	Quadrats màgics · 1/3
32	El quadrat de Bachet	Quadrats màgics · 2/3
33	Les divuit fitxes de dòmino	Quadrats màgics · 2/3
34	Les cistelles de prunes	Quadrats màgics · 2/3
35	Un quadrat màgic de compostos	Quadrats màgics · 2/3
36	Un quadrat màgic reversible	Quadrats màgics · 2/3
37	El número estripat	Aritmètica · 1/3
38	L'amulet	Aritmètica · 1/3
39	Comptant els rectangles	Aritmètica · 1/3
40	El problema del cent	Aritmètica · 2/3
41	Multiplicació amb les nou xifres	Aritmètica · 2/3
42	Els cinc bandolers	Aritmètica · 2/3
43	L'aranya i la mosca	Aritmètica · 3/3

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917). Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Una dissecció fàcil

An Easy Dissection Puzzle, Amusements in Mathematics (1917), núm. 146

Primer, retalla un tros de paper o de cartolina amb la forma de la il·lustració. Es veu de seguida que les proporcions són senzillament les d'un quadrat amb mig quadrat igual enganxat al costat, tallat per la diagonal. El trencaclosques consisteix a tallar-lo en quatre peces exactament de la mateixa mida i de la mateixa forma.



Retalla la figura en quatre peces exactament iguals: de la mateixa mida i de la mateixa forma.


Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Un quadrat fàcil

An Easy Square Puzzle, Amusements in Mathematics (1917), núm. 147

Si agafes un tros de cartolina rectangular, el doble de llarg que d'ample, i el talles per la meitat seguint la diagonal, obtindràs dues de les peces de la il·lustració. El trencaclosques consisteix a formar un quadrat amb cinc peces iguals com aquestes. Una de les peces es pot tallar en dues, però les altres s'han de fer servir senceres.



Retalla cinc triangles com aquests (mig rectangle de 2 × 1) i fes-ne un quadrat. N'has de tallar un en dues peces; els altres, sencers.

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


Els quadrats de brocat

The Squares of Brocade, Amusements in Mathematics (1917), núm. 174

Una vegada que feia una visita a casa d'una senyora, vaig agafar de damunt d'una taula dos quadrats de brocat preciosos. Eren dues peces de treball oriental, totes dues amb el mateix dibuix: un quadriculat delicat.

—Oi que són precioses? —va dir la meva amiga—. Me les va portar un cosí que acaba de tornar de l'Índia. Ara vull que m'ajudi: he decidit ajuntar-les per fer-ne una sola funda de coixí, quadrada i gran. Com ho puc fer espatllant la roba tan poc com sigui possible? És clar que només vull tallar per les línies que separen els quadrets.

Vaig tallar els dos quadrats en quatre peces que encaixaven per formar un quadrat més gran, amb el dibuix ben casat, i quan vaig acabar em vaig adonar que dues de les peces tenien exactament la mateixa àrea: cadascuna tenia el mateix nombre de quadrets. Sabries com es van fer els talls, amb aquestes condicions?



Retalla els dos quadrats només per les línies de la quadrícula, en quatre peces en total, i munta un quadrat de 10 × 10 amb les flors ben alternades. Dues peces han de tenir la mateixa àrea.

Espai per pensar-hi


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

El problema del fuster

The Joiner's Problem, Amusements in Mathematics (1917), núm. 151

Sovint he tingut ocasió de remarcar la utilitat pràctica dels trencaclosques: els petits trucs i recursos que aprenem resolent problemes d'entreteniment es poden aplicar a les coses de cada dia.

El fuster de la il·lustració vol tallar aquest tros de fusta en el mínim de peces possible per fer el tauler d'una taula quadrada, sense malbaratar gens de material. Com s'ho ha de fer? Quantes peces et caldrien a tu?



Talla la fusta en el mínim de peces possible per fer el tauler quadrat, sense que en sobri gens. Quantes peces calen?


Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Dues creus d'una

Two Crosses from One, Amusements in Mathematics (1917), núm. 143

Talla una creu grega en cinc peces que formin dues creus com aquesta, totes dues de la mateixa mida. La solució d'aquest trencaclosques és molt bonica.



Retalla la creu en cinc peces: una ha de ser una creu sencera més petita, i amb les altres quatre (sense girar-les del revés) n'has de fer una altra d'igual. Pista: la creu petita va una mica girada.

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

La mitra


Dissecting a Mitre, Amusements in Mathematics (1917), núm. 150

La figura que fa rumiar el fuster de la il·lustració representa una mitra. Es veu que les seves proporcions són les d'un quadrat al qual s'ha tret una quarta part. El trencaclosques consisteix a tallar-la en cinc peces que encaixin i formin un quadrat perfecte.

Als Estats Units es va publicar un intent de fer-ho amb quatre peces, basat en l'anomenat «principi de l'escala», però és un error. Primer ens diuen que tallem dos triangles de dalt i els encaixem a l'espai triangular que queda a sota, per formar un rectangle. Fins aquí, tot bé. Després ens diuen que retallem el rectangle en forma d'escala i que, baixant un esglaó una de les dues peces, en surt el quadrat. Però, per desgràcia, no surt un quadrat, sinó un rectangle.

Diguem que els tres costats llargs de la mitra fan 84 polzades cadascun. Llavors, abans de tallar els esglaons, el rectangle fa 84 × 63. Els esglaons han de fer 10½ polzades d'alt i 12 d'ample. Per tant, baixant un esglaó reduïm en 12 polzades el costat de 84 i augmentem en 10½ el de 63, i el rectangle final fa 72 × 73½ polzades, que no és cap quadrat! El fet és que el principi de l'escala només es pot aplicar a rectangles amb els costats en unes proporcions concretes. Per exemple, si aquí el costat curt fes 61 5/7 (en lloc de 63), el mètode sí que funcionaria, perquè els esglaons farien 10 2/7 polzades d'alt i 12 d'ample. Fixeu-vos que 61 5/7 × 84 = el quadrat de 72. De moment no s'ha trobat cap solució amb quatre peces, i no crec que n'hi hagi.

Unitats: 1 polzada ≈ 2,54 cm.



Retalla la mitra (un quadrat sense una quarta part) en cinc peces i fes-ne un quadrat perfecte. Compte: el «principi de l'escala» no hi funciona.

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


El trencaclosques del mercer

The Haberdasher's Puzzle, The Canterbury Puzzles (1907), núm. 26

Els pelegrins van insistir molt perquè el mercer, que anava amb la colla, els proposés algun trencaclosques, però durant molt de temps no hi va haver manera. Finalment, en una de les parades del camí, va dir que els ensenyaria una cosa que els «cargolaria el cervell com la corda d'una campana». La veritat és que els feia una broma, perquè ell mateix no sabia la resposta del trencaclosques que els va posar.

Va treure un tros de roba en forma de triangle equilàter perfecte i va dir: —Hi ha algú de vosaltres que sàpiga tallar bé la roba? Em penso que no. Cadascú al seu ofici: el savi pot aprendre del criat, i l'home assenyat, del ximple. Doncs ensenyeu-me, si en sabeu, com es pot tallar aquest tros de roba en quatre peces que, ajuntades, facin un quadrat perfecte.

Alguns dels pelegrins més instruïts van trobar com fer-ho amb cinc peces, però no amb quatre. I quan van pressionar el mercer perquè donés la solució, va haver de reconèixer, després de fer moltes voltes, que no la sabia fer amb cap nombre de peces. «Per sant Francesc», va dir, «qualsevol bergant pot inventar una endevinalla; endevinar-la és cosa dels qui en saben». Per poc no es va endur una bona pallissa. El més curiós és que jo he trobat que realment es pot fer amb només quatre peces, i sense girar del revés cap peça. El mètode és subtil, però crec que el lector trobarà el problema interessantíssim.



Aquí tens les quatre peces de Dudeney: retalla-les i fes-ne un quadrat, sense girar-ne cap del revés. (Repte complet: dibuixa un triangle equilàter i busca tu els talls.)

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Les sis granotes

The Six Frogs, Amusements in Mathematics (1917), núm. 214

Les sis granotes ensinistrades de la il·lustració han après a girar el seu ordre: han de quedar amb els números 6, 5, 4, 3, 2, 1, i amb la casella buida al mateix lloc que ara.

Una granota pot saltar a la casella del costat, si és buida, o saltar per sobre d'una altra granota fins a la casella següent, si és buida, tal com es fa a les dames. Poden anar endavant o enrere, com vulguin.

Sabries dir com ho fan amb el mínim de moviments possible? És força fàcil; quan ho hagis aconseguit, afegeix una setena granota a la dreta i torna-hi. Després afegeix-ne més, fins que puguis donar la solució més curta per a qualsevol nombre de granotes: sempre es pot fer, amb aquella única casella buida, siguin quantes siguin.



Fes-ho amb sis monedes o papers numerats. Apunta l'ordre en què mous les granotes i compta els moviments.

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


Les granotes ensinistrades

The Educated Frogs, Amusements in Mathematics (1917), núm. 216

Les nostres sis granotes ensinistrades han après un número nou, i força bonic. Posades sobre gots de vidre, com a la il·lustració, canvien de costat: les tres negres han de quedar a l'esquerra i les tres blanques a la dreta, amb el got buit a l'altra punta, al número 7.

Una granota pot saltar al got del costat (si és buit) o per sobre d'una o de dues granotes fins a un got buit. Els salts es poden fer en les dues direccions, i una granota pot saltar per sobre de les del seu color, de les de l'altre color o de totes dues. Quatre salts d'exemple, un darrere l'altre, ho deixaran ben clar: del 4 a l'1, del 5 al 4, del 3 al 5 i del 6 al 3.

Sabries fer-ho en deu salts?



Fes-ho amb tres monedes d'un tipus i tres d'un altre sobre set llocs numerats. Apunta cada salt (d'on i cap on) i compta'ls: en calen deu.

Els salts:


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

El trencaclosques de Twickenham

The Twickenham Puzzle, Amusements in Mathematics (1917), núm. 217

A la il·lustració hi ha onze discos en cercle. Sobre cinc dels discos hi posem fitxes blanques amb lletres negres, com es veu, i sobre cinc més, fitxes negres amb lletres blanques. El disc de baix queda buit. Partint d'aquí, cal posar les fitxes en ordre perquè, llegides en el sentit de les agulles del rellotge, formin la paraula «Twickenham», amb el disc buit al mateix lloc que al principi.

Les fitxes negres es mouen en el sentit de les agulles del rellotge, i les blanques, en el sentit contrari. Una fitxa pot saltar per sobre d'una de l'altre color si el disc que ve just després és buit. Així, si el primer moviment és amb la K, la C pot saltar per sobre de la K. Si llavors la K avança cap a la E, pots fer saltar la W per sobre de la C, i així successivament. El trencaclosques es pot resoldre en vint-i-sis moviments. Recorda que una fitxa no pot saltar mai per sobre d'una del seu color.



Fes-ho amb deu papers amb les lletres (cinc de clars i cinc de foscos) sobre onze llocs en cercle. Les foscos giren com les agulles del rellotge; les clares, al revés. Apunta les lletres que mous, per ordre: en calen vint-i-sis.

Les lletres que mous:

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


Les lletres a la capsa

The Letter Block Puzzle, Amusements in Mathematics (1917), núm. 219

Aquí tenim un petit record del nostre vell amic, el trencaclosques del 15. Vuit blocs de fusta amb lletres són dins una capsa, com es veu a la il·lustració. Només es pot moure un bloc cada vegada, cap al lloc que en aquell moment és buit, perquè cap bloc no es pot treure de la capsa. El trencaclosques consisteix a anar-los movent fins que quedin en aquest ordre:

A	**B**	**C**
D	**E**	**F**
G	**H**	

Si et deixen fer tants moviments com vulguis, veuràs que no és gens difícil. Però el trencaclosques és fer-ho amb el mínim de moviments possible. No diré quin és aquest mínim, perquè potser el lector el voldrà descobrir pel seu compte. Per apuntar els moviments n'hi ha prou d'escriure les lletres en l'ordre en què es mouen. Així, els cinc primers moviments podrien ser C, H, G, E, F, i aquesta manera d'apuntar-ho no pot portar cap confusió. A la pràctica, només et calen vuit fitxes i un diagrama senzill en un full de paper.



Fes-ho amb vuit papers amb lletres sobre una quadrícula de 3 × 3. Apunta les lletres que mous, per ordre. Quants moviments calen, com a mínim?

Les lletres que mous:


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Les quatre granotes

The Four Frogs, Amusements in Mathematics (1917), núm. 341

A la il·lustració hi ha vuit bolets, amb granotes blanques a l'1 i al 3 i granotes negres al 6 i al 8. El trencaclosques consisteix a moure una granota cada vegada, en l'ordre que vulguis, per una de les línies rectes que van de bolet a bolet, fins que hagin canviat de lloc: les blanques han de quedar al 6 i al 8, i les negres, a l'1 i al 3.

Si fas servir quatre fitxes sobre un diagrama senzill, ho trobaràs força fàcil. Però és una mica més difícil fer-ho en només set jugades, si compten com una sola jugada tots els moviments seguits d'una mateixa granota. És clar que mai no hi pot haver dues granotes en un mateix bolet.



Fes-ho amb dues monedes d'un tipus i dues d'un altre sobre el dibuix. Apunta cada jugada entre parèntesis, amb tots els moviments seguits d'una mateixa granota: en calen set.

Les jugades:


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Les vuit locomotores

The Eight Engines, Amusements in Mathematics (1917), núm. 221

El diagrama representa el dipòsit de locomotores d'una companyia de ferrocarrils amb una direcció força excèntrica. Les locomotores només es poden aturar als nou punts indicats, un dels quals ara és buit. Cal moure les locomotores, d'una en una, de punt en punt, en disset moviments, de manera que els seus números quedin en ordre al voltant del cercle, amb el punt del mig buit.

Però a una de les locomotores li han apagat el foc i, per tant, no es pot moure. Com s'ha de fer? I quina és la locomotora que es queda quieta tota l'estona?



Fes-ho amb vuit papers numerats sobre el dibuix. Apunta les locomotores que mous, per ordre: en calen disset. Quina no s'ha mogut?

Les locomotores que mous:

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Els formatges de l’administrador


The Reve’s Puzzle, The Canterbury Puzzles (1907), núm. 1

L’administrador era un home astut i una mica erudit. Com diu Chaucer, «no hi havia auditor que el pogués enganyar» i «ningú no el va poder agafar mai en descobert». El poeta també es va fixar que «sempre cavalcava el darrer de la colla»: ho feia per poder rumiar, sense que ningú l’interrompés, els problemes i les idees fantasioses que li passaven pel cap.

Una vegada que els pelegrins es van aturar en un hostal del camí, va veure uns quants formatges de mides diferents. Va demanar quatre tamborets i va dir a la colla que els ensenyaria un trencaclosques seu que els entretindria mentre descansaven. Va posar vuit formatges, de més gran a més petit, en un dels tamborets de la punta, amb el més petit a dalt de tot.

—És una endevinalla —va dir— que vaig plantejar als meus veïns de Baldeswell, a Norfolk, i per sant Joce que cap no la va saber resoldre. I és ben fàcil: només us demano que, movent els formatges d’un en un d’un tamboret a un altre, els passeu tots al tamboret de l’altra punta, sense posar mai cap formatge sobre un de més petit. A qui ho faci amb el mínim de moviments possible, li pagaré un glop del millor que tingui el nostre bon hostaler.

Resoldre aquest trencaclosques amb el mínim de moviments, primer amb 8 formatges, després amb 10 i, finalment, amb 21, és un entreteniment ben interessant.



Fes-ho amb vuit monedes de mides diferents (o vuit papers numerats) i quatre llocs. Compta els moviments: quants en calen, com a mínim?

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


Travessant el rierol

Crossing the Stream, Amusements in Mathematics (1917), núm. 373

Durant una passejada pel camp, el senyor i la senyora Softleigh es van trobar en un bon embolic. Havien de travessar un rierol amb una barqueta que només podia portar 150 lliures de pes. Però el senyor Softleigh i la seva dona pesaven exactament 150 lliures cada un, i cada un dels seus dos fills, 75. I encara hi havia el gos, que no hi havia manera que volgués nedar.

Seguint el principi de «les senyores, primer», de seguida van fer passar la senyora Softleigh a l'altra banda. Va ser una badada, perquè va haver de tornar amb la barca i no s'havia guanyat res. Com van aconseguir passar tots a l'altra banda? Segur que tu ho trobaràs molt més fàcil que la família Softleigh.

Unitats: 1 lliura ≈ 0,45 kg: 150 lliures són uns 68 kg.



Escriu cada travessia: qui va a la barca i cap a on. La barca no pot portar més de 150 lliures, i el gos (que en pesa 30) no sap remar.

Travessia	A la barca	Cap a
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


Un nou problema de mesures

New Measuring Puzzle, Amusements in Mathematics (1917), núm. 365

Aquí teniu un nou problema de mesurar líquids que trobareu interessant. Un home té dues gerres de 10 quarts plenes de vi, i una mesura de 5 quarts i una altra de 4. Vol posar exactament 3 quarts a cadascuna de les dues mesures.

Com ho ha de fer? I quantes manipulacions (vessar d'un recipient a un altre) necessites? És clar que no s'hi val a llençar vi, a inclinar els recipients ni a fer cap altre truc.

Unitats: 1 quart anglès ≈ 1,14 litres.



Escriu, després de cada abocada, quant vi hi ha a cada recipient. Cada vegada que vesses, el vi passa fins que l'un queda buit o l'altre ple.

	gerra de 10	gerra de 10	mesura de 5	mesura de 4
inici	10	10	0	0
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).


El bol de la festa

The Wassail Bowl, Amusements in Mathematics (1917), núm. 362

Una nit de Nadal, tres rodamons es van trobar amb un autèntic bol de festa: un barriló amb exactament 12 pintes de llimonada. Un d'ells tenia una gerra de 5 pintes, i un altre, una de 3. El problema era repartir-se la llimonada a parts iguals sense malbaratar-ne ni una gota. És clar que no poden fer servir cap altre recipient ni cap altra mesura.

Si trobes com fer-ho, intenta trobar la manera que necessita menys manipulacions. Cada vegada que es vessa d'un recipient a un altre, o directament a la boca d'un dels rodamons, compta com una manipulació.

Unitats: 1 pinta anglesa ≈ 0,57 litres: 12 pintes són uns 6,8 litres.



Escriu, després de cada manipulació, quanta llimonada hi ha al barril i a cada gerra, i quanta se n'ha begut cada rodamón. El que un rodamón s'ha begut ja no torna.

	barril	gerra de 5	gerra de 3	X	Y	Z
inici	12	0	0	0	0	0
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Espai per pensar-hi

El tresor del castell


Stealing the Castle Treasure, Amusements in Mathematics (1917), núm. 377

La família De Gourney encara explica, de generació en generació, la manera enginyosa com uns lladres es van endur un cofre ple de joies i pedres precioses del castell de Gloomhurst. Els lladres eren un home, un jove i un noi petit, i l'única manera d'escapar amb el cofre era per una finestra molt alta. A fora de la finestra hi havia una politja, i per la politja passava una corda amb una cistella a cada punta. Quan una cistella era a terra, l'altra era a la finestra. La corda estava posada de manera que els qui anaven a les cistelles no s'hi podien ajudar, ni podien rebre l'ajuda de ningú. En resum, l'única manera de fer servir les cistelles era posar més pes en una que en l'altra.

L'home pesava 195 lliures; el jove, 105; el noi, 90, i el cofre del tresor, 75. La cistella que baixava no podia pesar més de 15 lliures més que l'altra: si no, baixaria tan de pressa que seria molt perillós per a una persona, tot i que al tresor no li faria cap mal. A cada cistella només hi podien anar dues persones, o una persona i el tresor. Com s'ho van fer per escapar tots i endur-se el tresor?

El trencaclosques és trobar la manera més curta de fer-ho, que en si no és difícil. Recorda que ningú no es pot ajudar estirant la corda: l'única manera de baixar és «de cop», amb un contrapès a l'altra cistella.

Unitats: 1 lliura ≈ 0,45 kg.



Escriu cada manipulació: qui baixa i qui puja. Si a la cistella que baixa hi ha una persona, la diferència de pes no pot passar de 15 lliures; el tresor sol pot baixar amb qualsevol diferència.

Les manipulacions (qui baixa i qui puja):


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Cinc entrenadors i una barca

Five Jealous Husbands, Amusements in Mathematics (1917), núm. 375

Durant unes inundacions, cinc entrenadors de futbol i les cinc estrelles dels seus equips es van quedar envoltats d'aigua, i havien d'escapar amb una barca on només hi cabien tres persones cada vegada. Cada entrenador desconfiava tant dels altres que no volia que la seva estrella estigués, ni a la barca ni a cap de les dues ribes, amb un altre entrenador (o amb uns quants) si ell no hi era: li podrien fer una oferta per fitxar-la! Quina és la manera més ràpida de passar tots deu a l'altra banda?

Anomenem els entrenadors A, B, C, D i E, i les seves estrelles, a, b, c, d i e. Anar i tornar compta com dues travessies. No s'hi valen trucs com cordes, nedar, aprofitar els corrents, etc.



Escriu cada travessia: qui va a la barca i cap a on. Hi caben tres persones, i cap estrella (minúscula) no pot estar amb un altre entrenador (majúscula) si el seu no hi és.

Travessia	A la barca	Cap a
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Espai per pensar-hi


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Alfils sense protecció

Bishops—Unguarded, Amusements in Mathematics (1917), núm. 297

Posa tan pocs alfils com puguis en un tauler d'escacs normal, de manera que totes les caselles del tauler quedin ocupades o atacades.

Fixa't que la torre té més abast que l'alfil: la posis on la posis, sempre ataca catorze caselles, mentre que l'alfil n'ataca set, nou, onze o tretze, segons la diagonal en què sigui. I convé dir ara que, quan parlem de «diagonals» en un tauler d'escacs, no ens referim només a les dues diagonals llargues, de racó a racó, sinó també a totes les línies més curtes paral·leles a aquestes. Per evitar malentesos més endavant, val la pena que el lector ho tingui ben present.



Dibuixa alfils (punts o creus) perquè totes les caselles quedin ocupades o atacades. Recorda que un alfil no ataca a través d'una altra peça. Quants en calen, com a mínim?


Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Alfils protegits

Bishops—Guarded, Amusements in Mathematics (1917), núm. 298

I ara, quants alfils calen perquè totes les caselles quedin ocupades o atacades, i que, a més, cada alfil estigui protegit per un altre alfil? I com s'han de posar?



Dibuixa alfils perquè totes les caselles quedin ocupades o atacades i cada alfil estigui protegit per un altre. Quants en calen, com a mínim?

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


Les vuit reines

The Eight Queens, Amusements in Mathematics (1917), núm. 300

La reina és, de molt, la peça més poderosa del tauler d'escacs. Si la poses en una de les quatre caselles del centre, ataca ni més ni menys que vint-i-set caselles; i si la vols amagar en un racó, encara n'ataca vint-i-una.

Es poden posar vuit reines al tauler de manera que cap no n'ataqui cap altra, i és un trencaclosques antic (el va proposar Nauck el 1850, i ja té tota una petita literatura) trobar de quantes maneres diferents es pot fer. A la figura en mostro una. En total n'hi ha dotze de fonamentalment diferents, que en donen noranta-dues si comptem com a diferents els girs i els reflexos. La de la figura és simètrica: si gires el llibre cap per avall, queda exactament igual. Per això les dotze no en donen noranta-sis, com passaria si cap no fos simètrica, sinó noranta-dues.

Sabries posar les vuit reines al tauler de manera que cap no n'ataqui cap altra i que no n'hi hagi mai tres en línia recta en cap direcció obliqua? Una altra ullada a la figura mostra que aquesta col·locació no compleix les condicions, perquè en les dues direccions marcades amb línies de punts hi ha tres reines en línia recta. Només una de les dotze maneres fonamentals resol el trencaclosques. Sabries trobar-la?



Busca una col·locació de vuit reines sense atacs i sense tres reines en línia en cap direcció. Dibuixa-la al tauler buit.

Espai per pensar-hi


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Peons sense tres en línia

A Puzzle with Pawns, Amusements in Mathematics (1917), núm. 317

Posa dos peons al mig del tauler d'escacs, l'un a d4 i l'altre a e5. Ara posa els catorze peons que queden (setze en total) de manera que no n'hi hagi mai tres en línia recta en cap direcció possible.

Fixa't que a propòsit no dic reines, perquè amb les paraules «en cap direcció possible» vaig més enllà dels atacs en diagonal. Els peons s'han de considerar simples punts de l'espai, als centres de les caselles. Mira les línies de punts del problema de «Les vuit reines».



Dibuixa els catorze peons que falten (setze amb els de d4 i e5): a cada fila i a cada columna n'hi ha d'haver dos, i mai tres en línia recta en cap direcció.

Espai per pensar-hi


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Els cavalls guardians

The Knight-Guards, Amusements in Mathematics (1917), núm. 319

El cavall és el pallasso del tauler d'escacs. «És un bergant imprevisible, sorneguer i desmoralitzador», diu un escriptor americà: salta per sobre de les altres peces, s'amaga en els llocs més segurs per espantar el rei i, quan menys t'ho esperes, es menja la reina. És difícil definir el seu moviment amb poques paraules, però un infant l'aprèn en pocs minuts mirant-lo: una casella com la torre i una altra com l'alfil, tot d'un sol salt.

A la figura he posat dotze cavalls (el mínim possible) de manera que cada casella del tauler està ocupada o atacada per un cavall. Comprova-ho casella per casella. Ara el trencaclosques és trobar quants cavalls calen, com a mínim, perquè cada casella estigui ocupada o atacada *i, a més, cada cavall estigui protegit per un altre cavall*. I com els posaries? Dels dotze de la figura, només quatre estan protegits: són a un salt de cavall d'un altre cavall.



Posa cavalls (punts o monedes) perquè totes les caselles quedin ocupades o atacades i cada cavall estigui protegit per un altre. Quants en calen, com a mínim?

Espai per pensar-hi


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Visitant les ciutats

Visiting the Towns, Amusements in Mathematics (1917), núm. 243

Un viatger que surt de la ciutat número 1 vol visitar totes les ciutats una vegada, i només una, anant sempre per les carreteres que marquen les línies rectes. Quantes rutes diferents pot triar?

És clar que ha d'acabar el viatge a la ciutat 1, d'on ha sortit, i que no ha de fer cas de les cruïlles: ha d'anar recte de ciutat a ciutat. És un trencaclosques absurdament fàcil, si t'hi poses de la manera adequada.



Dibuixa la ruta sobre el mapa: surt de l'1, passa una sola vegada per cada ciutat i torna a l'1. Quantes rutes hi ha?

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


L’inspector del metro

The Tube Inspector’s Puzzle, Amusements in Mathematics (1917), núm. 242

L’home de la il·lustració té un petit dilema. L’acaben de nomenar inspector d’una xarxa de metro, i la seva feina és revisar regularment, dins d’un termini fixat, les disset línies de la companyia, que uneixen dotze estacions, tal com es veu al gran plànol que està mirant. Vol organitzar la ruta de manera que passi per totes les línies viatjant tan poc com pugui. Pot començar on vulgui i acabar on vulgui. Quina és la ruta més curta?

Sembla ben senzill, oi? Però de seguida veuràs que, ho facis com ho facis, l’inspector ha de passar per algunes línies més d’una vegada. Dit d’una altra manera: si les estacions són a una milla l’una de l’altra, haurà de viatjar més de disset milles per revisar totes les línies. Aquí hi ha la dificultat. Quant ha de viatjar, com a mínim, i quina ruta li recomanaries?

Unitats: 1 milla ≈ 1,6 km.



Dibuixa la ruta sobre el plànol i escriu-la amb les lletres de les estacions. Quantes milles fa, com a mínim?

Ruta:

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Inspeccionant una mina


Inspecting a Mine, Amusements in Mathematics (1917), núm. 247

El diagrama representa els passadissos o galeries d'una mina. Suposarem que cada galeria (de la A a la B, de la B a la C, de la C a la H, de la H a la I, etc.) fa un furlong de llargada. Es pot veure que n'hi ha trenta-una.

Un inspector les ha de revisar totes, i baixa pel pou fins al punt A. Quant ha de caminar, i quina ruta li recomanes? Potser de primer diràs: «Com que hi ha trenta-una galeries d'un furlong, haurà de caminar exactament trenta-un furlongs». Però això és suposar que no haurà de passar mai dues vegades per la mateixa galeria, i no és així.

Agafa un llapis i intenta trobar la ruta més curta. Aviat descobriràs que cal pensar-hi bé. De fet, és un trencaclosques desconcertant.

Unitats: 1 furlong ≈ 201 metres.



Dibuixa la ruta sobre el plànol, sortint de la A, i escriu-la amb les lletres de les cruïlles. Quants furlongs fa, com a mínim?

Ruta:


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

El trencaclosques del mariner

The Sailor's Puzzle, Amusements in Mathematics (1917), núm. 249

El mariner de la il·lustració explica que, des que era petit, s'ha dedicat a comerciar amb una embarcació petita per una vintena d'illetes del Pacífic. Ens ha donat el mapa aproximat que reproduïm aquí, i ens ha explicat que les línies d'illa a illa són les úniques rutes que ha fet servir mai. Sempre sortia de l'illa A al començament de la temporada, visitava totes les illes una vegada, i només una, i acabava la volta a la A, d'on havia sortit. Però sempre deixava la visita a la C per al més tard possible, per raons comercials que no cal explicar. El trencaclosques és descobrir la seva ruta exacta, i es pot trobar amb tota seguretat.

Agafa un llapis i, sortint de la A, intenta seguir-la. Si escrius les illes en l'ordre en què les visites (per exemple, A, I, O, L, G, etc.), veuràs de seguida si n'has visitat alguna dues vegades o si te n'has deixat alguna. És clar que no s'ha de fer cas dels encreuaments de les línies: has de continuar recte per la teva ruta, i no et pots desviar en un encreuament per anar en una altra direcció. En aquest trencaclosques no hi ha cap truc d'aquesta mena. El mariner coneixia la millor ruta. La sabries trobar?



Dibuixa la ruta sobre el mapa, sortint de la A, i escriu-la amb les lletres de les illes. Recorda que el mariner deixa la C per al més tard possible.

Ruta:


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

La volta de la torre

The Rook's Tour, Amusements in Mathematics (1917), núm. 320

El trencaclosques consisteix a moure la torre, que està sola, per tot el tauler, de manera que visiti cada casella una vegada, i només una, i acabi el recorregut a la casella d'on ha sortit. Ho has de fer amb el mínim de jugades possible i, si no vas amb molt de compte, en faràs just una de més.

És clar que una casella es considera «visitada» tant si la torre només hi passa per sobre com si s'hi atura, i no discutirem si la casella de sortida es visita dues vegades: suposarem que no.



Dibuixa el recorregut de la torre, sortint de d5: cada jugada és una línia recta per una fila o una columna, i cap casella no es pot repetir. Quantes jugades calen, com a mínim?

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


La mosca a l'octàedre

The Fly on the Octahedron, Amusements in Mathematics (1917), núm. 245

—Mira —va dir el professor al seu col·lega—, fa estona que observo aquella mosca de l'octàedre, i només camina per les arestes. Per què deu evitar les cares?

—Potser intenta resoldre algun problema de recorreguts —va suggerir l'altre—. Si surt del vèrtex de dalt, per quantes rutes diferents pot passar per totes les arestes sense recórrer mai dues vegades la mateixa aresta en una mateixa ruta?

El problema va resultar més difícil del que es pensaven i, després de dedicar-hi les estones lliures durant uns quants dies, els seus resultats no coincidien; de fet, tots dos s'equivocaven. Si el lector se sorprèn del seu fracàs, que provi de resoldre ell mateix aquest petit trencaclosques. Només explicaré que l'octàedre és un dels cinc cossos regulars, o platònics, i que està format per vuit triangles equilàters iguals. Si retalles dues peces de cartolina com les que es veuen al marge de la il·lustració, les ratlles seguint les línies de punts, les plegues i les ajuntes, tindràs un octàedre perfecte. En qualsevol ruta per totes les arestes, veuràs que la mosca ha d'acabar al punt de sortida, el de dalt.



Dibuixa una ruta per les dotze arestes, sortint de la A i sense repetir-ne cap. Quantes rutes diferents hi ha?

Ruta:


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

El vuit rebel

The Troublesome Eight, Amusements in Mathematics (1917), núm. 399

Gairebé tothom sap que un *quadrat màgic* és una disposició de nombres en forma de quadrat de manera que totes les files, totes les columnes i les dues diagonals llargues sumen el mateix. Per exemple, et costaria poc posar un nombre diferent a cadascuna de les nou caselles de la figura de manera que les files, les columnes i les diagonals sumin 15. I, al primer intent, segurament et trobaries amb un 8 en un dels racons.

El trencaclosques és fer el quadrat màgic, amb les mateixes condicions, però amb el 8 al lloc que indica la figura.



Escriu nou nombres diferents perquè totes les files, columnes i diagonals sumin 15, amb el 8 al lloc on és.

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


El quadrat de Bachet

Bachet's Square, Amusements in Mathematics (1917), núm. 304

Un dels trencaclosques de cartes més antics és de Claude-Gaspard Bachet de Méziriac, i crec que es va publicar per primera vegada a l'edició de 1624 de la seva obra. Col·loca les setze figures de la baralla (comptant-hi els asos) en un quadrat de manera que en cap fila de quatre cartes, ni horitzontal, ni vertical, ni diagonal, hi hagi dues cartes del mateix pal ni del mateix valor.

Això ja és prou fàcil, però una part del trencaclosques és trobar de quantes maneres diferents es pot fer. L'eminent matemàtic francès A. Labosne, a la seva edició moderna de Bachet, hi dona una resposta equivocada. I tanmateix el trencaclosques és força fàcil. Cada disposició en dona set més girant el quadrat i reflectint-lo en un mirall, i Bachet les compta com a diferents.

Fixa't que diu «fila de quatre cartes»: les úniques diagonals que cal tenir en compte són les dues llargues.



Escriu les setze cartes al quadrat (A, K, Q, J i ♦ ♠ ♥ ♣): cap fila, columna ni diagonal llarga pot repetir pal ni valor. De quantes maneres es pot fer?

Espai per pensar-hi


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Les divuit fitxes de dòmino

The Eighteen Dominoes, Amusements in Mathematics (1917), núm. 406

La il·lustració mostra divuit fitxes de dòmino col·locades en forma de quadrat, de manera que els punts de cadascuna de les sis columnes, de les sis files i de les dues diagonals llargues sumen 13. És la suma més petita possible amb qualsevol tria de fitxes d'una capsa normal de vint-i-vuit.

La suma més gran possible és 23, i se'n pot trobar fàcilment una solució canviant cada nombre pel que li falta per arribar a 6: cada blanc per un 6, cada 1 per un 5, cada 2 per un 4, el 3 per un 3, el 4 per un 2, el 5 per un 1 i el 6 per un blanc. Però el trencaclosques consisteix a triar divuit fitxes i col·locar-les (exactament en la forma de la il·lustració) de manera que les sumes siguin 18 en totes catorze direccions.



Fes-ho amb un dòmino de veritat: tria divuit fitxes i posa-les de peu, com a la il·lustració, perquè totes les files, les columnes i les dues diagonals sumin 18.

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


Les cistelles de prunes

The Baskets of Plums, Amusements in Mathematics (1917), núm. 409

Aquesta és la forma en què vaig presentar per primera vegada la qüestió dels quadrats màgics amb nombres primers. Avisaré el lector que hi ha un petit parany.

Un fruiter tenia nou cistelles. A cada cistella hi havia prunes (totes sanes i madures), i el nombre de prunes de cada cistella era diferent. Posades com a la il·lustració, en tres files de tres, formaven un quadrat màgic: si agafava tres cistelles qualssevol en línia, en qualsevol de les vuit direccions possibles, sempre hi havia el mateix nombre de prunes. Aquesta part del trencaclosques és prou fàcil d'entendre. Però el que ve ara sembla una mica estrany a primera vista.

El fruiter va dir a un dels seus homes que repartís el contingut de la cistella que volgués entre uns quants nens, donant prunes a cada nen de manera que tots en rebessin el mateix nombre. Però l'home va veure que era del tot impossible, triés la cistella que triés i hi fes venir tants nens com volgués. Digues quantes prunes hi havia a cada cistella perquè passés això.



Escriu nou nombres diferents al quadrat perquè totes les files, columnes i diagonals sumin el mateix, i cap no es pugui repartir a parts iguals entre uns quants nens (cap divisor que no sigui 1 o ell mateix). Compte amb el parany!


Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Un quadrat màgic de compostos

A Magic Square of Composites, Amusements in Mathematics (1917), núm. 411

Com que acabem de parlar de com es construeixen quadrats màgics amb nombres primers, el problema següent n'és un bon company. Fes un quadrat màgic amb nou nombres compostos consecutius: els més petits possible.



Escriu nou nombres compostos consecutius (sense cap primer al mig), els més petits possible, en un quadrat màgic de 3 × 3.


Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Un quadrat màgic reversible

A Reversible Magic Square, The Canterbury Puzzles (1907), núm. 102

Sabries construir un quadrat de setze nombres diferents que sigui màgic (és a dir, que les quatre files, les quatre columnes i les dues diagonals sumin el mateix) tant si gires el dibuix cap per avall com si no? No pots fer servir el 3, el 4 ni el 5, perquè aquestes xifres no es poden girar; però un 6 es converteix en un 9 quan es gira, un 9 en un 6, un 7 en un 2 i un 2 en un 7. L'1, el 8 i el 0 es llegeixen igual de les dues maneres. Recorda que la constant no ha de canviar quan es gira.



Escriu setze nombres diferents (sense les xifres 3, 4 i 5) en un quadrat màgic de 4 × 4 que continuï sent màgic quan gires el full cap per avall. El 6 i el 9 s'intercanvien, i el 7 i el 2 també.

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


El número estripat

The Torn Number, Amusements in Mathematics (1917), núm. 113

L'altre dia tenia una etiqueta amb el número 3025 escrit en xifres grosses. Sense voler, es va estripar pel mig, de manera que el 30 va quedar en un tros i el 25 en l'altre, com es veu a la figura.

Mirant els dos trossos, vaig començar a fer càlculs gairebé sense adonar-me'n, i vaig descobrir una petita curiositat: si sumem el 30 i el 25 i elevem la suma al quadrat, obtenim el número complet de l'etiqueta! És a dir, 30 més 25 fan 55, i 55 per 55 fan 3025. Curiós, oi?

Ara el trencaclosques és trobar un altre número de quatre xifres, totes diferents, que es pugui partir pel mig i doni el mateix resultat.



Busca un altre número de quatre xifres diferents que faci (primera meitat + segona meitat)² = el número.

El número:

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

L'amulet

The Amulet, The Canterbury Puzzles (1907), núm. 38

Un dia van trobar un home estrany que rondava pel pati del castell i, com que parlava amb accent estranger, els servents van sospitar que era un espia. El van portar davant de Sir Hugh, que no en va poder treure res. Va manar que se l'emportessin i l'escorcollessin, per veure si duia amagada alguna carta secreta. Tot el que li van trobar va ser un tros de pergamí ben lligat al coll, amb aquesta inscripció misteriosa:


Avui sabem que Abracadabra era el déu suprem dels assiris, i aquesta curiosa disposició de les lletres de la paraula es duia sovint a Europa com a amulet o talismà contra les malalties. Però Sir Hugh no n'havia sentit mai a parlar i, com que s'ho prenia força seriosament, va fer venir un sacerdot savi.

—Us ho prego, senyor clergue —li va dir—, expliqueu-me el veritable significat d'aquest escrit tan estrany.

—Sir Hugh —va respondre el sant home, després de parlar amb el foraster en una llengua estrangera—, no és més que un amulet que aquest pobre home porta al pit per protegir-se de les febres, del mal de queixal i d'altres mals del cos.

—Doncs doneu-li menjar i roba, i que continuï el seu camí —va dir Sir Hugh—. Mentrestant, senyor clergue, em sabríeu dir de quantes maneres es pot llegir la paraula «Abracadabra» en aquest amulet, començant sempre per la A de dalt de tot?

Posa el llapis a la A de dalt i compta de quantes maneres diferents pots seguir la paraula cap avall, passant sempre d'una lletra a una que hi estigui tocant.



Compta de quantes maneres es pot llegir ABRACADABRA, sortint de la A de dalt i baixant cada vegada a una de les dues lletres que hi ha a sota.


Resposta:

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Comptant els rectangles

Counting the Rectangles, Amusements in Mathematics (1917), núm. 347

Sabries dir exactament quants quadrats i altres rectangles hi ha en un tauler d'escacs? Dit d'una altra manera: de quantes maneres diferents es pot marcar un quadrat o un altre rectangle tancat per les línies que separen les caselles del tauler?



Compta quants rectangles (quadrats inclosos) té el tauler d'escacs, i quants d'aquests rectangles són quadrats.

Respostes:


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

El problema del cent

The Century Puzzle, Amusements in Mathematics (1917), núm. 90

Sabries escriure 100 en forma de nombre mixt fent servir les nou xifres una vegada, i només una? El distingit matemàtic francès Édouard Lucas, ja traspassat, va trobar set maneres diferents de fer-ho, i dubtava que n'hi hagués cap més. De fet, n'hi ha exactament onze, i cap més. Aquí en tens una: 91 5742/638.

Nou de les altres maneres també tenen dues xifres a la part entera, però l'onzena només en té una. Sabries trobar aquesta última?



Escriu 100 com a nombre mixt (un enter més una fracció) amb les nou xifres de l'1 al 9, una vegada cadascuna, amb una sola xifra a la part entera. Exemple, amb dues: 91 + 5742/638.

Les teves maneres:


Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Multiplicació amb les nou xifres

Digital Multiplication, Amusements in Mathematics (1917), núm. 83

Aquí tens un altre problema entretingut amb les nou xifres, sense el zero. Fent servir cada xifra una vegada, i només una, podem escriure dues multiplicacions que donin el mateix producte, i això es pot fer de moltes maneres. Per exemple, 7 × 658 i 14 × 329 contenen totes les xifres una vegada, i en tots dos casos el producte és el mateix: 4606.

Es veurà que la suma de les xifres del producte és 16, que no és ni la més alta ni la més baixa que es pot obtenir. Sabries trobar la solució que dona la suma de xifres més petita al producte comú? I la que dona la suma més gran?



Escriu dues multiplicacions amb el mateix producte fent servir les nou xifres una vegada cadascuna, com 7 × 658 = 14 × 329 = 4606. Busca el producte amb la suma de xifres més petita i el de la suma més gran.

Producte més petit i més gran:

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net

Els cinc bandolers

The Five Brigands, Amusements in Mathematics (1917), núm. 133

Els cinc bandolers espanyols Alfonso, Benito, Carlos, Diego i Esteban comptaven el botí després d'un assalt, i van veure que entre tots havien aconseguit exactament 200 doblons. Un de la colla va fer notar que, si l'Alfonso en tingués dotze vegades més, el Benito tres vegades més, el Carlos els mateixos, el Diego la meitat i l'Esteban un terç, encara tindrien entre tots exactament 200 doblons. Quants doblons tenia cadascun?

Hi ha força respostes igualment correctes. Aquí en tens una:

A	6	× 12	= 72
B	12	× 3	= 36
C	17	× 1	= 17
D	120	× ½	= 60
E	45	× ⅓	= 15
	200		200

El trencaclosques és descobrir exactament quantes respostes diferents hi ha, entenent que cada home tenia alguna cosa i que no hi ha monedes partides: només doblons sencers. Aquest problema, amb un enunciat una mica diferent, el va proposar Tartaglia (que va morir el 1559), que es vantava d'haver-ne trobat una solució. Però un matemàtic francès notable, M. A. Labosne, en una obra recent, diu que els seus lectors quedaran astorats quan els asseguri que hi ha 6639 respostes correctes diferents. És així? Quantes respostes hi ha?

Unitats: El dobló era una moneda d'or espanyola.

A	6	× 12	72
B	12	× 3	36
C	17	× 1	17
D	120	× ½	60
E	45	× ⅓	15
	200		**200**

Busca quants repartiments de 200 doblons entre els cinc bandolers (tots en tenen almenys un) fan encara 200 amb A × 12, B × 3, C × 1, D × ½ i E × ⅓, sense mitjos doblons. Fes-ho per casos.

Resposta:

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d'obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net


L’aranya i la mosca

The Spider and the Fly, The Canterbury Puzzles (1907), núm. 75

Dins d’una sala rectangular de 30 peus de llarg i 12 peus d’ample i d’alt hi ha una aranya en una de les parets dels extrems, al mig, a 1 peu del sostre, com a A; i una mosca a la paret de l’altre extrem, al centre, a 1 peu del terra, com a B.

Quina és la distància més curta que ha de recórrer l’aranya per arribar fins a la mosca, que no es mou? És clar que l’aranya no es deixa caure ni fa servir la teranyina: camina com cal.

Unitats: 1 peu ≈ 30,5 cm: la sala fa uns 9 m de llarg i 3,7 m d’ample i d’alt.



Dibuixa la sala desplegada com una capsa de cartró i traça-hi el camí recte de l’aranya. Quin és el camí més curt?

Espai per pensar-hi

Problemes de Henry E. Dudeney (1857–1930), d’obres de domini públic: The Canterbury Puzzles (1907) i Amusements in Mathematics (1917).
Traducció, adaptació i figures: David Arso Civil (CC BY-NC-SA 4.0). dudeney.step-quiz.net