

Activitat 3 — Mesurar l'atzar

Calcular probabilitats amb la regla de Laplace, operar amb successos (unió, intersecció, contrari) amb diagrames de Venn, i connectar la freqüència relativa amb la probabilitat (lleis dels grans nombres).

Idea clau

Ja saps comptar possibilitats. Ara aprendràs a **mesurar** quina possibilitat té de passar cada cosa: la **probabilitat**, un número entre 0 (impossible) i 1 (segur). Amb la regla de Laplace la calcularàs comptant casos; amb l'experimentació, veuràs que la teoria i la realitat s'acosten quan repeteixes molt.

La regla de Laplace

Regla de Laplace

Si tots els resultats són **igualment probables**, la probabilitat d'un succés és

$$P(\text{succés}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos possibles}}.$$

Sempre $0 \leq P \leq 1$. El succés **contrari** compleix $P(\text{no } A) = 1 - P(A)$.

Exercici resolt 10.3.1 — Amb un dau

En llançar un dau, calcula $P(\text{parell})$ i $P(\text{no surt un 6})$.

Solució. Casos possibles: 6. Parells: $\{2, 4, 6\}$, 3 casos.

$$P(\text{parell}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

$$P(\text{no 6}) = 1 - P(6) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$


Resposta: $P(\text{parell}) = \frac{1}{2}$; $P(\text{no 6}) = \frac{5}{6}$.

Operacions amb successos: els diagrames de Venn

Unió, intersecció, contrari

- A i B (intersecció): passen tots dos alhora.
- A o B (unió): passa almenys un.
- **no** A (contrari): no passa A .

Per a la unió: $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ i } B)$ (es resta la part comptada dues vegades).



la zona central es compta un sol cop

Diagrama de Venn: la intersecció $A \cap B$ pertany als dos successos; per això a la unió es resta una vegada.

Freqüència relativa i llei dels grans nombres

Quan la realitat s'acosta a la teoria

La **freqüència relativa** d'un resultat és el nombre de vegades que surt dividit pel nombre de proves. La **llei dels grans nombres** diu que, com més proves fas, més s'acosta la freqüència relativa a la probabilitat teòrica. Llançant una moneda poques vegades pot sortir 70% de cares; llançant-la milers, s'acosta al 50%.

Exercicis per fer**10.3.1 Laplace amb dau.** Calcula:

- (a) $P(\text{surt un } 5)$
- (b) $P(\text{surt més de } 4)$
- (c) $P(\text{surt imparell})$

10.3.2 Laplace amb cartes (baralla de 52). Calcula:

- (a) $P(\text{cor})$
- (b) $P(\text{as})$
- (c) $P(\text{figura: J, Q o K})$

10.3.3 Contrari. En una bossa amb 10 boles (3 roges), calcula $P(\text{roja})$ i $P(\text{no roja})$, i comprova que sumen 1.**10.3.4 Unió (Venn).** En llançar un dau, sigui $A = \{\text{parell}\}$ i $B = \{\text{més de } 4\}$.

- (a) Escribeu els casos de A , de B i de A i B .
- (b) Calcula $P(A \text{ o } B)$ amb la fórmula de la unió.

10.3.5 Rang de la probabilitat. Digues si cada valor pot ser una probabilitat: 0,3; 1,2; 0; -0,5; 1.**10.3.6 Freqüència relativa.** S'ha llançat una xinxeta 200 vegades i ha caigut «cap amunt» 130 cops. Quina és la freqüència relativa? Serviria per *estimar* la probabilitat (que aquí no es pot calcular amb Laplace)?**10.3.7 Llei dels grans nombres.** En llançar una moneda 10 vegades han sortit 7 cares. Vol dir que la moneda està trucada? Què esperaríeu si la llancessis 10 000 vegades?**10.3.8 Troba l'error.** Un company diu que $P(\text{parell o més de } 4)$ amb un dau és $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. Quin cas ha comptat dues vegades? Quin és el valor correcte?**10.3.9 Repte N3+.** En una classe, 18 alumnes fan anglès, 12 fan francès i 5 fan totes dues. Si n'hi ha 25 en total, quants no fan cap idioma? (*Pista: dibuixa el Venn i fes servir la unió.*)**10.3.10 Per al Quadern d'eines.** Escribeu la regla de Laplace, la fórmula del contrari i de la unió, i què diu la llei dels grans nombres, amb un exemple de cada.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

10.3.1 (a) $\frac{1}{6}$. (b) $\{5, 6\}$: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. (c) $\{1, 3, 5\}$: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

10.3.2 (a) $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$. (b) $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$. (c) $\frac{12}{52} = \frac{3}{13}$.

10.3.3 $P(\text{roja}) = \frac{3}{10}$; $P(\text{no roja}) = \frac{7}{10}$; suma $\frac{3}{10} + \frac{7}{10} = 1$. ✓

10.3.4 (a) $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{5, 6\}$, $A \cap B = \{6\}$. (b) $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

10.3.5 Poden ser: 0,3, 0, 1. No poden: 1,2 (major que 1) ni -0,5 (negatiu).

10.3.6 Freqüència relativa = $\frac{130}{200} = 0,65$. Sí: quan no hi ha simetria (la xinxeta no és «justa»), la freqüència relativa de moltes proves *estima* la probabilitat.

10.3.7 No necessàriament: amb només 10 llançaments és normal desviar-se del 50%. Amb 10 000 llançaments, la proporció de cares s'acostaria molt a $\frac{1}{2}$ (lleis dels grans nombres).

10.3.8 Ha comptat el 6 dues vegades (és parell i més de 4). Cal restar $P(6) = \frac{1}{6}$: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

10.3.9 Fan almenys un idioma: $18 + 12 - 5 = 25$. Com que la classe té 25, no en queda cap sense idioma: 0 alumnes.

10.3.10 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Introdueix la probabilitat: Laplace, operacions amb successos (Venn) i la connexió freqüència $\rightarrow$ probabilitat (lleis dels grans nombres). Tres sessions; experimentació real amb daus, cartes i simuladors.
- **Laplace i les seves condicions (ex. 6).** Laplace exigeix casos *equiprobables*; quan no ho són (xinxeta), s'estima amb freqüència relativa. Distingir-ho és clau (criteri 1.1).
- **L'error rei (ex. 8).** A la unió, oblidar restar la intersecció fa comptar casos dues vegades; el Venn ho fa visible (criteri 4.1).
- **Rang 0–1 (ex. 5).** Que una probabilitat no pugui ser negativa ni major que 1 és un control de sentit permanent.
- **Llei dels grans nombres (ex. 7).** Desmunta la «fal·làcia del jugador» (creure que després de moltes cares «toca» creu); prepara el pensament crític de l'Activitat 5.
- **Venn amb dades (ex. 9).** Els problemes de conjunts (idiomes) donen sentit a la unió i la intersecció més enllà dels daus.
- **Quadern d'eines (ex. 10).** Laplace, contrari, unió i llei dels grans nombres formen el nucli de la probabilitat simple.