

Activitat 3 — La funció lineal $y = mx$: pendent i creixement

Calcular i interpretar el pendent com a ritme de canvi, i relacionar-ne el signe amb el creixement o decreixement.

Idea clau

La funció lineal $y = mx$ és la recta que passa per l'origen. Tot el seu caràcter el dona el **pendent** m : diu com de ràpid canvia la y quan avança la x , i el seu **signe** diu si la recta puja o baixa.

El pendent com a ritme de canvi

Quant puja per cada pas

El **pendent** m és el que augmenta la y cada cop que la x augmenta en 1. Entre dos punts (x_1, y_1) i (x_2, y_2) de la recta:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{variació de } y}{\text{variació de } x}$$

Exemple 6.3.1 — Calcular el pendent

Una recta passa per $(1, 2)$ i $(3, 6)$. El pendent és

$$m = \frac{6 - 2}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2.$$


Cada cop que x avança 1, la y puja 2.

El signe del pendent

Puja, baixa o es queda plana

- $m > 0$: la funció és **creixent** (la recta puja d'esquerra a dreta).
- $m < 0$: la funció és **decreixent** (la recta baixa).
- $m = 0$: la funció és **constant** (recta horitzontal).

Com més gran és $|m|$, més *inclinada* és la recta.



Pendent positiu: la recta puja. Pendent negatiu: la recta baixa. Totes dues passen per l'origen.

Exercicis per fer

6.3.1 Calcula el pendent entre els dos punts:

- $(0, 0)$ i $(2, 8)$
- $(1, 3)$ i $(4, 12)$

(c) $(0, 0)$ i $(2, -6)$

6.3.2 Taula i pendent. Per a $y = 4x$, fes una taula amb $x = 0, 1, 2, 3$ i comprova que la y puja 4 a cada pas.

6.3.3 Creixent o decreixent? Sense dibuixar, digues si cada funció és creixent, decreixent o constant:

(a) $y = 5x$ (b) $y = -2x$ (c) $y = 0,5x$

6.3.4 La més inclinada. De les rectes $y = x$, $y = 3x$ i $y = -4x$, quina és la més inclinada? Com ho saps sense dibuixar?

6.3.5 De la gràfica al pendent. Una recta que passa per l'origen també passa per $(3, 9)$. Escribeu la seva fórmula.

6.3.6 Context. Un cotxe va a velocitat constant i recorre 80 km en 1 hora. Escribeu la funció «distància segons el temps» i digues què representa el pendent.

6.3.7 Troba l'error. Un alumne calcula el pendent entre $(1, 2)$ i $(3, 6)$ així: $m = \frac{3-1}{6-2} = \frac{2}{4} = 0,5$. On és l'error? Quin és el pendent correcte?

6.3.8 Rutina d'estimació. Una recta $y = mx$ passa gairebé plana però puja lleugerament. El seu pendent, és més gran o més petit que 1? I si fos molt inclinada cap amunt?

6.3.9 Per al Quadern d'eines. Anota la fórmula del pendent (variació de y entre variació de x), la relació entre el signe de m i el creixement, i que $|m|$ gran vol dir recta molt inclinada.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

6.3.1 (a) $\frac{8}{2} = 4$. (b) $\frac{12-3}{4-1} = \frac{9}{3} = 3$. (c) $\frac{-6}{2} = -3$.

6.3.2 $x = 0 \rightarrow 0$, $1 \rightarrow 4$, $2 \rightarrow 8$, $3 \rightarrow 12$: puja 4 a cada pas ($m = 4$).

6.3.3 (a) creixent. (b) decreixent. (c) creixent.

6.3.4 La més inclinada és $y = -4x$: el que compta és $|m|$, i $|-4| = 4$ és el més gran.

6.3.5 $m = \frac{9}{3} = 3$, així que $y = 3x$.

6.3.6 $y = 80x$ (amb x en hores). El pendent, 80, és la **velocitat**: els km que recorre cada hora.

6.3.7 Error. Ha posat la variació de x a dalt i la de y a baix, invertides. El correcte és $m = \frac{6-2}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$.

6.3.8 Poc inclinada cap amunt $\rightarrow m$ entre 0 i 1. Molt inclinada cap amunt $\rightarrow m$ gran (més gran que 1).

6.3.9 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **El pendent com a ritme de canvi.** Insistiu en la lectura *contextual* (velocitat, preu per unitat), no només en el càlcul. L'exercici 6 connecta el pendent amb una magnitud real, que és l'objectiu competencial.
- **L'error de la fórmula invertida (ex. 7)** és molt freqüent; és un ítem **N3**. Un truc: sempre «variació de y a dalt».
- **Signe i inclinació (ex. 3, 4).** Distingir el *signe* (puja o baixa) del *valor absolut* (com d'inclinada) és clau i sovint es confon; el gràfic doble ho fa visible.
- **Continuïtat amb 2n.** Aquesta activitat reprèn la $y = mx$ de 2n i hi afegeix la lectura sistemàtica del pendent; la funció afí (amb n) arriba a l'Activitat 4.
- **DUA.** Els lliscadors de Desmos/GeoGebra permeten veure com canvia la inclinació en moure m ; reserveu-los sobretot per a l'Activitat 4, on s'afegeix n .