

## Activitat 5 — Interpretar i decidir

Llegir què diuen les solucions d'una equació en el context real i decidir quines valen i quines cal descartar.

### Idea clau

Una equació de 2n grau sovint dona **dues solucions**, però en un problema real **no totes tenen sentit**. Una longitud no pot ser negativa; un temps abans de començar no compta; un nombre de persones ha de ser sencer i positiu. **Resoldre no és el final: cal interpretar i decidir**. Aquesta és la marca de Matemàtiques A.

#### Preguntes per decidir si una solució val

- És una **longitud, àrea o distància**? → ha de ser positiva.
- És un **temps**? → ha de ser  $\geq 0$  (i dins del que dura el fenomen).
- És un **nombre de coses** (persones, objectes)? → ha de ser sencer i positiu.
- **Comprova** sempre la solució vàlida substituint-la a l'enunciat.

### Descartar amb criteri

#### Exercici resolt 5.5.1 — L'hort, ara sí, interpretat

Recordem l'hort:  $x^2 + 5x - 24 = 0$  donava  $x = 3$  o  $x = -8$ . Quina és la resposta al problema?

**Solució.**  $x$  és el costat curt de l'hort, una **longitud**. La solució  $x = -8$  es **descarta**: no existeix un costat de  $-8$  m. La solució vàlida és  $x = 3$  m, i el costat llarg és 8 m.

**Resposta:** L'hort fa  $3 \times 8$  m. La solució  $x = -8$  es descarta per ser una longitud negativa.

#### Exemple 5.5.1 — Quan totes dues valen

En un tir,  $-5t^2 + 20t = 15$  donava  $t = 1$  i  $t = 3$ . Aquí **totes dues valen**: la pilota passa per 15 m dos cops, un pujant ( $t = 1$  s) i un baixant ( $t = 3$  s). El context decideix, no una regla fixa.

### La rutina de comprovació

Substituir la solució a l'equació original és la manera segura de saber si l'has resolt bé. Val la pena fer-ho sempre: t'estalvia donar per bo un error.

#### Exercicis per fer

**5.5.1 Escalfem el cap.** Per a cada solució, digues si pot ser un *costat* d'una figura: (a)  $x = 5$ ; (b)  $x = -3$ ; (c)  $x = 0$ ; (d)  $x = 2,5$ .

**5.5.2 Descarta.** Un rectangle d'àrea 40 amb el llarg 3 més que l'ample dona  $x^2 + 3x - 40 = 0$ , amb solucions  $x = 5$  i  $x = -8$ . Quina és l'ample? Per què l'altra no val?

**5.5.3 Totes dues?** Un tir compleix  $-5t^2 + 20t = 15$  amb  $t = 1$  i  $t = 3$ . Explica què vol dir cada solució en el context.

**5.5.4 Comprova.** Per a  $x^2 - 5x + 6 = 0$  ( $x = 2$  o  $x = 3$ ), comprova les dues substituint-les.

- 5.5.5 Caça l'error.** Per al problema de l'hort, un company respon «els costats són 3 i  $-8$ ». Per què la resposta és incompleta o incorrecta?
- 5.5.6 Interpreta un tir.** Una pilota segueix  $h = -5t^2 + 30t$ . Troba quan toca terra i explica per què descartes (o no) cada solució.
- 5.5.7 Decideix.** En un problema surten les solucions  $x = 4,5$  i  $x = -2$  per al *nombre d'autobusos* necessaris. Cap de les dues serveix tal qual: per què? Què faries?
- 5.5.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta les preguntes per decidir si una solució val i la rutina de comprovació.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

- 5.5.1** (a) sí; (b) no (negatiu); (c) no (un costat 0 no forma figura); (d) sí.
- 5.5.2** Ample  $x = 5$  m (llarg 8 m).  $x = -8$  es descarta: una longitud no pot ser negativa.
- 5.5.3** La pilota passa per 15 m dues vegades: a  $t = 1$  s mentre puja i a  $t = 3$  s mentre baixa. Les dues solucions són vàlides.
- 5.5.4**  $x = 2$ :  $4 - 10 + 6 = 0$  ✓.  $x = 3$ :  $9 - 15 + 6 = 0$  ✓.
- 5.5.5** Perquè  $-8$  no és un costat possible: cal **descartar-la** i donar només 3 i 8 com a dimensions. Donar  $-8$  com a resposta és no haver interpretat.
- 5.5.6**  $-5t^2 + 30t = 0 \Rightarrow -5t(t - 6) = 0 \Rightarrow t = 0$  o  $t = 6$ .  $t = 0$  és la sortida; toca terra a  $t = 6$  s. Segons el context, es dona  $t = 6$  s (o totes dues, indicant què és cada una).
- 5.5.7** El nombre d'autobusos ha de ser **sencer i positiu**:  $-2$  es descarta (negatiu) i  $4,5$  no és sencer. Caldria arrodonir *amunt* a 5 autobusos (perquè 4 no bastarien), tornant al context del problema.
- 5.5.8** Resposta oberta (Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** La **interpretació** de solucions és el cor de la marca A i el que més sovint es descuida. Es treballa explícitament descartar amb criteri i la **rutina de comprovació**.
- **Criteris. 2.1** (justificar quina solució val) com a criteri protagonista; també **1.1**.
- **Error rei (ex. 5).** Donar solucions «que no valen» sense interpretar-les (la longitud negativa és l'exemple canònic). Es reprèn al producte final.
- **No hi ha regla fixa (ex. 3, 6).** De vegades una solució es descarta, de vegades totes dues valen: *el context decideix*. Evitar la regla mecànica «la negativa fora sempre».
- **Ex. 7 (arrodonir amunt).** Connecta amb la Unitat 1 (precisió i unitats indivisibles) i mostra que interpretar pot voler dir ajustar el resultat al context, no només triar-ne un.
- **Benestar.** Normalitzar que «surtin solucions que no valen» treu pressió: no és un error, és part del procés.