

Activitat 3 — La fórmula general i el discriminant

Deduir la fórmula general de l'equació de 2n grau completant el quadrat, i fer servir el discriminant per anticipar quantes solucions tindrà abans de resoldre-la.

Idea clau

Els mètodes ràpids no sempre funcionen. Necessitem una eina que resolgui *qualsevol* equació de 2n grau: la **fórmula general**. Però aquí no te la donarem perquè la memoritzis: la **deduirem** des de zero. I descobrirem que, dins la fórmula, hi ha un número —el **discriminant**— que ens diu quantes solucions hi haurà *abans* de calcular-les. Aquesta és la marca de la via Acadèmiques.

La fórmula, deduïda

Partim de $ax^2 + bx + c = 0$ i la transformem fins a aïllar x , completant el quadrat (la mateixa idea de les identitats notables de la Unitat 3).

Deducció (completar el quadrat)

Dividim per a i passem el terme independent:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}.$$

Sumem als dos costats el que falta per formar un quadrat perfecte, $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}.$$

L'esquerra és un quadrat perfecte; la dreta, amb denominador comú:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

Arrelem (amb el $\pm$!) i aïllem x :

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El discriminant: la solució abans de resoldre

El número sota l'arrel, $b^2 - 4ac$, decideix tot. L'anomenem **discriminant**, Δ (delta).

Què diu $\Delta = b^2 - 4ac$

- $\Delta > 0$: l'arrel existeix i el $\pm$ dona **dues** solucions reals diferents.
- $\Delta = 0$: l'arrel és 0, i el $\pm$ no separa res: **una** solució (doble).
- $\Delta < 0$: no hi ha arrel real d'un negatiu: **cap** solució real.

Amb un sol càlcul —el de Δ — saps quantes solucions tindràs sense resoldre l'equació.

Exercici resolt 4.3.1 — Fórmula general pas a pas

Resol $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Solució. Aquí $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. Discriminant:

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0 \Rightarrow \text{dues solucions.}$$

Fórmula:

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow x = 3 \text{ o } x = 2.$$

Resposta: $x = 2$ i $x = 3$.

Exercici resolt 4.3.2 — Quan Δ avisa

Quantes solucions té $x^2 + 2x + 5 = 0$?

Solució. $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 = -16 < 0$. Com que és negatiu, **no hi ha solucions reals**: no cal ni aplicar la fórmula.

Resposta: Cap solució real ($\Delta < 0$).

Exercicis per fer

4.3.1 Només el discriminant. Calcula Δ i digues quantes solucions té *sense resoldre*:

- (a) $x^2 - 4x + 4 = 0$
- (b) $x^2 - x - 6 = 0$
- (c) $x^2 + 3x + 5 = 0$
- (d) $x^2 - 9 = 0$

4.3.2 Resol amb la fórmula. Aplica la fórmula general:

- (a) $x^2 - 5x + 6 = 0$
- (b) $2x^2 - 7x + 3 = 0$
- (c) $x^2 - x - 6 = 0$
- (d) $3x^2 - 2x - 1 = 0$

4.3.3 Cas $\Delta = 0$. Resol i comprova que hi ha una única solució:

- (a) $x^2 - 4x + 4 = 0$
- (b) $x^2 + 6x + 9 = 0$

4.3.4 Tria el mètode. Per a cada equació digues si la resoldries amb un mètode ràpid o amb la fórmula, i resol-la:

- (a) $x^2 = 16$
- (b) $x^2 - 3x = 0$
- (c) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

4.3.5 Anticipa i comprova. Per a $x^2 - 6x + 9 = 0$: primer digues, amb Δ , quantes solucions esperes; després resol i comprova que tenies raó.

4.3.6 Reconstrueix la deducció. Sense copiar, explica amb les teves paraules els passos per arribar de $ax^2 + bx + c = 0$ a la fórmula general. Quin moment fa aparèixer el $\pm$?

4.3.7 Troba l'error. Un company resol $x^2 - 5x + 6 = 0$ i escriu $x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2}$, i dona només $x = 3$. Què s'ha deixat?

4.3.8 Dissenya-la. Escriptu una equació de 2n grau que tingui:

(a) exactament una solució (doble);

(b) cap solució real.

(Pista: controla el signe de Δ .)

4.3.9 Repte N3+. Per a $x^2 - 5x + 6 = 0$, comprova que la suma de les dues solucions és 5 i el seu producte és 6. Ho relaciones amb els coeficients b i c ? (*És una curiositat coneguda com a relacions de Cardano-Vieta.*)

4.3.10 Per al Quadern d'eines. Escriptu la fórmula general emmarcada, la definició de $\Delta = b^2 - 4ac$ i la taula dels tres casos ($\Delta > 0$, $= 0$, < 0) amb el nombre de solucions.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 4.3.1** (a) $\Delta = 16 - 16 = 0$: una. (b) $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$: dues. (c) $\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$: cap. (d) $\Delta = 0 + 36 = 36 > 0$: dues.
- 4.3.2** (a) $x = 2, 3$. (b) $x = 3, \frac{1}{2}$. (c) $x = 3, -2$. (d) $x = 1, -\frac{1}{3}$.
- 4.3.3** (a) $(x - 2)^2 = 0 \Rightarrow x = 2$ (doble). (b) $(x + 3)^2 = 0 \Rightarrow x = -3$ (doble).
- 4.3.4** (a) ràpid (arrel): $x = \pm 4$. (b) ràpid (factor comú): $x = 0, 3$. (c) fórmula: $x = 3, \frac{1}{2}$.
- 4.3.5** $\Delta = 36 - 36 = 0$: s'espera una solució. Resolent: $(x - 3)^2 = 0 \Rightarrow x = 3$ (doble). Coincideix. ✓
- 4.3.6** Resposta oberta. Passos esperats: dividir per a ; passar c/a ; sumar $(b/2a)^2$ per completar el quadrat; escriure l'esquerra com un quadrat; arrelar amb $\pm$ (aquí apareix el $\pm$, en arrelar) i aïllar x .
- 4.3.7** S'ha deixat la segona solució: $\frac{5-1}{2} = 2$. El $\pm$ dona *dues* solucions, $x = 3$ i $x = 2$.
- 4.3.8** (a) qualsevol amb $\Delta = 0$, p.ex. $x^2 - 6x + 9 = 0$ (sol. doble $x = 3$). (b) qualsevol amb $\Delta < 0$, p.ex. $x^2 + 1 = 0$ ($\Delta = -4$). (S'accepten altres exemples correctes.)
- 4.3.9** Solucions 2 i 3: suma $2 + 3 = 5 = -b$; producte $2 \cdot 3 = 6 = c$ (amb $a = 1$). Sí: la suma és $-b/a$ i el producte c/a (Cardano-Vieta).
- 4.3.10** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el cor de la SA i la marca de B: la fórmula general es *dedueix* (completar el quadrat, connectant amb les identitats de la Unitat 3) i el discriminant s'usa per *anticipar* el nombre de solucions abans de resoldre. Tres sessions.
- **Criteri 1.4 (discriminar solucions).** L'ús del discriminant (ex. 1, 5, 8) és l'objectiu central: decidir quantes solucions hi ha, i per què, abans de calcular-les. És el que separa B d'una aplicació mecànica de la fórmula.
- **Criteri 2.1 i 3.2 (deduir i justificar).** La reconstrucció de la deducció (ex. 6) és l'ítem N3 per excel·lència; no cal reproduir cada símbol, sí captar l'estructura (completar el quadrat $\rightarrow$ arrel $\rightarrow \pm$). Es pot fer en gran grup, guiada.
- **Els dos errors rei (ex. 7).** Oblidar una de les dues solucions (el $\pm$) i aplicar la fórmula quan $\Delta < 0$ sense adonar-se'n. Convé que la comprovació sigui rutina.
- **Fil històric.** Al-Khwarizmi resolvia aquestes equacions completant quadrats amb figures; el mètode geomètric és una bona il·lustració DUA de la deducció.
- **Cardano-Vieta (ex. 9, N3+).** Curiositat d'aprofundiment; connecta solucions i coeficients i prepara la lectura dels punts de tall (Unitat 5).
- **Quadern d'eines (ex. 10).** La fórmula i la taula del discriminant són el centre del dossier final.