Activitat 5 — La funció logarítmica

Estudiar $y = \log_b x$: el seu domini, la seva gràfica i la seva relació d'inversa amb l'exponencial (simetria respecte de la recta $y = x$).


Idea clau

Si el logaritme és l'operació que desfà l'exponencial, la **funció logarítmica** $y = \log_b x$ ha de ser, gràficament, el «mirall» de l'exponencial. Aquesta activitat tanca l'atles: l'última família nova, i la que revela com dues funcions poden ser una la inversa de l'altra.

La funció logarítmica
$y = \log_b x$ (amb $b > 0$, $b \neq 1$) dona, per a cada x, l'exponent al qual cal elevar b per obtenir x. És la **inversa** de $y = b^x$.

Inversa vol dir mirall

Ser funcions inverses significa que **intercanvien els papers de x i y**: si l'exponencial passa per $(3, 8)$ (perquè $2^3 = 8$), la logarítmica passa per $(8, 3)$ (perquè $\log_2 8 = 3$). Gràficament, cada punt es reflecteix sobre la recta $y = x$.



$y = \log_2 x$ és el reflex de $y = 2^x$ sobre la recta $y = x$. On una passa per $(0, 1)$, l'altra passa per $(1, 0)$.

Propietats de $y = \log_b x$

- **Domini:** només $x > 0$ (no existeix el logaritme de 0 ni de negatius). És el «mirall» del fet que l'exponencial sempre dona positiu.
- **Passa per $(1, 0)$:** $\log_b 1 = 0$ per a qualsevol base.
- **Asímptota:** l'eix vertical ($x = 0$); la corba s'hi acosta però mai el toca.
- **Creixement:** si $b > 1$, creix (a poc a poc); és l'invers del creixement ràpid de l'exponencial.

Exercici resolt 50 — Fer la taula per reflexió

Fes una taula de $y = \log_2 x$ aprofitant que és la inversa de $y = 2^x$.

Solució. De 2^x coneixem: $(-1, \frac{1}{2}), (0, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 8)$. Intercanviant x i y:

x	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$y = \log_2 x$	-1	0	1	2	3

Resposta: Cada punt (a, b) de l'exponencial dona el punt (b, a) de la logarítmica.

Exercicis per fer

51 Fes la taula. Per a $y = \log_2 x$, calcula y a $x = 1, 2, 4, 8$ (pensa «a quina potència elevo 2»).

52 Domini. Per a $y = \log_{10} x$, digues quins d'aquests valors de x tenen imatge i quins no: $x = 100,\ 10,\ 1,\ 0,\ -5$.

53 El punt comú. Comprova que $\log_2 1 = 0$, $\log_{10} 1 = 0$ i $\log_5 1 = 0$. Per quin punt passen totes les logarítmiques?

54 Inversa en acció. Si $y = 3^x$ passa per $(2, 9)$, per quin punt passa $y = \log_3 x$? Justifica-ho.

55 Creix o decreix? La funció $y = \log_2 x$ (base > 1), creix o decreix? Compara la velocitat del seu creixement amb la de $y = 2^x$.

56 Llegeix la gràfica. A la figura de dalt, quant val $y = \log_2 x$ quan $x = 1$? Cap on va la corba quan x s'acosta a 0 per la dreta?

57 Troba l'error. Un company calcula $\log_{10}(-100)$ i diu que és -2. Per què no existeix aquest logaritme?

58 Simetria. Explica, amb un punt concret, per què les gràfiques de $y = 2^x$ i $y = \log_2 x$ són simètriques respecte de la recta $y = x$.

59 Repte N3+. Les funcions $y = 10^x$ i $y = \log_{10} x$ són inverses. Comprova-ho amb un valor: agafa $x = 2$, calcula 10^2, i després $\log_{10}$ del resultat. Tornes al 2?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

51 $x = 1 \to 0$, $2 \to 1$, $4 \to 2$, $8 \to 3$.

52 Tenen imatge: 100 ($\to 2$), 10 ($\to 1$), 1 ($\to 0$). No en tenen: 0 i -5 (el logaritme només existeix per a $x > 0$).

53 Tots donen 0. Totes les logarítmiques passen per $(1, 0)$.

54 Per $(9, 2)$: la inversa intercanvia les coordenades, i com que $\log_3 9 = 2$, el punt és $(9, 2)$.

55 Creix (base > 1), però *molt a poc a poc*: és l'invers del creixement ràpid de l'exponencial (creix com decreix de lent el logaritme).

56 A $x = 1$, $y = 0$. Quan $x \to 0^+$, la corba baixa cap a $-\infty$ (s'enfila per l'asímptota vertical $x = 0$).

57 Perquè no hi ha cap exponent al qual elevar 10 que doni un nombre negatiu: $10^{\text{qualsevol}}$ sempre és positiu. Per tant $\log_{10}(-100)$ no existeix. (I $10^{-2} = 0{,}01$, no -100.)

58 Resposta oberta. Exemple: l'exponencial passa per $(3, 8)$ i la logarítmica per $(8, 3)$; intercanviar x i y és, geomètricament, reflectir sobre $y = x$.

59 $10^2 = 100$; $\log_{10} 100 = 2$. Sí, es torna al 2: aplicar una funció i després la seva inversa deixa el nombre igual.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca les famílies noves amb la funció logarítmica i la idea de **funció inversa** (simetria respecte de $y = x$). Desmos per superposar exponencial, logarítmica i la recta $y = x$. Dues sessions.
- **Inversa = mirall (ex. 54, 58, 59).** És el concepte central i el més potent: intercanviar coordenades i reflectir sobre $y = x$. Convé treballar-lo amb punts concrets abans que amb la gràfica sencera (criteris 5.1, 1.2).
- **Domini $x > 0$ (ex. 52, 57).** És el reflex exacte que l'exponencial només dona valors positius; l'error de calcular el log d'un negatiu (ex. 57) es desmunta recordant aquesta simetria. Criteri 6.4.
- **Passa per $(1, 0)$ (ex. 53).** Punt d'ancoratge, mirall del $(0, 1)$ de l'exponencial.
- **Creixement lent (ex. 55).** Que el logaritme creixi molt a poc a poc és el revers del creixement ràpid de l'exponencial; bona ocasió per parlar d'escales logarítmiques (enllaç amb l'Activitat 4).
- **Composició inversa (ex. 59, N3+).** $\log_b(b^x) = x$ i $b^{\log_b x} = x$ de manera intuïtiva; via d'aprofundiment.