
Activitat 2 — Sinus, cosinus i tangent

Definir sin, cos i tan d'un angle agut com a raons entre els costats d'un triangle rectangle, introduir la circumferència goniomètrica i conèixer els angles notables.

Idea clau

A l'activitat anterior vas veure que triangles amb els mateixos angles tenen costats proporcionals. Això vol dir que, fixat un angle, la **raó** entre dos costats sempre és la mateixa, *independentment de la mida* del triangle. Aquestes raons tenen nom —**sinus**, **cosinus**, **tangent**— i són l'eina central de la unitat.

Les tres raons



Respecte de l'angle α: el catet oposat *(davant), el catet* contigu *(al costat) i la hipotenusa.*

Definició de les raons
Per a un angle agut α d'un triangle rectangle:

$$\sin\alpha = \frac{\text{catet oposat}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos\alpha = \frac{\text{catet contigu}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan\alpha = \frac{\text{catet oposat}}{\text{catet contigu}}.$$

Regla per recordar-ho: **SOH-CAH-TOA** (*Sinus = Oposat/Hipotenusa*, *Cosinus = Contigu/Hipotenusa*, *Tangent = Oposat/Contigu*).

Exercici resolt 13 — Les raons del triangle 3-4-5

En un triangle rectangle de catets 3 (oposat a α) i 4 (contigu) i hipotenusa 5, calcula les tres raons de α.

Solució.

$$\sin\alpha = \frac{3}{5} = 0{,}6, \quad \cos\alpha = \frac{4}{5} = 0{,}8, \quad \tan\alpha = \frac{3}{4} = 0{,}75.$$

Resposta: $\sin\alpha = 0{,}6$, $\cos\alpha = 0{,}8$, $\tan\alpha = 0{,}75$.

La circumferència goniomètrica i els angles notables

En una circumferència de radi 1, un angle α marcat des del centre situa un punt les coordenades del qual són, exactament, $(\cos\alpha, \sin\alpha)$. Aquesta **circumferència goniomètrica** és el suport visual de tota la trigonometria.

Angles notables (val la pena saber-los)

α	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$
$30°$	$\frac{1}{2} = 0{,}5$	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$	$\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}58$
$45°$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$	1
$60°$	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$	$\frac{1}{2} = 0{,}5$	$\sqrt{3} \approx 1{,}73$

Exercicis per fer

14 Identifica els costats. En un triangle rectangle amb un angle α, digues quin costat és l'oposat, el contigu i la hipotenusa respecte de α (fes un esbós i etiqueta'ls).

15 Calcula les raons. Un triangle rectangle té catet oposat 5, catet contigu 12 i hipotenusa 13. Calcula $\sin\alpha$, $\cos\alpha$ i $\tan\alpha$.

16 Amb la calculadora. Calcula (arrodoneix a dues decimals):

(a) $\sin 40°$

(b) $\cos 25°$

(c) $\tan 55°$

17 Angles notables de memòria. Sense calculadora, digues:

(a) $\sin 30°$

(b) $\cos 60°$

(c) $\tan 45°$

(d) $\cos 30°$

18 Troba l'angle. Si $\sin\alpha = 0{,}5$, quant val α? I si $\tan\alpha = 1$? *(Pista: mira la taula d'angles notables.)*

19 Coherència. Comprova que, per a l'angle del triangle 3-4-5, es compleix $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ (calcula $0{,}6^2 + 0{,}8^2$).

20 Circumferència goniomètrica. A la circumferència de radi 1, un angle de 60° marca un punt. Quines són les seves coordenades? *(Pista:* $(\cos 60°, \sin 60°)$*.)*

21 Troba l'error. Un company diu que $\sin\alpha$ pot valer 1,5. Per què és impossible en un angle agut? *(Pista: és una raó de catet a hipotenusa.)*

22 Repte N3+. En un triangle rectangle, si $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$, troba $\cos\alpha$ i $\tan\alpha$ *sense calcular l'angle. (Pista: fes servir Pitàgores per trobar el catet que falta.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

14 L'oposat és el catet *davant* de α; el contigu, el que *toca* α (i no és la hipotenusa); la hipotenusa, el costat oposat a l'angle recte. (Esbós lliure.)

15 $\sin\alpha = \frac{5}{13} \approx 0{,}38$; $\cos\alpha = \frac{12}{13} \approx 0{,}92$; $\tan\alpha = \frac{5}{12} \approx 0{,}42$.

16 (a) 0,64. (b) 0,91. (c) 1,43.

17 (a) 0,5. (b) 0,5. (c) 1. (d) $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$.

18 $\sin\alpha = 0{,}5 \Rightarrow \alpha = 30°$; $\tan\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 45°$.

19 $0{,}6^2 + 0{,}8^2 = 0{,}36 + 0{,}64 = 1$. ✓

20 $(\cos 60°, \sin 60°) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx (0{,}5,\ 0{,}87)$.

21 Perquè $\sin\alpha$ és el quocient catet oposat / hipotenusa, i en un triangle rectangle el catet sempre és *més curt* que la hipotenusa; per tant la raó és sempre menor que 1. No pot ser 1,5.

22 Si $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, el catet oposat és 3 i la hipotenusa 5; per Pitàgores el contigu és $\sqrt{25-9} = 4$. Així $\cos\alpha = \frac{4}{5}$ i $\tan\alpha = \frac{3}{4}$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Introdueix el saber (*) de B: les raons trigonomètriques com a raons de costats (des de la semblança de l'Activitat 1). Tres sessions. La circumferència goniomètrica manipulable i GeoGebra són el suport visual (DUA).
- **Independència de la mida.** La idea que sin/cos/tan depenen només de l'angle, no del triangle, és la clau conceptual; convé mostrar-la amb dos triangles semblants de mides diferents (criteri 5.2).
- **Angles notables.** Memoritzar 30-45-60 és útil, però més important és saber-los deduir del triangle equilàter partit i del quadrat; es pot fer com a ampliació.
- **L'error rei (ex. 21).** Que sin o cos d'un angle agut siguin > 1 és impossible (catet $<$ hipotenusa); és un bon control de sentit del resultat.
- **Identitat fonamental (ex. 19).** $\sin^2 + \cos^2 = 1$ apareix aquí de manera natural i es reprèn a l'Activitat 3.
- **N3+ (ex. 22).** Trobar les altres raons a partir d'una, via Pitàgores, sense calcular l'angle, és raonament pur; via d'aprofundiment.
- **Calculadora.** Assegurar que està en *graus* (DEG), no radians: font d'errors clàssica.