

Activitat 4 — Factoritzar, el camí invers

Factoritzar expressions traient factor comú i reconeixent les identitats notables a la inversa, i simplificar fraccions algebraïques senzilles.

Idea clau

Fins ara hem **desenvolupat**: de producte a suma. Ara farem el camí invers, **factoritzar**: de suma a producte. És com desmuntar el que hem construït, i és la clau per simplificar expressions i fraccions algebraïques. Factoritzar és, exactament, l'operació inversa del que vam fer a l'Activitat 3.

Factor comú: la distributiva al revés

Treure factor comú

Si tots els termes comparteixen un factor, el «treiem a fora»:

$$a \cdot c + a \cdot d = a(c + d).$$

És la propietat distributiva llegida de dreta a esquerra.

Exercici resolt 29 — Factor comú

Factoritza $2x^2 + 8x$ i $3x^3 - 6x^2$.

Solució.

$$2x^2 + 8x = 2x(x + 4), \quad 3x^3 - 6x^2 = 3x^2(x - 2).$$

Comprovació: tornant a multiplicar, recuperem l'original. Sempre treiem el factor *més gran* possible (aquí $2x$ i $3x^2$).

Resposta: $2x(x + 4)$ i $3x^2(x - 2)$.

Identitats notables, a la inversa

Reconèixer una identitat notable «al revés» permet factoritzar de cop.

Les tres, llegides al revés

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2, \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2, \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

La **diferència de quadrats** és la més útil: sempre que vegis «quadrat menys quadrat», factoritza.

Exercici resolt 30 — Diferència de quadrats i quadrat perfecte

Factoritza $x^2 - 49$, $4x^2 - 9$ i $x^2 + 6x + 9$.

Solució.

$$x^2 - 49 = x^2 - 7^2 = (x + 7)(x - 7).$$

$$4x^2 - 9 = (2x)^2 - 3^2 = (2x + 3)(2x - 3).$$

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 = (x + 3)^2.$$

Resposta: $(x+7)(x-7)$; $(2x+3)(2x-3)$; $(x+3)^2$.

Simplificar fraccions algebraiques

Factoritzar per simplificar

Una **fracció algebraica** es simplifica factoritzant dalt i baix i cancel·lant els factors comuns —igual que amb les fraccions numèriques. **Compte:** només es cancel·len *factors* (multiplicant), mai termes solts d'una suma.

Exercici resolt 31 — Simplificar

Simplifica $\frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

Solució. Factoritzem el numerador (diferència de quadrats):

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x+3)(x-3)}{x-3} = x+3 \quad (x \neq 3).$$

El factor $(x-3)$ es cancel·la. Anotem $x \neq 3$ perquè el denominador no pot ser zero.

Resposta: $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = x + 3$, amb $x \neq 3$.

Exercicis per fer

32 Factor comú. Factoritza:

- (a) $5x^2 - 20x$
- (b) $3x^3 + 9x^2$
- (c) $6x^2 - 4x$
- (d) $x^3 - x$

33 Diferència de quadrats. Factoritza:

- (a) $x^2 - 16$
- (b) $x^2 - 64$
- (c) $9x^2 - 4$
- (d) $25 - x^2$

34 Quadrat perfecte. Factoritza reconeixent la identitat:

- (a) $x^2 + 10x + 25$
- (b) $x^2 - 10x + 25$
- (c) $9x^2 - 12x + 4$

35 Tria l'eina. Per a cada expressió, digues quin mètode uses (factor comú, diferència de quadrats o quadrat perfecte) i factoritza:

- (a) $x^2 - 100$
- (b) $4x^2 + 8x$
- (c) $x^2 - 14x + 49$

36 Simplifica fraccions. Factoritza i simplifica (indica les restriccions):

- (a) $\frac{x^2 - 25}{x + 5}$
- (b) $\frac{x^2 + 6x + 9}{x + 3}$
- (c) $\frac{2x + 6}{x^2 - 9}$

37 Camí d'anada i tornada. Desenvolupa $(x - 6)^2$ i, tot seguit, torna a factoritzar el resultat. Has recuperat el punt de partida?**38 Troba l'error.** Un company simplifica així:

$$\frac{x^2 + 4}{x + 2} = x + 2.$$

Comprova-ho a $x = 2$ i digues per què està malament. (*Pista: es pot factoritzar $x^2 + 4$?*)**39 Àrea a la inversa.** L'àrea d'un rectangle és $x^2 + 7x$ i un dels costats és x . Quin és l'altre costat? (*Pista: factoritza.*)**40 Repte N3+.** Factoritza completament $x^3 - 4x$. (*Pista: primer factor comú, després mira què queda.*)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 32** (a) $5x(x-4)$. (b) $3x^2(x+3)$. (c) $2x(3x-2)$. (d) $x(x^2-1) = x(x+1)(x-1)$.
- 33** (a) $(x+4)(x-4)$. (b) $(x+8)(x-8)$. (c) $(3x+2)(3x-2)$. (d) $(5+x)(5-x)$.
- 34** (a) $(x+5)^2$. (b) $(x-5)^2$. (c) $(3x-2)^2$.
- 35** (a) diferència de quadrats: $(x+10)(x-10)$. (b) factor comú: $4x(x+2)$. (c) quadrat perfecte: $(x-7)^2$.
- 36** (a) $\frac{(x+5)(x-5)}{x+5} = x-5$ ($x \neq -5$). (b) $\frac{(x+3)^2}{x+3} = x+3$ ($x \neq -3$). (c) $\frac{2(x+3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{2}{x-3}$ ($x \neq \pm 3$).
- 37** $(x-6)^2 = x^2 - 12x + 36$; factoritzant, $x^2 - 12x + 36 = (x-6)^2$. Sí, es recupera el punt de partida: desenvolupar i factoritzar són operacions inverses.
- 38** A $x = 2$: $\frac{4+4}{4} = 2$, però $x+2 = 4$. No coincideixen. L'error és que x^2+4 *no* es pot factoritzar (no és diferència de quadrats, és una *suma*); no hi ha cap factor comú amb $x+2$ per cancel·lar.
- 39** $x^2+7x = x(x+7)$, així que l'altre costat és $x+7$.
- 40** $x^3-4x = x(x^2-4) = x(x+2)(x-2)$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Presenta la factorització com a *inversa* del desenvolupament (Activitat 3) i l'aplica a simplificar fraccions algebraïques senzilles. Dues sessions; convé molta pràctica de reconeixement del patró.
- **Criteri 3.2 (patrons).** Tota la factorització és reconeixement de patrons: veure «quadrat menys quadrat» o «quadrat perfecte». L'ex. 35 (triàr l'eina) i l'ex. 40 (factoritzar en dues passes) hi insisteixen.
- **L'error rei de la fracció (ex. 38).** Cancel·lar termes d'una suma (x^2+4 amb $x+2$) és l'error més perillós del bloc. Convé desmuntar-lo numèricament i deixar clar que *només es cancel·len factors*. Ítem **N3**, criteri 2.1.
- **Restriccions ($x \neq \dots$).** Fer explícit el valor prohibit del denominador és part del rigor de B; connecta amb el domini de les funcions (Unitats 5 i 6).
- **Anada i tornada (ex. 37).** Reforça que desenvolupar i factoritzar són inverses, el missatge central de la unitat (mapa de l'Activitat 5).
- **N3+ (ex. 40).** Factoritzar completament (factor comú + diferència de quadrats) prepara la resolució d'equacions per factorització (Unitat 4).