

Activitat 4 — Problemes que amaguen una x^2

Traduir enunciats reals a equacions de $2n$ grau, resoldre-les i interpretar les solucions descartant les que no tenen sentit; connectar amb els punts de tall.

Idea clau

Una equació de $2n$ grau no és un fi en si mateixa: és una eina per resoldre problemes. La part difícil sovint no és calcular, sinó **traduir** l'enunciat a llenguatge algebraic i, al final, **interpretar** què volen dir les solucions —perquè, com ja saps, no totes valen.

El mètode, en quatre passos

1. **Nomena** la incògnita: «sigui $x = \dots$ ».
2. **Tradueix** l'enunciat a una equació.
3. **Resol** l'equació (mètode ràpid o fórmula).
4. **Interpreta**: comprova quines solucions tenen sentit al problema.

Un problema de nombres

Exercici resolt 32 — Dos nombres consecutius

El producte de dos nombres naturals consecutius és 56. Quins són?

Solució. Nomeno: sigui x el primer; el següent és $x + 1$.

Tradueixo: $x(x + 1) = 56$, és a dir $x^2 + x - 56 = 0$.


Resolc: $\Delta = 1 + 224 = 225$, $\sqrt{225} = 15$, així $x = \frac{-1 \pm 15}{2}$: $x = 7$ o $x = -8$.

Interpreto: han de ser naturals, així que $x = 7$; els nombres són 7 i 8. ($x = -8$ es descarta.)

Resposta: Els nombres són 7 i 8.

Un problema de tir

Molts moviments segueixen una **paràbola**. L'altura d'una pilota llançada enlaire, en metres, després de t segons, pot ser $h = -5t^2 + 20t$. Preguntar «quan toca el terra» és resoldre $h = 0$.



$h = -5t^2 + 20t$: la pilota surt del terra ($t = 0$), puja i torna a tocar-lo ($t = 4$). Els dos zeros són els punts de tall amb l'eix.

Exercici resolt 33 — Quan toca el terra

Amb $h = -5t^2 + 20t$, quan torna la pilota al terra?

Solució. $h = 0$: $-5t^2 + 20t = 0 \Rightarrow -5t(t - 4) = 0 \Rightarrow t = 0$ o $t = 4$.

Interpreto: $t = 0$ és quan surt; $t = 4$ s és quan torna a terra.

Resposta: Torna a terra als 4 segons.

Exercicis per fer

- 34 Nombres.** El producte de dos nombres naturals consecutius és 42. Escriu l'equació, resol-la i digues quins són.
- 35 Un nombre i el seu quadrat.** El quadrat d'un nombre és igual al nombre més 12. Planteja l'equació ($x^2 = x + 12$) i troba el nombre (n'hi ha dos; interpreta).
- 36 Rectangle.** Un rectangle té la base 3 m més llarga que l'altura, i una àrea de 40 m².
(a) Anomena l'altura x i escriu l'equació.
(b) Resol-la.
(c) Interpreta: quines mides té el rectangle?
- 37 Tir.** Amb $h = -5t^2 + 20t$ (altura en m, temps en s):
(a) A quins instants la pilota és a 15 m d'altura?
(b) Quant temps està enlaire en total?
- 38 Marc quadrat.** Un quadrat té una àrea de 100 cm². Quant fa el costat? (Compte amb la solució que no val.)
- 39 Tria i resol.** Per a cada problema, planteja i resol amb el mètode que et sembli més eficient:
(a) Un nombre multiplicat per si mateix dona 81.
(b) Dos nombres sumen 10 i el seu producte és 21. (*Pista: si un és x , l'altre és $10 - x$.*)
- 40 Troba l'error.** En el problema del rectangle (àrea 40, base $x + 3$), un company dona com a resposta $x = -8$ i $x = 5$, i es queda amb totes dues. Quina no val i per què?
- 41 Connexió amb els punts de tall.** L'equació $x^2 - 4 = 0$ té solucions $x = \pm 2$. Si penses en la corba $y = x^2 - 4$, què representen aquests dos valors respecte de l'eix horitzontal? (*Aquest és el pont cap a la Unitat 5.*)
- 42 Repte N3+.** La suma de les àrees de dos quadrats és 25 cm², i el costat d'un és 1 cm més gran que el de l'altre. Troba els costats. (*Pista: $x^2 + (x + 1)^2 = 25$.*)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 34** $x(x+1) = 42 \Rightarrow x^2 + x - 42 = 0$; $\Delta = 169$, $x = \frac{-1 \pm 13}{2}$: $x = 6$ (o -7). Els nombres són 6 i 7.
- 35** $x^2 = x + 12 \Rightarrow x^2 - x - 12 = 0$; $x = 4$ o $x = -3$. Tots dos compleixen (el quadrat de -3 és $9 = -3 + 12$); si el context demana natural, $x = 4$.
- 36** (a) $x(x+3) = 40 \Rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0$. (b) $\Delta = 169$, $x = 5$ o $x = -8$. (c) l'altura és 5 m i la base 8 m ($x = -8$ es descarta).
- 37** (a) $-5t^2 + 20t = 15 \Rightarrow -5t^2 + 20t - 15 = 0 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0$; $t = 1$ i $t = 3$ s (puja passant per 15 m a $t = 1$ i torna a passar-hi a $t = 3$). (b) toca terra a $t = 4$ s, així que està enlaire 4 segons.
- 38** $x^2 = 100 \Rightarrow x = \pm 10$; com a costat, $x = 10$ cm.
- 39** (a) $x^2 = 81 \Rightarrow x = \pm 9$ (o $x = 9$ si es demana positiu). (b) $x(10 - x) = 21 \Rightarrow x^2 - 10x + 21 = 0$; $x = 3$ o $x = 7$: els nombres són 3 i 7.
- 40** No val $x = -8$: una altura (longitud) no pot ser negativa. La resposta és $x = 5$.
- 41** Representen els **punts de tall** de la corba $y = x^2 - 4$ amb l'eix horitzontal: on la corba val 0 ($x = -2$ i $x = 2$). Resoldre l'equació és trobar aquests talls.
- 42** $x^2 + (x+1)^2 = 25 \Rightarrow 2x^2 + 2x - 24 = 0 \Rightarrow x^2 + x - 12 = 0$; $x = 3$ (o -4 , descartat). Els costats són 3 cm i 4 cm.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Posa l'equació de 2n grau al servei del problema: traduir, resoldre i *interpretar*. Dues sessions. Amb GeoGebra es poden visualitzar el tir i els punts de tall.
- **Criteri 5.2 (connexions) i 1.4.** L'ex. 41 fa el pont explícit cap a la Unitat 5: les solucions són els punts de tall de la paràbola amb l'eix. Aquesta connexió és clau i convé no deixar-la per al final.
- **Interpretar és el nucli (ex. 40).** Descartar la solució que no val (longituds/temps negatius) és on es juga el nivell **N3**: no n'hi ha prou de resoldre, cal decidir quines solucions tenen sentit (criteri 2.1 i vector de benestar emocional).
- **Traducció d'enunciats (comprensió lectora).** El pas «nomenar + traduir» és el més difícil; convé fer-lo explícit i verbalitzat, dins el vector de comprensió lectora traçat.
- **Context de tir.** El model $h = -5t^2 + 20t$ (amb $g \approx 10$) és una simplificació escolar; s'hi pot comentar que és una aproximació.
- **N3+ (ex. 42).** Suma d'àrees amb dues incògnites lligades: bon repte de modelització que reforça el pas de traduir.