


1. Activitat 3 — Vèrtex, eix i punts de tall

Determinar el vèrtex, l'eix de simetria i els punts de tall d'una paràbola $y = ax^2 + bx + c$, tant gràficament com algebraicament (resolent l'equació associada, connexió amb la Unitat 4).

1.1 Idea clau

Per «estudiar» una paràbola qualsevol $y = ax^2 + bx + c$ n'hi ha prou de trobar uns pocs punts clau: el **vèrtex** (el punt més alt o baix), l'**eix de simetria** (el mirall vertical) i els **punts de tall** amb els eixos. Amb aquests punts, la corba queda determinada. I els sabem trobar amb àlgebra.

1.2 Els elements d'una paràbola



$y = x^2 - 4x + 3$: vèrtex $(2, -1)$, eix $x = 2$, talls amb l'eix horitzontal a 1 i 3, i tall vertical a $(0, 3)$.

1.3 Com trobar cada element

Les fórmules clau

Per a $y = ax^2 + bx + c$:

- **Eix de simetria:** la recta vertical $x = \frac{-b}{2a}$.
- **Vèrtex:** el seu x és $\frac{-b}{2a}$; el seu y s'obté substituint aquest valor a la funció.
- **Talls amb l'eix horitzontal:** resoldre $ax^2 + bx + c = 0$ (Unitat 4!). Poden ser 2, 1 o cap, segons el discriminant.
- **Tall amb l'eix vertical:** el punt $(0, c)$ (fer $x = 0$).

Exercici resolt 1.1 — Estudiar una paràbola

Troba el vèrtex, l'eix i els punts de tall de $y = x^2 - 4x + 3$.

Solució. Aquí $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$.

Eix: $x = \frac{-(-4)}{2 \cdot 1} = 2$.

Vèrtex: a $x = 2$, $y = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$; vèrtex $(2, -1)$.

Talls horitzontals: $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 1, 3$.

Tall vertical: $(0, 3)$.

Resposta: Vèrtex $(2, -1)$, eix $x = 2$, talls $x = 1, 3$ i $(0, 3)$.

Exercicis per fer

- 1.1 Eix i vèrtex.** Per a cada paràbola, troba l'eix de simetria i el vèrtex:
- (a) $y = x^2 - 4x + 3$
 - (b) $y = x^2 + 2x - 3$
 - (c) $y = x^2 - 6x + 8$
- 1.2 Punts de tall.** Troba els talls amb tots dos eixos:
- (a) $y = x^2 - 9$
 - (b) $y = x^2 - 4x + 3$
 - (c) $y = x^2 + 2x - 3$
- 1.3 Estudi complet.** Fes l'estudi (eix, vèrtex, talls) de $y = x^2 - 6x + 8$ i dibuixa-la aproximadament amb aquests punts.
- 1.4 Quants talls?** Sense resoldre del tot, digues quants punts de tall amb l'eix horitzontal té cada paràbola (pensa en el discriminant):
- (a) $y = x^2 - 2x + 1$
 - (b) $y = x^2 + 1$
 - (c) $y = x^2 - 4$
- 1.5 De la gràfica a l'expressió.** Una paràbola talla l'eix horitzontal a $x = -2$ i $x = 2$, i l'eix vertical a $(0, -4)$. Comprova que $y = x^2 - 4$ compleix les tres condicions.
- 1.6 Llegeix el vèrtex.** A $y = x^2 - 4x + 3$, el vèrtex és el punt més *baix* o més *alt*? Com ho saps abans de calcular-lo?
- 1.7 Troba l'error.** Un company calcula el vèrtex de $y = x^2 - 4x + 3$ i dona $x = \frac{-4}{2} = -2$. On s'ha equivocat amb el signe? Quin és el valor correcte?
- 1.8 Simetria en acció.** Si una paràbola té el vèrtex a $x = 2$ i passa pel punt $(1, 0)$, per quin altre punt de l'eix horitzontal ha de passar, per simetria?
- 1.9 Repte N3+.** Troba una paràbola $y = x^2 + bx + c$ que tingui el vèrtex a $(3, -1)$. (*Pista: l'eix ha de ser $x = 3$, així que $-b/2 = 3$; després ajusta c perquè el vèrtex tingui $y = -1$.*)
- 1.10 Per al Quadern d'eines.** Escribeu les fórmules de l'eix ($x = -b/2a$), del vèrtex i com trobar els talls (resoldre l'equació i fer $x = 0$), amb un exemple complet.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 1.1 (a) eix $x = 2$, vèrtex $(2, -1)$. (b) eix $x = -1$, vèrtex $(-1, -4)$. (c) eix $x = 3$, vèrtex $(3, -1)$.
- 1.2 (a) horitzontals $x = \pm 3$, vertical $(0, -9)$. (b) horitzontals $x = 1, 3$, vertical $(0, 3)$. (c) horitzontals $x = -3, 1$, vertical $(0, -3)$.
- 1.3 Eix $x = 3$; vèrtex $(3, -1)$; talls horitzontals $x^2 - 6x + 8 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 2, 4$; tall vertical $(0, 8)$. La corba obre amunt amb el punt més baix a $(3, -1)$.
- 1.4 (a) un ($\Delta = 0$; toca l'eix al vèrtex). (b) cap ($\Delta = -4 < 0$; no toca l'eix). (c) dos ($\Delta = 16 > 0$).
- 1.5 Talls: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$ ✓; tall vertical $(0, -4)$ ✓. Compleix les tres condicions.
- 1.6 És el més **baix**: com que $a = 1 > 0$, la paràbola obre cap amunt, i el vèrtex és el punt mínim.
- 1.7 Error de signe: $b = -4$, així $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2} = \frac{4}{2} = 2$, no -2 . El vèrtex està a $x = 2$.
- 1.8 Per simetria respecte de $x = 2$: el punt $(1, 0)$ està a distància 1 a l'esquerra de l'eix, així que hi ha un punt simètric a distància 1 a la dreta: $(3, 0)$.
- 1.9 Eix $x = 3 \Rightarrow -b/2 = 3 \Rightarrow b = -6$. Amb $b = -6$, el vèrtex a $x = 3$ val $9 - 18 + c = -9 + c$; perquè sigui -1 , $c = 8$. Paràbola: $y = x^2 - 6x + 8$ (la mateixa de l'ex. 3). (S'accepten equivalents.)
- 1.10 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És la sessió tècnica: determinar els elements d'una paràbola per àlgebra i contrastar-los gràficament amb GeoGebra. Dues sessions.
- **Connexió amb B4 (ex. 2, 4).** Els talls horitzontals són les solucions de l'equació de 2n grau; el nombre de talls el diu el discriminant. Aquest lligam (criteri 5.1) és el pont central de la unitat i cal fer-lo explícit cada vegada.
- **L'error rei (ex. 7).** El signe a $x = -b/2a$ quan $b < 0$ és font constant d'errors; convé insistir-hi i comprovar amb la simetria (ex. 8). Criteri 2.1.
- **Simetria (ex. 8).** Fer servir l'eix per trobar punts sense calcular reforça la comprensió estructural (criteri 4.2), no la mecànica.
- **Mínim o màxim (ex. 6).** Que el vèrtex sigui mínim o màxim depèn del signe de a ; cal llegir-ho abans de calcular.
- **Representacions (ex. 3, 5).** Passar d'expressió a punts a gràfica i a l'inrevés (ex. 5, 9) és l'objectiu de representació (criteris 1.2, 7.2).
- **Quadern d'eines (ex. 10).** Les fórmules dels elements són el nucli de l'estudi de la paràbola (producte final).