

1. Activitat 5 — La funció logarítmica

Estudiar $y = \log_b x$: el seu domini, la seva gràfica i la seva relació d'inversa amb l'exponencial (simetria respecte de la recta $y = x$).

1.1 Idea clau


Si el logaritme és l'operació que desfà l'exponencial, la **funció logarítmica** $y = \log_b x$ ha de ser, gràficament, el «mirall» de l'exponencial. Aquesta activitat tanca l'atles: l'última família nova, i la que revela com dues funcions poden ser una la inversa de l'altra.

La funció logarítmica

$y = \log_b x$ (amb $b > 0$, $b \neq 1$) dona, per a cada x , l'exponent al qual cal elevar b per obtenir x . És la **inversa** de $y = b^x$.

1.2 Inversa vol dir mirall

Ser funcions inverses significa que **intercanvien els papers de x i y** : si l'exponencial passa per $(3, 8)$ (perquè $2^3 = 8$), la logarítmica passa per $(8, 3)$ (perquè $\log_2 8 = 3$). Gràficament, cada punt es reflecteix sobre la recta $y = x$.



$y = \log_2 x$ és el reflex de $y = 2^x$ sobre la recta $y = x$. On una passa per $(0, 1)$, l'altra passa per $(1, 0)$.

Propietats de $y = \log_b x$

- **Domini:** només $x > 0$ (no existeix el logaritme de 0 ni de negatius). És el «mirall» del fet que l'exponencial sempre dona positiu.
- **Passa per $(1, 0)$:** $\log_b 1 = 0$ per a qualsevol base.
- **Asímtota:** l'eix vertical ($x = 0$); la corba s'hi acosta però mai el toca.
- **Creixement:** si $b > 1$, creix (a poc a poc); és l'invers del creixement ràpid de l'exponencial.

Exercici resolt 1.1 — Fer la taula per reflexió

Fes una taula de $y = \log_2 x$ aprofitant que és la inversa de $y = 2^x$.

Solució. De 2^x coneixem: $(-1, \frac{1}{2})$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(3, 8)$. Intercanviant x i y :

x	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$y = \log_2 x$	-1	0	1	2	3

Resposta: Cada punt (a, b) de l'exponencial dona el punt (b, a) de la logarítmica.

Exercicis per fer

- 1.1 Fes la taula.** Per a $y = \log_2 x$, calcula y a $x = 1, 2, 4, 8$ (pensa «a quina potència elevo 2»).
- 1.2 Domini.** Per a $y = \log_{10} x$, digues quins d'aquests valors de x tenen imatge i quins no: $x = 100, 10, 1, 0, -5$.
- 1.3 El punt comú.** Comprova que $\log_2 1 = 0$, $\log_{10} 1 = 0$ i $\log_5 1 = 0$. Per quin punt passen totes les logarítmiques?
- 1.4 Inversa en acció.** Si $y = 3^x$ passa per $(2, 9)$, per quin punt passa $y = \log_3 x$? Justifica-ho.
- 1.5 Creix o decreix?** La funció $y = \log_2 x$ (base > 1), creix o decreix? Compara la velocitat del seu creixement amb la de $y = 2^x$.
- 1.6 Llegeix la gràfica.** A la figura de dalt, quant val $y = \log_2 x$ quan $x = 1$? Cap on va la corba quan x s'acosta a 0 per la dreta?
- 1.7 Troba l'error.** Un company calcula $\log_{10}(-100)$ i diu que és -2 . Per què no existeix aquest logaritme?
- 1.8 Simetria.** Explica, amb un punt concret, per què les gràfiques de $y = 2^x$ i $y = \log_2 x$ són simètriques respecte de la recta $y = x$.
- 1.9 Repte N3+.** Les funcions $y = 10^x$ i $y = \log_{10} x$ són inverses. Comprova-ho amb un valor: agafa $x = 2$, calcula 10^2 , i després $\log_{10}$ del resultat. Torna al 2?
- 1.10 Per al Quadern d'eines.** Escribeu la fitxa de la funció logarítmica per a l'atles: forma, domini ($x > 0$), asímptota ($x = 0$), passa per $(1, 0)$, i que és la inversa (mirall) de l'exponencial.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 1.1 $x = 1 \rightarrow 0, 2 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 2, 8 \rightarrow 3$.
- 1.2 Tenen imatge: $100 (\rightarrow 2), 10 (\rightarrow 1), 1 (\rightarrow 0)$. No en tenen: 0 i -5 (el logaritme només existeix per a $x > 0$).
- 1.3 Tots donen 0 . Totes les logarítmiques passen per $(1, 0)$.
- 1.4 Per $(9, 2)$: la inversa intercanvia les coordenades, i com que $\log_3 9 = 2$, el punt és $(9, 2)$.
- 1.5 Creix (base > 1), però *molt a poc a poc*: és l'invers del creixement ràpid de l'exponencial (creix com decreix de lent el logaritme).
- 1.6 A $x = 1, y = 0$. Quan $x \rightarrow 0^+$, la corba baixa cap a $-\infty$ (s'enfila per l'asíptota vertical $x = 0$).
- 1.7 Perquè no hi ha cap exponent al qual elevar 10 que doni un nombre negatiu: $10^{\text{qualsevol}}$ sempre és positiu. Per tant $\log_{10}(-100)$ no existeix. (I $10^{-2} = 0,01$, no -100 .)
- 1.8 Resposta oberta. Exemple: l'exponencial passa per $(3, 8)$ i la logarítmica per $(8, 3)$; intercanviar x i y és, geomètricament, reflectir sobre $y = x$.
- 1.9 $10^2 = 100$; $\log_{10} 100 = 2$. Sí, es torna al 2: aplicar una funció i després la seva inversa deixa el nombre igual.
- 1.10 Resposta oberta (fitxa de l'atles).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca les famílies noves amb la funció logarítmica i la idea de **funció inversa** (simetria respecte de $y = x$). Desmos per superposar exponencial, logarítmica i la recta $y = x$. Dues sessions.
- **Inversa = mirall (ex. 4, 8, 9).** És el concepte central i el més potent: intercanviar coordenades i reflectir sobre $y = x$. Convé treballar-lo amb punts concrets abans que amb la gràfica sencera (criteris 5.1, 1.2).
- **Domini $x > 0$ (ex. 2, 7).** És el reflex exacte que l'exponencial només dona valors positius; l'error de calcular el log d'un negatiu (ex. 7) es desmunta recordant aquesta simetria. Criteri 6.4.
- **Passa per $(1, 0)$ (ex. 3).** Punt d'ancoratge, mirall del $(0, 1)$ de l'exponencial.
- **Creixement lent (ex. 5).** Que el logaritme creixi molt a poc a poc és el revers del creixement ràpid de l'exponencial; bona ocasió per parlar d'escala logarítmica (enllaç amb l'Activitat 4).
- **Composició inversa (ex. 9, N3+).** $\log_b(b^x) = x$ i $b^{\log_b x} = x$ de manera intuïtiva; via d'aprofundiment.
- **Quadern d'eines (ex. 10).** Darrera fitxa de l'atles.