

1. Activitat 4 — De la fracció al decimal

Convertir una fracció en decimal i distingir els decimals exactes dels periòdics.

1.1 Idea clau

Una fracció és una divisió esperant a fer-se: $\frac{3}{4}$ vol dir $3 : 4$. Si fem la divisió, obtenim el **decimal** equivalent. A vegades la divisió s'acaba i a vegades no; aquí està la diferència entre decimals exactes i periòdics.

Fracció → decimal: dividir

Es divideix el numerador entre el denominador:

$$\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0,75, \quad \frac{1}{2} = 1 : 2 = 0,5.$$

1.2 Decimals exactes

Decimal exacte

Un decimal és **exacte** quan la divisió **s'acaba** (residu 0) i té un nombre finit de xifres decimals:

$$\frac{1}{4} = 0,25, \quad \frac{7}{8} = 0,875, \quad \frac{1}{5} = 0,2.$$

1.3 Decimals periòdics

Decimal periòdic

A vegades la divisió **no s'acaba mai**: unes xifres es repeteixen sense fi. En diem **periòdic**, i el tros que es repeteix (el **període**) es marca amb un arquet a sobre:

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots = 0,\widehat{3}, \quad \frac{2}{3} = 0,666\dots = 0,\widehat{6}.$$

- **Pur**: el període comença just després de la coma. $0,\widehat{3}$.
- **Mixt**: hi ha alguna xifra abans del període. $\frac{1}{6} = 0,1\widehat{6}$ (el 1 no es repeteix; el 6 sí).

Exercici resolt 1.1 — Classificar una fracció

Passa $\frac{5}{6}$ a decimal i digues quin tipus és.

Solució. Fem la divisió $5 : 6$:

$$\frac{5}{6} = 0,8333\dots = 0,8\widehat{3}.$$

El 8 no es repeteix, però el 3 sí. És un decimal **periòdic mixt**.

Resposta: $\frac{5}{6} = 0,8\widehat{3}$, periòdic mixt.

1.4 Triar la millor representació

Fracció o decimal?

Cap de les dues formes és sempre millor: depèn del context.

- La **fracció** és exacta sempre ($\frac{1}{3}$ és exacte com a fracció).
- El **decimal** és més còmode per comparar i per mesurar, però pot ser aproximat si és periòdic (0,33).

Exercicis per fer

1.1 Passa a decimal i digues si és exacte:

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{2}{5}$

1.2 Passa a decimal i digues si és periòdic (marca el període):

- (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{9}$ (c) $\frac{1}{6}$

1.3 Classifica cada decimal en exacte, periòdic pur o periòdic mixt:

- (a) 0,25 (b) $0,\overline{7}$ (c) $0,1\overline{6}$ (d) 0,125

1.4 Ordena de més petit a més gran passant-ho tot a decimal: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{1}{4}$.

1.5 Cert o fals? Justifica.

- (a) $\frac{1}{3}$ es pot escriure com un decimal exacte.
(b) $\frac{1}{4}$ i 0,25 són el mateix nombre.

1.6 Troba l'error. Un company diu que $\frac{1}{3} = 0,3$ exactament. Per què no és cert? Com s'escriu bé?

1.7 Repte. Sense fer la divisió sencera, es pot saber si una fracció donarà decimal exacte mirant el seu denominador (un cop simplificada): si només té factors 2 i 5, serà exacte. Comprova-ho amb $\frac{3}{20}$, $\frac{7}{8}$ i $\frac{2}{15}$.

1.8 Per al Quadern d'eines. Escriu els tres tipus de decimal (exacte, periòdic pur, periòdic mixt) amb un exemple de cadascun i com es marca el període.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 1.1** (a) 0,5 exacte. (b) 0,75 exacte. (c) 0,125 exacte. (d) 0,4 exacte.
- 1.2** (a) $0,\hat{3}$. (b) $0,\hat{1}$. (c) $0,1\hat{6}$.
- 1.3** (a) exacte. (b) periòdic pur. (c) periòdic mixt. (d) exacte.
- 1.4** $\frac{1}{4} = 0,25 < \frac{1}{2} = \frac{2}{4} = 0,5 < \frac{3}{5} = 0,6$. (Ordre: $\frac{1}{4}, \frac{1}{2} = \frac{2}{4}, \frac{3}{5}$.)
- 1.5** (a) Fals: $\frac{1}{3} = 0,\hat{3}$ és periòdic, no exacte. (b) Cert: $\frac{1}{4} = 0,25$.
- 1.6** 0,3 és només una aproximació. El valor exacte és $0,\hat{3} = 0,333\dots$ (infinites treses).
- 1.7** $\frac{3}{20}$: denominador $20 = 2^2 \cdot 5$, exacte (0,15). $\frac{7}{8}$: $8 = 2^3$, exacte (0,875). $\frac{2}{15}$: $15 = 3 \cdot 5$ (té un 3), periòdic ($0,1\hat{3}$).
- 1.8** Producció oberta; es comproven els tres tipus.

Notes per al professorat.

- La classificació exacte/periòdic (pur/mixt) és vocabulari explícit de la SA. A 1r n'hi ha prou amb reconèixer-los i marcar el període; el pas de periòdic a fracció (fracció generatriu) es deixa per a cursos posteriors.
- El repte 7 (mirar els factors del denominador) és una connexió preciosa amb la factorització de la UD2 i permet predir el tipus sense dividir. És un bon indicador de nivell N3.
- Es tanca el «triangle» de representacions de la UD4 afegint-hi l'arrel a l'Activitat 5: un mateix nombre, moltes cares. Convé remarcar que triar la representació adequada és una competència, no un caprici.
- El notació $0,\hat{3}$ pot ser nova; convé escriure-la a mà i a la pissarra fins que s'automatitzi.