

1. Activitat 5 — Quadrats perfectes i arrel quadrada

Calcular arrels quadrades exactes i aproximar les que no ho són.

1.1 Idea clau

Ja sabem que l'arrel quadrada desfà el quadrat: com que $5^2 = 25$, aleshores $\sqrt{25} = 5$. Però no tots els nombres tenen una arrel exacta. Avui aprendrem a trobar les exactes i a **aproximar** les que no ho són.

Arrel quadrada exacta

$\sqrt{n}$ és exacta quan n és un **quadrat perfecte** (el quadrat d'un natural):

$$\sqrt{1} = 1, \sqrt{4} = 2, \sqrt{9} = 3, \sqrt{16} = 4, \sqrt{25} = 5, \sqrt{36} = 6, \sqrt{49} = 7, \dots$$

Per això val la pena tenir memoritzats els quadrats perfectes: són les arrels que surten «rodones».

1.2 Quan l'arrel no és exacta

Atrapar l'arrel entre dos naturals

Si n no és un quadrat perfecte, la seva arrel cau **entre dos naturals**. Per exemple, per a $\sqrt{10}$:

$$\sqrt{9} = 3 \quad \text{i} \quad \sqrt{16} = 4, \quad \text{i com que } 9 < 10 < 16, \quad 3 < \sqrt{10} < 4.$$

Com que 10 és molt a prop de 9, $\sqrt{10}$ estarà a prop de 3 (aproximadament 3,2).

Exercici resolt 1.1 — Entre quins naturals cau

Entre quins dos naturals està $\sqrt{50}$?

Solució. Busquem els quadrats perfectes que envolten el 50:

$$7^2 = 49 \quad \text{i} \quad 8^2 = 64.$$

Com que $49 < 50 < 64$, tenim $7 < \sqrt{50} < 8$. I com que 50 és molt a prop de 49, $\sqrt{50}$ és una mica més de 7 (uns 7,07).

Resposta: $7 < \sqrt{50} < 8$, aproximadament 7,1.

Aproximar amb decimals

Podem afinar provant decimals. Per a $\sqrt{10}$:

$$3,1^2 = 9,61, \quad 3,2^2 = 10,24.$$

Com que 10 està entre 9,61 i 10,24, l'arrel està entre 3,1 i 3,2, més a prop de 3,2. Amb la **calculadora**: $\sqrt{10} \approx 3,16$. La calculadora dona l'aproximació; nosaltres entenem entre què cau.

Exercicis per fer

- 1.1** Calcula les arrels exactes:
(a) $\sqrt{16}$ (b) $\sqrt{64}$ (c) $\sqrt{100}$ (d) $\sqrt{144}$
- 1.2** Digue's si cada nombre és quadrat perfecte. Si ho és, dona'n l'arrel:
(a) 81 (b) 50 (c) 121 (d) 30
- 1.3** Entre quins dos naturals està cada arrel?
(a) $\sqrt{20}$ (b) $\sqrt{30}$ (c) $\sqrt{70}$
- 1.4** Un quadrat té una àrea de 49 cm^2 . Quant fa el seu costat?
- 1.5** Un quadrat té una àrea de 40 cm^2 . Entre quins dos nombres enters està el seu costat?
A quin dels dos s'acosta més?
- 1.6 Cert o fals?** Justifica.
(a) $\sqrt{36} = 6$.
(b) $\sqrt{20}$ és un nombre enter.
(c) $\sqrt{2}$ està entre 1 i 2.
- 1.7 Troba l'error.** Un company diu que $\sqrt{16} = 8$ «perquè la meitat de 16 és 8». On és la confusió? Quant és realment?
- 1.8 Repte.** Troba, provant amb decimals, una aproximació de $\sqrt{2}$ amb una xifra decimal.
Pista: prova 1,4 i 1,5 al quadrat.
- 1.9 Per al Quadern d'eines.** Escribeu la llista dels quadrats perfectes fins a 144 i el mètode d'atrapar una arrel no exacta entre dos naturals, amb l'exemple de $\sqrt{50}$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

1.1 (a) 4. (b) 8. (c) 10. (d) 12.

1.2 (a) sí, $\sqrt{81} = 9$. (b) no. (c) sí, $\sqrt{121} = 11$. (d) no.

1.3 (a) $4 < \sqrt{20} < 5$. (b) $5 < \sqrt{30} < 6$. (c) $8 < \sqrt{70} < 9$.

1.4 Costat = $\sqrt{49} = 7$ cm.

1.5 $6 < \sqrt{40} < 7$ (perquè $36 < 40 < 49$). S'acosta més a 6 (perquè 40 és a prop de 36); de fet $\approx 6,3$.

1.6 (a) Cert. (b) Fals: $\sqrt{20}$ està entre 4 i 5, no és enter. (c) Cert: $1^2 = 1$ i $2^2 = 4$, i $1 < 2 < 4$.

1.7 Confon l'arrel amb la meitat. $\sqrt{16}$ és el nombre que elevat al quadrat dona 16, és a dir 4 ($4^2 = 16$), no 8.

1.8 $1,4^2 = 1,96$ i $1,5^2 = 2,25$; com que 2 està entre tots dos i a prop de 1,96, $\sqrt{2} \approx 1,4$.

1.9 Producció oberta; es comprova la llista i el mètode.

Notes per al professorat.

- L'arrel es presenta com a **inversa de la potència** (recuperant la SA1) i amb sentit **geomètric** (costat d'un quadrat d'àrea coneguda), cosa que enllaça amb la mesura i prepara el projecte de rajoles.
- L'error del punt 7 (confondre arrel amb meitat) és freqüent; el remei és tornar sempre a «quin nombre, al quadrat, dona...». La llista de quadrats perfectes memoritzada ho fa immediat.
- Aproximar entre dos naturals (i després amb decimals) treballa l'**estimació amb consciència de l'error**, saber central de la SA. La calculadora s'usa per verificar, no per pensar.
- No cal introduir la irracionalitat de $\sqrt{2}$ a 1r; n'hi ha prou amb veure que l'arrel «no s'acaba» i que l'aproximem amb la precisió que calgui.