

Qüestió 6

Considereu les rectes

$$r : \frac{x-5}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{-1} \quad \text{i} \quad s : \begin{cases} x = 4 + 2k \\ y = 3 + k \\ z = -1 \end{cases}$$

a) Quina és la seva posició relativa? Calculeu l'equació implícita d'un pla π que sigui paral·lel a les dues rectes i que passi per l'origen de coordenades. [1,25 punts]

Pista. Dedueix quins són els vectors directors $\vec{v}_r$ i $\vec{v}_s$ i un punt de cada recta. Per a decidir la posició relativa: si els directores són proporcionals, les rectes són paral·leles (o coincidents); si no ho són, pot ser que es tallin o que siguin encreuades. Per a distingir entre rectes que es tallen o que es creuen, recorda que calculàvem un determinant, format pels vectors directores de les rectes respectivament i hi afegim un vector PQ , amb P i Q respectivament de cada recta. Bé, després la pregunta segueix i et demana trobar el pla π . Pensa que el seu vector normal ha de ser perpendicular als dos directores, de manera que $\vec{n}_\pi = \vec{v}_r \times \vec{v}_s$. Com que el pla passa per l'origen, vol dir que el terme independent de l'equació general és $D = 0$.

b) Calculeu l'equació de la recta t que talla les dues rectes r i s perpendicularment. [1,25 punts]

Pista. La recta t que busques (la “perpendicular comuna”) té com a vector director, precisament, $\vec{v}_r \times \vec{v}_s$, que ja has calculat a l'apartat anterior. Per a trobar un punt de t , pren un punt genèric de r (amb paràmetre t) i un punt genèric de s (amb paràmetre k) i imposa que el vector que els uneix sigui perpendicular simultàniament a $\vec{v}_r$ i a $\vec{v}_s$: obtindràs un sistema de dues equacions amb dues incògnites (t i k). Un moment, encara millor: quan l'hagis resolt, substituint un d'aquests paràmetres tindràs un punt concret de t , i ja ho tens tot per a escriure'n l'equació.