Exercici 3

Una empresa produeix dos tipus de peces, de ferro i d'acer. El 60 % de la producció total correspon a peces de ferro i la resta són d'acer. Sabem que el 95 % de les peces de ferro produïdes no tenen cap defecte, mentre que el 3 % de les peces d'acer són defectuoses.

a) Si agafem una peça a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui defectuosa? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. Hi ha dos camins que porten a «defectuosa»:
>
> - la peça és de ferro *i* és defectuosa;
> - la peça és d'acer *i* és defectuosa.
>
> Aplica el teorema de la probabilitat total.
>
> **Atenció:** el 95 % del ferro és el de peces *no* defectuoses.

b) L'empresa aviat diversificarà la producció i començarà a produir també peces de titani, que es vendran en paquets de 5. Si la probabilitat que una peça de titani sigui defectuosa és un valor desconegut p, i cada peça és defectuosa independentment de les altres, comproveu que l'expressió que ens dona la probabilitat que en un paquet de 5 peces n'hi hagi exactament 4 de defectuoses (en funció de p) és $f(p) = 5(p^4 - p^5)$. [0,75 punts]

> **Pista.** Sigui X el nombre de peces defectuoses del paquet: $X \sim B(5, p)$. Fes servir la fórmula de la binomial,
>
> $$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \, (1-p)^{n-k},$$
>
> amb $n = 5$ i $k = 4$, i desenvolupa el factor $(1 - p)$ per arribar a l'expressió demanada.

c) Considereu la funció $f(p)$ de l'apartat anterior. Determineu el valor màxim que pren $f(p)$ quan $p \geq 0$. [1 punt]

> **Pista.** És un problema d'optimització:
>
> - deriva $f(p)$ i resol $f'(p) = 0$;
> - queda't amb els valors de l'interval $[0, 1]$, perquè una probabilitat no en pot prendre d'altres;
> - comprova que el candidat és un màxim i no un mínim.