

Statistik II

Einheit 7: Regressionsmodelle mit Interaktionen

Sommersemester 2026 | Prof. Dr. Stephan Goerigk

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Wiederholung:

Effektarten:

1. Haupteffekt

- Haupteffekte beschreiben den Einfluss einer UV auf die AV unabhängig von anderen UVs (Konstanthaltung)

2. Interaktionseffekt

- Wechselwirkung zwei UVs/Pädiktoren (Interaktion) auf die AV

Abgrenzung zur mehrfaktoriellen ANOVA:

- Bei der ANOVA sind UVs immer kategorial (Mittelwertesvergleiche zw. Gruppen/Kategorien)
- Im Regressionsmodell können kategoriale und stetige UVs verwendet und auch kombiniert werden

→ Im multiplen Regressionsmodell sind weitere Arten von Interaktionen möglich

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Mögliche Interaktionen von 2 Prädiktoren im multiplen Regressionsmodell

Die Regression erlaubt alle Kombinationen von Prädiktorentypen (Erweiterung des multiplen Regressionsmodells):

1. stetig x stetig
2. stetig x diskret
3. diskret x diskret

→ Dabei dürfen die diskreten Prädiktoren 2 oder ≥ 2 Stufen haben.

Zum Vergleich - ANOVA erlaubt lediglich die Prüfung einer Art von Interaktion:

1. diskret x diskret

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

- Datensatz für $N = 52$ Therapeut:innen
- **Forschungsfrage:** Was kann als Prädiktor für Therapieerfolg gelten? Gibt es Interaktionen?
- Es wurden folgende Variablen gemessen:
 - Therapieerfolg (AV; 0-100 Punkte)
 - Therapieerfahrung der Therapeut:in (UV; niedrig, hoch)
 - Bereitschaft Patient:in zu konfrontieren (UV 0-100 Punkte)
 - Empathiefähigkeit der Therapeut:in (UV; niedrig, hoch)
 - IQ der Therapeut:in (UV; $\mu = 100, \sigma = 15$)
- Die ersten 15 Fälle sind in der Tabelle rechts dargestellt.

Therapieerfolg	Erfahrung	Konfrontativ	Empathie	IQ
89	hoch	61	niedrig	88
54	niedrig	48	hoch	125
62	hoch	23	niedrig	108
36	niedrig	69	niedrig	77
54	niedrig	53	niedrig	90
77	hoch	39	niedrig	87
41	niedrig	62	niedrig	125
46	niedrig	62	niedrig	114
54	niedrig	61	hoch	95
71	hoch	58	hoch	109
50	niedrig	56	niedrig	92
75	hoch	44	hoch	96
51	niedrig	39	hoch	87
66	niedrig	38	hoch	93
73	hoch	32	niedrig	125

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

Kodierung der diskreten Variablen:

Erinnerung - Diskrete Variablen werden im Regressionsmodell dummy-kodiert:

- Therapieerfahrung (rechts dargestellt)
 - niedrig = 0 (Referenz)
 - hoch = 1
- Empathiefähigkeit
 - niedrig = 0 (Referenz)
 - hoch = 1

→ Im Modell berechnete Steigung (b) repräsentiert durchschnittlichen Unterschied in AV, wenn Person nicht zu Referenzkategorie gehört

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -22.720  -6.753  -1.786   6.497  20.148
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value      Pr(>|t|)
## (Intercept)    51.720      1.955  26.453 < 0.0000000000000002 ***
## Erfahrunghoch   23.132      2.713   8.525  0.00000000000259 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.776 on 50 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5924,    Adjusted R-squared:  0.5843
## F-statistic: 72.68 on 1 and 50 DF,  p-value: 0.00000000002591
```

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

Kodierung der diskreten Variablen:

Interpretation der Koeffizienten:

- Theapeut:innen mit niedriger Erfahrung (Erfahrung = 0) haben Therapieerfolg von 51.72 Punkten.
- Theapeut:innen mit hoher Erfahrung (Erfahrung = 1) haben 23.13 Punkte Therapieerfolg mehr.
- Theapeut:innen mit hoher Erfahrung (Erfahrung = 1) haben Therapieerfolg von $51.72 + 23.13 = 74.85$ Punkte

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -22.720  -6.753  -1.786   6.497  20.148
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    51.720     1.955  26.453 < 0.0000000000000002 ***
## Erfahrunghoch    23.132     2.713   8.525  0.00000000000259 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.776 on 50 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5924,    Adjusted R-squared:  0.5843
## F-statistic: 72.68 on 1 and 50 DF,  p-value: 0.000000000002591
```

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

Modell mit 2 Prädiktoren: Erfahrung und Konfrontationsbereitschaft:

1. Multiples Regressionsmodell ohne Interaktion (diskret + stetig):

$$Y_i = a + b_1 \cdot X_{i1} + b_2 \cdot X_{i2} + \epsilon_i$$

$$Erfolg = b_1 \cdot Erfahrung_{(hoch)} + b_2 \cdot Konfrontationsb. + \epsilon_i$$

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

$$Y_i = a + b_1 \cdot X_{i1} + b_2 \cdot X_{i2} + b_3 \cdot (X_{i1} \cdot X_{i2}) + \epsilon_i$$

$$Erfolg = b_1 \cdot Erfahrung_{(hoch)} + b_2 \cdot Konfrontationsb. + b_3 \cdot (Erfahrung_{(hoch)} \cdot Konfrontationsb.) + \epsilon_i$$

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

1. Multiples Regressionsmodell ohne Interaktion (diskret + stetig):

Mögliche Forschungsfragen im Modell:

1. Besteht ein Unterschied zwischen unerfahrenen und erfahrenen Therapeut:innen hinsichtlich des Therapieerfolgs? → Steigung Erfahrung
2. Verändert sich der Therapieerfolg mit zunehmender Konfrontationsbereitschaft? → Steigung Konfrontationsbereitschaft
3. Wie viel Varianz der AV (Therapieerfolg) kann das Gesamtmodell mit beiden Prädiktoren erklären → Bestimmtheitsmaß R^2

→ Für Fragen 1 und 2 wird der jeweils andere Prädiktor konstant gehalten.

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

1. Multiples Regressionsmodell ohne Interaktion (diskret + stetig):

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung + Konfrontativ, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung + Konfrontativ, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -26.0175  -5.7825  -0.4526   4.4386  18.8281
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value      Pr(>|t|)
## (Intercept)  44.67633    4.19638   10.646 0.0000000000000242 ***
## Erfahrunghoch 23.64821    2.66084    8.887 0.00000000000086793 ***
## Konfrontativ  0.14565    0.07729    1.884    0.0655 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.536 on 49 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.62,    Adjusted R-squared:  0.6045
## F-statistic: 39.97 on 2 and 49 DF,  p-value: 0.00000000005077
```

Interpretation der Koeffizienten:

- Y-Achsenabschnitt (aka. Intercept, α): Therapeut:innen mit Erfahrung = 0 (niedrig) und Konfrontationsbereitschaft = 0 haben 44.68 Punkte Therapieerfolg.
- Mit 1 Einheit mehr Erfahrung (1 = hoch) haben Therapeut:innen 23.65 Punkte zusätzlichen Therapieerfolg (bei Konstanthaltung von Konfrontationsbereitschaft).
- Mit 1 Einheit mehr Konfrontationsbereitschaft haben Therapeut:innen 0.15 Punkte zusätzlichen Therapieerfolg (bei Konstanthaltung von Erfahrung).

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

1. Multiples Regressionsmodell ohne Interaktion (diskret + stetig):

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung + Konfrontativ, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung + Konfrontativ, data = df)
##
## Residuals:
```

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-26.0175	-5.7825	-0.4526	4.4386	18.8281

```
##
## Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	44.67633	4.19638	10.646	0.0000000000000242 ***
Erfahrunghoch	23.64821	2.66084	8.887	0.00000000000086793 ***
Konfrontativ	0.14565	0.07729	1.884	0.0655 .

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.536 on 49 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.62,    Adjusted R-squared:  0.6045
## F-statistic: 39.97 on 2 and 49 DF,  p-value: 0.00000000005077
```

Interpretation der Koeffizienten:

- Bei Konstanthaltung von Konfrontationsbereitschaft ist Erfahrung signifikant mit Therapieerfolg assoziiert ($t(49) = 8.89, p < .001$).
- Bei Konstanthaltung von Erfahrung ist Konfrontationsbereitschaft nicht signifikant mit Therapieerfolg assoziiert ($t(49) = 1.89, p = .066$).
- Das Gesamtmodell kann 62% der Varianz des Therapieerfolgs erklären ($R^2 = .62$).

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

1. Multiples Regressionsmodell ohne Interaktion (diskret + stetig):

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung + Konfrontativ, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung + Konfrontativ, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -26.0175  -5.7825  -0.4526   4.4386  18.8281
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value      Pr(>|t|)
## (Intercept)  44.67633    4.19638   10.646 0.0000000000000242 ***
## Erfahrunghoch 23.64821    2.66084    8.887 0.00000000000086793 ***
## Konfrontativ  0.14565    0.07729    1.884    0.0655 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.536 on 49 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.62,    Adjusted R-squared:  0.6045
## F-statistic: 39.97 on 2 and 49 DF,  p-value: 0.00000000005077
```

Berechnung der Konfidenzintervalle:



```
confint(model)
```

```
##              2.5 %      97.5 %
## (Intercept)  36.243399754  53.1092660
## Erfahrunghoch 18.301052243  28.9953688
## Konfrontativ -0.009678479   0.3009798
```

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

1. Multiples Regressionsmodell ohne Interaktion (diskret + stetig):



Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

Achtung: Unterschiedliche Steigungsparameter für selben Prädiktor (Erfahrung) nach Hinzunahme weiterer Prädiktoren

```
modell1 = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung, data = df)
summary(modell1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -22.720  -6.753  -1.786   6.497  20.148
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value      Pr(>|t|)
## (Intercept)    51.720      1.955   26.453 < 0.0000000000000002 ***
## Erfahrunghoch  23.132      2.713    8.525  0.000000000000259 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.776 on 50 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5924,    Adjusted R-squared:  0.5843
## F-statistic: 72.68 on 1 and 50 DF,  p-value: 0.00000000002591
```

```
modell2 = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung + Konfrontativ, data = df)
summary(modell2)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung + Konfrontativ, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -26.0175  -5.7825  -0.4526   4.4386  18.8281
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value      Pr(>|t|)
## (Intercept)    44.67633      4.19638   10.646 0.000000000000000242 ***
## Erfahrunghoch  23.64821      2.66084    8.887 0.00000000000086793 ***
## Konfrontativ    0.14565      0.07729    1.884    0.0655 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.536 on 49 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.62,    Adjusted R-squared:  0.6045
## F-statistic: 39.97 on 2 and 49 DF,  p-value: 0.00000000005077
```

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

Achtung: Unterschiedliche Steigungsparameter für selben Prädiktor (Erfahrung) nach Hinzunahme weiterer Prädiktoren

- Steigungsparameter unterscheiden sich marginal:
 - Modell ohne Konfrontationsbereitschaft: $b_{Erfahrung=hoch} = 23.13$
 - Modell mit Konfrontationsbereitschaft $b_{Erfahrung=hoch} = 23.65$

Begründung:

- Im zweiten Modell ist der Steigungsparameter von Erfahrung für den Einfluss von Konfrontationsbereitschaft **kontrolliert** (Einfluss wurde herausgerechnet)
- Man spricht dann bei der Konfrontationsbereitschaft von einer **Kovariaten** (Kontrollvariable)

Regressionsmodelle mit Interaktionen


Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

Mögliche Forschungsfragen im Modell:

1. Verändert sich der Therapieerfolg von unerfahrenen Therapeut:innen mit zunehmender Konfrontationsbereitschaft?
2. Verändert sich der Therapieerfolg von erfahrenen Therapeut:innen mit zunehmender Konfrontationsbereitschaft?
3. Ist der Effekt der Konfrontationsbereitschaft auf den Therapieerfolg in den Gruppen signifikant unterschiedlich?

→ Die dritte Frage stellt eine sog. Moderationshypothese dar (rechts dargestellt)



- AV: Therapieerfolg
- UV: Konfrontationsbereitschaft
- Moderator: Erfahrung

Moderation: *Beeinflusst die Erfahrung den Effekt der Konfrontationsbereitschaft auf den Therapieerfolg?*

(Beispielserklärung: Erfahrenere Therapeut:innen können besser konfrontieren.)

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
##
## Residuals:
```

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-13.0279	-4.6580	-0.1674	4.3870	19.0061

```
##
## Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	73.1303	5.3550	13.657	< 0.0000000000000002 ***
Erfahrunghoch	-15.2556	6.2921	-2.425	0.019140 *
Konfrontativ	-0.4427	0.1069	-4.143	0.000138 ***
Erfahrunghoch:Konfrontativ	0.8216	0.1263	6.507	0.000000042 ***

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 7.023 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7981,    Adjusted R-squared:  0.7855
## F-statistic: 63.24 on 3 and 48 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
```

Interpretation der Koeffizienten:

- Therapeut:innen mit niedriger Erfahrung (Erfahrung=0) haben bei einer Konfrontationsbereitschaft = 0 einen geschätzten Therapieerfolg von 73.13 Punkten
- Therapeut:innen mit hoher Erfahrung (Erfahrung=1) haben bei einer Konfrontationsbereitschaft = 0 einen geschätzten Therapieerfolg von -15.26 Punkten weniger, als die Referenzgruppe

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -13.0279  -4.6580  -0.1674   4.3870  19.0061
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      73.1303     5.3550  13.657 < 0.0000000000000002 ***
## Erfahrunghoch     -15.2556     6.2921  -2.425   0.019140 *
## Konfrontativ       -0.4427     0.1069  -4.143   0.000138 ***
## Erfahrunghoch:Konfrontativ  0.8216     0.1263   6.507   0.000000042 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 7.023 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7981,    Adjusted R-squared:  0.7855
## F-statistic: 63.24 on 3 and 48 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
```

Interpretation der Koeffizienten:

- Mit 1 Einheit zusätzlicher Konfrontationsbereitschaft nimmt der Therapieerfolg von Therapeut:innen mit niedriger Erfahrung um -0.44 Punkte ab ($t(48) = -4.14, p < .001$).
- Mit 1 Einheit zusätzlicher Konfrontationsbereitschaft nimmt der Therapieerfolg von Therapeut:innen mit hoher Erfahrung um 0.82 Punkte mehr zu, als bei der Referenzgruppe ($t(48) = 6.51, p < .001$).
- Insgesamt nimmt der Therapieerfolg bei von Therapeut:innen mit hoher Erfahrung mit 1 Einheit zusätzlicher Konfrontationsbereitschaft also um $-0.44 + 0.82 = 0.38$ Punkte zu

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -13.0279  -4.6580  -0.1674   4.3870  19.0061
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      73.1303     5.3550  13.657 < 0.0000000000000002 ***
## Erfahrunghoch     -15.2556     6.2921  -2.425   0.019140 *
## Konfrontativ       -0.4427     0.1069  -4.143   0.000138 ***
## Erfahrunghoch:Konfrontativ  0.8216     0.1263   6.507   0.000000042 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 7.023 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7981,    Adjusted R-squared:  0.7855
## F-statistic: 63.24 on 3 and 48 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
```

Berechnung der Konfidenzintervalle:

```
confint(model)
```

```
##              2.5 %      97.5 %
## (Intercept)      62.3634902  83.897191
## Erfahrunghoch     -27.9066443 -2.604596
## Konfrontativ      -0.6575726 -0.227884
## Erfahrunghoch:Konfrontativ  0.5676853  1.075428
```

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -13.0279  -4.6580  -0.1674   4.3870  19.0061
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      73.1303     5.3550  13.657 < 0.0000000000000002 ***
## Erfahrunghoch     -15.2556     6.2921  -2.425   0.019140 *
## Konfrontativ       -0.4427     0.1069  -4.143   0.000138 ***
## Erfahrunghoch:Konfrontativ  0.8216     0.1263   6.507   0.000000042 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 7.023 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7981,    Adjusted R-squared:  0.7855
## F-statistic: 63.24 on 3 and 48 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
```

Interpretation der Koeffizienten:

Moderationseffekt:

- Der Unterschied zwischen den Steigungen der Gruppen mit niedriger und hoher Erfahrung ist signifikant ($b = 0.82, t(48) = 6.51, p < .001$)

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
summary(model)
```


```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
##
## Residuals:
```

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-13.0279	-4.6580	-0.1674	4.3870	19.0061

```
##
## Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	73.1303	5.3550	13.657	< 0.0000000000000002 ***
Erfahrunghoch	-15.2556	6.2921	-2.425	0.019140 *
Konfrontativ	-0.4427	0.1069	-4.143	0.000138 ***
Erfahrunghoch:Konfrontativ	0.8216	0.1263	6.507	0.000000042 ***

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 7.023 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7981,    Adjusted R-squared:  0.7855
## F-statistic: 63.24 on 3 and 48 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
```



Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -13.0279  -4.6580  -0.1674   4.3870  19.0061
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      73.1303     5.3550  13.657 < 0.0000000000000002 ***
## Erfahrunghoch     -15.2556     6.2921  -2.425   0.019140 *
## Konfrontativ       -0.4427     0.1069  -4.143   0.000138 ***
## Erfahrunghoch:Konfrontativ  0.8216     0.1263   6.507   0.000000042 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 7.023 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7981,    Adjusted R-squared:  0.7855
## F-statistic: 63.24 on 3 and 48 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
```

Anmerkung:

- Output des Regressionsmodells enthält lediglich einen Signifikanztest für die Steigung der Referenzkategorie ($b_{Konfrontativ|Erfahrung=0} = -0.44, t(48) = -4.14, p < .001$)
- Steigung der anderen Gruppe lässt sich "per Hand" ausrechnen ($b_{Konfrontativ|Erfahrung=1} = -0.44 + 0.82 = 0.38$)
- Signifikanztest prüft jedoch nur, ob $b_{Konfrontativ|Erfahrung=0} \neq b_{Konfrontativ|Erfahrung=1}$ ($t(48) = 6.51, p < .001$), nicht ob ($b_{Erfahrung=1} \neq 0$)

→ Dafür müsste die Referenzkategorie getauscht werden, sodass hohe Erfahrung = 0 und niedrige Erfahrung = 1.

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ relevel(Erfahrung, "hoch") * Konfrontativ,
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ relevel(Erfahrung, "hoch") * Konfrontativ,
##     data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -13.0279  -4.6580  -0.1674   4.3870  19.0061
##
## Coefficients:
##                                Estimate Std. Error t value
## (Intercept)                   57.87472     3.30370   17.518
## relevel(Erfahrung, "hoch")niedrig 15.25562     6.29205    2.425
## Konfrontativ                   0.37883     0.06727    5.632
## relevel(Erfahrung, "hoch")niedrig:Konfrontativ -0.82156     0.12626   -6.507
##                                Pr(>|t|)
## (Intercept)                   < 0.0000000000000002 ***
## relevel(Erfahrung, "hoch")niedrig      0.0191 *
## Konfrontativ                       0.0000000911 ***
## relevel(Erfahrung, "hoch")niedrig:Konfrontativ 0.000000042 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 7.023 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7981    Adjusted R-squared:  0.7855
```

Anmerkung:

- Nun ist "hohe Erfahrung" die Referenzkategorie
- Y-Achsenabschnitt (Intercept) und Steigungen beziehen sich jetzt auf "hohe Erfahrung" = 0
- Signifikanztest für die Steigung der Referenzkategorie (hohe Erfahrung = 0) nun möglich
 $(b_{Konfrontativ|Erfahrung=0} = 0.38, t(48) = 5.63, p < .001)$

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

Die einzelnen Steigungen und deren KIs lassen sich jedoch auch automatisch anzeigen:

```
library(emmeans)
emtrends(model, pairwise ~ Erfahrung, var = "Konfrontativ")
```

```
## $emtrends
##   Erfahrung Konfrontativ.trend      SE df lower.CL upper.CL
##   niedrig          -0.443 0.1070 48    -0.658    -0.228
##   hoch             0.379 0.0673 48     0.244     0.514
##
## Confidence level used: 0.95
##
## $contrasts
##   contrast      estimate      SE df t.ratio p.value
##   niedrig - hoch    -0.822 0.126 48   -6.507  <.0001
```

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

Signifikanz kann auch mittels Omnibustest ermittelt werden:

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
anova(model)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Therapieerfolg
##
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
## Erfahrung	1	6945.8	6945.8	140.8252	0.00000000000000006985 ***
## Konfrontativ	1	322.9	322.9	6.5463	0.01372 *
## Erfahrung:Konfrontativ	1	2088.1	2088.1	42.3364	0.00000000420103645563 ***
## Residuals	48	2367.5	49.3		

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Für jeden Modellfaktor stellt sich die Frage: "*Erklärt das Modell mit diesem Faktor signifikant mehr Varianz als ohne den Faktor?*"

- Alle 3 Effekte (2 Haupeffekt + 1 Interaktion signifikant)
- Vorsicht: Bei signifikanter Interaktion muss bei Interpretation der Haupteffekte aufgepasst werden!

→ Haupteffekt Konfrontationsbereitschaft deutlich größerer p-Wert, da Effekt in beiden Gruppen gegenläufig (disordinale Interaktion)

Regressionsmodelle mit Interaktionen


Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x diskret) :

Mögliche Forschungsfragen im Modell:

1. Verändert sich der Therapieerfolg von unerfahrenen Therapeut:innen mit zunehmender Empathiefähigkeit?
2. Verändert sich der Therapieerfolg von erfahrenen Therapeut:innen mit zunehmender Empathiefähigkeit?
3. Ist der Effekt der Empathiefähigkeit auf den Therapieerfolg in den Gruppen signifikant unterschiedlich?

→ Die dritte Frage stellt eine sog. Moderationshypothese dar (rechts dargestellt)



- AV: Therapieerfolg
- UV: Empathiefähigkeit
- Moderator: Erfahrung

Moderation: *Beeinflusst die Erfahrung den Effekt der Empathiefähigkeit auf den Therapieerfolg?* (Beispielserklärung: Erfahrenere Therapeut:innen können Empathie besser ausdrücken.)

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x diskret) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Empathie, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * Empathie, data = df)
##
## Residuals:
```

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-19.875	-5.535	-1.665	6.795	18.546

```
##
## Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	48.8750	2.2992	21.258	< 0.0000000000000002 ***
Erfahrunghoch	21.5795	3.6021	5.991	0.000000259 ***
Empathiehoch	7.9028	3.8319	2.062	0.0446 *
Erfahrunghoch:Empathiehoch	-0.4823	5.2592	-0.092	0.9273

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.197 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6537,    Adjusted R-squared:  0.6321
## F-statistic: 30.21 on 3 and 48 DF,  p-value: 0.00000000004051
```

Interpretation der Koeffizienten:

- Therapeut:innen mit niedriger Erfahrung (Erfahrung=0) haben bei einer niedrigen Empathie (Empathie = 0) einen geschätzten Therapieerfolg von 48.88 Punkten
- Therapeut:innen mit hoher Erfahrung (Erfahrung=1) haben bei einer niedrigen Empathie (Empathie = 0) einen geschätzten Therapieerfolg von 21.58 Punkten mehr, als die Referenzgruppe

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x diskret) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Empathie, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * Empathie, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -19.875  -5.535  -1.665   6.795  18.546
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      48.8750     2.2992  21.258 < 0.0000000000000002 ***
## Erfahrunghoch      21.5795     3.6021   5.991  0.000000259 ***
## Empathiehoch       7.9028     3.8319   2.062   0.0446 *
## Erfahrunghoch:Empathiehoch -0.4823     5.2592  -0.092   0.9273
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.197 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6537,    Adjusted R-squared:  0.6321
## F-statistic: 30.21 on 3 and 48 DF,  p-value: 0.00000000004051
```

Interpretation der Koeffizienten:

- Mit 1 Einheit zusätzlicher Empathiefähigkeit (Empathie=hoch) nimmt der Therapieerfolg von Therapeut:innen mit niedriger Erfahrung um 7.9 Punkte zu ($t(48) = 2.06, p = .045$).
- Mit 1 Einheit zusätzlicher Empathiefähigkeit (Empathie=hoch) nimmt der Therapieerfolg von Therapeut:innen mit hoher Erfahrung um -0.48 Punkte weniger zu, als bei der Referenzgruppe ($t(48) = -0.09, p = .927$).
- Insgesamt nimmt der Therapieerfolg bei von Therapeut:innen mit hoher Erfahrung mit 1 Einheit zusätzlicher Empathiefähigkeit also um $7.9 + (-0.48) = 7.42$ Punkte zu.

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x diskret):

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Empathie, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * Empathie, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -19.875  -5.535  -1.665   6.795  18.546
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      48.8750     2.2992  21.258 < 0.0000000000000002 ***
## Erfahrunghoch      21.5795     3.6021   5.991  0.000000259 ***
## Empathiehoch       7.9028     3.8319   2.062   0.0446 *
## Erfahrunghoch:Empathiehoch -0.4823     5.2592  -0.092   0.9273
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.197 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6537,    Adjusted R-squared:  0.6321
## F-statistic: 30.21 on 3 and 48 DF,  p-value: 0.00000000004051
```

Berechnung der Konfidenzintervalle:

```
confint(model)
```

```
##              2.5 %    97.5 %
## (Intercept)      44.2522120  53.49779
## Erfahrunghoch      14.3370286  28.82206
## Empathiehoch       0.1981311  15.60742
## Erfahrunghoch:Empathiehoch -11.0566143  10.09197
```


Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x diskret) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Empathie, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * Empathie, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -19.875  -5.535  -1.665   6.795  18.546
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      48.8750     2.2992  21.258 < 0.0000000000000002 ***
## Erfahrunghoch      21.5795     3.6021   5.991  0.000000259 ***
## Empathiehoch       7.9028     3.8319   2.062   0.0446 *
## Erfahrunghoch:Empathiehoch -0.4823     5.2592  -0.092   0.9273
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.197 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6537,    Adjusted R-squared:  0.6321
## F-statistic: 30.21 on 3 and 48 DF,  p-value: 0.00000000004051
```



Regressionsmodelle mit Interaktionen


Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

Mögliche Forschungsfragen im Modell:

1. Verändert sich der Therapieerfolg von unerfahrenen Therapeut:innen mit zunehmendem IQ?
2. Verändert sich der Therapieerfolg von erfahrenen Therapeut:innen mit zunehmendem IQ?
3. Ist der Effekt des IQ auf den Therapieerfolg in den Gruppen signifikant unterschiedlich?

→ Die dritte Frage stellt eine sog. Moderationshypothese dar (rechts dargestellt)



- AV: Therapieerfolg
- UV: IQ
- Moderator: Erfahrung

Moderation: *Beeinflusst die Erfahrung den Effekt der Empathiefähigkeit auf den Therapieerfolg?* (Beispielserklärung: Erfahrenere Therapeut:innen können Intelligenz besser einsetzen / geringe Intelligenz kompensieren.)

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

```
df$IQ_cent = round(df$IQ - mean(df$IQ))

model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * IQ, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * IQ, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -22.096  -6.900  -1.909   6.275  20.129
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    64.1096    13.8693   4.622 0.0000288 ***
## Erfahrunghoch    10.4164    21.5182   0.484   0.631
## IQ             -0.1288     0.1428  -0.903   0.371
## Erfahrunghoch:IQ   0.1320     0.2125   0.621   0.537
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.894 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5992,    Adjusted R-squared:  0.5742
## F-statistic: 23.92 on 3 and 48 DF,  p-value: 0.000000001298
```

Interpretation der Koeffizienten:

- Therapeut:innen mit niedriger Erfahrung (Erfahrung=0) haben bei einem IQ von 0 einen geschätzten Therapieerfolg von 64.11 Punkten
- Therapeut:innen mit hoher Erfahrung (Erfahrung=1) haben bei einem IQ von 0 einen geschätzten Therapieerfolg von 10.42 Punkten mehr, als die Referenzgruppe

VORSICHT: Effekt von Erfahrung in diesem Modell nicht mehr signifikant ($t(48) = 0.48, p = .631$) - Wie kann dies sein?

→ IQ = 0 ist kein sinnvoller Wert! → Lösung: **Zentrierung** (folgt gleich)

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * IQ, data = df)
anova(model)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Therapieerfolg
##          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Erfahrung    1 6945.8   6945.8  70.9557 0.00000000005083 ***
## IQ           1   42.0    42.0   0.4291   0.5156
## Erfahrung:IQ  1   37.8    37.8   0.3859   0.5374
## Residuals   48 4698.7    97.9
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

- Im Omnibustest ist der Haupteffekt von Erfahrung signifikant ($F(1, 48) = 70.96, p < .001$)
- Der Faktor Erfahrung scheint also ein signifikantes Maß an Varianz zu erklären.
- Dennoch ist die Steigung nicht signifikant...

→ IQ = 0 ist kein sinnvoller Wert! → Lösung:
Zentrierung (nächste Folie)

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

Zentrierung - Prädiktoren ohne sinnhaften 0-Punkt:

- Einige Koeffizienten im Regressionsmodell gehen von Prädiktor = 0 aus
- Wenn 0 des Prädiktors kein sinnvoller Wert ist, wendet man eine Zentrierung an:

$$x_{izentriert} = x_i - \bar{x}$$

- Von jedem Wert wird der Mittelwert abgezogen (Grand-Mean Zentrierung)

Ergebnis: zentrierte Variable

- alle Werte, die genau dem Mittelwert entsprechen sind nun 0 (neuer Nullpunkt)
- Werte $> \bar{x}$ sind positiv
- Werte $< \bar{x}$ sind negativ

→ Beispiel: $x_{izentriert} = 2$ bedeutet 2 Einheiten mehr als der Durchschnitt

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

Zentrierung des IQ Prädiktors:

$$IQ_{i\text{zentriert}} = IQ_i - \bar{IQ}$$

- $\bar{IQ} = 100$ ist der neue Nullpunkt der Variable

→ Die neue 0 ist als "durchschnittlich intelliagent" interpretierbar

Therapieerfolg	Erfahrung	Konfrontativ	Empathie	IQ	IQ_cent
89	hoch	61	niedrig	88	-12
54	niedrig	48	hoch	125	25
62	hoch	23	niedrig	108	8
36	niedrig	69	niedrig	77	-23
54	niedrig	53	niedrig	90	-10
77	hoch	39	niedrig	87	-13
41	niedrig	62	niedrig	125	25
46	niedrig	62	niedrig	114	14
54	niedrig	61	hoch	95	-5
71	hoch	58	hoch	109	9
50	niedrig	56	niedrig	92	-8
75	hoch	44	hoch	96	-4
51	niedrig	39	hoch	87	-13
66	niedrig	38	hoch	93	-7
73	hoch	32	niedrig	125	25

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * IQ_cent, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * IQ_cent, data = df)
##
## Residuals:
```

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-22.096	-6.900	-1.909	6.275	20.129

```
##
## Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	51.2252	2.0533	24.948	< 0.0000000000000002 ***
Erfahrunghoch	23.6145	2.8651	8.242	0.000000000000951 ***
IQ_cent	-0.1288	0.1428	-0.903	0.371
Erfahrunghoch:IQ_cent	0.1320	0.2125	0.621	0.537

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.894 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5992,    Adjusted R-squared:  0.5742
## F-statistic: 23.92 on 3 and 48 DF,  p-value: 0.000000001298
```

Modell mit **zentriertem IQ** als Prädiktor:

Interpretation der Koeffizienten:

- Therapeut:innen mit niedriger Erfahrung (Erfahrung=0) haben bei einem durchschnittlichen IQ (IQ=0) einen geschätzten Therapieerfolg von 51.23 Punkten
- Therapeut:innen mit hoher Erfahrung (Erfahrung=1) haben bei einem durchschnittlichen IQ (IQ=0) einen geschätzten Therapieerfolg von 23.61 Punkten mehr, als die Referenzgruppe → Nun wieder signifikant ($t(48) = 8.24, p < .001$)

Regressionsmodelle mit Interaktionen


Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (diskret x stetig) :

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * IQ_cent, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * IQ_cent, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -22.096  -6.900  -1.909   6.275  20.129
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      51.2252     2.0533   24.948 < 0.0000000000000002 ***
## Erfahrunghoch      23.6145     2.8651    8.242  0.000000000000951 ***
## IQ_cent          -0.1288     0.1428   -0.903    0.371
## Erfahrunghoch:IQ_cent  0.1320     0.2125    0.621    0.537
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.894 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5992,    Adjusted R-squared:  0.5742
## F-statistic: 23.92 on 3 and 48 DF,  p-value: 0.000000001298
```

Für Visualisierung muss IQ diskret gemacht werden (z.B. unter Durchschnitt, Durchschnitt, über Durchschnitt):



Regressionsmodelle mit Interaktionen


Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (stetig x stetig) :

Mögliche Forschungsfragen im Modell:

1. Verändert sich der Therapieerfolg von konfrontativeren Therapeut:innen mit zunehmendem IQ?

→ Diese Frage stellt eine sog. Moderationshypothese dar (rechts dargestellt)



- AV: Therapieerfolg
- UV: IQ
- Moderator: Erfahrung

Moderation: *Beeinflusst die Intelligenz den Effekt der Konfrontationsfähigkeit auf den Therapieerfolg?*

(Beispielserklärung: Intelligenterer Therapeut:innen können besser konfrontieren.)

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

2. Multiples Regressionsmodell mit Interaktion (stetig x stetig) :

```
df$IQ_cent = round(df$IQ - mean(df$IQ))

model = lm(Therapieerfolg ~ Konfrontativ * IQ, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Konfrontativ * IQ, data = df)
##
## Residuals:
```

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-35.991	-11.893	2.257	9.898	29.475

```
##
## Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	111.630738	49.145301	2.271	0.0276 *
Konfrontativ	-1.407004	1.000679	-1.406	0.1662
IQ	-0.495811	0.477318	-1.039	0.3041
Konfrontativ:IQ	0.014410	0.009679	1.489	0.1431

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 15.03 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.07545,    Adjusted R-squared:  0.01766
## F-statistic: 1.306 on 3 and 48 DF,  p-value: 0.2834
```

Interpretation der Koeffizienten:

- Therapeut:innen mit niedriger Konfrontativität (Konfrontativ=0) haben bei einem IQ von 0 einen geschätzten Therapieerfolg von 111.63 Punkten
- Therapeut:innen mit 1 Einheit zusätzlicher Konfrontativität haben zusätzlichen Therapieerfolg von -1.41 Punkten, im Vergleich zur Referenzgruppe
- Therapeut:innen mit 1 Einheit zusätzlichem IQ haben zusätzlichen Therapieerfolg von -0.5 Punkten, im Vergleich zur Referenzgruppe
- Therapeut:innen mit 1 Einheit zusätzlichem IQ haben bei Zunahme um 1 Punkt Konfrontativität eine zusätzliche Steigung von 0.014 Punkten.

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

Diskrete Prädiktoren mit > 2 Stufen:

Nehmen wir einmal an, Erfahrung der Therapeut:innen würde 3-stufig definiert:

- niedrig = 0 (Referenz)
- mittel = 1
- hoch = 2

Therapieerfolg	Erfahrung	Konfrontativ	Empathie	IQ
52	mittel	61	niedrig	84
50	niedrig	48	niedrig	94
61	hoch	23	niedrig	86
33	niedrig	69	niedrig	139
50	niedrig	53	niedrig	126
51	mittel	39	hoch	100
89	hoch	62	hoch	118
38	niedrig	62	niedrig	96
78	hoch	61	hoch	100
80	hoch	58	hoch	95
46	niedrig	56	hoch	94
73	hoch	44	niedrig	135
61	niedrig	39	hoch	105
65	hoch	38	hoch	108
42	mittel	32	hoch	107

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

Diskrete Prädiktoren mit > 2 Stufen:

Dummy-Kodierung: Zerlegung der 3-stufigen in zwei 2-stufige Dummy Variablen:

Dummy-Variable 1:

- niedrig = 0 (Referenz)
- mittel = 1

Dummy-Variable 2:

- niedrig = 0 (Referenz)
- hoch = 1

Modell mit Dummy-Kodierung:

$$\begin{aligned} \text{Erfolg} = & b_1 \cdot \text{Erfahrung}_{(\text{mittel})} + b_2 \cdot \text{Erfahrung}_{(\text{hoch})} + b_3 \cdot \text{Konfrontationsb.} \dots \\ & \dots + b_4 \cdot (\text{Erfahrung}_{(\text{mittel})} \cdot \text{Konfrontationsb.}) + b_5 \cdot (\text{Erfahrung}_{(\text{hoch})} \cdot \text{Konfrontationsb.}) + \epsilon_i \end{aligned}$$


Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

Diskrete Prädiktoren mit > 2 Stufen:

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -18.7144  -5.1562  -0.1617   5.2746  19.2377
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      71.4295     7.1862   9.940 0.000000000000493 ***
## Erfahrungmittel    -20.2295     8.5970  -2.353   0.02295 *
## Erfahrunghoch     -18.2173     9.7180  -1.875   0.06721 .
## Konfrontativ       -0.4322     0.1511  -2.860   0.00635 **
## Erfahrungmittel:Konfrontativ  0.4128     0.1791   2.305   0.02572 *
## Erfahrunghoch:Konfrontativ  0.8832     0.1962   4.503 0.000045661383946 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 8.376 on 46 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7173,    Adjusted R-squared:  0.6866
## F-statistic: 23.34 on 5 and 46 DF,  p-value: 0.00000000001343
```



Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

Diskrete Prädiktoren mit > 2 Stufen:

```
model = lm(Therapieerfolg ~ Erfahrung * Konfrontativ, data = df)
anova(model)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Therapieerfolg
##
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Erfahrung	2	6698.9	3349.4	47.746	0.0000000000005978 ***
Konfrontativ	1	19.8	19.8	0.282	0.5979430
Erfahrung:Konfrontativ	2	1469.2	734.6	10.472	0.0001787 ***
Residuals	46	3227.0	70.2		

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

- Der Omnibustest funktioniert wie bei der ANOVA (≥ 2 Stufen)
- Alle 3 Steigungen werden simultan auf Signifikanz getestet
- So wird eine α –Fehlerkumulierung verhindert
- Welche Steigungen sich genau zwischen den Gruppen unterscheiden, lässt sich mit Post-Hoc Trend-Vergleichen prüfen (nächste Folie)

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

Diskrete Prädiktoren mit > 2 Stufen:

```
emtrends(model, pairwise ~ Erfahrung, var = "Konfrontativ")
```

```
## $emtrends
##   Erfahrung Konfrontativ.trend      SE df lower.CL upper.CL
##   niedrig      -0.4322 0.1510 46    -0.736   -0.128
##   mittel      -0.0194 0.0961 46    -0.213    0.174
##   hoch         0.4510 0.1250 46     0.199    0.703
##
## Confidence level used: 0.95
##
## $contrasts
##   contrast      estimate      SE df t.ratio p.value
##   niedrig - mittel  -0.413 0.179 46   -2.305  0.0651
##   niedrig - hoch    -0.883 0.196 46   -4.503  0.0001
##   mittel - hoch     -0.470 0.158 46   -2.983  0.0124
##
## P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
```

- Bei Therapeut:innen mit hoher Erfahrung steigt Therapieerfolg mit zunehmender Konfrontationsbereitschaft signifikant an.
- Bei Therapeut:innen mit mittlerer Erfahrung nimmt Therapieerfolg mit zunehmender Konfrontationsbereitschaft nicht signifikant ab.
- Bei Therapeut:innen mit niedriger Erfahrung nimmt Therapieerfolg mit zunehmender Konfrontationsbereitschaft signifikant ab.

Regressionsmodelle mit Interaktionen

Beispiel: Faktoren für Erfolg einer Therapie

Diskrete Prädiktoren mit > 2 Stufen:

```
emtrends(model, pairwise ~ Erfahrung, var = "Konfrontativ")
```

```
## $emtrends
##   Erfahrung Konfrontativ.trend      SE df lower.CL upper.CL
##   niedrig      -0.4322 0.1510 46    -0.736   -0.128
##   mittel      -0.0194 0.0961 46    -0.213    0.174
##   hoch         0.4510 0.1250 46     0.199    0.703
##
## Confidence level used: 0.95
##
## $contrasts
##   contrast      estimate      SE df t.ratio p.value
##   niedrig - mittel  -0.413 0.179 46   -2.305  0.0651
##   niedrig - hoch    -0.883 0.196 46   -4.503  0.0001
##   mittel - hoch     -0.470 0.158 46   -2.983  0.0124
##
## P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
```

- $b_{Konfrontativ|Erfahrung=hoch}$ unterscheidet sich signifikant von ($b_{Konfrontativ|Erfahrung=niedrig}$ ($p < .001$) und $b_{Konfrontativ|Erfahrung=mittel}$ ($p = .012$))
- $b_{Konfrontativ|Erfahrung=niedrig}$ und $b_{Konfrontativ|Erfahrung=mittel}$ unterscheiden sich nicht signifikant ($p = .065$)
- P-Werte sind Tukey-korrigiert, um Typ-I Fehler zu kontrollieren

Multiple Regression mit Interaktion – stetig x stetig

Berichten der Ergebnisse nach APA

Depressivität gemessen durch BDI-II (Beck Depressions Inventar-II)

Kindheitstrauma gemessen durch CTQ (Childhood Trauma Questionnaire)

Resilienz gemessen durch CD-RISC (Connor-Davidson Resilience Scale)

Die Prädiktoren wurden für eine bessere Interpretierbarkeit **zentriert**.

```
##
## Call:
## lm(formula = BDI ~ CTQ_c * CDRISC_c, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -28.6606 -13.7076  -0.5533  12.8185  29.0597
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  25.562525   0.912900   28.001  <2e-16 ***
## CTQ_c         0.127812   0.046540    2.746  0.0064 **
## CDRISC_c      -0.097395   0.041764   -2.332  0.0204 *
## CTQ_c:CDRISC_c -0.056800   0.002208  -25.727  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 15.75 on 296 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6966,    Adjusted R-squared:  0.6935
## F-statistic: 226.5 on 3 and 296 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Statistischer Bericht: (In Ihrer Klausur)

Wenn Sie in Ihrer Klausur den Output einer multiplen Regression mit Interaktion berichten sollen, könnte dies so aussehen:

Eine multiple Regression mit Interaktion mit den Prädiktoren Kindheitstrauma sowie Resilienz und dem Kriterium Depressivität wurde durchgeführt. Der Prädiktor Kindheitstrauma sagt unter Konstanthaltung von Resilienz Depressivität signifikant vorher, $b = 0.13$, $t(296) = 2.75$, $p = .006$. Auch der Prädiktor Resilienz ist bei Konstanthaltung von Kindheitstrauma signifikant mit Depressivität assoziiert, $b = -0.10$, $t(296) = -2.33$, $p = .020$. Es zeigt sich ein signifikanter Moderationseffekt, $b = -0.06$, $t(296) = -25.73$, $p < .001$. Das Gesamtmodell erklärt einen signifikanten Anteil der Varianz in der AV Depressivität, $F(3, 296) = 226.5$, $p < .001$, $R^2 = .70$.

Multiple Regression mit Interaktion – stetig x stetig

Inhaltliche Interpretation der Modellparameter

Depressivität gemessen durch BDI-II (Beck Depressions Inventar-II)

Kindheitstrauma gemessen durch CTQ (Childhood Trauma Questionnaire)

Resilienz gemessen durch CD-RISC (Connor-Davidson Resilience Scale)

Die Prädiktoren wurden für eine bessere Interpretierbarkeit **zentriert**.

```
##
## Call:
## lm(formula = BDI ~ CTQ_c * CDRISC_c, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -28.6606 -13.7076  -0.5533  12.8185  29.0597
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  25.562525   0.912900   28.001  <2e-16 ***
## CTQ_c         0.127812   0.046540    2.746   0.0064 **
## CDRISC_c      -0.097395   0.041764   -2.332   0.0204 *
## CTQ_c:CDRISC_c -0.056800   0.002208  -25.727  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 15.75 on 296 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6966,    Adjusted R-squared:  0.6935
## F-statistic: 226.5 on 3 and 296 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Inhaltliche Interpretation

Intercept: Eine Person mit durchschnittlichen Werten auf Kindheitstrauma und Resilienz (aufgrund der Zentrierung) hätte einen erwarteten Depressionswert von 25.56.

Kindheitstrauma: Bei einer zusätzlichen Einheit Kindheitstrauma steigt die durchschnittliche Depressivität um 0.13 Einheiten (Unter Konstanthaltung von Resilienz).

Resilienz: Wenn die Resilienz um eine Einheit zunimmt, sinkt die erwartete Depressivität um 0.10 Einheiten (Unter Konstanthaltung von Kindheitstrauma).

Interaktionseffekt: Mit zunehmender Resilienz verringert sich der positive Effekt von Kindheitstrauma auf Depressivität. Resilienz wirkt damit als Moderator und schwächt den Zusammenhang zwischen Kindheitstrauma und Depressivität ab.

Multiple Regression mit Interaktion – diskret x stetig

Berichten der Ergebnisse nach APA

Kriterium: **Depressivität**

Prädiktor 1: **Schlafqualität** (stetig)

Prädiktor 2: **Therapiegruppe** (diskret: Warteliste / Psychotherapie)

```
##
## Call:
## lm(formula = Depressivität ~ Schlafqualität * Gruppe, data = data)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -7.4422 -2.0718 -0.0871  2.0012  7.8608
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      26.4732     0.9550   27.719 < 2e-16 ***
## Schlafqualität     -2.2688     0.2193  -10.344 < 2e-16 ***
## GruppePsychotherapie -5.1317     1.5693   -3.270  0.00127 **
## Schlafqualität:GruppePsychotherapie -1.6370     0.3016   -5.427 1.68e-07 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.988 on 196 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9242,    Adjusted R-squared:  0.9231
## F-statistic: 796.8 on 3 and 196 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Statistischer Bericht: (In Ihrer Klausur)

Wenn Sie in Ihrer Klausur den Output einer multiplen Regression mit Interaktion berichten sollen, könnte dies so aussehen:

Eine multiple lineare Regression mit Interaktion wurde durchgeführt, um die Effekte von Schlafqualität und Therapiegruppe (Warteliste vs. Psychotherapie) auf Depressivität zu untersuchen. Der Prädiktor Schlafqualität sagte innerhalb der Wartelistengruppe die Depressivität signifikant vorher, $b = -2.27$, $t(196) = -10.34$, $p < .001$. Auch der Prädiktor Gruppenzugehörigkeit erwies sich als signifikant, $b = -5.13$, $t(196) = -3.27$, $p = .001$. Es zeigt sich ein signifikanter Moderationseffekt, $b = -1.64$, $t(196) = -5.43$, $p < .001$. Das Gesamtmodell erklärt einen signifikanten Anteil der Varianz in der AV Depressivität, $F(3, 196) = 796.8$, $p < .001$, $R^2 = .92$.

Multiple Regression mit Interaktion – diskret x stetig

Inhaltliche Interpretation der Modellparameter

Kriterium: **Depressivität**

Prädiktor 1: **Schlafqualität** (stetig)

Prädiktor 2: **Therapiegruppe** (diskret: Warteliste / Psychotherapie)

```
##
## Call:
## lm(formula = Depressivität ~ Schlafqualität * Gruppe, data = data)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -7.4422 -2.0718 -0.0871  2.0012  7.8608
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      26.4732     0.9550  27.719 < 2e-16 ***
## Schlafqualität    -2.2688     0.2193 -10.344 < 2e-16 ***
## GruppePsychotherapie -5.1317     1.5693  -3.270 0.00127 **
## Schlafqualität:GruppePsychotherapie -1.6370     0.3016  -5.427 1.68e-07 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.988 on 196 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9242,    Adjusted R-squared:  0.9231
## F-statistic: 796.8 on 3 and 196 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Inhaltliche Interpretation

Intercept: Eine Person aus der Warteliste (Gruppe = 0) hätte bei einer Schlafqualität von 0 eine erwartete Depressivität von 26.47.

Schlafqualität: Wenn bei einer Person aus der Wartelistengruppe die Schlafqualität um eine Einheit zunimmt, sinkt die erwartete Depressivität um 2.27 Einheiten.

Therapiegruppe: Der Mittelwertsunterschied in der Depressivität zwischen den beiden Therapiegruppe (Warteliste vs. Psychotherapie) liegt bei Konstanthaltung der Schlafqualität bei -5.13

Interaktionseffekt: Wenn bei einer Person aus der Psychotherapiegruppe (Gruppe = 1) die Schlafqualität um eine Einheit zunimmt, sinkt die Depressivität um 1.64 Einheiten mehr als in der Referenzgruppe (Gruppe = 0), also insgesamt um $-2.27 - 1.64 = -3.91$ Einheiten.

Multiple Regression mit Interaktion – diskret x diskret

Berichten der Ergebnisse nach APA

Kriterium: **Testergebnis**

Prädiktor 1: **Lernstrategie** (diskret: Lernstrategie A / Lernstrategie B)

Prädiktor 2: **Motivation** (diskret: niedrig / hoch)

```
##
## Call:
## lm(formula = Testergebnis ~ Lernstrategie * Motivation, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -16.9633  -4.4815   0.3779   4.2736  14.0876
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      59.720      1.075   55.559 < 2e-16 ***
## LernstrategieB    9.416      1.510    6.236 4.58e-09 ***
## MotivationHoch     5.534      1.542    3.588 0.000454 ***
## LernstrategieB:MotivationHoch  5.853      2.114    2.768 0.006362 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 6.449 on 146 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6044,    Adjusted R-squared:  0.5962
## F-statistic: 74.34 on 3 and 146 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Statistischer Bericht: (In Ihrer Klausur)

Wenn Sie in Ihrer Klausur den Output einer multiplen Regression mit Interaktion berichten sollen, könnte dies so aussehen:

Eine multiple lineare Regression mit Interaktion wurde durchgeführt, um die Effekte von Lernstrategien (A vs. B) und Motivation (niedrig vs. hoch) auf das Testergebnis zu untersuchen. Sowohl der Prädiktor Lernstrategie, $b = 9.41$, $t(146) = 6.24$, $p < .001$., als auch der Prädiktor Motivation, $b = 5.53$, $t(146) = 3.59$, $p < .001$, konnten das Testergebnis signifikant vorhersagen. Es zeigt sich ein signifikanter Moderationseffekt, $b = 5.85$, $t(146) = 2.77$, $p = .006$. Das Gesamtmodell erklärte einen signifikanten Anteil der Varianz im Testergebnis, $F(3, 146) = 796.8$, $p < .001$, $R^2 = .92$.

Multiple Regression mit Interaktion – diskret x diskret

Inhaltliche Interpretation der Modellparameter

Kriterium: **Testergebnis**

Prädiktor 1: **Lernstrategie** (diskret: Lernstrategie A / Lernstrategie B)

Prädiktor 2: **Motivation** (diskret: niedrig / hoch)

```
##
## Call:
## lm(formula = Testergebnis ~ Lernstrategie * Motivation, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -16.9633  -4.4815   0.3779   4.2736  14.0876
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      59.720      1.075  55.559  < 2e-16 ***
## LernstrategieB      9.416      1.510   6.236 4.58e-09 ***
## MotivationHoch      5.534      1.542   3.588 0.000454 ***
## LernstrategieB:MotivationHoch  5.853      2.114   2.768 0.006362 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 6.449 on 146 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6044,    Adjusted R-squared:  0.5962
## F-statistic: 74.34 on 3 and 146 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Inhaltliche Interpretation

Intercept: Das durchschnittliche Testergebnis von Proband:innen mit Lernstrategie A und niedriger Motivation lag bei 59.72

Gruppenmittelwerte: Das durchschnittliche Testergebnis von Proband:innen mit Lernstrategie B und niedriger Motivation war um 9.42 Einheiten höher als in der Referenzgruppe (Lernstrategie A & niedrige Motivation) und lag bei $59.72 + 9.42 = 69.14$

Das durchschnittliche Testergebnis von Proband:innen mit Lernstrategie A und hoher Motivation war um 5.53 Einheiten höher als in der Referenzgruppe (Lernstrategie A & niedrige Motivation) und lag bei $59.72 + 5.53 = 65.25$

Für Proband:innen mit Lernstrategie B und hoher Motivation ergab sich ein geschätzter Mittelwert von 80.52 ($59.72 + 9.42 + 5.53 + 5.85$)

- Die Regression erlaubt **alle Kombinationen** von [stetig x stetig], [diskret x diskret] und [stetig x diskret] Prädiktoren.
- Testung des Interaktionseffekt entspricht Prüfung einer **Moderationshypothese**.
- Diskrete Variablen müssen **dummy-codiert** werden. Zur Inspektion der Steigungen aller Stufen muss **Referenzkategorie** ggf. gewechselt werden.
- Bei stetigen Prädiktoren ohne sinnhaften Nullpunkt sollte eine **Zentrierung** durchgeführt werden.
- Bei > 2 -stufigen diskreten Prädiktoren sollten **Omnibustests** verwendet werden, um Typ-I Fehler zu vermeiden.
- Paarweise Vergleiche von Steigungen innerhalb der Stufen eines Faktors lassen sich mit **Post-Hoc Trend Vergleichen** rechnen.

