CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Statistik I

Einheit 6: Schätzungen und Stichprobenfehler

Sommersemester 2026 | Prof. Dr. Stephan Goerigk

Schätzungen und Stichprobenfehler

Wiederholung:

Inferenzstatistik:

- Umfasst alle statistischen Verfahren, die es erlauben, trotz der Informationsunvollständigkeit der Stichprobendaten Aussagen über eine Population zu treffen.

Population:

- Gesamtheit aller Merkmalsträger:innen, auf die eine Untersuchungsfrage gerichtet ist.

Stichprobe:

- Auswahl bestimmter Merkmalsträger:innen aus einer Population

Schätzungen und Stichprobenfehler

Logik des Schließens von Stichprobe auf Population (Einzelschritte folgen)



Schätzungen und Stichprobenfehler

Einfache Zufallsstichprobe:

Jetzt: Zufällige Ziehung von n Personen aus einer Population von N Personen (mit „Zurücklegen“).

- n wird hierbei Stichprobenumfang genannt.
- Dieser Vorgang ist ein Zufallsexperiment:
  - Wir wissen im Voraus nicht, welche Personen gezogen werden
  - Die Ergebnismenge Ω ist die Menge aller möglichen Stichproben mit n Personen.
- Wir setzen voraus, dass jede Person in der Population bei jeder der n Ziehungen die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, in die Stichprobe gezogen zu werden.
- Wir setzen zudem voraus, dass die n Personen unabhängig voneinander gezogen werden.
- Zufallsstichproben mit diesen beiden Eigenschaften nennt man einfache Zufallsstichproben.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Einfache Zufallsstichprobe - Probleme:

Leider werden in der Praxis oft keine einfachen Zufallsstichproben gezogen. Häufig auftretende Probleme:

1. Fehlende Repräsentativität:

- Eine bestimmte Teilgruppe von Personen in der Population hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe gezogen zu werden als andere Personen.
- Beispiel: Nur Personen die Psychologie studieren haben eine echt positive Wahrscheinlichkeit gezogen werden.
- Folge: Die interessierende Maßzahl in der Population entspricht nicht mehr dem Parameter der jeweiligen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Inferenzstatistische Verfahren, die hierauf aufbauen, sind verzerrt.

2. Abhängigkeit der Ziehungen:

- Die Ziehungen der Personen sind nicht unabhängig voneinander.
- Beispiel: sog. geschachtelte Stichproben: Zufälliges Ziehen einer Schule, dann zufälliges Ziehen von Personen aus dieser Schule.
- Folge: Die Zufallsvariablen sind nicht unabhängig, Inferenzstatistische Verfahren die hierauf aufbauen, sind verzerrt.
- Falls die Art der Abhängigkeit bekannt ist, kann dies mithilfe statistischer Methoden (hierarchische Modellierung) ausgeglichen werden.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Inferenzstatistik:

Je nach Fragestellung, d.h. je nach Art der Aussage, die über einen Parameter getroffen werden soll, lassen sich inferenzstatistische Methoden zwei Gebieten zuordnen:

1. Parameterschätzung:

- Fragestellung: Welchen konkreten Wert hat ein Parameter?
- Beispiele:
  - Welchen Wert hat π?
  - Welche Werte haben μ und σ^2?
- Resultate von Parameterschätzungen sind konkrete Zahlen oder Intervalle.

2. Statistische Hypothesentests:

- Fragestellung: Entspricht ein Parameter einem vorgegebenen Wert oder liegt er in einem vorgegebenen Bereich?
- Beispiele:
  - Ist $\pi = 0.5$?
  - Ist $\mu = 100$?
  - Ist $\sigma^2 > 10$?
- Das Resultat eines statistischen Hypothesentests ist eine Ja/Nein-Antwort.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Parameterschätzung:

Ziel der Parameterschätzung: Auf der Basis einer einfachen Zufallsstichprobe eine Aussage darüber treffen, welchen konkreten Wert ein Parameter hat.

Man unterscheidet in der Parameterschätzung zwischen

1. Punktschätzung:

- Ergebnis einer Punktschätzung ist eine konkrete Zahl.
- Beispiel: Wir gehen auf Basis unserer Stichprobe davon aus, dass der Parameter π gleich 0.45 ist.

2. Intervallschätzung

- Ergebnis einer Intervallschätzung ist ein Intervall von Zahlen.
- Beispiel: Wir gehen auf Basis unserer Stichprobe davon aus, dass der Parameter μ im Bereich zwischen 101 und 108 liegt.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Parameterschätzung:

- Zur Erinnerung (sehr wichtig!): Aussagen über Parameter sind im Fall von einfachen Zufallsstichproben gleichbedeutend mit Aussagen über die uns eigentlich interessierenden deskriptivstatistischen Maßzahlen in der Population:

Punktschätzung:

- „Wir gehen auf Basis unserer Stichprobe davon aus, dass der Parameter π gleich 0.45 ist.“ ist gleichbedeutend mit „Wir gehen auf Basis unserer Stichprobe davon aus, dass die relative Häufigkeit der uns interessierenden Messwertausprägung in der Population gleich 0.45 ist.“

Intervallschätzung

- „Wir gehen auf Basis unserer Stichprobe davon aus, dass der Parameter μ im Bereich zwischen 101 und 108 liegt.“ ist gleichbedeutend mit „Wir gehen auf Basis unserer Stichprobe davon aus, dass der Mittelwert der uns interessierenden stetigen Variable in der Population im Bereich zwischen 101 und 108 liegt.“

Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzwerte:

Wir interessieren uns für eine deskriptivstatistische Maßzahl in einer Population.

- Beispiel 1 (diskret):
  - die relative Häufigkeit h_A der Angststörung in der Population
- Beispiel 2 (stetig):
  - den Mittelwert $\bar{x}_{IQ}$ des IQs in der Population
  - die empirische Varianz s^2_{empIQ} des IQs in der Population
- Wir ziehen eine einfache Zufallsstichprobe und betrachten die Zufallsvariablen $X_1, X_2, \ldots, X_n$ mit ihren Realisationen $x_1, x_2, \ldots, x_n$ (dies sind die Messwerte der Personen in der Stichprobe).
- Diese ZVs weisen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf, deren Parameter jeweils den uns interessierenden deskriptivstatistischen Maßzahlen in der Population entsprechen:
  - Beispiel 1: $\pi = h_A$
  - Beispiel 2: $\mu = \bar{x}_{IQ}$ und $\sigma^2 = s^2_{empIQ}$

Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzwerte:

- Wir wollen auf Basis der Realisationen der ZVs für jeden Parameter jeweils einen Schätzwert bestimmen
- Schätzwert = Wert, von dem wir auf der Basis unserer Stichprobe davon ausgehen, dass er „möglichst nahe“ an dem wahren Parameterwert bzw. dem wahren Wert der Maßzahl in der Population liegt.

Naheliegende Idee:

- Wir verwenden als Schätzwert einfach zunächst die entsprechende deskriptivstatistische Maßzahl in der Stichprobe.
- Ob diese Schätzungen unseren qualitativen Ansprüchen genügen, muss sich aber noch herausstellen.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzwerte:





Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzwerte:

Als naheliegender Schätzwert für π die relative Häufigkeit der Angststörung in der Stichprobe:

$$h_A = \frac{H_A}{n}$$

Als naheliegender Schätzwert für μ den Mittelwert des IQs in der Stichprobe:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Als naheliegender Schätzwert für σ^2 die empirische Varianz des IQs in der Stichprobe:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzwerte:

- Wie können wir feststellen, ob diese Schätzwerte jeweils nahe an den wahren Parametern liegen?
- Antwort: Für eine einzelne Stichprobe können wir dies leider nicht.
- Um zu bestimmen, wie weit ein einzelner Schätzwert vom wahren Parameterwert entfernt ist, müssten wir ja den wahren Parameterwert schon kennen.
- Aber: Da die Ziehung der einfachen Zufallsstichprobe ein Zufallsexperiment ist, können wir uns anschauen, wie sich die Schätzwerte verhalten würden, falls wir (theoretisch unendlich oft) wiederholt eine solche einfache Zufallsstichprobe ziehen und die Schätzwerte berechnen würden.
- Wir können auf diese Art und Weise herausfinden, wie gut unsere Schätzungen „im Durchschnitt“ sind.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzwerte:

- Jedes Mal, wenn wir eine einfache Zufallsstichprobe der Größe n aus der Population ziehen, gelangen andere Personen in unsere Stichprobe.
- Daher ergeben sich auch jedes Mal andere Realisationen $x_1, x_2, \ldots, x_n$ der Zufallsvariablen $X_1, X_2, \ldots, X_n$ und daher auch andere Schätzwerte.
- Die Schätzwerte unterliegen also Zufallsschwankungen.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzwerte:

Zufallsschwankungen im Schätzwert (Beispiel 1 - Angststörungen)



Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzwerte:

Zufallsschwankungen im Schätzwert (Beispiel 1 - Angststörungen)

- Die relative Häufigkeit der Angststörung in dieser Population wäre $h_A = \frac{7}{50} = 0.14$
- Angenommen, wir würden uns für h_A in dieser Population interessieren, könnten die Population aber nicht direkt untersuchen, sondern nur einfache Zufallsstichproben der Größe $n = 10$ ziehen.
- Zur Erinnerung: In diesem Fall ist $h_A = \pi$



Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzwerte:

Zufallsschwankungen im Schätzwert (Beispiel 1 - Angststörungen)

Beispiele für mögliche zufällig gezogene Stichproben der Größe $n = 10$ und jeweils resultierender Schätzwert h_S:

- Stichprobe 1:
  - Messwerte: $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1...$
  - Schätzwert: $h_S = 0.2$
- Jedes Mal würde aufgrund der zufälligen Ziehung der Personen ein zufälliger anderer Schätzwert resultieren!



Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzwerte:

Zufallsschwankungen im Schätzwert (Beispiel 2 - IQ)



Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzfunktionen:

- Das Ziehen einer einfachen Zufallsstichprobe ist ein Zufallsexperiment.
- Das Ergebnis dieses Zufallsexperiments ist eine Stichprobe von n Personen.
- Ein Schätzwert ist eine konkrete Zahl und kann für jede dieser Stichproben aus den Realisationen $x_1, x_2, \ldots, x_n$ der Zufallsvariablen $X_1, X_2, \ldots, X_n$ berechnet werden.
- Wir können also eine Zufallsvariable definieren, die jedem möglichen Ergebnis des Zufallsexperiments – also jeder möglichen Stichprobe - den aus ihr berechneten Schätzwert zuweist.
- Eine solche Zufallsvariable heißt **Schätzfunktion**.
- Der konkrete **Schätzwert** ist dann die **Realisation dieser Schätzfunktion**.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzfunktionen:

Beispiel:

Die zu dem Schätzwert

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

gehörige Schätzfunktion für den Parameter μ ist die Zufallsvariable

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

Der konkrete Schätzwert $\bar{x}$ ist eine Realisation der Schätzfunktion $\bar{X}$.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Schätzfunktionen:

- Schätzwerte sind Funktionen der Realisationen x_i der Zufallsvariablen X_i
- Schätzfunktionen sind Funktionen der Zufallsvariablen X_i selbst

VORSICHT:

- Schätzfunktionen sind Zufallsvariablen, die allein dadurch zu Schätzfunktionen für einen Parameter werden, dass man sie zur Schätzung für diesen Parameter verwendet. Das heißt aber natürlich nicht, dass es sich dann automatisch um gute Schätzfunktionen für diesen Parameter handelt.

Wir werden in der Inferenzstatistik noch sehr häufig der folgenden Situation begegnen:

- Wir interessieren uns für einen Parameter einer Wahrscheinlichkeitsverteilung.
- Für diesen Parameter bestimmen wir eine Schätzfunktion.
- Wir ziehen eine einfache Zufallsstichprobe, in der sich die Schätzfunktion in einem konkreten Schätzwert für den Parameter realisiert.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Gütekriterien einer Schätzfunktion:

- Im Folgenden sei θ ein beliebiger Parameter einer beliebigen Wahrscheinlichkeitsverteilung und $\hat{\theta}$ eine Schätzfunktion für diesen Parameter.
- Wir können uns damit nun erst mal unabhängig von einer konkreten Funktion oder eines Parameters überlegen, was gegeben sein sollte, damit wir $\hat{\theta}$ als Schätzfunktion θ verwenden.

Wir betrachten dafür folgende drei **Gütekriterien**:

- Erwartungstreue (und Genauigkeit)
- Effizienz
- Konsistenz

Schätzungen und Stichprobenfehler

Gütekriterien einer Schätzfunktion:

Erwartungstreue:

Je nachdem, welche konkrete Stichprobe zufällig gezogen wird, resultieren unterschiedliche Schätzwerte.

- Ein in einer konkreten Stichprobe berechneter Schätzwert wird daher in den seltensten Fällen genau dem wahren Parameterwert entsprechen.
- Wir können jedoch fordern, dass die Schätzwerte bei unendlicher Wiederholung des Zufallsexperiments - d.h. falls wir unendlich viele einfache Zufallsstichproben der Größe n ziehen würden - zumindest im Mittel dem wahren Parameterwert entsprechen sollten. Dieses Kriterium wird **Erwartungstreue** genannt.
- Da die Schätzwerte Realisationen der Schätzfunktion sind, und der Mittelwert unendlich vieler Realisationen einer Zufallsvariable deren Erwartungswert ist, ergibt sich:
- Eine Schätzfunktion $\hat{\theta}$ für einen Parameter θ ist erwartungstreu, falls gilt:

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

Schätzungen und Stichprobenfehler

Gütekriterien einer Schätzfunktion:

Genauigkeit:

- Wenn $E(\hat{\theta}) = \theta$ ist die Anforderung an eine Schätzfunktion, dass sie zu möglichst „präzisen“ oder „genauen“ Schätzungen führen sollte.
- Bei einer Schätzfunktion mit hoher „Genauigkeit“ würden wir erwarten, dass ihre Realisationen – die Schätzwerte - bei wiederholter Ziehung der Stichprobe nur in geringerem Ausmaß um den wahren Parameterwert streuen.
- In diesem Fall liefern nämlich viele der möglichen zufälligen Stichproben einen Schätzwert, der nahe an dem wahren Parameterwert liegt.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Gütekriterien einer Schätzfunktion:

Genauigkeit:

- Als Maß für die Genauigkeit einer Schätzfunktion kommen also prinzipiell alle Streuungsmaße für Zufallsvariablen infrage.
- Meistens wird die Standardabweichung $SD(\hat{\theta})$ der Schätzfunktion $\hat{\theta}$ betrachtet.
- Diese wird im Fall einer Schätzfunktion $\hat{\theta}$ Standardfehler $SE(\hat{\theta})$ von $\hat{\theta}$ genannt:

$$SE(\hat{\theta}) = SD(\hat{\theta})$$

- Je geringer der Standardfehler, desto weniger streuen die Schätzwerte und desto genauer ist die Schätzfunktion (Erwartungstreue vorausgesetzt).
- Bemerkung: SE kommt von **S**tandard **E**rror, der englischen Bezeichnung für den Standardfehler.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Gütekriterien einer Schätzfunktion:

Genauigkeit - Beispiel Standardfehler:

- Der wahre Wert des Parameters sei θ = 10
- Beispiel für die Schätzwerte, die aus einer erwartungstreuen Schätzfunktion $\hat{\theta}$ für θ mit **niedrigem** Standardfehler $SE(\hat{\theta})$ resultieren könnten:
- Zufällige Stichprobe 1: $\hat{\theta}_{Wert}$ = 10.3
- Zufällige Stichprobe 2: $\hat{\theta}_{Wert}$ = 9.8
- Zufällige Stichprobe 3: $\hat{\theta}_{Wert}$ = 10.1
- usw.

$\rightarrow$ Geringe Streuung der Schätzwerte $\rightarrow$ die meisten Schätzwerte liegen nahe um den wahren Wert $\theta = 10$.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Gütekriterien einer Schätzfunktion:

Genauigkeit - Beispiel Standardfehler:

- Der wahre Wert des Parameters sei θ = 10
- Beispiel für die Schätzwerte, die aus einer erwartungstreuen Schätzfunktion $\hat{\theta}$ für θ mit **hohem** Standardfehler $SE(\hat{\theta})$ resultieren könnten:
- Zufällige Stichprobe 1: $\hat{\theta}_{Wert}$ = 52.3
- Zufällige Stichprobe 2: $\hat{\theta}_{Wert}$ = -31.8
- Zufällige Stichprobe 3: $\hat{\theta}_{Wert}$ = 25.1
- usw.

$\rightarrow$ Starke Streuung der Schätzwerte $\rightarrow$ die meisten Schätzwerte liegen fern vom wahren Wert $\theta = 10$.

- Da die Schätzfunktion erwartungstreu ist, ist der Mittelwert der Schätzwerte unendlich vieler Stichproben immer noch gleich dem wahren Wert.
- Dies hilft uns jedoch nicht wirklich, da wir in der Realität nur eine Stichprobe und daher nur einen Schätzwert $\hat{\theta}_{Wert}$ haben. Dieser kann sehr weit weg vom wahren Parameterwert liegen.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Gütekriterien einer Schätzfunktion:

Effizienz:

Nach diesen Vorüberlegungen können wir nun das Gütekriterium der Effizienz formulieren:

- Eine Schätzfunktion ist effizient, falls sie erwartungstreu ist und einen geringeren Standardfehler als alle anderen erwartungstreuen Schätzfunktionen aufweist.
- Eine effiziente Schätzfunktion ist also die „präziseste“ Schätzfunktion unter allen erwartungstreuen Schätzfunktionen.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Gütekriterien einer Schätzfunktion:

Konsistenz:

- Eine weitere wünschenswerte Eigenschaft von Schätzfunktionen ist, dass sie mit wachsendem Stichprobenumfang n immer „präziser“ werden.
- Das heißt: mit wachsendem Stichprobenumfang n sollte der Standardfehler der Schätzfunktion immer kleiner werden und schließlich gegen Null gehen.
- Formal: Eine erwartungstreue Schätzfunktion $\hat{\theta}$ für einen Parameter θ ist konsistent, falls gilt:

$$\lim_{n \to \infty} SE(\hat{\theta}) = 0$$

Schätzungen und Stichprobenfehler

Nutzen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur Quantifizierung des Stichprobenfehlers:

Inferenzstatistik verwendet Stichprobenkennwerte (z.B. Stichprobenmittelwert, Stichprobenvarianz oder auch den Quotient zweier Stichprobenvarianzen) als Schätzfunktionen für die entsprechenden Populationsparameter.

- Zieht man immer wieder voneinander unabhängige Zufallsstichproben und berechnet die Kennwerte, werden die einzelnen Kennwerte aufgrund der zufälligen Zusammensetzung der Stichproben nicht ident sein
- Sie streuen zufällig um den Erwartungswert.
- Die Kennwerte einzelner Zufallsstichproben sind Realisierungen von Zufallsvariablen.
- Kenntnis der Verteilung dieser ZV (= Stichprobenverteilung) ist Grundlage für Inferenzstatistik, z.B. von Hypothesentests, Vertrauensbereichen für Schätzwerte.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Nutzen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur Quantifizierung des Stichprobenfehlers:



Es ist nützlich ein Intervall zu definieren…

…in welchem der wahre (Populations-)Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt

Dieses Intervall nennt sich **Konfidenzintervall**

Schätzungen und Stichprobenfehler

Nutzen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur Quantifizierung des Stichprobenfehlers:

- Ziel: Quantifizieren wie gut der Stichprobenkenwert (z.B. Mittelwert) als Schätzer für die Population ist
- Anders gesagt: Wie **wahrscheinlich** ist das Ergebnis der Schätzfunktion relativ zu allen möglichen Ergebnissen
- Vorteil Wahrscheinlichkeitsfunktionen: Werte sind tabelliert und können abgelesen werden.

Schätzungen und Stichprobenfehler

Konfidenzintervall

- Wir interessieren uns für einen unbekannten wahren Parameter θ, der die Verteilung einer Zufallsvariable charakterisiert
- θ wird durch eine Schätzfunktion $\hat{\theta}$ aus einer (repräsentativen) Stichprobe mit Umfang n geschätzt
- Es wird davon ausgegangen, dass die Stichprobe in etwa die Grundgesamtheit widerspiegelt, und dass deshalb die Schätzung in der Nähe des wahren Parameters liegen müsste
- Die Schätzfunktion ist selbst eine Zufallsvariable mit einer Verteilung, die den Parameter θ enthält
- Bei der Schätzung von Parametern geht es nicht nur darum, Schätzfunktionen zu finden und deren Eigenschaften (Erwartungstreue, Konsistenz, etc.) abzuklären
- Man möchte auch Intervalle angeben, in welchen θ mit einer gewissen Sicherheit liegt
- Es sei α eine vorgegebene Irrtumswahrscheinlichkeit, und a bzw. b reelle Zahlen, mit a ≤ b. Die Schätzung des Bereiches $a \leq \theta \leq b$ mit der Vertrauenswahrscheinlichkeit $(1-\alpha)$ nennen wir Konfidenzintervall des Parameters θ mit Irrtumswahrscheinlichkeit α
- $\hat{\theta}$ Punktschätzung von θ, im Vergleich zur Intervallschätzung

Schätzungen und Stichprobenfehler

Konfidenzintervall

- Wir konstruieren ein symmetrisches Konfidenzintervall auf Grundlage einer Schätzfunktionen $\hat{\theta}$
- Von besonderem Interesse ist die Breite des Konfidenzintervalls. Diese bestimmt sich durch $SE(\hat{\theta})$
- Erwünscht ist ein schmales Konfidenzintervall, denn dies weist auf eine genaue Schätzung hin

Wir werden folgende Konfidenzintervall rechnen lernen:

- Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ einer $N(\mu, \sigma^2)$ Variable bei bekannter Varianz σ^2
- Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ einer $N(\mu, \sigma^2)$ Variable bei unbekannter Varianz σ^2

Schätzungen und Stichprobenfehler

KI für μ einer $N(\mu, \sigma^2)$ Variable bei bekannter σ^2

- Die Normalverteilung ist eine reproduzierende Verteilung

1. Wir ziehen unabhängige Zufallsstichproben vom Umfang n und berechnen in jeder Teilstichprobe den Mittelwert
2. Die Mittelwerte $\bar{x}_n$ aller Zufallsstichproben erzeugen eine Variable $\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \ldots + X_n)$
3. $\bar{X}$ ist abgesehen von der multiplikativen Konstante $\frac{1}{n}$ eine Summe normalverteilter Variablen, und es gilt

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

- Wenn X normalverteilt ist, hat $\bar{X}$ wiederum Normalverteilung mit dem selben Erwartungswert, aber wesentlich kleinerer Varianz $\frac{\sigma^2}{n}$
- Durch ziehen der Wurzel aus der Varianz erhalten wir auch den Standardfehler $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Schätzungen und Stichprobenfehler

KI für μ einer $N(\mu, \sigma^2)$ Variable bei bekannter σ^2

- Wir verwenden die Verteilung von $\bar{X}$ um ein KI für μ aufzustellen
- Standardisieren der normalverteilten Variable $\bar{X}$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

- Es gilt für $(1 - \alpha)$% aller Stichproben mit Umfang n

$$|\bar{x} - \mu| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Durch Umstellen ergibt sich die Formel für die obere (+) und untere (-) Grenze des Konfidenzintervalls:

$$\mu_{1,2} = \bar{x} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Schätzungen und Stichprobenfehler

KI für μ einer $N(\mu, \sigma^2)$ Variable bei bekannter σ^2

Interpretation des KIs:

- Die Breite des KI hängt von 3 Faktoren ab:
  - von der Streuung der Variable X bzw. σ
  - von n
  - von der Irrtumswahrscheinlichkeit α (i.d.R. wählen wir $\alpha = .05$)

Was passiert wenn...

- Je kleiner σ, desto enger das KI (geringere Schwankung $\rightarrow$ mehr Konfidenz)
- Je größer n, desto enger das KI (größere Stichprobe $\rightarrow$ mehr Konfidenz)
- Je kleiner α, desto breiter das KI (strengere Irrtumswahrscheinlichkeit $\rightarrow$ mehr Konfidenz)

Schätzungen und Stichprobenfehler

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

KI für μ einer $N(\mu, \sigma^2)$ Variable bei bekannter σ^2

Beispiel:

- Eine Stichprobe von $n = 234$ 14-jährigen Schüler:innen wurde mit einem Intelligenztest, der für 14-18 jährige Jugendliche normiert wurde, getestet.
- In der Gesamtpopulation aller Jugendlichen wurde der Test so geeicht, dass die Messwerte normalverteilt mit $\mu = 100$ und $\sigma = 15$ sind (das entspricht dem Standardmaß des IQ). $\rightarrow$ Varianz ist bekannt!
- Der Mittelwert der 14-jährigen, der in der Stichprobe gemessen wird, ist $\bar{x} = 98.10$

$$\mu_{1,2} = \bar{x} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Der z-Wert für $1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{.05}{2} = 1.96$ muss in der z-Tabelle nachgesehen werden. α wird halbiert, da sich die 5% Fehler auf die untere und obere Grenze des KIs aufteilen.

$$\mu_{1,2} = 98.10 \pm 1.96 \frac{15}{\sqrt{234}} = 98.10 \pm 1.92$$

- μ_{14} liegt mit einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von .95 im Konfidenzintervall [96.18, 100.02].

Schätzungen und Stichprobenfehler

KI für μ einer $N(\mu, \sigma^2)$ Variable bei unbekannter σ^2

- Unbekannte Varianz σ^2 wird aus den vorliegenden Daten geschätzt

$$\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Anstelle der Standardnormalverteilung...

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

...nutzen wir eine leicht abgewandelte Verteilung (T-Verteilung). Die T-Werte berechnen sich analog:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

Schätzungen und Stichprobenfehler

Exkurs t-Verteilung

- Ist Populationsvarianz jedoch nicht bekannt und muss geschätzt werden, dann ist der Quotient nicht standardnormalverteilt sondern t-verteilt
- Die t-Verteilung ist wie die NV eingipfelig und symmetrisch (schauen sich sehr ähnlich)
- Die Form der t-Verteilung ist mitbestimmt durch sog. Freiheitsgrade (df = degrees of freedom). Diese sind leicht zu berechnen:

$$df = n - 1$$

- $E(T) = 0$ (für $df \geq 2$), und Varianz $n/(n-2)$ (für $df \geq 3$)
- Mit wachsender Zahl der Freiheitsgrade (also größerem n) nähert sich die t-Verteilung der $N(0,1)$ (sie "approximiert die NV")
- Die Quantile der t-Verteilung können bei gegebenem α und df aus der t-Tabelle abgelesen werden (**Link zur t-Tabelle**)

Schätzungen und Stichprobenfehler

KI für μ einer $N(\mu, \sigma^2)$ Variable bei unbekannter σ^2

- Das KI für μ ergibt sich also aus

$$\frac{|\bar{X} - \mu|}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}} \leq t_{n-1}, df = n - 1$$

- Mit Irrtumswahrscheinlichkeit α gilt

$$|\bar{x} - \mu| \leq t_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, df = n - 1$$

- Durch Umstellen ergibt sich die Formel für die obere (+) und untere (-) Grenze des Konfidenzintervalls:

$$\mu_{1,2} = \bar{x} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, df = n - 1$$

Schätzungen und Stichprobenfehler

Beispiel:

- Der Subtest "Rechenaufgaben" eines Intelligenztests wird einer Zufallsstichprobe von $n = 87$ Münchner Student:innen vorgegeben
- Gesucht ist das Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ der Population aller Münchner Student:innen
- In der Stichprobe wird eine Mittelwert von $\bar{x} = 25.48$ und eine Standardabweichung von $s = 6.12$ gemessen

$$\mu_{1,2} = 25.48 \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{6.12}{\sqrt{87}}, df = 86$$

- Tabelle enthält keine Eintragung für $df = 86$, aber nächstgelegener Wert ist $df = 60$; $t_{0.975} = 2.00$

$$\mu_{1,2} = 25.48 \pm 2.00 \frac{6.12}{\sqrt{87}}, df = 86$$

- $\mu_{25.48}$ liegt mit einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von $.95$ im Konfidenzintervall [24.17, 26.79].

Take-aways

Einfache Zufallsstichprobe

- n Personen werden unabhängig voneinander gezogen
- Jede Person hat die gleiche Wahrscheinlichkeit gezogen zu werden
- Grundlage für Zufallsvariablen

Schätzfunktionen sind Zufallsvariablen

- für die wir Erwartungswert und Standardabweichung (Standardfehler) berechnen können
- die erwartungstreu, effizient und konsistent sein sollten
- mit deren Hilfe wir Parameter (gesuchter Parameter einer Verteilung entspricht interessierender Größe in der Population) aus Stichprobendaten schätzen

Konfidenzintervall

- gibt ein Intervall an, in welchem Parameter zur Schätzung des Populationswerts mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (i.d.R. 95%) liegen