CHARLOTTE FRESENIUS
HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Statistik I

Einheit 7: Hypothesen und Hypothesentests

Sommersemester 2026 | Prof. Dr. Stephan Goerigk

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Wiederholung:

Inferenzstatistik:

- Umfasst alle statistischen Verfahren, die es erlauben, trotz der Informationsunvollständigkeit der Stichprobendaten Aussagen über eine Population zu treffen.
- Wir wissen nun, dass wir einzelne Populationsparameter aus der Stichprobe schätzen können

ABER:

- Das reine Schätzen eines Wertes ist noch keine wissenschaftliche Aussage
- Was für "Aussagen", die wir über die Population treffen, sind gemeint?

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Was sind Hypothesen?

Hypothese (griech.) = Unterstellung, Vermutung

Eine Vermutung/Annahme ist dann als wissenschaftliche Hypothese zu verstehen, wenn sie folgende 5 Kriterien erfüllt:

Wenn sie…

1. …sich auf reale Sachverhalte bezieht, die empirisch untersuchbar sind. (**Empirie**)
2. …allgemein gültig ist und über den Einzelfall bzw. ein singuläres Ereignis hinausgeht. (**All-Satz**)
3. …zumindest implizit die Form eines Konditionalsatzes hat. (**wenn-dann, je-desto**)
4. …durch Erfahrungen potenziell widerlegbar ist. (**Falsifizierbarkeit**)
5. …(theoretisch begründbar ist)

Hypothesen und Hypothesentests

Beispiele für Hypothesen:

- Frauen sind kreativer als Männer
- Mit zunehmender Müdigkeit sinkt die Konzentrationsfähigkeit
- Je schöner das Wetter, desto besser die Stimmung
- Jungen und Mädchen lesen unterschiedlich viel in ihrer Freizeit

Behauptungen erfüllen alle genannten Kriterien: sind daher Hypothesen



Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Hypothesen: JA oder NEIN?

- Bei starkem Zigarettenkonsum kann es zu Herzinfarkt kommen
- Wenn es regnet, kann die Sonne scheinen.
- Es gibt Kinder, die niemals weinen.
- SchülerInnen aus Gymnasien zeigen gute Leistungen

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Hypothesen: JA oder NEIN?

- Bei starkem Zigarettenkonsum kann es zu Herzinfarkt kommen

→ Kann-Sätze sind nicht falsifizierbar

- Wenn es regnet, kann die Sonne scheinen.

→ Kann-Sätze sind nicht falsifizierbar

- Es gibt Kinder, die niemals weinen.

→ kein All-Satz, nicht falsifizierbar

- Schüler:innen aus Gymnasien zeigen gute Leistungen

→ Wenn-dann Struktur nicht gegeben, daher nicht falsifizierbar

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Hypothesen: JA oder NEIN?

- Die Konzentrationsfähigkeit hängt mit der Blutalkoholkonzentration zusammen.
- Positive Verstärkung durch Lehrer:innen kann zu guten Leistungen bei Schüler:innen führen.
- Positives Feedback beeinflusst die Arbeitsleistung.
- Viele Studierende mögen Methodenlehrveranstaltungen.

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Hypothesen: JA oder NEIN?

- Die Konzentrationsfähigkeit hängt mit der Blutalkoholkonzentration zusammen.

→ JA

- Positive Verstärkung durch Lehrer:innen kann zu guten Leistungen bei Schüler:innen führen.

→ NEIN

- Positives Feedback beeinflusst die Arbeitsleistung.

→ JA

- Viele Studierende mögen Methodenlehrveranstaltungen.

→ NEIN

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Richtung von Hypothesen

Je nach Erkenntnisstand kann eine ungerichtete oder eine gerichtete Hypothese formuliert werden.

Ungerichtete Hypothese:

Die Konzentrationsfähigkeit hängt mit der Blutalkoholkonzentration zusammen.

→ Eher wenig theoretisches Vorwissen.

Gerichtete Hypothese:

Je höher die Blutalkoholkonzentration, desto niedriger die Konzentrationsfähigkeit.

→ Mehr theoretisches Vorwissen notwendig.

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ableitung von statistisch-prüfbaren Hypothesen aus wiss. Hypothese

- Die Hypothese muss in numerische Ausdrücke umgewandelt werden.
- Man spricht von einem **Hypothesenpaar:**
  - **Nullhypothese** (H_0)**:** Der hypothetisierte Effekt besteht nicht.
  - **Alternativhypothese** (H_1)**:** Der hypothetisierte Effekt besteht
- In der Forschung hofft man oft, dass die H_1 zutrifft (Hier steckt der angenommene Effekt drin)
- Man versucht, **"Die H_0 zu verwerfen"** (Hypothesentest kommt später)

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ableitung von statistisch-prüfbaren Hypothesen aus wiss. Hypothese

Beispiel: **(Ungerichtete) Forschungshypothese:**

"Männer und Frauen sind im Schnitt unterschiedlich groß."

- H_0 Es besteht **kein Unterschied** zwischen der durchschnittlichen Größe der Männer (Mittelwert) und der durchschnittlichen Größe der Frauen.
- H_1 Es besteht **ein Unterschied** zwischen der durchschnittlichen Größe der Männer (Mittelwert) und der durchschnittlichen Größe der Frauen.

Ableitung statistische Hypothese:

- H_0 Mittelwert Männer - Mittelwert Frauen $=$ 0

$\rightarrow$ **In Zahlen:** Wenn kein Unterschied besteht ist Differenz = 0 (z.B. 10 - 10 = 0)

- H_1 Mittelwert Männer - Mittelwert Frauen $\neq$ 0

$\rightarrow$ **In Zahlen:** Wenn ein Unterschied besteht ist Differenz $\neq$ 0 (z.B. 15 - 10 = 5)

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Beispiele:

- Binomialtest: Auftretenshäufigkeit $\rightarrow$ 1. Semester
- χ^2-Test: Unterschiede in Verteilungen $\rightarrow$ 1. Semester
- unabhängiger t-Test: Unterschiede in Gruppenmittelwerten $\rightarrow$ 1. Semester
- abhängiger t-Test: Unterschiede in Mittelwerten zwischen Zeitpunkten $\rightarrow$ 1. Semester
- Korrelation: Zusammenhänge $\rightarrow$ 1. Semester
- F-Test (ANOVA): Unterschiede in Varianzen $\rightarrow$ 2. Semester
- Regression: Vorhersagen $\rightarrow$ 2. Semester

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Hypothesen

- Statistisch zu prüfende Aussagen: Hypothesen
- Der Inhalt einer Hypothese muss quantifiziert werden, damit wir sie prüfen können
- Hypothese wird in eine prüfbare Gleichung (oder Ungleichung $\rightarrow$ größer-kleiner Verhältnisse) umgewandelt
  - inhaltlich: Männer sind im Durchschnitt größer als 173 cm
  - numerisch: $\mu > 173$
- Die Entscheidung über die Gültigkeit der Hypothese erfolgt auf Basis unserer Wahrscheinlichkeitsverteilungen ("wie wahrscheinlich ist es, dass...")
  - "Wie wahrscheinlich ist es, dass unter Annahme, dass die Körpergröße normalverteilt ist, der erwartete Mittelwert der Männer größer ist als 173 cm."
- Trifft eine Hypothese zu spricht man oft vom Vorliegen eines **Effekts**

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Hypothesentest - To-Do Liste

Zur erfolgreichen Durchführung eines Hypothesentests müssen folgende wichtige Schritte geschehen

1. Austellen von Nullhypothese und Alternativhypothese (Hypothesenpaar)
2. Bestimmung einer zugrundeliegenden Verteilung
3. Festlegung des Annahme- und Ablehnungsbereichs der Nullhypothese (kritischer Wert)
4. Beobachtungswert auf Wahrscheinlichkeitsverteilung abbilden
    - Binomialverteilung $\rightarrow$ Wahrscheinlichkeiten
    - z-Verteilung $\rightarrow$ Mittelwerte, wenn σ in Population bekannt
    - t-Verteilung $\rightarrow$ Mittelwerte, wenn σ in Population nicht bekannt
    - F-Verteilung $\rightarrow$ Varianzen
    - χ^2-Verteilung $\rightarrow$ Häufigkeiten/Proportionen
5. Vergleich kritischer Wert und Teststatistik
6. Entscheidung: Test signifikant oder nicht signifikant

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Hypothesen

Statistische Hypothese:

- Entscheidung basiert darauf, ob sich ein beobachteter Wert überzufällig stark von einem vorgegebenen Wert unterscheidet
- Das heißt einfach, dass man überprüft, ob die Abweichung des beobachteten Wertes vom hypothetisierten Wert zu groß ist, als dass sie noch zufällig sein kann.
- Um alle Wahrscheinlichkeiten für einen Ausgang des Hypothesentests abzudecken formuliert man ein Hypothesenpaar
  - H_0: Der hypothetisierte Effekt liegt nicht vor (Werte unterscheiden sich nicht)
  - H_1: Der hypothetisierte Effekt liegt vor (Werte unterscheiden sich)

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Nullhypothese und Alternativhypothese

Nullhypothese (H_0):

- Gegenstück zur eigentlichen Untersuchungshypothese, der Alternativhypothese
- Die H_0 stellt meistens den aktuellen Zustand oder anders ausgedrückt den „Standard“ dar gegen den getestet wird

Alternativhypothese (H_1):

- Die Alternativhypothese beinhaltet oft die neue Annahme, den "Effekt".
- Drückt eine "Unterschiedlichkeit" von einem Referenzwert aus

$\rightarrow$ Nur über das komplementäre Hypothesenpaar lässt sich eine komplementäre Gesamtwahrscheinlichkeit abdecken:

$$P_{H_0} + P_{H_1} = 1$$

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY


Signifikanzniveau

- Um das Ausmaß der Abweichung zu definieren, welches uns als strengen Wissenschaftler:innen ausreichend "sicher" erscheint (kritischer Wert) legen wir eine **"Irrtumswahrscheinlichkeit"** fest
- Diese bezeichnet man als **Signifikanzniveau** α.
- Meistens wird $\alpha = .05$ gewählt (häufige Konvention aus der Wissenschaft)
- Das bedeutet, dass wir eine 5% Wahrscheinlichkeit erlauben unsere Hypothese fälschlicherweise anzunehmen
- Die 5% legen einen bestimmten Bereich auf der Wahrscheinlichkeitsverteilung fest (**Verwerfungsbereich**)
    - z-Verteilung
    - t-Verteilung
    - ...

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Signifikanzniveau und Verwerfungsbereich



- Die große (rosane) Fläche der Verteilung entspricht der Annahme unserer H_0
- Der Erwartungswert ist 0 (kein Effekt $\rightarrow$ daher Null-Hypothese)
- Werte jenseits des "kritischen Werts" sind im **Verwerfungsbereich** der H_0 (pink).
- Diese sind unter Annahme der H_0 ausreichend unwahrscheinlich.
- Wir glauben nicht mehr an einen Zufall!
- Die H_0 wird verworfen.

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

p-Wert

- In Statistik-Softwareprodukten wird zusammen mit der Teststatistik eines statistischen Tests ein sogenannter **p-Wert** ausgegeben
- Der p-Wert gibt die **Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art** an, also die Wahrscheinlichkeit, eine gültige H_0 zu verwerfen aufgrund der beobachteten Daten
- **Vorteil** des p-Wertes liegt darin, dass bei der Entscheidung keine Tabelle der Verteilung der Teststatistik benötigt wird
- Wird der zweiseitige p-Wert angegeben und die H_1 ist gerichtet, muss man den p-Wert **durch 2 dividieren** und mit α vergleichen.
- Bei einseitigen Hypothesen ist die zusätzliche Überprüfung notwendig, ob die Teststatistik tatsächlich im Verwerfungsbereich der H_0 liegt

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Fehler beim Hypothesentest

- Beim Treffen von Entscheidungen können Menschen nicht nur in ganz alltäglichen Situationen Fehler unterlaufen
- Konkret gibt es bei Hypothesentests **vier Möglichkeiten**, wie die Entscheidung ausfallen kann
  - Fehler 1. Art bzw. α-Fehler: Wenn die Nullhypothese fälschlicherweise verworfen wird und die Alternativhypothese angenommen wird
  - Fehler 2. Art bzw. β-Fehler: Wenn die Nullhypothese fälschlicherweise beibehalten wird, obwohl die Alternativhypothese wahr ist

	H_0 ist wahr	**H_1 ist wahr**
H_0 wird angenommen	1 - α	β (Fehler 2. Art)
H_0 wird verworfen	α (Fehler 1. Art)	1 - β (Power)

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Fehler beim Hypothesentest

- Die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 1. Art zu begehen, entspricht immer maximal dem Signifikanzniveau
- Je kleiner α, umso kleiner der Fehler 1. Art (H_0 irrtümlich zu verwerfen)
- → α möglichst klein wählen, z.B. $\alpha = 0.001$?
- Entscheiden für Signifikanzniveau ist vergleichbar mit dem Abschluss einer Versicherung. Umso besser der Versicherungsschutz gegen einen α-Fehler, umso höher die Kosten.

Kosten eines kleinen (strengen) Signifikanzniveaus:

- Größerer Fehler 2. Art (β-Fehler = H_0 irrtümlich beizubehalten)
- geringere Teststärke $1 - \beta$ (Macht oder Power = Wahrscheinlichkeit, H_0 zugunsten einer H_1 zu verwerfen, wenn tatsächlich H_1 gilt)

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Beziehungen zwischen Statistischen Fehlern

Dilemma

- Versicherung gegen α-Fehler hat die Kosten eines höheren β-Fehlers und geringerer Macht des Tests
- Versicherung gegen β-Fehler hat die Kosten eines höheren α-Fehlers
- Kompromiss in der Praxis: $\alpha = .05$ oder $\alpha = .01$ je nachdem, welchen Fehler man eher riskieren möchte

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ein- und Zweiseitige Hypothesen

Einseitige Hypothese:

- Der beobachtete Wert ist größer oder kleiner als ein Referenzwert
- Man spricht von einer gerichteten Hypothese
- Beispiel Hypothesenpaar (inhaltlich):
  - H_0: Männer sind durchschnittlich 173 cm groß oder kleiner
  - H_1: Männer sind durchschnittlich größer als 173 cm

Zweiseitige Hypothese:

- Der beobachtete Wert unterscheidet sich von dem Referenzwert
- Man spricht von einer ungerichteten Hypothese
- Beispiel Hypothesenpaar (inhaltlich):
  - H_0: Die Durchschnittsgröße von Männern liegt bei etwa 173 cm
  - H_1: Die Durchschnittsgröße von Männern unterscheidet sich von 173 cm

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ein- und Zweiseitige Hypothesen

Einseitige Hypothese:


- Der beobachtete Wert ist größer oder kleiner als ein Referenzwert
- Man spricht von einer gerichteten Hypothese
- Beispiel Hypothesenpaar (statistisch):
  - H_0: $\mu \leq 173$ cm
  - H_1: $\mu > 173$ cm

Zweiseitige Hypothese:

- Der beobachtete Wert unterscheidet sich von dem Referenzwert
- Man spricht von einer ungerichteten Hypothese
- Beispiel Hypothesenpaar (statistisch):
  - H_0: $\mu = 173$ cm
  - H_1: $\mu \neq 173$ cm

Hypothesen und Hypothesentests

Ein- und Zweiseitige Hypothesen - Graphisch




Ein-Stichproben	(un-)abhängig	Ein-Stichproben	(un-)abhängig	Ein-Stichproben	(un-)abhängig
$H_0: \mu = \mu_0$	$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ $\mu_1 = \mu_2$	$H_0: \mu \geq \mu_0$	$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0$	$H_0: \mu \leq \mu_0$	$H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0$
$H_1: \mu \neq \mu_0$	$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ $\mu_1 \neq \mu_2$	$H_1: \mu < \mu_0$	$H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$	$H_1: \mu > \mu_0$	$H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0$

- μ_0 ist ein Wert gegen welchen wir testen (beispielsweise ein Referenzwert)
- alternative Schreibweisen sind in grau geschrieben

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ein- und Zweiseitige Hypothesen - Graphisch



- Erwartungswert: wahrscheinlichster Wert unter Annahme der H_0


Beispiel:

- H_0: $\mu = 173$
- wenn $\mu = 173$ dann $\mu - 173 = 0$
- Erwartungswert unter Annahme der H_0 = 0
- pinke Fläche: Verwerfungsbereich H_0
- rosane Fläche: Annahmebereich H_0

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ein- und Zweiseitige Hypothesen - Graphisch



- rote Linie: Kritischer Wert
- Um zu glauben, dass $\mu \neq 173$ (H_1) muss der beobachtete Wert ausreichend weit vom Erwartungswert der $H_0 = 0$ wegliegen
- Als Schwelle/Entscheidungsgrundlage definiert man einen kritischen Wert
- Dieser liegt oft bei dem Wert, der unter Annahme der Wahrscheinlichkeitsverteilung 5% Auftretenswahrscheinlichkeit hat

In Worten: Der beobachtete Wert ist unter Annahme der H_0 nur 5% wahrscheinlich, somit ist es auf Basis der Beobachtung unwahrscheinlich, dass die H_0 zutrifft.

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ein- und Zweiseitige Hypothesen

Festlegung auf eine Formulierung

- Wahl des Hypothesenpaars sollte a priori erfolgen
  - vor der eigenen Untersuchung
  - ohne Berücksichtigung der aktuellen Daten
  - aufgrund inhaltlicher Kriterien
- Spezialfall einseitige H_1:
  - Richtung basiert auf einer von den aktuellen Daten unabhängigen Vorinformation

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ein-Stichproben z-Test (Gauß-Test)

- Hypothesen über μ einer normalverteilten Variable, wobei σ^2 (Populationsvarianz) bekannt ist
- Mögliche Hypothesen:
  - H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu \neq \mu_0$ (ungerichtet)
  - H_0: $\mu \leq \mu_0$; H_1: $\mu > \mu_0$ (gerichtet)
  - H_0: $\mu \geq \mu_0$; H_1: $\mu < \mu_0$ (gerichtet)
- $\mu =$ Populationsmittelwert; $\mu_0 =$ hypothetischer Populationsparameter
- Prüft anhand des Mittelwerts einer Stichprobe ob der Erwartungswert in der entsprechenden Population gleich einem vorgegebenen Wert ist (dem unter H_0 erwarteten μ_0).
- Vergleich eines Stichprobenmittelwertes mit dem hypothetischen Populationsparameter μ_0.

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ein-Stichproben z-Test (Gauß-Test)

- Ziel: Prüfen, ob der Populationsmittelwert (μ) sich von hypothetischen Populationsparameter (μ_0) unterscheidet
- Methode: Da wir Populationsmittelwert (μ) nicht kennen, nutzen wir den Stichprobenmittelwert $(\bar{x})$
- Es geht also um den **Unterschied** zwischen μ und μ_0
  - mathematisch können wir diesen als Differenz ausdrücken: $\bar{x} - \mu_0$.
- Wenn H_0: $\mu = \mu_0$ und H_1: $\mu \neq \mu_0$, dann müsste $\bar{x} - \mu_0 \neq 0$ sein.
  - In Worten: Wenn ein Unterschied besteht, muss die Differenz $\neq 0$ sein

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ein-Stichproben z-Test (Gauß-Test)

- Wenn ein Unterschied besteht, muss die Differenz $\bar{x} - \mu_0 \neq 0$ sein.
- Dabei reicht uns ein rein numerischer Unterschied nicht
  - z.B. 1 vs. 1.000000001 ist ein Unterschied, aber dieser ist sehr klein und ggf. nicht sehr bedeutsam
- Wir wollen eine **verlässliche** Aussage machen (Unterschied muss über gewisse Unsicherheit erhaben sein)
- **numerischer Unterschied $\neq$ signifikanter (verlässlicher) Unterschied**
- Ziel: Wir müssen für den Unterschied eine Wahrscheinlichkeit angeben können
- Für normalverteilte Variablen können wir dafür die z-Tabelle nutzen

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ein-Stichproben z-Test (Gauß-Test)

Bestimmung des z-Werts

- Wir wandeln den Effekt, über den wir unsere Hypothese aufstellen $(\bar{x} - \mu_0)$ in eine Teststatistik um:


$$z_{emp} = \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma}$$

- Da der z-Wert aus den beobachteten Daten berechnet wurde, nenne wir ihn auch empirischen z-Wert (z_{emp})

- z : standardnormalverteilter Wert, für den Wahrscheinlichkeit in Tabelle nachgesehen werden kann (Ziel)
- $\bar{x}$: Mittelwert in Stichprobe (beobachtet)
- μ_0 : hypothetischer Populationsparameter aus Fragestellung
- σ : Populationsstandardabweichung (bekannt)
- n : Stichprobengröße (muss berücksichtigt werden $\rightarrow$ größere Stichprobe, mehr Verlässlichkeit)

Hypothesen und Hypothesentests

Ein-Stichproben z-Test (Gauß-Test)




Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY


Ein-Stichproben z-Test (Gauß-Test)

- Zur Erinnerung: Wahrscheinlichkeit, die H_0 abzulehnen, obwohl sie in Wirklichkeit gilt, heißt α-Fehler oder Fehler 1. Art
- z-Wert ist signifikant, wenn seine Auftretenswahrscheinlichkeit kleiner ist als das gewählte α (H_0 verwerfen)
- Für die Signifikanzprüfung kann der z-Wert (z_{emp}) mit dem kritischen z-Wert (z_{krit}) verglichen werden (in z-Tabelle nachsehen)
- Die Wahl des Signifikanzniveaus ist von inhaltlichen Überlegungen abhängig und wird oft als $\alpha = .05$ gewählt.



Hypothesen und Hypothesentests

Ein-Stichproben z-Test (Gauß-Test)




- Signifikanzniveau $\alpha = .05$ muss auf beide Seiten aufgeteilt werden
- Damit $\alpha = .05$ erreicht wird, darf z_{krit} nur 2.5% der Fläche abschneiden
- Auftretenswahrscheinlichkeit von z_{emp} muss kleiner als 2.5%
- Ist Betrag von z_{emp} größer als z_{krit} so ist Test signifikant

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ein-Stichproben z-Test (Gauß-Test)

- Mittelwertsdifferenz muss in vorhergesagte Richtung auftreten
- Gesamte 5% liegen auf vorhergesagter Seite der Verteilung
- Folge: Gleiche empirische Mittelwertsdifferenz wird bei einseitigen Hypothesen leichter signifikant (Betrag von z_{krit} ist kleiner, bzw. Ablehnungsbereich ist größer).



Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ein-Stichproben z-Test (Gauß-Test) - Beispiel

- Weicht der Mittelwert einer Zufallsstichprobe aus Indonesien, $\bar{x}_I$, in einem in Deutschland entwickelten sprachfreien Intelligenztest signifikant vom Populationsparameter in Deutschland, $\mu_D = 100$, ab?


- WICHTIG: Nur die indonesische Stichprobe wurde in der Studie rekrutiert und gemessen. Der deutsche Referenzwert wird vorgegeben.

Daten:

- $n = 108$, Testpunkte normalverteilt,
- $\bar{x}_I = 99.32$
- $\sigma_I = 15$
- $\alpha = 0.05$

Hypothesen:

- H_0: $\mu_I = 100$
- H_1: $\mu_I \neq 100$ (indonesische Stichprobe)



Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Ein-Stichproben z-Test (Gauß-Test)

Beispiel 1:

- $n = 108$, Testpunkte normalverteilt, $\bar{x}_I = 99.32$, $\sigma_I = 15$
- H_0: $\mu_I = 100$; H_1: $\mu_I \neq 100$; $\alpha = 0.05$

Teststatistik:

$$z_{emp} = \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma}$$

$$z_{emp} = \sqrt{108} \cdot \frac{99.32 - 100}{15} = -0.47$$

In z-Tabelle z_{krit} bei $p = 1 - \frac{\alpha = .05}{2} = 0.975$ (durch 2 teilen, da 2-seitige Fragestellung)

- $z_{krit} = -1.96$
- $-0.47 > -1.96 \rightarrow H_0$ beibehalten
- Interpretation: Der Mittelwert der Zufallsstichprobe aus Indonesien unterscheidet sich nicht signifikant vom deutschen Referenzwert.

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Beispiel 1: Binomialtest (einseitiges Testen)

Ein Therapieverfahren zur Behandlung von Angststörungen soll nach 6 Montaten eine Rückfallquote von maximal 30% haben.

- Das Verfahren soll an einer Zufallsstichprobe von $N = 100$ Patient:innnen geprüft werden

Aufstellen des Hypothesenpaares:

- H_0: $p \geq .3$ (mindestens 30%)
- H_1: $p < .3$ (unter 30%)

Fragen:

- Wie viele Patienten in der Stichprobe erleiden einen Rückfall
- Ist dieses Ergebnis **überzufällig** und somit auf die Population (aller Angstpatient:innen) verallgemeinerbar

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Beispiel 1: Binomialtest (einseitiges Testen)

Beobachtung in der Stichprobe (Schätzer):

- In der Stichprobe erleiden $n = 28$ Patienten einen Rückfall
- In absoluten Zahlen spricht das erst einmal für das Verfahren $(\frac{28}{100} = 28\% < 30\%)$

Frage, die der Hypothesentest stellt:

- Ist $n = 28$ (28%) ausreichend weit weg von 30%, sodass wir das Ergebnis verallgemeinern können?

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Beispiel 1: Binomialtest (einseitiges Testen)

Bestimmung einer passenden Wahrscheinlichkeitsverteilung:

- Art (und i.d.R.) Name des Tests basiert auf zugrunde liegender Verteilung
- Unsere Zufallsvariable X (s.h. Hypothese) ist in Wahrscheinlichkeiten angegeben $(p = .3)$
- Wahrscheinlichkeitsverteilung zur Wahrscheinlichkeit von Wahrscheinlichkeiten (p) : Binomialverteilung

Auswahl Hypothesentest:

- Wir wählen als Hypothesentest des **Binomialtest**
- Zur Entscheidung über unsere Hypothesen werden wir eine **Binomialverteilungstabelle** nutzen
- Merke:
  - Bei gerichteten (einseitigen) Formulierungen wie "mindestens" oder "höchstens" nutzen wir die **kumulierte Binomialverteilungstabelle**
  - Bei ungerichteten Formulierungen wie "genau" nutzen wir die **einfache Binomialverteilungstabelle**

Hypothesen und Hypothesentests

Beispiel 1: Binomialtest (einseitiges Testen)

Parameter für den Binomialtest:


- $p = 30\% = .3$
- $N = 100$
- Signifikanzniveau $\alpha = 5\% = .05$
- $k = 28$

Ist die Rückfallquote niedrig genug, um die Nullhypothese zu verwerfen?

Hypothesen und Hypothesentests

Beispiel 1: Binomialtest (einseitiges Testen)

Festlegung kritischer Wert (Annahme und Ablehnungsbereich der Nullhypothese):



Fällt das Stichprobenergebnis in den Ablehnungsbereich:

- $H_0: p \geq .3$ (verwerfen)
- $H_1: p < .3$ (annehmen)

Kritischer Wert kann in der kumulierte Binomialverteilungstabelle nachgesehen werden (**Link zur Tabelle**)

Wir wollen für $n = 100$ und die Wahrscheinlichkeit $p = .3$ den letzten Wert k finden, der unter Annahme der BV eine Auftretenswahrscheinlichkeit kleiner als unser Signifikanzniveau $(\alpha = .05)$ hat

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Beispiel 1: Binomialtest (einseitiges Testen)

Festlegung kritischer Wert (Annahme und Ablehnungsbereich der Nullhypothese):

- Kritischer Wert kann in der kumulierten Binomialverteilungstabelle nachgesehen werden (**Link zur Tabelle, S.6**)
- Wir wollen für $n = 100$ und die Wahrscheinlichkeit $p = .3$ den letzten Wert k finden, für den der dazugehörige Wert in der Tabelle unterhalb des Signifikanzniveaus $\alpha = .05$ gilt

$\rightarrow$ Dieser Wert ist unser kritischer Wert


- In unserem Beispiel ist der kritische Wert $k = 22$ bei einer Wahrscheinlichkeit von $p = .0479$
- Hätten wir $k = 22$ unterschritten, könnten wir mit 95% Sicherheit glauben, dass das Programm max. 30% Rückfallrate hat.

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Beispiel 1: Binomialtest (einseitiges Testen)

Festlegung kritischer Wert (Annahme und Ablehnungsbereich der Nullhypothese):



Es ergibt sich:

- Verwerfungsbereich der H_0 von 1-22
- Annahmebereich der H_0 von 23-100
- Unsere Stichprobe ergab 28 Rückfälle
- Dieser Wert liegt im Annahmebereich der H_0
- Test ist nicht signifikant $\rightarrow$ H_0 beibehalten

Interpretation:

- Numerisch weniger Rückfälle als 30%
- ABER: Wir können nicht mit 95% Wahrscheinlichkeit sagen, dass $p < .3$

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY


Macht eines Tests (Teststärke, aka Power)

- $1 - \beta$ = Power
- Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein statistischer Test zugunsten einer H_1 entscheidet, wenn diese gilt (d.h. die H_0 richtigerweise zu verwerfen)
- Die Teststärke hängt von verschiedenen Faktoren ab:
  - Signifikanzniveau α (je kleiner, desto weniger Power)
  - Ein- oder zweiseitige Alternativhypothese (bei einseitiger H_1 höhere Power)
  - Größe des Effekts (des Unterschiedes zwischen Beobachtungs- und Referenzwerts)
  - Streuung der Variable X in der Population (je größer desto weniger Power)
  - Stichprobenumfang n (je größer, desto mehr Power)
  - Verwendeter statistischer Test: je höher der verwendete Informationsgehalt der Daten, umso höher seine Macht

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Statistische Power – Visualisierung



Richtig Negativ (1−α) H_0 korrekt beibehalten (kein Fehler)	**Falsch Negativ (β) – Fehler 2. Art** H_0 beibehalten, obwohl H_1 gilt (β-Fehler, Teststärke↓)	**Falsch Positiv (α) – Fehler 1. Art** H_0 abgelehnt, obwohl H_0 gilt (Signifikanzniveau, α-Fehler)	**p-Wert** Fläche unter H_0 rechts der beobachteten Teststatistik
Power (1−β) H_0 korrekt abgelehnt, H_1 richtig erkannt			

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Statistische Signifikanz und praktische Relevanz

- Mit genügend großem Stichprobenumfang kann man praktisch jede H_0 verwerfen
- Festlegung einer Effektgröße ε (z.B. praktisch relevanter Unterschied) und einer spezifischen H_1
- Muss aufgrund inhaltlicher Überlegungen vor Datenerhebung festgelegt werden (Poweranalyse)
- Vorteil: notwendiger Stichprobenumfang, der bei gegebenem α, gewünschtem $1 - \beta$ und bestimmter Effektgröße eine eindeutige Entscheidung ermöglicht, bestimmbar

Hypothesen und Hypothesentests


CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Kumulierung des α-Fehlers

Führt man mehrere statistische Tests durch, hat man bei jedem dieser Tests das Risiko eines α-Fehlers

Beispiel:

- Jemand führt drei statistische Tests durch um eine Hypothese zu prüfen
- Annahme: Unabhängigkeit der einzelnen Tests
- Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 1 Test fälschlicherweise signifikant wird
  $= 1 - (1 - 0.05)^3 = 0.14$
- 14% Fehlerwahrscheinlichkeit statt 5%



Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Kumulierung des α-Fehlers

Führt man k unabhängige statistische Tests zur überprüfung einer H_0 durch, kommt es zu einer Kumulierung des α-Fehler Risikos

$$\alpha' = 1 - (1 - \alpha)^k$$

Lösung:

- Lässt es sich nicht vermeiden, mehrere statistische Tests zur Prüfung einer Hypothese durchzuführen, muss eine α-Fehler Korrektur vorgenommen werden
- Der Test wird somit strenger (Grenze für signifikantes Ergebnis niedriger)
- α-Fehler Adjustierung nach Bonferroni:

$$\alpha_{adj} = 1 - (1 - \alpha)^{1/k}$$

Beispiel: 3 Tests

$$\alpha_{adj} = 1 - (1 - 0.05)^{1/3} = 0.017$$

Hypothesen und Hypothesentests

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Darstellung des Ergebnisses eines Hypothesentests

- Voraussetzung: Formulierung der H_0 und H_1
- Angabe von α
- Angabe von N
- Angabe des p-Wertes
- Angabe der Teststatistik (+ df wo nötig)
- Teststärke und Effektgröße
- Korrekte Formulierung bei nicht-signifikantem Ergebnis:
  - H_0 wird beibehalten (korrekt)
  - H_0 wurde bewiesen (falsch)
- Falsche Interpretationen:
- "Je kleiner der p-Wert, umso größer der Effekt."
  - Der p-Wert ist keine Effektgröße.
  - Der p-Wert gibt die Wahrscheinlichkeit für das Zutreffen der H_0 an.
  - Der p-Wert ist die $P(beobachtetesErgebnis|H_0)$

Take-aways

- Zur Prüfung der Geltung einer Hypothese (ja/nein) rechnen wir **Signifikanztests**
- **Auswahl des Tests** richtet sich nach der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Testgrößen (Wahrscheinlichkeit, Mittelwerte, Häufigkeiten...)
- Zur Prüfung muss ein Hypothesenpaar aus Nullhypothese und Alternativhypothese aufgestellt werden.
- Je nach Vorwissen können wir Nullhypothese und Alternativhypothese **gerichtet und ungerichtet** formulieren.
- Als Entscheidungskriterium definieren wir einen **kritischen Wert** (oft Wert mit Auftretenswahrscheinlichkeit 5% unter Annahme der Nullhypothese)
- Ist der Test signifikant wird die Nullhypothese **verworfen** und die Alternativhypothese vorläufig angenommen (s.h. Popper)