

Μεταβολική οξέωση

$\text{pH} < 7.40$ και $[\text{HCO}_3^-] < 24 \text{ mEq/L}$

- Που οφείλεται η ΜΟ;
- Σε προσθήκη οξέος ή σε απώλεια HCO_3^- ;
- Χάσμα ανιόντων: $\text{AG} = [\text{Na}^+] - \{[\text{Cl}^-] + [\text{HCO}_3^-]\}$
- $\text{AG} = 140 - (104 + 24) = 12 \text{ mEq/L}$ Φ.Τ. = $12 \pm 2 \text{ mEq/L}$
- $\text{AG} \uparrow \Rightarrow$ Προσθήκη οξέος
- $\text{AG} = \kappa\varphi \Rightarrow$ απώλεια HCO_3^-

Μεταβολική Οξέωση

- Αυξημένο AG
Προσθήκη οξέος

- Γαλακτική
- Διαβητική
- Δηλητηρίαση
- Νεφρική ανεπάρκεια

- Φυσιολογικό AG
Απώλεια HCO_3^-

- Άμεσα (ΓΕΣ, Νεφροί-RTA II)

- Έμμεσα

(νεφρική σωληναριακή οξέωση,

RTA I, III, IV)  κατανάλωση


HCO_3^- για την εξουδετέρωση
οξέος και αδυναμία των νεφρών
να αναγεννήσουν το ιόν αυτό)

Μεταβολική οξέωση $\text{pH} < 7.40$ και $[\text{HCO}_3^-] < 24 \text{ mEq/L}$

Αντιρρόπηση στην μεταβολική οξέωση

- $\downarrow [\text{HCO}_3^-]$ $\downarrow \text{pCO}_2$ (1 προς 1,2)
- Η PCO_2 $\downarrow$ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L $\downarrow$ της $[\text{HCO}_3^-]$
- Αμιγής μεταβολική οξέωση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ

