


Μεταβολική αλκάλωση

pH > 7,4 και $[\text{HCO}_3^-] > 24 \text{ mEq/L}$

Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης



The diagram illustrates the formula for bicarbonate concentration, $[\text{HCO}_3^-]$, and how its components change in metabolic alkalosis. The formula is shown as a fraction: the numerator is "ποσό HCO_3^- στον εξωκυττάριο όγκο" (amount of HCO_3^- in the extracellular volume) and the denominator is "εξωκυττάριο όγκο" (extracellular volume). A large blue arrow points upwards next to the $[\text{HCO}_3^-]$ term, indicating an increase. Another large blue arrow points upwards next to the numerator, indicating an increase. A third large blue arrow points downwards next to the denominator, indicating a decrease.

$$[\text{HCO}_3^-] = \frac{\text{ποσό } \text{HCO}_3^- \text{ στον εξωκυττάριο όγκο}}{\text{εξωκυττάριο όγκο}}$$

Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης:

- Για να διατηρηθεί η μεταβολική αλκάλωση






πρέπει

οι νεφροί να μην αποβάλουν τα
πλεονάζοντα HCO_3^-

Πότε χάνεται η απεκκριτική ικανότητα των νεφρών στα HCO_3^- ;

- Σε μείωση του εξωκυττάριου όγκου = $\downarrow$ GFR, διέγερση άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης- αλδοστερόνης
- Αλδοστερόνη: αυξάνει την έκκριση H^+ στα αθροιστικά σωληνάρια και άρα επαναρροφούνται HCO_3^- στο αίμα
- Σε υποκαλιαιμία = $\downarrow$ GFR (έκκριση αγγειοσυσταστικών ουσιών) και ευόδωση δράσης αλδοστερόνης




Έμετοι-Ρινογαστρικός σωλήνας-Διουρητικά



- Υπομαγνησισαιμία
- Σύνδρομο Bartter
- Μεθυπερκαπνική αλκάλωση

Μεταβολική αλκάλωση $\text{pH} > 7,4$ και $[\text{HCO}_3^-] > 24 \text{ mEq/L}$

Αντιρρόπηση στην μεταβολική αλκάλωση

-  $[\text{HCO}_3^-]$  pCO_2 (1 προς 0,7)
- Για κάθε 1 meq/L  $[\text{HCO}_3^-]$ από το 24 (mEq/L)
αντιστοιχεί 0,7  της pCO_2 από το 40 (mmHg)
- Αμιγής μεταβολική αλκάλωση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ

